



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



2044 106 311 962

Dict.

58.5



Neu entdeckte Pflanzen

i h r e

Charakteristik, Benützung und Behandlung,
hinsichtlich der Standörter, Fortpflanzung
und Vermehrung

v o n

Dr. Friedrich Gottlieb Dietrich,
Großherzogl. Sächs. Rath, Professor der Botanik, Direktor des botanischen
Gartens zu Eisenach und vieler gelehrten Gesellschaften Mitglieds.

Vierter Band.
Fabiana bis Jungermannia.

U l m, 1 8 3 5.
Verlag der J. Ebner'schen Buchhandlung.

Neuer Nachtrag
zum
vollständigen Lexikon
der
Gärtnerei und Botanik

oder
alphabetische Beschreibung
vom Bau, Wartung und Nutzen aller in- und
ausländischen, ökonomischen, officinellen und
zur Zierde dienenden Gewächse

von
Dr. Friedrich Gottlieb Dietrich,
Großherzogl. Sächs. Rath, Professor der Botanik, Direktor des botanischen
Gartens zu Eisenach und vieler gelehrten Gesellschaften Mitgliede.

Vierter Band. 4
Fabiana bis Jungermannia.
oder
des ganzen Werkes 24r Band.

Ulm, 1835.
Verlag der J. Ebner'schen Buchhandlung.

OCT 18 1903

Herbarium

Fabiana Ruiz et Pav. Fl. peruv. 2. p. 12. Fabiana.
Character generic. f. I Nachtrag B. 3. S. 315.

Kelch fünfspaltig, Corolle langröhrig, trichterförmig, der Rand fünfspaltig, gefaltet, zurückgerollt, fünf Staubfäden, davon zwei länger als die übrigen sind. Narbe ausgerandet. Kapsel 2 fächerig, vielsaamig.

Pentandria Monogynia. (Familie der Convolvuleen.)

Diese Gattung ist der Nierembergia zunächst verwandt. Sie führt ihren Namen zu Ehren eines Botanikers Herrn Fabian, Erzbischof von Valenzia, und enthält zwei Arten: *Fabiana imbricata* R. et P. f. I Nachtrag, und folgende

1. *Fabiana thymifolia* Hilar. Thymianblättrige Fabiana.

Stengel staudenstrauchig, drüsig-silzig. Blätter zerstreut stehend, linienförmig, stumpflich, ohne Rippen. Blumen einzeln winkelförmig, gestielt, überhängend.

Waterland Südamerika. Rio Grande. h.

Kultur. Gute lockere Dammerde. Durchwinterung im warmen Hause. Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.

Fabricia Gaertn. Sem. t. 35. Smith. Fabricie.

Kelch fünfspaltig. Fünf Corollenblätter, ohne Nagel. Staubfäden zahlreich, so lang als die Corollenblätter. Kapsel viel-fächerig. Saamen geflügelt.

Icosandria Monogynia (Familie der Myrteen.)

Diese Gattung hat Dr. Gaertner bestimmt und sie Herrn Fabricius zu Ehren Fabricia genannt. Phil. Conr. Fabricius ward 1714 geboren, dann Professor zu Helmstädt. Er schrieb ein Werk: „*Primitiae florae butisbacensis*, Wezlar 1743. 8.“ und starb 1774.

Es sind jetzt nur zwei Arten bekannt, die ich im Lexicon B. 4. S. 127. beschrieben und ihre Behandlung in Gärten angegeben habe.

Dietr. Extr. 2r. Nachtr. IV. Bb.

X

Fabronia Radd. Schwägr. Musc. frond. Suppl.

Diese Laubmoosgattung unterscheidet sich durch acht Zähne, die eingebogen sind, durch die, an der Basis Kapsel (ohne Aufsatz) und durch die seitenständige (Kapselstiel).

Cryptogamia Sect. 11. (Familie der Laubmoose.)

1. *Fabronia Persoonii* Schwägr. J. c. Stengel auf Aeste gleichhoch. Blätter linien-lanzettförmig, steif, ohne Venen, gefranzt-gezägt. Vaterl. Ins. Maskar.
2. *Fab. pussila* Radd. (*Grimmia inconspicua* Bert) Ein kleines kriechendes Moos, dessen Blätter lanzettförmig, feinspizig und ungleich sägezähmig-gewimpert sind. Zähne des Kapselmundes fast aufrecht, wächst in Eutruu
3. *Fab. octoblepharis* Schwägr. (*Hypnum ciliare* Brid) Stengel kriechend. Blätter fast dachziegelförmig übereinander liegend, aufrecht, eiförmig, langgespitzt, sägerant Vaterl. Schweiz.
4. *Fab. polycarpa* Hooker. Stengel kriechend, ästig. Blätter zerstreutstehend, eiförmig, langgespitzt, ganzrandig, allseitig verbreitet. Kapsel kreiselförmig. Neugranada.
5. *Fab. australis* Hook. Stengel kriechend, ästig. Blätter angedrückt-aufrecht, lanzettförmig, fast sägerantig. Kapsel oval. Neuholland.

Fagara Linn. Schreb. gen. pl. Fagare, Sattelbaur f. Eric. B. 4.

Kelch vierspaltig. Corolle vierblättrig. 4–8 Staubfäden. Ein Griffel. Beere einsamig.

Die Arten, welche Thunb. Willd. u. a. unter *Fagara* aufgeführt haben, hat Kurt Sprengel zur Gattung *Amyris* gezogen. Syst. veg. 2. Octandria Monogynia. (Familie der Terebinthaceen.)

1. *Fagara inæqualia* Dietr. (*Amyris inæqualis* Spr.)

Blätter vielpaarig gefiedert. Blattstiele rund, unbewehrt, filzig. Blättchen an der Basis ungleich, eiförmig, gekerbt, glatt, hell punktiert. Blumen in wenigblümigen Trauben, die kürzer als die Blätter sind.

Waterland das südliche Afrika. †

2. *Fag. copallifera* Dietr. (*Amyris* Spr. *Elaphrium copalliferum* Sels.)

Blätter gestielt, gefiedert. Stiele gerändert. Blättchen

eyförmig, gezähnt. Blumen in Trauben, die so lang als die Blätter sind. Blumenstielen gehäuft stehend, sehr kurz. Vaterland Mexico h Blühz. Sommer.

3. *Fag. penicellata* Dietr. (Amyris Spr. Elaphrium penicellatum Sess.)

Blätter gestielt, gefiedert, glattlich. Stiele am Rande mit Barthaaren besetzt. Blättchen länglich, langgespißt, gezähnt. Blumen in wenigblümigen Trauben, die kürzer als die Blätter sind.

Vaterland Mexico. h.

Synonymen.

- | | | |
|--|-----|-------------------------------------|
| <i>Fagara fraxinifolia</i> Lam. | ist | <i>Xanthoxylon tricarpon</i> Michx. |
| — <i>guianensis</i> — — — — — | | <i>hermaphroditum</i> Willd. |
| — <i>heterophylla</i> — — — — — | | <i>heterophyl.</i> Smith. |
| — <i>lenticifolia</i> Willd. f. 1. Nachtr. | | |
| — <i>martinicensis</i> Lam. — — — — — | | <i>Pterota</i> Kunth. |
| | | <i>senegalensis</i> Cand. |
| — <i>monophylla</i> — — — — — | | <i>Ochroxylon</i> — |
| — <i>nitida</i> Roxb. — — — — — | | <i>nitidum</i> — |
| — <i>pentandra</i> Aubl. — — — — — | | <i>hermaphrodita</i> Willd. |
| — <i>pimpinelloides</i> Lam. — — — — — | | <i>pimpinelloides</i> Cand. |
| — <i>piperita</i> Linn. f. Lexic. — — — — — | | <i>piperitum</i> — |
| — <i>piperita</i> Lour. — — — — — | | <i>nitidum</i> — |
| — <i>Pterota</i> Linn. f. Lexic. — — — — — | | <i>Pterota</i> Kunth. |
| — <i>tragodes</i> Jacq. f. Lexic. — — — — — | | <i>tragodes</i> Cand. |
| — <i>xanthoxyloides</i> Lam. f. Lexic. — — — — — | | <i>senegalense</i> — |
- Fagelia* Neck. Cand. ist *Crotalaria bituminosa*, *Glycine bituminosa* Linn.
- Fagelia flavicans* Gmel. ist *Calceolaria pinnata* Linn. f. Lexic.
- Fagonia* Linn. *Fagonie* f. Lexic. B. 4.
- Character generic. f. 1. Nachtrag B. 3. S. 316.

Kelch fünfblättrig, abfallend. Fünf Corollenblätter mit Nägeln versehen; 10 Staubfäden. 1 Griffel. Kapsel rundlich, fünffächerig, fünfsamig.

Decandria Monogynia (Familie der Rutaceen.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines alten Botanikers des Herrn Dr. Guid. Cresc. Fagon, ehemaligem Professor in Paris, der im Jahr 1683 seine Stelle an den berühmten Tournefort abtrat.

† Foliis simplicibus. Blätter einfach.

1. *Fagonia persica* Cand. ist *Fagonia indica* Linn. f. Lexic. B. 4. S. 135. hierzu gehört auch *F. Oliverii* Cand

2. *Fag. Bruguieri* Cand. (*F. mysorensis* Roth.)

Aeste vierkantig. Blätter länglich, feinspizig. Aesterblätter dornig, länger als die Blätter. Blumenstiele sehr kurz. Früchte filzig.

Waterland Ostindien und am Euphrat 2?

†† Foliis ternatis. Blätter dreizählig.

3. *Fag. mollis* Delil. Zottenhaarige Fagonie.

Stengel strauchig, ästig, weitschweifig. Blätter dreizählig. Blättchen eysförmig, mucronenspizig, zottenhaarig. Aesterblätter pfriemenspizig = dornig, horizontal abstehend, fast so lang als die Blätter, Früchte scharfborstig.

Waterl. Aegypten. h Blühz. Frühjahr und Sommer.

4. *Fag. glutinosa* Delil. Klebrige Fagonie (*F. scabra* Forsk.)

Stengel staudenstrauchig, gestreckt, zweitheilig. Blätter dreizählig. Blättchen umgekehrt = eysförmig, mucronenspizig, zottenhaarig, klebrig. Aesterblätter pfriemenspizig, gerade, kürzer als die Blattstiele. Früchte, wie der Stengel klebrig.

Waterland Aegypten. 2 h

5. *Fag. latifolia* Delil. Breitblättrige Fagonie.

Stengel krautartig, behaart. Blätter dreizählig. Die Seitenblättchen spatel-lanzettförmig, das mittlere (Endblättchen) größer, fast kreisrund, mucronenspizig. Aesterblätter pfriemenspizig, abgekürzt.

Waterland Aegypten. ○

Die meisten Arten dieser Gattung empfehlen sich durch Anstand und durch die Gestalt und Farbe der Blumen. Man zieht sie aus Saamen (s. Lexic. B. 4. S. 134.) in warmen Beeten, und vermehrt noch überdies Nr. 3. und 4. durch Stedtlinge.

Synonymen.

- Fagonia hispanica* Linn. ist *Fagonia cret.* var. f. Lex.
 — *indica* N. L. Burm f. — *persica* N. 1.
 — *mysorensis* Roth f. — *Bluguieri* N. 3.
 — *Oliverii* Cand. f. — *persica* N. 1.
 — *scabra* Forsk. f. — *glutinosa* N. 4.

Fagraea Thunberg hat Kurt Sprengel mit *Willughbeia* Scop. (f. Lexic. B. 10.) vereinigt und folgende neue Arten aufgeführt. Syst. Veg. 1. p. 672, IV. curae poster. p. 71.

- Fagraea auriculata* Jackson ist *Willughbeia auriculata* Spr. f. 2 Nachtr.
 — *elliptica* Roxb. f. — *elliptica* 2. —
 — *fragrans* — f. — *fragrans* 2. —
 — *obovata* Wallich. f. — *obovata* 2. —
 — *racemosa* Jack. f. — *racemosa* 2. —
 — *volubilis* Wall. f. — *volubilis* 2. —
 — *zeylanica* Thunb. (f. Lexicon) ist — *zeylanica* Spr.

Fagus Linn. Buche f. Lexicon B. 4.

Blumen monöisch, in rundlichen Köschchen. ♂ Kelch fünfspalstig, von Bracteen unterstützt. Staubfäden zahlreich, 15–20. ♀ Kelch doppelt: äußerer fünfspalstig, zweiblumig, innerer gezähnt, den Fruchtknoten umgebend. Drei Narben. 2–3 Nüsse, in den bleibenden verhärteten Kelch (Kapsel) geschlossen.

Monöcia Polyandria (Familie der Amentaceen; Köschchenbäume.)

I. *Fagus asplenifolia* Dietr. Streifenfarrenblättrige Buche.

Diese Buche habe ich schon im Lexicon B. 4. S. 136. beschrieben. Im Sommer 1827 sah ich im Park zu Wiesbaden und Biberich 6–12 Fuß hohe Bäume, deren junge schlaffe Aeste überhängen. Uebrigens gleicht sie, in Hinsicht auf Wuchs, Anstand und Bildung der Knospen unserer gemeinen Buche (*Fagus sylvatica*), unterscheidet sich aber durch die Blätter. Diese stehen wechselsweise, sind gestielt, länglich-lanzettförmig, fiederspaltig, glatt, 2–2½ Zoll lang. Einschnitte lanzettförmig, gespitzt, feingekerbt, der Endlappen viel länger als die untern, linien-lanzettförmig, fast stichelförmig, die obern Astblätter zuweilen getheilt, schmal, linienförmig, zart gekerbt, fast wellenrandig. Blattstiele und Aestchen flzig-zottenhaarig. Die braunen linienförmigen pfriemenförmigen Ausschlagschuppen (Ramenta) bleiben fast bis

zur völligen Ausbildung der Blätter stehend. Indessen ist diese zierliche Buche doch nur als eine Varietät von unserer gemeinen Buche (*F. sylvatica*) zu betrachten, davon wir noch einige kennen, z. B. die Blutbuche *F. sylv. foliis atro-rubentibus*, dann *F. sylv. pendula*, deren Aeste bis zur Erde herabhängen. Einen großen Baum sah ich auf dem Geisberge bei Wiesbaden. Im 1. Nachtrage B. 3. S. 317. Seite 5 von unten wird *F. asplenifolia* nebst *Myrica banksiæfolia* ausgestrichen.

Fagus Castanea Linn. (f. Lex.) ist *Castanea vesca* Gaertn.

f. 2. Nachtr. B. 2.

— *pumila* — — — — *pumila* Michx.

f. 2. Nachtr. B. 2.

— *Castanea* Lour. ist *Castanea chinensis* Spr. Blätter lanzettförmig, sägerandig, die Serraturen mucronenspizig, an der Basis ganzrandig, unten glatt. Früchte einsamig.

Waterland China und Cochinchina. †

Falcatula falso - trifolium Brot. ist *Trigonella ornithopodioides* Cand.

Falkia Linn. Falkie f. Lexic. B. 4.

Kelch fünfzählig. Corolle trichterförmig, gefaltet. Fünf Staubfäden, in die Corolle eingeschlossen. Zwei Griffel. Vier Schaalsaamen (Karpopsen).

Pentandria Digynia (Familie der Convolvuleen.)

Diese Gattung hat Linn. bestimmt und sie dem Herrn Dr. Falk zu Ehren *Falkia* genannt. Joh. Georg Pet. Falk, geboren in Westgothland, (ein Schüler des alten Linné) war Professor und Direktor des botanischen Gartens zu St. Petersburg und starb nach seiner vollendeten Reise in Kasan 1774?

Es ist jetzt nur eine Art bekannt, nämlich *Falkia repens* Linn. f. Lexic. Stengel staudenstrauchig, braun-grau, glatt, liegend, wurzelnd. Blätter herzförmig, stumpf, glatt. Blumenstiele einzeln stehend, fadenförmig. Corolle incarnatroth-weißlich. Kap. d. g. Hoffn. (Abbild. Andrews Reposit. t. 257.)

Farsetia Turr. Cand. Farsetie.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 317.

Kelch und Corolle vierblättrig. Schötchen elliptisch, viel-samig, mit dem kurzen bleibenden Griffel gekrönt. Klappen flach. Saamen zusammen gedrückt, geflügelt.

Tetradynamia siliculosa (Familie der Kreuzblumen.)

† *Fruticosæ*. Stengel strauchig oder staudenstrauchig.

1. *Farsetia eriocarpa* Cand. Wollfrüchtige Farsetie.

Stengel strauchig. Blätter länglich, sternhaarig = filzig. Schötchen dicht, seidenhaarig, wollig. Vaterland die Insel Cypern. h

2. *Fars. triquetra* Cand. Dreiseitige Farsetie.

Stengel strauchig. Aeste dreiseitig, an der Basis gestreckt, Wurzelblätter länglich-deltaförmig. Stengelblätter gestielt, länglich = umgekehrt, eiförmig, grau = filzig. Staubfäden ohne Bähne. Schötchen elliptisch, sternhaarig = filzig. Griffel lang, abfallend.

Waterl. Dalmatien an Bergen h (Abbild. Portenschlag Enum. pl. Dalm. t. 10. f. 1.)

3. *Fars. obliqua* Spr. Schieffrüchtige Farsetie.

Alyssum obliquum Smith. *Berteroa* Cand.

Blätter fast linienförmig, wellenrandig, grau. Corollenblätter gespalten. Schötchen schief, elliptisch, sternhaarig = filzig, grau.

Waterland Neapel und Sicilien. h

4. *Fars. orbiculata* Spr. Rundfrüchtige Farsetie.

Alyssum orbiculatum Urv. *Berteroa* Cand.

Blätter grau. Wurzelblätter länglich, buchtig. Stengelblätter lanzettförmig, ganzrandig. Blumen sehr klein. Schötchen fast kreisrund, mit dem fadenförmigen Griffel gekrönt.

Waterland. Macedonien. 4 h

5. *Fars. peruviana* Spr. Peruvianische Farsetie.

Berteroa Cand. f. 2. Nachtrag B. 1. S. 529.

Stengel staudenstrauchig. Blätter oval-länglich, an beiden Enden verdünnt, sternhaarig = filzig. Blumenstielen mit Bracteen besetzt. Corollenblätter umgekehrt-eiförmig. Staubfäden ohne Bähne. Schötchen länglich = umgekehrt = eiförmig, scharf.

Waterland Peru. h 4

+ + Herbaceae. Stengel krautartig.

6. *Fars. parviflora* Spr. Kleinblumige Farsetie.

Lunaria parviflora Delil. *Savignia* Cand.

Stengel krautartig. Blätter glatt, untere länglich = umgekehrt, eiförmig, gekerbt, obere linienförmig. Schötchen doldentraubig, lang gestielt, glatt.

Waterland Aegypten, an Bergen 4?

7. *Fars. lybica* Spr. (*Lunaria lybica* viv. Königa R. Brown.)

Stengel krautartig. Blätter fast spatel-linienförmig, ganzrandig. Schötchen doldentraubig, feinborstig.

Waterland das nördliche Afrika. ☉?

8. *Fars. incana* R. Br. ist *Alyssum incanum* Linn. f. Lexic. *Draba cheiranthifolia* Lam. *Monichia incana* Roth. *Berteroa* Cand.

Synonymen.

Farsetia aegyptiaca Turr. ist *Cheiranthus Farsetia* Linn. f. Lexic. B. 3.

Farsetia cheiranthoides R. Br. ist *Cheiranthus Farsetia* Linn.

Farsetia linifolia Andr. ist *Alyssum linifolium* et *illyricum* Willd. f. Lexic.

Farsetia pinnata Desv. ist *Peltaria capensis* Linn. Suppl. *Lunaria* Thunb. *Aubrietia lepidioides* Spr.

Farsetia suffruticosa Cand. ist *Lunaria suffruticosa* Vent. f. Lexic.

Die übrigen hierher gehörenden Synonymen f. I. Nachtrag B. 3. S. 318.

Favolus hirtus P. Br. ist *Boletus favus* Linn.

Favolus tenuiculus P. Br. ist *Boletus tenuiculus* Spr.

Feaea Spr. Anthod. polyphyllum duplici serie. Recept. paleaceum, paleis centralibus setiformibus. Flosculi ♀ radiales antheris abortientibus. Papp. aristulis s. setis coronatus Syst. Veg. p. 362.

Blüthendecke (Kelch) vielblättrig, doppeltreihig. Fruchtknoten mit Spreublättchen besetzt; die in der Mitte stehenden Spreublättchen sind linienborstenförmig. Scheibenblümchen röhrig, hermaphroditisch. Randblümchen zahlreich, zungenförmig, weiblich, mit unfruchtbaren Antheren. Schaaksaameutig, mit kleinen Grannen oder Borsten gekrönt

Syngenesia Ordn. 2. (Familie der Compositae.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines Apothekers in Paris, des Herrn A. L. A. Fée, der ein schätzbares Werk über exotische officinelle kryptogamische Gewächse herausgegeben hat: „Essai sur les cryptogames des écorces exotiques officinales.“ Paris 1824—1826. 4.

Hierher gehört auch *Selloa* Kunth, die ich, da wir schon eine *Selloa* Roth haben, *Tittmannia* nennen wollte, aber Reichenbach hat schon, ehe mein letzter Band 1. Nachtrag er-

sien, eine *Tittmannia* aufgestellt, daher kann das Synonym: *Sellowia* s. *Tittmannia* im 1. Nachtrage B. 8. S. 37. ausgestrichen werden.

Die neue Gattung *Feæa* enthält jetzt nur folgende zwei Arten:

1. *Feæa plantaginea* Spr. Merikanische Feæa.

Selloa plantaginea Kunth. in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. IV. p. 266. t. 395.

Stengel krautartig, aufrecht, schaftförmig, 1—3 blumig. Wurzelblätter länglich, stumpf, ausgeschweift, fast gezähnt, dreirippig, glatt. Stengelblätter linienförmig. Blume gelb.

Waterland Mexico an Bergen. ☉ Blühz. August. Septbr.

2. *Feæa linearis* Spr. Linienförmige Feæa.

Die Wurzel treibt Ausläufer (Sprossen), welche sich ausbreiten. Stengel krautartig, einblumig, blättrig, aufrecht. Blätter gegenüberstehend, gestielt spatel-linienförmig, stumpf, ohne Rippen, glatt, ganzrandig.

Waterland Monte Video. 2?

Beide Arten zieht man aus Saamen in warmen Beeten.

Fedia Moench. Schmalzkrant. (Valerian Spec. Linn. Valerianella Alb. Dietr. in Willd. Spec. pl. Tom. I. Sect. 11.)

Character generic. s. 1. Nachtr. B. 3. S. 313.

Kelch auf dem Fruchtknoten, fünfzählig, stehen bleibend. Corolle röhrig, fünfspaltig. Staubfäden 3. Kapsel dreifächerig, mit dem Kelche gekrönt. Zwei Fächer sind gewöhnlich ohne Saamen (fehlschlagend).

Triandria Monogynia (Familie der Valerianaceen).

Die Arten dieser Gattung sind krautartige Pflanzen, deren Stengel meist sich gabelförmig theilen. Blätter gegenüberstehend, ungetheilt oder fiederspaltig. Blumen winkels- und gipfelständig, meist stiellos, in Köpfchen gesammelt, selten ährenständig. Corollen weiß, roth, zuweilen gelb. Die meisten wachsen in Europa, an Bergen, in Feldern u. a. D.

1. *Fedia auriculata* Cand. Gedährtes Schmalzkrant.

Stengel krautartig, scharf oder glattlich. Blätter gegenüberstehend, untere länglich, stumpf, obere gespißt, an beiden Seiten mit 2—3 Zähnen versehen. Blumen doldens- kopfförmig. Bracteen linienförmig, glattrandig. Kapsel glatt, un- deutlich gefurcht, mit den Kelchzähnen gekrönt, davon einer röhrförmig ist.

Waterland Frankreich und Deutschland an Aedern. ☉

2. *Fedia truncata* Reichenb. Abgestuftes Schmalzkraut.
Stengel krautartig, aufrecht. Blätter glatt, länglich.
Kapsel hinten mit zwei Rippen und kugelförmigen Anhängen versehen, die an der Spitze schief abgestuft sind.
Waterland: Creta. ○?
3. *Fedia costata* Stev. Geripptes Schmalzkraut.
Stengel und Blätter glatt. Blumen dolden = kopfförmig.
Bracteen länglich, stumpflich. Kapsel rundlich, zusammengesdrückt, sehr stumpf, glatt, an beiden Seiten mit zwei tiefen Furchen versehen.
Waterland: Laurien, auf Aedern und an Bergen. ○?
4. *Fedia turgida* Stev. Angeschwollenes Schmalzkraut.
Bracteen länglich, stumpflich. Kapsel angeschwollen (aufgetrieben), fast halbkugelig, sehr stumpf, dreiknöpfig, concav, glatt. Waterl. Laurien. ○
5. *Fedia carinata* Roem. et Schult.
Stengel rund, glatt, zweitheilig. Blätter länglich, stumpf, ganzrandig. Blumen fast kopfförmig. Bracteen länglich, stumpflich, knorplich-gezähnt. Kapsel nackt, glatt, rinnigkeelförmig, verlängert.
Waterland: Laurien und Frankreich, auf Aedern bei Paris.
Auch in Deutschland z. B. in Thüringen. ○
6. *Fedia tridentata* Stev. Dreizähniges Schmalzkraut.
Stengel krautartig, zweitheilig. Blätter liniensförmig, ganzrandig. Bracteen lanzettförmig, filzig. Kapsel halbkugelig, glatt, an der Spitze dreizähnig.
Waterl. Laurien, Kaukasus und Frankreich, auf Aedern. ○
7. *Fedia minuta* Vahl. (*Valerianella microcarpa* Lois.)
Bracteen lanzettförmig, filzig. Kapsel klein, eiförmig, zottenhaarig, an der Spitze gerandet, mit drei ungleichen Zähnen versehen.
Waterl. Laurien, Kaukasus.
8. *Fedia eriocarpa* Desv. Borstig = fruchtiges Schmalzkraut.
Valeriana eriocarpa Journ. de Bot. 11. p. 314. t. XI.
Stengel krautartig, eckig. Aeste ausgesperret. Blätter ungetheilt, scharfrandig: untere spatelförmig, obere liniensförmig. Blumen dolden = kopfförmig. Bracteen pfriemenspizig, knorplich-gezähnt. Kapsel eiförmig, eckig, scharfborstig, zur Zeit der Reife braun. *Fedia rugulosa* Spr. f. 1, Nachtr. B. 3.

6. 323. gehört hierher, auch *Fed. muricata* R. et Schult.? Vaterl. Frankreich und Griechenland. ☉

9. *Fedia acaulis* Stev. Stengelloses Schmalzfrant.

Valeriana exscapa Stev. *Fedia exscapa* R. et Schult.

Wurzelblätter zungenförmig, glatt, grau- oder bläulich-grün. Stengel fehlt. Blumenwurzel ständig. Kapsel umgekehrt-eiförmig, gerippt, an der Spitze fünfzählig.

Vaterl. Armenien. ☉

10. *Fedia platyloba* R. et Schult (*Valerianella platyloba* Dii. Fresn. Hist. des Valerian. t. 3.)

Stengel glatt. Die untern Blätter breit-länglich, obere linienförmig. Kapsel zottenhaarig, mit dem sechsblappigen Kelche gekrönt.

11. *Fedia chenopodifolia* Pursh. Gänsefußblättriges Schmalzfrant.

Stengel frantartig, zweitheilig. Blätter eiförmig, gespißt, unten gezähnt. Blumen in nackten, ausgesperrt-zweitheiligen Ästern. Staubfäden lang.

Vaterl. Virginien. ☉

12. *Fedia chaerophylloides* Kunth in Journ. de botan. 4. p. 173. ist *Boerhaavia chaerophylloides* Vahl. Willd. Sp. pl. f. Lexic. B. I. 6. 252.

Die übrigen Arten, welche der Gattung *Fedia* angehören, habe ich im 1. Nachtrage B. 3. angezeigt. Man zieht sie aus Saamen, der in botanischen Gärten an der bestimmten Stelle im freien Lande ausgesäet wird; dann pflanzen sich einige europäische Arten durch den ausfallenden Saamen selbst fort.

Synonymen.

Fedia chaerophylloides Kunth ist *Boerhaavia chaerophylloides* Vahl. f. Lexic. B. 1.

Fedia dasycarpa M. a. B. ist *Fedia dentata* 1. Nachtr.

Fedia exscapa R. et Sch. f. *Fedia acaulis* N. 9.

Fedia hamata Bast. ist *Fedia uncinata* M. a. B. Willd. f. 1. Nachtr.

Fedia Morisoni Spr. ist *Fedia dentata* Vahl var.

Fedia rugulosa Spr. f. *Fed. eriocarpa* N. 2.

Fedia rupestris Vahl f. 1. Nachtr. ist *Patrinea rupestris* Juss.

Fedia sibirica Vahl f. 1. Nachtr. ist *Patrinea sibirica* Juss.

Fedia villosa Vahl ist *Patrinea villosa* Juss.

Feea nana Bory. ist *Trichomanes botryoides* Kaulf.

— *polypodina* ist *Trichomanes spicatum* Hedw.

Fegatella officinalis Rodd. ist *Marchantia conica* Linn.

Ferdinanda Lagasc. *Ferdinande*.

Blüthendecke (Kelch) ziegelschuppig. Fruchtboden kegelförmig, mit Spreublättern besetzt. Die Saamen auf der Scheibe nackt, ohne Krone, die am Rande mit kurzen Spreublättern gekrönt.

Syngenesia 2. Ord. (Familie Compositae) (Radiatae)

1. *Ferdinanda augusta* Lag. Stengel strauchig. Blätter unten silberfarbig, die obersten, neben den Blumen stehenden, ganzrandig, gefärbt.

Waterl. Neu-Spanien. h

2. *Ferd. eminens* Lag. Stengel strauchig, oben scharf, unten sitzig. Blattstiele geflügelt. Neu-Spanien. h

Fereira parasitica Vand ist *Hillia longiflora* Swartz.

Fernandezia Ruiz et Pav. f. 1. Nachtr. B. 3. daselbst lese man *Fernandezia* statt *Pernadesia*.

Fernelia buxifolia Lamarck ist *Coccocypselum buxifolium* Spr.

Fernelia obovata Lamarck ist *Coccocypselum uniflorum* Willd.

Feronia Corr. Elephantenapfel.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 327.

Blumen polygamisch. Kelch fünfspaltig. Fünf Corollenblätter. Staubfäden an der Basis ausgebreitet, in fleischigem Boden stehend. Narbe fünfkappig. Apfelfrucht fünffächerig, die Fächer einsamig.

Decandria Monogynia. (Familie Aurantien, Pomeranzengrüchte.)

1. *Feronia Elephantum* Roxb. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 328.

2. *Feron. pellucida* Roth. Elephantenapfel.

Stamm baumartig. Blätter gefiedert. Blättchen durchscheinend-punktiert. Die gemeinschaftlichen Blattstiele rund, sitzig. Waterl. und Kultur wie N. 1. f. 1. Nachtrag.

Ferraria Linn. *Ferrarie* f. Lexic. B. 4

Character generic. f. 1. Nachtrag B. 3. S. 323.

Scheide 2—3 blättrig. Corolle sechstheilig, fast regelmässig. Die Theile wellenrandig; die drei innern schmaler als die äussern. Staubfäden 3, verbunden. Ein Griffel mit drei pinselförmigen Narben. Kapsel dreifächerig.

Triandria Monogynia (Familie der Coronarien).

Diese schöne Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines Jesuiten, Joh. Bapt. Ferrari aus Siena. Er war 1584 geboren, hat alle schöne Pflanzen, welche damals die römischen Gärten zierten, abbilden lassen, die in einem Werke: „de floribus naturae Rom 1633 erschienen, und starb 1655.

Die hierher gehörenden Arten: *Ferr. undulata* Linn. *F. Ferrariola* Thunb. f. Lexic. und Synonymen I. Nachtr. B. 3. S. 329. die folgende ist neu und von Link bestimmt.

1. *Ferraria pusilla* Link et Otto Icon. pl. select. p. 125. t. 59. Kleine *Ferrarie*.

Blätter so lang als der Schaft, linienförmig, tiefgefurcht: edig. Blumen zu drei, büschelförmig stehend. Scheide 2—3 blättrig, grün, die Blätter lanzettförmig, gespitzt. Blumenstielchen 8—10 Linien lang, von den Scheiden bedeckt. Corolle sechstheilig, die äussern Theile zurückgeschlagen, 1 Zoll lang, gelb, an der Basis purpurroth gefleckt; die drei innern Theile aufrecht, nicht gefleckt, (einfarbig), gelb, an der Basis rinnig, an der Spitze gerundet. Staubfäden purpurroth, oben ausgebreitet (flach) Antheren seitenständig. Griffel so lang als die Staubfäden. Fruchtknoten 2—3 Linien lang, rund, länglich. Vaterl. das südliche Brasilien (Porto alegre). 4

Ferreola buxifolia Roxb. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 329. ist *Maba buxifolia* Pers.

Ferula Linn. Stedentraut, Sedentraut. f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 330.

Früchte länglich, zusammengedrückt, flach, am Rande verbitt, auf dem Rücken mit drei stumpfen Rippen versehen. Die Hülsen variiren.

Pentandria Digynia (Familie der Doldenpflanzen.)

1. *Ferula sylvatica* Bess. Waldliebendes Stedentraut.

Wurzelblätter vielfach: zusammengesetzt. Blättchen borstenförmig: feinspitzig, untere abgekürzt, mit Anhängen versehen.

Stengel aufrecht, mehr oder weniger ästig. Vaterl. Pοδο-
lien in Wäldern.

2. *Ferula campestris* Bess. Feldliebendes Stedenkraut.

Wurzelblätter vielfach-zusammengesetzt. Blättchen lang, li-
nienförmig, knorplich-gezähnt. Die Anhänge kreuzend.
Vaterland Laurien auf Feldern.

3. *Fer. laevigata* Spr. ist *Bubon laevigatum* Ait. f. Le-
xicon B. 2.

4. *Fer. nudicaulis* Spr. Nacktstengeliches Stedenkraut.

Stengel rund, dreitheilig, fast blattlos. Blätter gefiedert,
lanzettförmig. Blättchen stiellos, fiederspaltig, die Lappchen
eingeschnitten. Die Blättchen beider Hüllen lanzettförmig.
Vaterl. Sicilien. 4 Blühz. Sommer.

5. *Fer. Opoponax* Spr. Hierher gehört *Laserpitium Chiro-*
anium et *Pastinaca Opoponax* Linn. f. Lexic. B. 5.
und 6.

6. *Fer. obtusifolia* Spr. Stumpfblättriges Stedenkraut.
Peucedanum obtusifolium Smith.

Stengel rund, gestreift. Blätter dreizählig, doppelt, fies-
derspaltig. Blättchen umgekehrt-eyförmig, ganzrandig, leder-
artig, grau- oder blaulichgrün. Der gemeinschaftliche Blatt-
stiel an der Basis scheidenartig. Blumen ockerweißlich, in
gipfelfständiger Dolde. Hülle wenigblättrig, abgekürzt. Frucht
oval, abgekürzt. Vaterl. Kleinasien und Griechenland. 4

7. *Fer. thyrsiflora* Smith. Straußblüthiges Stedenkraut.

Stengel rund, ästig, 1—2 Fuß hoch. Aeste quirlförmig
stehend, gleichhoch. Blätter vielfach zusammengesetzt. Blätt-
chen linienförmig, blaulichgrün, mucronenspitig, 2—3 Zoll
lang. Blumen klein, in 9—15 strahligen, ungleichen fast
straußförmigen Dolden. Hüllen wenigblättrig. Corollenblätter
außwendig weiß, inwendig ockergelblich. Vaterl. Creta an
Felsen. 4

8. *Fer. villosa* Walt. Zottenhaariges Stedenkraut.

Cicuta veneata Nuttall. gen. Amer. pl. I. p. 183.

Stengel, Blumenstiele und Dolden zottenhaarig. Blätter
dreizählig=vielfach, zusammengesetzt. Blättchen eyförmig, sä-
gerandig, steif, geadert, Blumen weiß. Vaterl. Nordameri-
ka auf sonnigen Hügeln. 4

9. *Fer. stricta* Spr. Schraffes Stedenkraut.

Stengel aufrecht, straff, steif, gefurcht. Blätter dreizäh-

jählig = vielfach = zusammengesetzt, straff. Blättchen dreizählig, dreiseitig, glatt. Hüllblätter länglich = eiförmig. Vaterland: das Kay d. g. Hoffnung. 4?

10. *Fer. nuda* Spr. Nacktes (hüllenloses) Stedentkraut.

Stengel rund, gestreift, ästig, glatt. Aeste abstehend. Blätter dreizählig-doppelt, fiederspaltig. Einschnitte stumpf, fast dreizählig. Blattstiele rundlich, wie die Blätter blaulichgrün, an der Basis scheidenartig, breit, fingerförmig-dreitheilig. Dolden zahlreich, ohne Hüllen. Corollen gelb. (Abbild. Spr. Umb. Spec. t. VII. f. 15.) Vaterland: Sibirien. 4 Blühz. Sommer.

11. *Fer. caspica* M. a. Bieb. Fl. Taur. Cauc. 1. p. 220. Spr. J. c. t. 7. f. 14.. *Fer. cachryoides* Fischer.

Stengel rund, gestreift, ästig, glatt, 1—2 Fuß hoch. Blätter doppelt dreizählig. Blättchen fiederspaltig. Lappchen kurz, mucronenspitzig. Blattstiele an der Basis mit Scheiden versehen, rundlich, glatt. Dolden zahlreich, gipfelständig, 5—10 strahlig. Hüllen meist fehlend. Blumen gelb. Vaterland: Taurien, Kaukasus. 4?

12. *Fer. longifolia* Fischer. Langblättriges Stedentkraut.

Fer. peucedanifolia Willd. herb. F. *tartarica* Fisch.

Stengel niedrig, rund, steif, glatt, weißlich, oben blattlos, nur Scheiden tragend. Blätter dreizählig, blaulichgrün. Blättchen linien-lanzettförmig, $1\frac{1}{2}$ Zoll lang, 2—3 Linien breit, steif, am Rande zurückgerollt, fast zu 3 stehend. Dolden gipfelständig, gestielt, fast sechsstrahlig. Hüllen meist fehlend. Blumen gelb. Früchte länglich, am Rande sehr aufgetrieben. Vaterl. am caspischen Meere und am Kaukasus.

13. *Fer. capillaris* Link. Haarförmiges Stedentkraut.

Stengel rund, gestreift, glatt. Blätter dreifach-dreizählig. Blättchen faden-haarförmig, schlaff. Blattstiele fast ohne Scheiden. Dolden winkelförmig. Hüllen wenigblättrig, borstenförmig. Corollen gelb. Vaterl. Portugal. 4? Blühz. Sommer.

14. *Fer. brevifolia* Link. Kurzblättriges Stedentkraut.

Stengel rund, glatt. Blätter vielfach = zusammengesetzt. Blättchen linien-rinnenförmig, ausgesperret, wellend, feinspitzig, verlängert. Dolden stiellos. Hüllen fast fehlend. Vaterland: Portugal.

Synonymen.

Ferula cachryoides Fischer f. *Ferula caspica* N. 11.

2. *Fedia truncata* Reichenb. Abgestuftes Schmalzkraut.
Stengel krautartig, aufrecht. Blätter glatt, länglich. Kapsel hinten mit zwei Rippen und kugelförmigen Anhängen versehen, die an der Spitze schief abgestuft sind.
Waterland: Creta. ☉?
3. *Fedia costata* Stev. Geripptes Schmalzkraut.
Stengel und Blätter glatt. Blumen dolden- kopfförmig. Bracteen länglich, stumpflich. Kapsel rundlich, zusammenge- drückt, sehr stumpf, glatt, an beiden Seiten mit zwei tiefen Furchen versehen.
Waterland: Laurien, auf Aedern und an Bergen. ☉?
4. *Fedia turgida* Stev. Angeschwollenes Schmalzkraut.
Bracteen länglich, stumpflich. Kapsel angeschwollen (auf- getrieben), fast halbkugelig, sehr stumpf, dreiknöpfig, concav, glatt. Waterl. Laurien. ☉
5. *Fedia carinata* Roem. et Schult.
Stengel rund, glatt, zweitheilig. Blätter länglich, stumpf, ganzrandig. Blumen fast kopfförmig. Bracteen länglich, stumpflich, knorplich-gezähnt. Kapsel nackt, glatt, rinnig- kielförmig, verlängert.
Waterland: Laurien und Frankreich, auf Aedern bei Paris. Auch in Deutschland z. B. in Thüringen. ☉
6. *Fedia tridentata* Stev. Dreizähniges Schmalzkraut.
Stengel krautartig, zweitheilig. Blätter linienförmig, ganzrandig. Bracteen lanzettförmig, filzig. Kapsel halbkugelig, glatt, an der Spitze dreizählig.
Waterl. Laurien, Kaukasus und Frankreich, auf Aedern. ☉
7. *Fedia minuta* Vahl. (*Valerianella microcarpa* Lois.)
Bracteen lanzettförmig, filzig. Kapsel klein, eiförmig, zottenhaarig, an der Spitze geraubet, mit drei ungleichen Zähnen versehen.
Waterl. Laurien, Kaukasus.
8. *Fedia eriocarpa* Desv. Borstig-früchtiges Schmalzkraut.
Valeriana eriocarpa Journ. de Bot. 11. p. 314. t. XI.
Stengel krautartig, eckig. Aeste ausgesperrt. Blätter un- getheilt, scharfrandig: untere spatelförmig, obere linienförmig. Blumen dolden- kopfförmig. Bracteen pfriemenspizig, knorp- lich-gezähnt. Kapsel eiförmig, eckig, scharfborstig, zur Zeit der Reife braun. *Fedia rugulosa* Spr. f. 1, Nachtr. B. 3.

6. 323. gehört hierher, auch *Fed. muricata* R. et Schult.? Waterl. Frankreich und Griechenland. ☉

9. *Fedia acaulis* Stev. Stengelloses Schmalzfrant.

Valeriana exscapa Stev. *Fedia exscapa* R. et Schult.

Wurzelblätter zungenförmig, glatt, grau- oder bläulich-grün. Stengel fehlt. Blumenwurzel ständig. Kapsel umgekehrt-eiförmig, gerippt, an der Spitze fünfkahnig.

Waterl. Armenien. ☉

10. *Fedia platyloba* R. et Schult (*Valerianella platyloba* Dii. Fresn. Hist. des Valerian. t. 3.)

Stengel glatt. Die untern Blätter breit-länglich, obere linienförmig. Kapsel zottenhaarig, mit dem sechsblappigen Kelche gekrönt.

11. *Fedia chenopodifolia* Pursh. Gänsefußblättriges Schmalzfrant.

Stengel frantartig, zweitheilig. Blätter eiförmig, gespißt, unten gezähnt. Blumen in nackten, ausgesperrt-zweitheiligen Ästern. Staubfäden lang.

Waterl. Virginien. ☉

12. *Fedia chaerophylloides* Kunth in Journ. de botan.

4. p. 173. ist *Boerhaavia chaerophylloides* Vahl. Willd. Sp. pl. f. Lexic. B. I. 6. 252.

Die übrigen Arten, welche der Gattung *Fedia* angehören, habe ich im 1. Nachtrage B. 3. angezeigt. Man zieht sie aus Saamen, der in botanischen Gärten an der bestimmten Stelle im freien Lande ausgesät wird; dann pflanzen sich einige europäische Arten durch den ausfallenden Saamen selbst fort.

Synonymen.

Fedia chaerophylloides Kunth ist *Boerhaavia chaerophylloides* Vahl. f. Lexic. B. 1.

Fedia dasycarpa M. a. B. ist *Fedia dentata* 1. Nachtr.

Fedia exscapa R. et Sch. f. *Fedia acaulis* N. 9.

Fedia hamata Bast. ist *Fedia uncinata* M. a. B. Willd. f. 1. Nachtr.

Fedia Morisoni Spr. ist *Fedia dentata* Vahl var.

Fedia rugulosa Spr. f. *Fed. eriocarpa* N. 9.

Fedia rupestris Vahl f. 1. Nachtr. ist *Patrinea rupestris* Juss.

Fedia sibirica Vahl f. 1. Nachtr. ist *Patrinea sibirica* Juss.

Fedia villosa Vahl ist *Patrinea villosa* Juss.

Feea nana Bory. ist *Trichomanes botryoides* Kaulf.

— *polypodina* ist *Trichomanes spicatum* Hedw.

Fegatella officinalis Rodd. ist *Marchantia conica* Linn.

Ferdinanda Lagasc. Ferdinande.

Blüthendecke (Kelch) ziegelschuppig. Fruchtboden kegelförmig, mit Spreublättern besetzt. Die Saamen auf der Scheibe nackt, ohne Krone, die am Rande mit kurzen Spreublättchen gekrönt.

Syngenesia 2. Ord. (Familie Compositae) (Radiatae)

1. *Ferdinanda augusta* Lag. Stengel strauchig. Blätter unten silberfarbig, die obersten, neben den Blumen stehenden, ganzrandig, gefärbt.

Waterl. Neu-Spanien. h

2. *Ferd. eminens* Lag. Stengel strauchig, oben scharf, unten flügelig. Blattstiele geflügelt. Neu-Spanien. h

Fereira parasitica Vand ist *Hillia longiflora* Swartz.

Fernandezia Ruiz et Pav. f. 1. Nachtr. B. 3. daselbst lese man *Fernandezia* statt *Fernadesia*.

Fernelia buxifolia Lamarck ist *Coccocypselum buxifolium* Spr.

Fernelia obovata Lamarck ist *Coccocypselum uniflorum* Willd.

Feronia Corr. Elephantenapfel.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 327.

Blumen polygamisch. Kelch fünfspaltig. Fünf Corollenblätter. Staubfäden an der Basis ausgebreitet, in fleischigem Boden stehend. Narbe fünfkappig. Apfelsfrucht küssfächerig, die Fächer einsamig.

Decandria Monogynia. (Familie Aurantien, Pomeranzfrüchte.)

1. *Feronia Elephantum* Roxb. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 328.

2. *Feron. pellucida* Roth. Elephantenapfel.

Stamm baumartig. Blätter gefiedert. Blättchen durchscheinend-punktirt. Die gemeinschaftlichen Blattstiele rund, flügelig. Waterl. und Kultur wie N. 1. f. 1. Nachtrag.

Ferraria Linn. *Ferrarie* f. Lexic. B. 4

Character generic. f. 1. Nachtrag B. 3. S. 323.

Scheide 2—3 blättrig. Corolle sechstheilig, fast regelmäsig. Die Theile wellenrandig; die drei innern schmaler als die äußern. Staubfäden 3, verbunden. Ein Griffel mit drei pinselförmigen Narben. Kapsel dreifächerig.

Triandria Monogynia (Familie der Coronarien).

Diese schöne Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines Jesuiten, Joh. Bapt. Ferrari aus Siena. Er war 1584 geboren, hat alle schöne Pflanzen, welche damals die römischen Gärten zierten, abbilden lassen, die in einem Werke: „de floribus natura Rom 1633 erschienen, und starb 1655.

Die hierher gehörenden Arten: *Ferr. undulata* Linn. *F. Ferrariola* Thunb. f. Lexic. und Synonymen I. Nachtr. B. 3. S. 329. die folgende ist neu und von Link bestimmt.

1. *Ferraria pusilla* Link et Otto Jcon. pl. select. p. 125. t. 59. Kleine *Ferrarie*.

Blätter so lang als der Schaft, linienförmig, tiefgefurcht-edig. Blumen zu drei, büschelförmig stehend. Scheide 2—3 blättrig, grün, die Blätter lanzettförmig, gespitzt. Blumenstielchen 8—10 Linien lang, von den Scheiden bedeckt. Corolle sechstheilig, die äußern Theile zurückgeschlagen, 1 Zoll lang, gelb, an der Basis purpurroth gefleckt; die drei innern Theile aufrecht, nicht gefleckt, (einfarbig), gelb, an der Basis rinnig, an der Spitze gerundet. Staubfäden purpurroth, oben ausgebreitet (flach) Antheren seitenständig. Griffel so lang als die Staubfäden. Fruchtknoten 2—3 Linien lang, rund, länglich. Vaterl. das südliche Brasilien (Porto alegre). 24

Ferreola buxifolia Roxb. f. I. Nachtr. B. 3. S. 329. ist *Maba buxifolia* Pers.

Ferula Linn. Steckenkraut, Sedenkraut. f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 330.

Früchte länglich, zusammengebrückt, flach, am Rande verbißt, auf dem Rücken mit drei stumpfen Rippen versehen. Die Hüllen variiren.

Pentandria Digynia (Familie der Doldenpflanzen.)

1. *Ferula sylvatica* Bess. Waldliebendes Steckenkraut.

Wurzelblätter vielfach-zusammengesetzt. Blättchen borstförmig-feinspizig, untere abgefürzt, mit Anhängen versehen.

Stengel aufrecht, mehr oder weniger ästig. Vaterl. Pοδο-
lien in Wäldern.

2. *Ferula campestris* Bess. Feldliebendes Stedenkraut.

Wurzelblätter vielfach-zusammengesetzt. Blättchen lang, li-
nienförmig, knorplich-gezähnt. Die Anhänge kreuzend.
Waterland Laurien auf Feldern.

3. *Fer. laevigata* Spr. ist *Bubon laevigatum* Ait. f. *Lexicon* B. 2.

4. *Fer. nudicaulis* Spr. Nacktstengeliches Stedenkraut.

Stengel rund, dreitheilig, fast blattlos. Blätter gefiedert,
lanzettförmig. Blättchen stiellos, fiederspaltig, die Lappchen
eingeschnitten. Die Blättchen beider Hüllen lanzettförmig.
Waterl. Sicilien. 24 Blühz. Sommer.

5. *Fer. Opoponax* Spr. Hierher gehört *Laserpitium Chiro-*
nium et *Pastinaca Opoponax* Linn. f. *Lexic.* B. 5.
und 6.

6. *Fer. obtusifolia* Spr. Stumpfblättriges Stedenkraut.

Peucedanum obtusifolium Smith.

Stengel rund, gestreift. Blätter dreizählig, doppelt, fle-
derspaltig. Blättchen umgekehrt-eyförmig, ganzrandig, leder-
artig, grau- oder blaulichgrün. Der gemeinschaftliche Blatt-
stiel an der Basis scheidenartig. Blumen ocherweißlich, in
gipfelfständiger Dolde. Hülle wenigblättrig, abgekürzt. Frucht
oval, abgekürzt. Waterl. Kleinasien und Griechenland. 24

7. *Fer. thyrsiflora* Smith. Straußblüthiges Stedenkraut.

Stengel rund, ästig, 1—2 Fuß hoch. Aeste quirlförmig
stehend, gleichhoch. Blätter vielfach zusammengesetzt. Blätt-
chen linienförmig, blaulichgrün, mucronenspizig, 2—3 Zoll
lang. Blumen klein, in 9—15 strahligen, ungleichen fast
straußförmigen Dolben. Hüllen wenigblättrig. Corollenblätter
auswendig weiß, inwendig ochergelblich. Waterl. Creta an
Felsen. 24

8. *Fer. villosa* Walt. Zottenhaariges Stedenkraut.

Cicuta veneata Nuttall. gen. Amer. pl. I. p. 183.

Stengel, Blumenstiele und Dolben zottenhaarig. Blätter
dreizählig = vielfach, zusammengesetzt. Blättchen eyförmig, sä-
gerandig, steif, geadert, Blumen weiß. Waterl. Nordameri-
ka auf sonnigen Hügeln. 24

9. *Fer. stricta* Spr. Schraffes Stedenkraut.

Stengel aufrecht, straff, steif, gefurcht. Blätter dreizäh-

jählig = vielfach = zusammengesetzt, straff. Blättchen dreizählig, dreiseitig, glatt. Hüllblätter länglich = eiförmig. Vaterland: das Kap d. g. Hoffnung. 4?

10. *Fer. nuda* Spr. Nacktes (Hüllenloses) Stedentkraut.

Stengel rund, gestreift, ästig, glatt. Aeste abstehend. Blätter dreizählig-doppelt, fiederspaltig. Einschnitte stumpf, fast dreizählig. Blattstiele rundlich, wie die Blätter blaulichgrün, an der Basis scheidenartig, breit, fingerförmig-dreitheilig. Dolden zahlreich, ohne Hüllen. Corollen gelb. (Abbild. Spr. Umb. Spec. t. VII. f. 15.) Vaterland: Sibirien. 4 Blühz. Sommer.

11. *Fer. caspica* M. a. Bieb. Fl. Taur. Cauc. 1. p. 220. Spr. J. c. t. 7. f. 14.. *Fer. cachryoides* Fischer.

Stengel rund, gestreift, ästig, glatt, 1—2 Fuß hoch. Blätter doppelt dreizählig. Blättchen fiederspaltig. Rappchen kurz, mucronenspizig. Blattstiele an der Basis mit Scheiden versehen, rundlich, glatt. Dolden zahlreich, gipfelständig, 5—10 strahlig. Hüllen meist fehlend. Blumen gelb. Vaterland: Taurien, Kaukasus. 4?

12. *Fer. longifolia* Fischer. Langblättriges Stedentkraut.

Fer. peucedanifolia Willd. herb. F. tartarica Fisch.

Stengel niedrig, rund, steif, glatt, weißlich, oben blattlos, nur Scheiden tragend. Blätter dreizählig, blaulichgrün. Blättchen linien-lanzettförmig, $1\frac{1}{2}$ Zoll lang, 2—3 Linien breit, steif, am Rande zurückgerollt, fast zu 3 stehend. Dolden gipfelständig, gestielt, fast sechsstrahlig. Hüllen meist fehlend. Blumen gelb. Früchte länglich, am Rande sehr aufgetrieben. Vaterl. am caspischen Meere und am Kaukasus.

13. *Fer. capillaris* Link. Haarförmiges Stedentkraut.

Stengel rund, gestreift, glatt. Blätter dreifach-dreizählig. Blättchen faden-haarförmig, schlaff. Blattstiele fast ohne Scheiden. Dolden winkelförmig. Hüllen wenigblättrig, borstenförmig. Corollen gelb. Vaterl. Portugal. 4? Blühz. Sommer.

14. *Fer. brevifolia* Link. Kurzblättriges Stedentkraut.

Stengel rund, glatt. Blätter vielfach = zusammengesetzt. Blättchen linien-rinnenförmig, ausgesperrt, wellend, feinspizig, verlängert. Dolden stiellos. Hüllen fast fehlend. Vaterland: Portugal.

Synonymen.

Ferula cachryoides Fischer f. *Ferula caspica* N. 11.

Ferula canadensis et *Athamanta montana* Linn. f. Lex.
ist *Cnidium canadense* Spr.

Ferula föniculacea Nuttall ist *Pastinaca foeniculacea*
Spr.

Ferula neapolitana Tenor. ist *Thapsia garganica* Linn.
f. Lexic. B. 9.

Ferula nodiflora Jacq. ist *Ferula Ferulago* Linn. f.
Lexic. B. 4.

Ferula nudicaulis Tenor. ist *Pastinaca nudicaulis* Spr.

Ferula rablensis Wolf f. Lexic. B. 4. ist *Selinum li-*
neare 1 Nachtrag B. 8.

Ferula sibirica Spr. ist *Peucedanum sibiricum* Willd.
f. Lexic. B. 7.

Ferula songarica Pallas ist *Peucedanum aureum* Ait.

Ferula sulcata Desfont. ist *Ferula nodiflora* Linn. f. Lex.

Ferula tartarica Fisch. f. *Ferula longifolia*. N. 12.

Ferula tolucensis Kunth. ist *Pastinaca tolucensis* Spr.

Festuca Linn. Schwingel (Host Gram. t. 82 — 88.)

Character generic f. 1. Nachtr. B. 3. S. 331.

Panicula. Spiculae ovatae lanceolatae compressae
multiflorae. Corollae valva exterior apicē aristata
Spr. Sys. veg.

Ahrchen ey: oder lanzettförmig, zusammengedrückt, vielblü-
mig und bilden Rispen. Die äußere Corollentlappe (Spelze)
ist an der Spitze glatt und mit einer Granne versehen.

Triandria Digynia (Familie der Gräser.)

Die Gattung *Festuca* enthält einige 60 Arten, von de-
nen etwa die Hälfte in Europa wild wachsen und die größ-
ten theils als Futtergräser benutzt werden und daher zur Ver-
besserung der Wiesen und der Grasplätze dienen. Manche Ar-
ten, die in ältern botanischen Schriften, auch in diesem Le-
xicon und 1 Nachtrage unter *Festuca* vorkommen, gehö-
ren nach neuern Untersuchungen und Bestimmungen der Grä-
ser andern Gattungen an, oder sie sind nur als Varietäten
zu betrachten, wie aus der am Schlusse beigefügten Synony-
men-Liste deutlich hervorgeht.

† *Foliis omnibus setaceis, filiformibus* Spr.

Blätter alle linten: borstenförmig, oder fadenförmig.

I. Festuca hirsuta Host. I. c. Raucher Schwingel.

Wurzel faserig. Stalm oben eckig. Blätter grün, borsten-
förmig. Scheiden behaart. Rispe ausgebreitet. Aeste abstehend,
wenig:

wenigblümig. Aehrchen länglich, fünfblümig. Grannen bebaart. Hierher gehört *Festuca Halleri* All. und *Fest. cinerea* Vill. f. 1 Nachtr. B. 3. S. 334 und 336.

2. *Festuca varia* Henk. (*Fest. rhaetica* Cand. *F. pumila* Host, *Poa violacea* Bellard.)

Wurzel faserig. Stalm aufrecht oder an der Basis gestreckt, oben rundlich. Blätter steif, langgespitzt. Blatthäutchen länglich, stumpf, oder gespitzt zweispaltig. Die Aeste der Rispe abstehend. Aehrchen lanzettförmig, fast 7 blümig gegrannt oder nackt, zusammengedrückt, grün, purpurröthlich oder goldgelb, bunt. Vaterl. das mittlere Europa auf Alpen, auch am Caucasus. 4.

3. *Fest. andicola* Kunth in Humb. et Bompl. Nov. gen. et sp. pl. 1. p. 153.

Wurzel ästig, faserig. Stalm rundlich, glatt. Blätter borstenförmig=dreiseitig, wie die Scheiden glatt. Rispe einfach, zusammengezogen, die Aeste fadenförmig wie die Spindel. Aehrchen länglich=eyförmig, zusammengedrückt, fast sechsblümig, begrannt.

Vaterl. Quito 4 Blüht daselbst im Januar.

4. *Fest. borbonica* Spr. (*F. caespitosa* Willd. herb.)

Stalm rundlich, Blätter borstenhaarförmig. Rispe straff, die Aeste scharf, Blumenstielen verdickt, Aehrchen meist 6 blümig, langgrannig. Vaterl. Insel Mascar. 4?

5. *Fest. capensis* Spr. (*Dactylis ciliaris* Thunb. f. Lexic. B. 3.)

Blätter sehr zart, zottenhaarig. Rispe ährenförmig, eingehüllt. Aehrchen vierblümig, fast ohne Grannen. Kelch- und Corollenklappen gewimpert. Kap. d. g. Hoffn.

6. *Fest. melangæa* Spr. ist *Dactylis hispida* Thunb. f. Lexic. B. 3.

Stalm aufrecht, an den Knoten, so wie die Mündung der Blattscheide, bartig. Rispe eyförmig, nackt. Aehrchen dreiblümig, fast ohne Grannen, Kelche scharfborstig. Vaterl. wie vorige Art. Nr. 5.

†† Blätter eingerollt, rinnenförmig.

7. *Fest. panicula* Wulff. Rispenförmiger Schwingel.

Wurzel faserig. Stalm aufrecht. Blätter eingerollt, oben zottenhaarig. Rispe lang, einseitig. Aeste scharf. Aehrchen siebenblümig. Kelchklappen gewimpert. Vaterl. Ungarn 4 Blüht. Sommer.

Dietr. Ex. 2c Nachtr. IV. Bd.

B

8. *Fest. delicatula* Lag. Rispe einseitig, ährenlanzettförmig. Aehrchen fünfblümic, absteheud, langgrannig. Kelchklappen abwechselnd kürzer. Vaterl. Spanien ☉?

9. *Fest. toluccensis* Kunth J. c. I. p. 153. Tolucaischer Schwingel.

Halm fast dreiseitig, wie die Blätter und Scheiden scharf. Rispe einfach, schlaff, Aeste wechselnd, wie die Kelch- und Corollenklappen scharf. Aehrchen länglich-umgekehrt-eiförmig, zusammengedrückt, meist sechsblümic, Grannen kurz. Vaterl. Mexico, bei Toluca. 4 Blühz. September.

10. *Fest. bulbosa* Bivon. Zwiebelwurzlicher Schwingel.

Wurzel zwiebelartig. Halm aufrecht, oder an der Basis gestreckt. Blätter lang eingerollt, blaulichgrün. Rispe zusammengezogen, einseitig. Aehrchen fast vierblümic zusammengedrückt. Kelch und Corollenklappen mucronenspizig. Vaterl. Sicilien 4. Blühz. Sommer.

11. *Fest. pubescens* Link Enum. B. 1. C. 91. Filziger Schwingel.

Wurzel ästig, faserig. Halm aufsteigend, eckig. Blätter eingerollt, glatt. Rispe überhängend, etwas schlaff. Aehrchen neun bis zehnbümic, filzig, die äußern Corollenklappen fünfrippig begrannt. Vaterl. Ungarn 4.

12. *Fest. dasyantha* Kunth. J. c. I. p. 154. Wollbüchiger Schwingel

Halm aufrecht, einfach, rund, wie die Blattscheiden, glatt. Blätter eingerollt, inwendig wollig, Rispe ästig, ausgebreitet, die Aeste wechselnd stehend, wie die Spindel, scharf. Aehrchen länglich, zusammengedrückt, fünf bis neun blümic. Kelch- und Corollenklappen behaart, wollig, gespißt. Vaterl. Quito. 4. Blühz. Junius.

13. *Fest. flabellata* Lam. Fächerförmiger Schwingel.

Halm aufrecht, straff. Blätter glatt, untere zweireihig-fächerförmig stehend, 1 Fuß lang, obere abgekürzt. Rispe fast ährenförmig. Aehrchen wie Dachziegeln über einander liegend, meist dreibümic mit kurzen Grannen versehen. Hierher gehört *Festuca arenaria* Lam. var. und *Dactylis caespitosa* Forst. s. Lexic. B. 3. Vaterl. Patagonien 4?

14. *Fest. glabra* Spr. Blätter und Scheiden glatt. Rispe absteheud, die Aeste nach einer Seite gerichtet. Aehrchen sechsblümic, ohne Grannen. Vaterl. Nordamerika, Longisland.

15. *Fest. brizoides* Spr. Rispe fast ährenförmig, Aehrchen eysförmig, aufrecht, meist neunblüthig. Corollenkappen spitzlichglatt. Hierher gehört *Briza erecta* Lam. Pers. f. 1. Nachtr. B. 1. und *Chascolytrum erectum* Desv. Waterl. Monte Video.
16. *Fest. Commersonii* Spr. (*Briza subaristata* Lam. *Chascolytrum* Desv.)
Blätter eingerollt. Rispe zusammengezogen. Aehrchen eysförmig, aufrecht, fast siebenblüthig. Corollenkappen fast begrannt. Monte Video.
17. *Fest. lanata* Spr. Wolliger Schwingel.
Stamm aufsteigend, edig, Blätter glatt. Blatthäutchen steif, hervorgezogen. Rispe zusammengezogen, walzenrund. Aehrchen fast sechsblüthig, eysförmig. Corollenkappen an der Basis mit langer Wolle bekleidet, fast unbegrannt. Waterl. Monte Video 2 ? Blüthz. Sommer.
18. *Fest. punctoria* Smith. Stamm rund, fast nackt. Blätter zurückgekrümmt, steif, stehend. Rispe fast einfach, einseitig, zusammengezogen. Aehrchen glatt, ohne Grannen. Waterl. Kleinasien an Bergen.
+++ Die untern Blätter borstenförmig, obere flach.
19. *Fest. nigrescens* Lam. Schwärzlicher Schwingel.
Wurzel faserig. Blätter glatt, obere größer als die untern, flach. Rispe länglich, abstehend. Aehrchen eysförmig, schwärzlichbunt, meist fünfblüthig. Die Grannen so lang als die Klappen. Waterl. das mittlere Europa auf Alpen.
Zu dieser Abtheilung gehören noch folgende im *Lexicon* beschriebene Arten: *F. heterophylla* Juss. vill. *F. bromoides*, *Duriuscula*, *rubra* Linn. *F. uliginosa* Smith. *F. poaeformis* Host. f. 1. Nachtr.
++++ Blätter alle flach.
20. *Fest. glomerata* Allion ist *Dactylis glomerata* Linn. f. *Lexic.* B. 3. *D. glauca* Roth. *D. glaucescens* Willd. *D. hispanica* Roth. *D. villosa* Tenor. sind Varietäten.
21. *Fest. Fenas* Lagasc. Wurzel faserig. Stamm aufrecht, ober aufsteigend. Blätter flach, gestreift, rückwärts scharf, ohne Blatthäutchen. Rispe zusammengezogen. Aeste fast einseitig, büschelförmig. Aehrchen fast stiellos, achtblüthig, glatt, andentlich begrannt. Waterl. Spanien auf Wiesen und Tristen 2.

22. *Fest. capitata* Balb. Halm zart, einfach. Blätter abgekürzt, linienförmig, abstehend, glatt. Blatt häutchen lang, scheidenartig. Rispe kopf-ährenförmig, eysförmig, zusammengedrückt, meist vierblümig. Kelchklappen sehr stumpf. Blümchen gefärbt. Vaterl. Sardinien.
23. *Fest. laevis* Spr. ist *Dactylis laevis* Thunb. f. Lex. B. 3.
24. *Fest. villosis* Spr. ist *Dactylis villosa* Thunb. f. Lex. B. 3.
25. *Fest. serrata* Spr. ist *Dactyl. serrata* Thunb. f. Lex. B. 3.
26. *Fest. grandiflora* Lamarck. Großblumiger Schwingel. Blätter flach, weif. Rispe lang, einfach, zusammengezo-gen, aufrecht. Aehrchen linienförmig, glatt, ange-drückt, meist sechsblümig, ohne Grannen. Blümchen wechselnd ent-fernt stehend, gespitzt, gerippt. Vaterl. Nordamerika. 4?
27. *Fest. triflora* Desfont. Dreiblümiger Schwingel. Blätter lang, flach, sägeartig gezähnt. Rispe lang, überhängend. Die Aeste knieartig gebogen. Aehrchen rund-lich, dreiblümig, ohne Grannen. Blümchen glatt. Vaterl. das nördliche Afrika.
28. *Fest. Scheuchzeri* Gaud. ist *F. carpathica* Dietr. f. 1. Nachtr. B. 3. *F. pulchella* Schrad. (non Dietr. f. Nachtr.) Hierher gehört auch *Schoenodorus nutans* 1. Nachtr.
29. *Fest. patula* Desfont. Ausgebreiteter Schwingel. Halm glatt, aufrecht. Blätter flach. Rispe sehr ausgebreitet, schlaff, die Aeste zu 2 stehend, verlängert. Aehr-chen glatt, fast fünfblümig, ohne Grannen. Blümchen lang gespitzt. Vaterl. das nördliche Afrika. ☉. ?
30. *Fest. stipoides* Cand. ist *Bromus stipoides* Linn. f. Lexic. B. 2. auch *Br. geniculatus* Linn. f. Lexic. ge- hört hierher.
31. *Fest. quitensis* Spr. Quitoischer Schwingel. *Bromus unioides* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. 1. p. 151. Halm glatt. Blätter flach. Scheiden gestreift. Blatt- häutchen stumpf, hervorstehend. Rispe ästig, überhängend, die Aeste quirlförmig stehend. Aehrchen länglich-zusammenge- drückt, meist achtblümig. Blümchen gerippt mit kurzen Gran- nen versehen. Vaterl. Quito, bei Chillo ☉ Blüht daselbst im Februar.
32. *Fest. aliena* Spr. Blätter weif, sehr schmal. Rispe sehr einfach, überhängend, wenigblümig. Aehrchen fast fünfblü-

zig, lanzettförmig. Blümchen glatt, die Corollenklappen am Rande gezähnt. Grannen lang, steif. Südamerika?

33. *Fest. pendulina* Spr. Hängender Schwingel.

Bromus pendulinus Sess.

Blätter breit, flach, glatt. Blattscheiden rückwärts behaart. Rispe sehr ausgebreitet. Aeste hängend. Aehrchen lanzettförmig, zusammengedrückt, fast achselständig, glatt. Grannen gerade, kürzer als die Klappen. Vaterl. Spanien ☉?

34. *Fest. Hemipoa* Delil. Stalm straff. Blätter sehr schmal, flach, glatt. Rispe aufrecht. Aeste wechselnd stehend, steif, glatt, gekörnt. Aehrchen fast stiellos, vier bis sechsblüthig, glatt, ohne Grannen. Vaterl. das südliche Frankreich ☉?

Synonymen.

Festuca alpestris Host ist *Festuca ovina* Linn. f. Lexic.

Festuca alpina Gaud. ist *Festuca ovina* var. Linn. f. Lex.

Festuca amethystina Lex. ist *Festuca ovina* var. Linn. f. Lexic.

Festuca arenaria Lam. f. *Festuca flabellata* Nr. 13.

Festuca arundinacea Schreb. ist *Festuca elatior* Linn. f. Lexic.

Festuca aurata Gaud. ist *Festuca ovina* var.

Festuca barbata Linn f. *Schismus marginatus* R. Br.

Festuca borealis M.Koch ist *Arundo festucacea* 1. Nachtr.

Festuca brevifolia Mühlenb. ist *Corycarpus arundinaceus* Zea.

Festuca caespitosa Desf. ist *Triticum caespitosum* Cand.

Festuca calamaria Sm. ist *Festuca sylvatica* 1. Nachtr.

Festuca calycina Lam. ist *Schismus minutus* R. Br.

Festuca capillata f. 1. Nachtr. ist *Festuca ovina* var. Linn.

Festuca cinerea Vill. f. *Festuca hirsuta* Nr. 1.

Festuca cristata L. f. Lexic. ist *Koeleria phleoides* Pers.

Festuca cynosuroides Desf. ist *Triticum cynosuroides* Spr.

Festuca dactyloides Sm. ist *Calotheca pungens* Spr.

Festuca decumbens L. f. Lexic. ist *Triodia decumbens* R. Br.

Festuca diandra Michx f. 1. Nachtr. ist *Corycarpus arundinacea* Zea.

Festuca dichotoma Forsk. ist *Festuca divaricata* Desf. f. Lexic.

Festuca distycha Willd. f. 1. Nachtr. ist *Triticum ciliatum* Cand.

Festuca dumetorum L. f. Lex. ist *Festuca duriuscula* Lex.

- Festuca fusca* L. f. Lex. ist *Diplachne fascicularis* R. Br.
Festuca Halleri All. f. 1. Nachtr. f. *Festuca hirsuta* Nr. 1.
Festuca Halleri Vill. ist *Festuca ovina* var.
Festuca indica Retz f. Lexic. ist *Diplachne indica* R. Br.
Festuca interrupta Desf. ist *Triticum patens* Brot.
Festuca lanceolata Forsk. ist *Festuca divaricata* Lexic.
Festuca latifolia Roth ist *Centotheca lappacea* Desv.
Festuca litoralis Labill. ist *Triotia Billardieri* R. Br.
Festuca litoralis Schrad. ist *Calotheca litoralis* R. Br.
Festuca litoralis Host. ist *Triticum junceum* Lexic.
Festuca loliacea Huds. f. Lexic. ist *Triticum patens* Brot.
Festuca monostachya Desf. 1. Nachtr. ist *Triticum ciliatum* Cand.
Festuca montana Cav. f. Nachtr. ist *Bromus erectus* Huds.
Festuca mucronata Forsk. ist *Calotheca arabica* Spr.
Festuca Myurus L. f. Lexic. ist *Festuca bromoides* Lex.
Festuca nutans Mühlenb. ist *Festuca obtusa* Spr.
Festuca octoflora Walt. ist *Triticum Nardus* Cand.
Festuca paludosa Gaud. ist *Festuca glauca* 1. Nachtr.
Festuca pectinata Labill f. 1. Nachtr. ist *Triticum pectinatum* R. Br.
Festuca procera Humb. ist *Diplachne procera* Spr.
Festuca procumbens Mühlenb. ist *Diplachne fascicularis* R. Br.
Festuca pumila Host. ist *Festuca ovina* var.
Festuca rhaetica Cand. f. *Festuca varia* N. 2.
Festuca vivipara Smith. ist *Festuca ovina* var.

Zu diesen hier angezeigten Synonymen gehören noch die im 1. Nachtr. B. 3. S. 343.

Feuillæa Linn. Feuillet f. Lexic. B. 4. (Plum. ic. t. 209—210.)

Flores dioeci. Calix campanulatus, limbo duplici patente utroque quinquefidus, interiore maximo, colorato. Stamina quinque interjectis filamentis totidem sterilibus. ♀ Filamenta dilatata. Styli 3—5. Bacca trilocularis calyce cincta. Semina orbicularia, compressa.

Blumen dioecisch. Kelch glockenförmig, fünfspaltig. Corolle (innerer Kelch) radförmig, fünfspaltig. Kranz zehnsplattig. Weibliche Blume zehn Staubfäden, davon aber nur fünf Antheren tragen und mit den unfruchtbaren abwechseln. Ein Fruchtknoten mit 3—5 Griffeln. Beere dreifächerig, von dem Kelche umgeben. Saamen freisamig, zusammengedrückt.

Dioecia Pentandria Linn. Monadelphica Spr. (Familie Cucurbitaceen.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Feuillées siehe 1. Nachtr. B. 3. S. 343. Wir kennen jetzt nur 4 Arten, nämlich: *F. cordifolia* et *trilobata* Linn. s. Lexic. und folgende:

1. *Feuillæa Javilla* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. 11. p. 124.

Ein kletternder Strauch, mit Gabelranken versehen. Blätter wechselnd stehend, herzförmig = buchtig, langgespitzt, glatt, Blumenstiele winkelförmig, einz. oder vielblüthig. Vaterl. Neu-granada, bei Turbaco h. Blüthz. Mai.

2. *Feuill. hederacea* Poir. (*F. cordifolia* β. Linn.)

Stengel kletternd. Blätter tiefherzförmig an der Basis geöhrt dreilappig, drüsig = punktiert. Vaterl. Westindien h? *Fibraurea tinctoria* Lour. ist *Menispermum tinctorium* Spr.

Fibrillaria stellata Sowerb. ist *Sporotricum plumosum* Spr.

Ficinia truncata Schrad. (*Isolepis truncata* Linnæa 8 Baud. S. 91.)

Ficus. Feigenbaum. s. Lexic. B. 4.

Character generic. s. 1. Nachtr. B. 3. S. 344.

Fruchtboden fleischig, geschlossen, nur an der Spitze mit einer kleinen Oeffnung versehen. (s. 1. Nachtr. B. 3. S. 344.) In diesem Fruchtboden finden sich männliche und weibliche Blümchen. ♂ Kelch dreitheilig. Staubfäden 3. ♀ Kelch 4—8 theilig. Griffel 1, seitenständig, gespalten. Saamen in der markigen Substanz des Fruchtknotens nistend.

Monoecia Monogynia (Familie Urticeen.)

Diese Gattung enthält jetzt 128 Arten, die im System nach der Gestalt der Blätter eingetheilt und geordnet sind. Es sind Bäume, die meist einen Milchsaft enthalten, manche strauchig, aufrecht oder kletternd, kriechend. Aeste und Blätter wechselnd stehend. Fruchtböden (Früchte) meist winkelförmig, einzeln oder gehäuft, selten gipfelsständig, traubig.

I. Foliis integerrimis. Blätter ungetheilt, ganzrandig.

+ **Foliis cordatis.** Blätter herzförmig.

Die zahlreichen Arten, mit ungetheilten Blättern, welche in dieser Abtheilung gehören, sind im Lexicon und 1. Nachtrage beschrieben.

1. *Ficus leucostica* Spr. (*F. venosa* Willd. non Ait. *F. leucatoma* Poir)
Blätter herzförmig-länglich, gespißt, glatt, oben weiß punk-
tirt, unten mit dicken weißen Rippen versehen. Früchte ge-
paart, birnförmig, gestielt. Vaterland: Ostindien. h
2. *Ficus holosericea* Schott. Sammtblättriger Feigenbaum.
Aestchen und Blattstiele mit rothgelben Haaren bekleidet.
Blätter breit, herzförmig, länglich, spizig, fast wellenrandig,
auf beiden Seiten zottenhaarig-weich, sammtartig. Früchte
einzeln? Vaterl. Brasilien. h
3. *Ficus rufa* Schott. Gelbrother Feigenbaum.
Blätter fast herzförmig, länglich, gespißt, oben glänzend,
unten gelbroth=filzig. Diese Art ist der folgenden sehr nahe
verwandt, vielleicht nur eine Varietät. Ueberhaupt bedürfen
die von Schott in Syst. Veg. ed. Spr. iv. p. 409.
aufgestellten Arten, da die Früchte fehlen, noch einer genau-
ern Beobachtung und Bestimmung, z. B. *F. adhatodaefo-*
lia, *eximia*, auch N. 18, 19, und sind daher noch als
zweifelshafte Arten zu betrachten.
4. *Ficus fulva* Spr. Feuerrother Feigenbaum.
Blätter länglich=herzförmig, stumpf, oben scharf, unten
feuerroth=gelb, filzig. Aeste zottenhaarig.
5. *Ficus stipulata* Thunb. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 362.
Stamm strauchig, sehr ästig, kletternd, kriechend. Aeste
dünn, braun. Blätter elliptisch=herzförmig, stumpf, an
der Basis ungleich, glatt, geadert, $\frac{1}{2}$ bis 1 Zoll lang. Aester-
blätter gegenüberstehend, lanzettförmig, häutig, abfallend.
In einem der hiesigen warmen Häuser hat sich dieser
Schlingstrauch an einer Kalkwand sehr weit, über 30 Fuß,
ausgebreitet und gewährt ein liebliches Ansehen. Seine zar-
ten Wurzeln, die am Stamme und Aesten sich bilden, (wie
bei *Hedera Helix* L.) dringen überall ein und befestigen
die Aeste, daher ist dieser Strauch zur Bekleidung der Wände
in warmen Häusern sehr zu empfehlen.
†† Foliis ovatis. Blätter eiförmig.
6. *Ficus nepalensis* Spr. (*F. ovata* Don.)
Blätter eiförmig, lederartig, dreirippig, glatt. Fruchtstän-
den (Früchte) gepaart, kugelförmig, gestielt. Vaterl. Nepal. h
7. *Ficus dendroctona* Spr. (*F. dendrocida* Kunth. in
Humb. gen. 2. p. 46.)
Blätter umgekehrt=eiförmig, an der Spitze und Basis ge-

rundet, ganzrandig, fast lederartig = steif, auf beiden Seiten fast scharf. Fruchtboden winkelförmig, einzeln oder gepaart, stiellos, kugelförmig, glattlich. Vaterl. Südamerika, am Magdalenen Flusse, daselbst wird diese Feige Suan oder Matapalo genannt. ♀ Fruchtreife April.

8. *Ficus pubescens* Roth. Filzige Feige. (*F. lasiophylla* Link?)

Blätter fast rundlich = eiförmig, spitzlich, fünfrippig, auf beiden Seiten zottenhaarig = filzig. Fruchtboden kugelförmig, stiellos, eingehüllt. Vaterl. Ostindien. ♀

+++ Foliis oblongis. Blätter länglich.

9. *Ficus terminalis* Roth.

Blätter länglich = elliptisch, an beiden Enden verdünnt, fast dreirippig, glatt, netzartig. Fruchtboden fast kugelförmig, gestielt, eingehüllt. Ostindien. ♀

10. *Ficus elastica* Roxburgh Corom. Elastischer dickblättriger Feigenbaum.

Aeste rund, im Alter horizontal abstehend, mehr oder weniger überhängend. Blätter elliptisch = länglich, dick, lederartig, elastisch, mit einer kurzen mucronenartigen Spitze, auf beiden Seiten glatt, glänzend, am Rande verdickt = knorplich, parallel geadert, mit erhabener Mittelrippe, 5 — 8 Zoll lang, 4 — 6 Zoll breit. In der Jugend, wenn der Baum im kräftigen Wachsthum steht, sind die Ausschlagsschnuppen (Asterblätter) an den Spizen der Aeste lang, scheidenartig, häutig, roth oder braunroth gefärbt, abfallend.

Im hiesigen botanischen Garten steht dieser Baum im warmen Hause, in einem Erdbette, ist jetzt 12 Fuß hoch, hat aber noch keine Früchte getragen. Vaterl. Ostindien, in Wäldern und Hainen. ♀

11. *Ficus nervosa* Roth. Gerippter Feigenbaum.

Blätter elliptisch = länglich, an beiden Enden verdünnt, meist dreirippig, glatt, netzartig. Fruchtboden fast kugelförmig, gestielt, nackt. Ostindien. ♀

12. *Ficus striata* Roth. (*F. pendula* Hortulan?)

Blätter elliptisch = länglich, langgespitzt, glatt, parallel geadert. Fruchtboden kugelförmig, stiellos. Ostindien. ♀

13. *Ficus padifolia* Kunth in Humb. Nov. Gen. et Sp. pl. 11. p. 47.

Blätter elliptisch, langgespitzt, an der Basis gerundet, fast lederartig, glatt, glänzend. Fruchtboden winkelförmig, ein-

zeln oder zu 3, kurzgestielt. Diese Art ist *F. Bengamina* Linn. (s. Lexic.) sehr nahe verwandt, aber unterschieden durch die Gestalt der Blätter und der Früchte. Waterl. Mexico. ♀ Blühz. April.

14. *Ficus gigantea* Kunth J. c. 11. p. 48. Riesen-Feigenbaum.

Ein großer Baum, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter länglich, gespißt, an der Basis gerundet, ganzrandig, fast lederartig, glatt. Blumenböden gepaart, gestielt, kugelförmig, pulverig-grau. Waterland: Neuandalusien, in Wäldern. ♀ Blühz. September. Diese Feige ist in ihrem Waterlande unter dem Namen Higuerote bekannt.

15. *Ficus complicata* Kunth. J. c. 11. p. 48. Griebener Feigenbaum.

Blätter länglich, langgespißt, dicht angebrückt, ganzrandig, häutig, glatt. Fruchtboden gepaart, kurzgestielt, kugelförmig, glatt. In Mexico, wo dieser Baum wild wächst, wird die Frucht Samatito oder Amesquiti genannt. ♀ Blühz. April.

16. *Ficus cotenifolius* Kunth. J. c. 11. p. 49.

Blätter elliptisch-umgekehrt, eiförmig, an der Spitze und Basis gerundet, ganzrandig, lederartig, glatt. Fruchtböden winkelförmig, einzeln oder gepaart, kugelförmig glatt. Waterl. Mexico. ♀ Blühz. April.

17. *Ficus obtusifolia* Kunth. J. c. 11. p. 49. Stumpfblättriger Feigenbaum.

Blätter länglich-umgekehrt, eiförmig, stumpf, an der Basis keilförmig, ganzrandig, fast lederartig, glatt. Fruchtböden winkelförmig, einzeln, stiellos, kugelförmig, glatt. Waterl. Mexico ♀ Blühzeit April.

18. *Ficus longifolia* Schott. Langblättriger Feigenbaum.

Blätter lang, länglich-linienförmig, langgespißt, lederartig, glatt, glänzend, kurzgestielt. Früchte einzeln?

19. *Ficus cestrifolia* Schott. Hammerstrauchblättriger Feigenbaum.

Blätter fast herz-lanzettförmig, langgespißt, fast dreirippig, auf beiden Seiten glatt. Brasilien? ♀

20. *Ficus pulchella* Schott. Bierlicher Feigenbaum.

Blätter lanzettförmig-langespißt, fast häutig, unten scharf, parallel-gekrümmt, geädert. Früchte gestielt, einzeln? Diese Art ist *F. Radula* Willd. zunächst verwandt, aber unters-

hieben durch häutige Blätter, die bei jener vollkommen lederartig sind. Brasilien. h

21. *Ficus brasiliensis* Link. Brasilischer Feigenbaum.

Blätter breit, lanzettförmig, fast langgespitzt, an der Basis verdünnt, glatt, glänzend, unten niedrig, 9 Zoll lang,

3 Zoll breit. Brasilien. h

++++ Blätter gezähnt, sägerandig.

22. *Ficus oblongifolia* Don.

Blätter länglich, dreirippig, glatt, an der Spitze dreizäh-
nig. Früchte einzeln stehend, gestielt, rundlich. Vaterland:
Nepal, in Wäldern. h

23. *Ficus oppositifolia* Roxb. habe ich schon im 1. Nachtr.
B. 3. beschrieben und die Synonymen angezeigt und bemerke
nur noch, daß dieser Baum im hiesigen Garten etwa 20 Fuß
hoch ist. Aeste abstehend, rund, scharf. Blätter alle einan-
der gegenüberstehend, gestielt, länglich = eiförmig, an der Ba-
sis undeutlich herzförmig, nach oben fein gekerbt = sägerandig,
oben dunkelgrün, scharf, unten blaß, gerippt, parallel-gedert,
weich-sitzig-vorstig, 8—10 Zoll lang, 15 Zoll breit.

II. *Folius divisus*. Blätter getheilt, lappig.

Alle Arten, welche zu dieser Abtheilung gehören, sind im
Ericon und 1. Nachtrage beschrieben. *Ficus sinuata* Thunb.
kommt im 1. Nachtrage zweimal vor N. 79 und 93, die
letzte wird gestrichen, denn die Blätter sind nicht vollkom-
men getheilt, sondern nur buchtig-gezähnt.

Zu den Synonymen, welche ich im 1. Nachtr. B. 3. S. 375.
angezeigt habe, gehören noch folgende.

Synonymen.

Ficus Amplos Lam. f. 1. Nachtr. ist *Ficus politoria* Lam.
f. Lexic. et Nachtr.

Ficus anthe lminthica Rich. Cand. ist *Ficus Radula*
Willd. f. 1. Nachtr. N. 47.

Ficus cililosa Hortul. ist *Ficus americana* Aubl. f. 1.
Nachtr. N. 2.

Ficus coronata Spin. ist *Ficus exasperata* f. 1. Nachtr. N. 68.

Ficus diformis Lam. ist *Ficus truncata* Vahl f. 1.
Nachtr. N. 95.

Ficus glabrata Kunth. ist *Ficus insipida* Willd. f. 1.
Nachtr. N. 24.

Ficus glandulosa Hortul. ist *Ficus exasperata*.

Ficus indica Forsk. ist *Ficus salicifolia* Vahl. f. 1.
Nachtr. N. 52.

Ficus lasiophylla Link. f. *Ficus pubescens* N. 8.

Ficus leucotoma Poir. f. *Ficus leucostica* N. 1.

Ficus Lichtensteinii Link ist *Ficus capensis* Thunb.
f. 1. Nachtr. N. 66.

Ficus myrtifolia Link ist *Ficus polita* Vahl. f. 1.
Nachtr. N. 40.

Ficus mysorensis Roth ist *Ficus tomentosa* f. 1. Nachtr.
N. 59.

Ficus oblongata Link ist *Ficus cordata* Thunb.

Ficus ovata Don. f. *Ficus nepalensis* N. 6.

Ficus pendula Hortul. ist *Ficus striata* Roth. N. 12.

Ficus pertusa Bory (non Linn.) ist *Ficus terebrata*
Willd. f. 1. Nachtr. N. 57.

Ficus religiosa Forsk. f. *Ficus populifolia* Vahl. f. 1.
Nachtr. N. 38.

Ficus superstitiona Link. ist *Ficus drupacea* Thunb.
f. 1. Nachtr. N. 16.

Ficus vasta Forsk. ist *Ficus bengalensis* Linn. f. Lexic.

Fieldia Cunningh. Fieldie.

Cal. 5 partitus persistens, bractea spatiformi
cinctus. Corolla tubuloso-ventricosa subbilabiata,
limbo 5 lobo aequali. Rudimentum filam. quinti.
Bacca 1 locularis. Ant. Sprengel Tentam. Suppl.
Syst. Veg. p. 18.

Didynamia Angiospermia (Familie Bignoneen.)

Reich fünftheilig, stehen bleibend, von scheidenartigen Brac-
teen umgeben. Corolle röhrig-bauchig, fast zweilippig, der
Rand fünflappig, gleich. 4 Staubfäden und ein schlüßlagens-
der (Rudiment). Beere einsächerig.

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn
Field, Botanikus in Neu-Süd-Wales. Es ist jetzt nur fol-
gende Art bekannt:

1. *Fieldia australis* Cunningh. Südliche Fieldie.

Stengel standenstrauchig, wurzelnd, kletternd. Aeste in der
Jugend rothfarbig-filzig. Blätter gegenüberstehend, ungleich,
länglich, sägerandig, zottenhaarig, unten rothfarbig. Blumen-
stiele einzeln, winkelftändig. Corollen weiß-grünlich. Vaterl.
die blauen Berge in Neu-holland. h

Filago Linn. Sitzkraut f. Lexic. B. 4. die von Linn. Smith, Delil. aufgestellten Arten hat Willd. und Gaertner zu andern Gattungen gezogen.

Filago acaulis Allion ist *Micropus pygmaeus* Desf.

Filago alpestris Presl. ist *Gnaphalium minimum* Smith.

Filago arvensis Linn. ist *Gnaphalium arvense* Willd.

Filago exigua Sibth. ist *Micropus exiguus* Urv.

Filago gallica Linn. f. Lexic. ist *Gnaphalium gallicum* Smith.

Filago germanica L. f. Lexic. ist *Gnaphalium germanicum* Smith.

Filago marcotica Delil. ist *Micropus marcoticus* Spr.

Filago maritima Linn. ist *Otanthus maritimum* Link.

Filago montana L. f. Lexic. ist *Gnaphalium montanum* Willd.

Filago pygmaea L. f. Lexic. ist *Micropus pygmaeus* Desf.

Filago pyramidata L. f. Lexic. ist *Gnaphalium pyramidatum* Willd.

Filago spatulata Presl. ist *Gnaphalium pyramidatum* Willd.

Filago tenuifolia Presl. ist *Gnaphalium gallicum* Smith.

Fimbristylis Vahl Enum. pl. 2. Franzengriffel.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 377 und 25 Arten.

Die Schüppchen gedrängt, alle einblümig, dachziegelförmig gelagert und bilden Aehren. Der Griffel ist oft am Grunde zwiebelartig verdickt, oder ausgebreitet, mehr oder weniger gewimpert und trägt 2—3 Narben. Die Borsten fehlen. Saamen rund.

Triandria Monogynia (Familie Cyperoiden).

I. Spica solitaria. Spr. Aehre einzeln.

† Aphyllae. Stalm blattlos.

1. *Fimbristylis pauciflora* Rob. Brown. Prodr. Fl. nov. Holl. 1. p. 225.

Stalm borstenförmig, nackt, nur an der Basis mit Scheiden versehen. Aehre aufrecht, pfriemensförmig, nackt, wenigblümig, die Schuppen einfädig. Schaalsaame etwas scharf. Vaterl. Neuholland.

2. *Fimbristylis androgyna* R. Br.

Stalm haarförmig, nackt, an der Basis Scheiden tragend. Aehre aufrecht, kegelförmig = pfriemenspizig, die untern Schuppen hermaphroditisch, dreifädig, obere kleiner nur mit einem Fruchtnoten versehen. Schaalsaame scharflich. Neuholland.

3. *Fimbristylis acicularis* R. Br.

Stamm haarförmig, an der Basis Scheiden tragend. Aehre nackt, lanzettförmig, zusammengedrückt. Schuppen spitzlich, länglich, punktiert, einmännig. Schaalsamen gerunzelt. Griffel an der Basis ausgebreitet, nackt. Neuholland.

4. *Fimbr. tetragona* R. Br. J. c.

Stamm viereckig, an der Basis Scheiden tragend. Aehre aufrecht, eiförmig, stumpf, nackt. Schuppen sehr stumpf, ohne Rippen. Griffel der Länge nach gefranzt, dreispaltig. Neuholland.

† Culmo foliano. Stamm mit Blättern besetzt.

5. *Fimbr. punctata* R. Br. J. c. 1. p. 226. Punktiertes Franzengriffel.

Stamm eckig, straff, an der Basis mit Blättern besetzt. Aehre aufrecht, oval, stumpflich, rund. Schuppen stumpf, mucronenspitzig, dreimännig. Griffel dreispaltig, an der Spitze gefranzt. Schaalsamen punktiert. Vaterl. Neuholland. 4

6. *Fimbr. pterygosperma* R. Br.

Stamm eckig, an der Basis blättrig, Aehre aufrecht, kugelförmig, nackt. Schuppen kreisrund, glatt. Griffel dreispaltig geöhnet. Schaalsamen geflügelt. Neuholland.

7. *Fimbr. xyridis* R. Br.

Stamm vierkantig, an der Basis mit flachen Blättern besetzt, die wenig behaart sind. Aehre fast kugelförmig, überhängend. Schuppen kreisrund, am Rande wollig. Neuholland.

8. *Fimbr. leucostachya* Roem. et Schult. Syst. veg. Weißähriger Franzengriffel.

Isolepis leucostachya Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. 1. p. 220.

Wurzelstock dick, senkrecht, mit braunen Schuppen bedeckt, an der Basis faserig. Halme zahlreich, aufrecht, 6 Zoll hoch, nackt, glatt. Wurzelblätter zahlreich, pfriemenborstenspitzig, dreiseitig, glatt, 3 Zoll lang, an der Basis scheidenartig. Aehre, gipfelständig, stumpf, $\frac{1}{2}$ Zoll lang, vielblüthig. Schuppen häutig, dreirippig, weiß. Griffel zusammengedrückt, flach, gefranzt, dreispaltig. Schaalsamen umgekehrt-eiförmig, braun, an der Basis nackt. Vaterl. Südamerika in Wäldern an niedern feuchten Orten, am Orinoco. 4 Blüthezeit May.

9. *Fimbr. lanata* R. et Schult. J. c. Wolliger Franzengriffel.

Isolepis lanata Kunth. J. c. I. p. 220. t. 68.

Stamm aufrecht, glatt, 1 Fuß und darüber, an der Basis mit Blättern besetzt. Blätter rinnig, dreiseitig, stehend, 4 Zoll lang, an der Basis scheidenartig ausgebreitet. Scheiden länglich-eiförmig, dicht, seidenhaarig-wollig, braun. Aehren gipfelständig, stumpf, 1 Zoll lang. Schuppen flachlich, häutig, braun, glatt, gewimpert. Griffel an der Basis zwiebelartig, oben gefranzt, dreispaltig. Vaterl. am Orinoco-Flusse. 4 Blühz. Mai.

II. *Spicis geminis aut ternis*. Aehren zu 2 oder zu 3 stehend.

10. *Fimbr. spiralis* R. Br. J. c.

Stamm borstenförmig. Aehren lanzettförmig, einzeln oder zu 2 stehend, eingehüllt, abwechselnd gestielt. Schuppen stumpflich. Schaalsaamen gerunzelt. Neuholland.

11. *Fimbr. tristachys* R. Br.

Stamm eßig, scharf, an der Basis blättrig. Aehren länglich gespitzt, meist zu 3 stehend, die seitenständigen gestielt. Schuppen eiförmig, mucronenspitzig. Schaalsaame glatt. Neuholland.

III. *Umbellis simplicibus*. Die Aehren bilden einfache Dolden.

12. *Fimbr. nana* Roth.

Wurzel faserig. Stamm zahlreich, kaum über 1 Zoll hoch, aufrecht. Blätter borstenförmig. Dolde fünfstrahlig, die Strahlen ungleich. Aehrchen lanzettförmig, sparrig, einzeln stehend. Schuppen eiförmig, gespitzt. Vaterl. Brasilien.

13. *Fimbr. exilis* R. et Schult. (*Isolepis exilis* Kunth. J. c. I. p. 224).

Wurzel faserig. Stamm zahlreich, aufrecht, gefurcht, an der Basis blättrig, 1 Fuß hoch. Blätter gestreift, doppelt, kürzer als der Stamm. Scheiden lanzettförmig, langgespitzt, häutig, braun, an der Spitze mit langen Wimperhaaren versehen. Dolde 4–5strahlig, die Strahlen ungleich lang, einährig. Aehrchen eiförmig, gespitzt. Hülle dreiblättrig, länger als die Dolde. Schuppen eiförmig, graunnenartig gespitzt. Vaterl. Cumana. 4 Blühz. September.

14. *Fimbr. depauperata* R. Br.

Stamm zusammengedrückt, an der Basis blättrig, Scheiden flüßig. Dolde vierstrahlig, Hülle zweiblättrig, länger als die Dolde. Aehrchen eiförmig, wie die Schuppen gespitzt. Neuholland.

15. *Fimbr. denudata* R. Br.

Stamm borstenförmig, zusammengebrückt, glatt, an der Basis mit Scheiden besetzt. Dolde 4 — 6strahlig. Hülle sehr kurz, schuppenförmig. Aehren länglich = eiförmig. Schuppen elliptisch. Schaalsaame gerunzelt. Neuholland.

16. *Fimbr. rara* R. Br.

Stamm eckig, glatt, an der Basis blättrig, scheidig. Dolde vierstrahlig. Hülle 1 — 2blättrig. Aehren fast kugelig, wenigblümig. Schuppen fast rund. Griffel dreispaltig. Neuholland.

17. *Fimbr. parviflora* R. Br.

Stämme borstenförmig, eckig, an der Basis blättrig. Dolde halb zusammengefasst, kürzer als die vielblättrige Hülle. Aehren fast kugelig, wenigblümig. Schuppen mucronenspitzig. Neuholland.

18. *Fimbr. elata* R. Br.

Stamm eckig, glatt, an der Basis Scheiden tragend. Dolde zusammengefasst, weitschweifig = ausgebreitet, die Strahlen meist drei Aehren tragend. Hülle vielblättrig. Aehren kegelförmig. Schuppen stumpf, trocken. Schaalsamen glatt. (*F. marginata* Labill. Nov. Caledon. t. 16.)

19. *Fimbr. caespitosa* R. Br.

Stämme eckig, glatt, an der Basis Scheiden tragend. Dolde einfach oder halb zusammengefasst, meist länger als die Hülle. Aehren eiförmig. Schuppen stumpf, trocken. Griffel zweispaltig. Samen glatt. Neuholland.

20. *Fimbr. brevifolia* R. Br. (*Scirpus miliaceus* Thunb.)

Stamm eckig, glatt, an der Basis mit kurzen scheidenartigen Blättern besetzt. Dolde einfach oder zusammengefasst, fast so lang als die Hülle. Aehren länglich = eiförmig, Schuppen mucronenspitzig. Neuholland und Japan.

21. *Fimbr. variabilis* R. Br.

Stamm eckig, an der Basis blättrig. Dolde fast zusammengefasst, kürzer als die Hülle, aber die Stielchen länger als die Hüllchen. Aehren länglich = eiförmig. Schuppen stumpf, zweimännig. Neuholland.

22. *Fimbr. divaricata* Hamilt. Prodr. fl. ind. occid. p. 14.

Stämme borstig = behaart, an der Basis fast ästig, die Aeste ausgesperrt. Dolde fast einfach, unregelmäßige Aehren einzeln,

den, fast kugelförmig. Blumenstiele verlängert. Vaterl. Portorico.

23. *Fimbr. spartium* Hamilt. J. C.

Blätter fast rund, faden-förmig, unten rinnig, so lang als der Halm, meist zweireihig. Dolde wie bei voriger Art. Hülle zweiblättrig, ungleiche Aehrchen eiförmig, gespitzt, schwarzlich. Vaterl. Portorico.

IV. Umbellis compositis Dolde zusammengesetzt.

24. *Fimbr. gracilis* R. Br.

Halm dünn,edig = borstförmig, an der Basis blättrig, Scheiden fzig. Dolde zusammengesetzt, länger als die Hülle. Strahlen fast dreihäufig. Aehrchen eiförmig; Schuppen gespitzt. Neuholland.

25. *Fimbr. velata* R. Br. (F. propinqua R. Br. var.)

Halm edig, an der Basis blättrig, Scheiden glattlich. Dolde so lang als die Hülle. Aehrchen eiförmig. Schuppen mucronenspizig, einmännig. Griffel an der Basis ausgebreitet. Neuholland.

26. *Fimbr. elongata* R. Br.

Halm edig, an der Basis blättrig. Dolde einfach oder doppelt zusammengesetzt. Die Hüllchen so lang als die besondern Dolde. Aehrchen oval = länglich, Schuppen keilförmig, mucronenspizig, zweimännig. Neuholland.

27. *Fimbr. striata* Labillard. Nov. Caledon. t. 16 f. 2. (F. obtusifolia Nees in siber. agrostis.)

Halm zusammengesetzt, gestreift, kaum länger als die Blätter, die Scheiden weißlich, hinten braun. Dolde zusammengesetzt, doppelt länger als die dreiblättrige Hülle, deren Blätter an der Basis behaart sind. Aehrchen eiförmig, Schuppen glatt, glänzend, mucronenspizig, dreimännig. Neuholland.

28. *Fimbr. stricta* R. Br.

Halm zusammengedrückt, straff, glatt, an der Basis blättrig. Dolde zusammengezogen, fast so lang als die Hülle. Aehrchen fast stiellos, eiförmig, Schuppen stumpflich, einmännig. Neuholland.

29. *Fimbr. sericea* R. Br.

Halm gestreift, fzig, Blätter unten silberweiß = seidenhaarig = fzig. Dolde zusammengesetzt. Aehrchen in Köpfchen gesammelt, eiförmig, Schuppen gespitzt. Neuholland.

30. *Fimbr. furfa* R. Br.

Halm edig, an der Basis scheidentragend. Dolde zusammengezogen. Dietr. Ex. 2r. Nachtr. IV. Bd.

mengesezt. Hülle sehr kurz. Aehrchen länger als die Stiele. Schuppen gespizt. Griffel dreispaltig, gefranzt, an der Basis bartig. Neuholand.

31. *Fimbr. capitata* R. Br.

Halm rektig, an der Basis mit Scheiden besetzt. Dolde fast kopfförmig, halb zusammengesetzt. Hülle sehr kurz. Aehrchen länglich, fast stielloß. Schuppen stumpf. Griffel nackt. Neuholand.

32. *Fimbr. speciosa* Rohde. Schöner Franzengriffel.

Scirpus domingensis Pers. Synops. 1. p. 76. Hamilt. Prodr. fl. ind. occid.

Blätter alle wurzelständig. Halm aufrecht, einfach, 2—3 Fuß hoch, an der Basis mit zweireihigen Scheiden besetzt. Dolde zusammengesetzt, gipfelständig. Aehrchen walzenrund, vielblümig (30 — 40), wie die Schuppen stumpf. Antheren gelb, linienförmig, an der Spitze borstig, Griffel flach, an der Spitze mit zwei Furchen, am Rande gefranzt. Waterl. St. Domingo. 4. Blühz. Sommer.

33. *Fimbr. tenuis* R. et Schult. J. c. (*Isolepis gracilis* Humb.)

Halm dreiseitig, dünn, wie die Blätter glatt. Asterdolde gipfelständig. Hülle dreiblättrig, abgekürzt. Aehrchen länglich = eiförmig. Schuppen eiförmig, langgespizt. Saamen punktirt = scharf. Neuholand.

34. *Fimbr. annua* R. et Schult. (*Scirpus annuus* Schrad. Allion. pedm. t. 28. f. 5.)

Wurzel faserig. Halm dünn, glatt, 5 — 6 Zoll hoch, an der Basis blättrig, filzig. Blätter linienförmig, sehr schmal, gespizt, schlaff. Scheiden sehr zart, gestreift. Asterdolde gipfelständig, meist zusammengesetzt, eingehüllt. Aehrchen einzeln stehend, länglich = eiförmig, Schuppen mucronenspizig, glänzend, rostfarbig. Saamen sehr klein gerippt. Waterl. das südliche Europa. ☉. Blühz. Sommer.

35. *Fimbr. hirta* R. et Schult. (*Isolepis hirta* Kunth. J. c. 1. p. 180.)

Wurzel faserig. Halme zahlreich, aufrecht, 3 — 4 Zoll hoch, gestreift. Blätter linien = borstenförmig. Scheiden gestreift, auswendig scharfborstig, Dolde zusammengesetzt. Hülle fast fünfbältrig, scharfborstig. Aehrchen länglich, vielblümig, $1\frac{1}{2}$ Linie lang. Schuppen grannenspizig. Waterl. Venezuela, zwischen Cura und Nava. 4.

36. *Fimbr. autumnalis* Vahl. (*Scirpus autumnalis* Linn.)
 Hierher gehört *Scirpus mucronulatus* Michx f. Eric.
 B. 8.

Dolde doppelt zusammengesetzt. Hülle zweiblättrig. Aehrchen länglich, fast vierseitig. Nordamerika und Westindien. 4. Blähz. Herbst.

37. *Fimbr. cymosa* R. Br.

Stamm eilig, länger als die gestreiften Blätter. Dolde doppelt zusammengesetzt, länger als die Hülle. Aehrchen kugelig-eiförmig, wenig blüthig. Schuppen eiförmig, Saamen glatt. Neuholland.

38. *Fimbr. brachyphylla* Spr. (*F. brevifolia* Wall, *Scirpus brevifolius* Roxburgh.)

Stamm halbrund, Blätter kurz. Dolde doppelt zusammengesetzt, länger als die fast dreiblättrige Hülle. Aehrchen länglich, Schuppen keilförmig, einmännig. Vaterl. Nepal und Bengalen. 4.

39. *Fimbr. spathacea* Roth. Nov. pl. Spec. p. 25. Scheidentragender Frangengriffel.

Stamm dreiseitig, nackt, an der Basis mit fadenförmigen Blättern besetzt. Aetherdolde zusammengesetzt. Allgemeine und besondere Hüllblätter scheidenartig, keilförmig, mit einer sehr kurzen Mucrone versehen. Aehrchen eiförmig, Schuppen mucronenspitig. In Hinsicht auf Wuchs und Anstand ist diese Art der *F. miliacea* Vahl zunächst verwandt, aber größer und noch überdies durch die scheidenartigen Hüllen zu unterscheiden. Vaterl. Ostindien. 4. Blähz. Sommer.

40. *Fimbr. mauritiana* Tausch in Sieber Herb. maurit.

Stamm 1 — 2 Fuß hoch, zusammengedrückt — gestreift, doppelt länger als die Blätter. Scheiden behaart, rostfarbig, hautrandig. Hüllblätter borstig-gewimpert. Dolde zusammengesetzt, meist sechsstrahlig. Aehrchen eiförmig, stumpf, filzig. Schuppen rostfarbig, stumpf, an der Basis glatt, Griffel gespalten. Saamen kugelig-zusammengedrückt, weißrandig. Vaterl. Ins. Mauritius. 4.

41. *Fimbr. pubigera* Link. Hort. berol. 1. p. 289.

Stamm fast dreiseitig, Blätter flach, filzig, fast so lang als der Stamm. Dolde doppelt oder vielfach zusammengesetzt. Hülle vielblättrig, länger als die Dolde. Aehrchen länglich, Schuppen keilförmig, mucronenspitig. Vaterl. Nordamerika.

42. *Fimbr. mezoſtachya* Link. J. c. 1. p. 290.

ſalm faſt dreieitig, Blätter flach, ſilzig, länger als der ſalm. Hülle vielblättrig, länger als die zuſammengeſetzte Dolde. Aehrchen länglich. Schuppen gefielt, dreistreifig, grün. Griffel zweitheilig.

Dieſe und die vorhergehende Art ſind vielleicht nur Varietäten von *Fimb. dichotoma* Vahl, der ſie bis auf einige Merkmale ſehr gleichen.

43. *Fimb. palliscens* Link. J. c. I. p. 291. ſcheint nur von *Fimb. annua* eine Varietät zu ſeyn, welche ſich am meiſten durch einen höhern ſalm unterſcheidet. —44. *Fimbr. Hoffmannſeggii* F. G. Dietr. Hoffmannſegg's Fimbristylis.

Fimbr. Candelabrum Alb. Dietr. in Willd. sp. pl. ed. 2. p. 154.

Scirpus candelabrum Link Jahrb. 1. Heft 3. S. 80, daſelbſt bemerkt Herr Dr. Link, daß der Name *Candelabrum* nicht paſſend ſey, deßwegen habe ich den Namen des Entdeckers dieſer neuen Art, Herrn Grafen von Hoffmannſegg, gewählt.

Wurzel faſerig, ſalm dreieitig, geſtreift. Blätter geöhnet, viel kürzer als der ſalm. Scheiden behaart, Dolde doppelt zuſammengeſetzt. Hülle vielblättrig, faſt ſo lang als die Dolde. Aehrchen länglich-eiförmig. Schuppen ſtumpfiſch, keilförmig. Waterl. Braſilien. 4

45. *Fimbr. affinis* Presl. Alb Dietr. J. c.

ſalme $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch, dreieitig, dünn. Blätter flach, kürzer als die ſalme, wie die Scheiden behaart. Dolde doppelt zuſammengeſetzt, meiſt ſechsſtrahlig, Hüllblätter flach, behaart, abſtehend. Aehrchen eiförmig, ſpizlich, Schuppen gerundet, geſtreift, die untern mucronenſpizig. Saamen umgelehrt-eiförmig, zweifchneibig, ſcharf-punktirt. Waterl. Inſel Guaham. 4

46. *Fimbr. villoſa* R. et Schult. Syst. veg. (*Scirpus villoſus* Poir. Enc. meth. 6. p. 781.)

Alle Theile der Pflanze ſind zottenhaarig. ſalme fadenförmig, dreieitig, geſtreift. Blätter flach, aufrecht, faſt ſo lang als die ſalme. Dolde zuſammengeſetzt. Hülle zweiblättrig, ſehr lang. Aehrchen eiförmig, aufgetrieben. Schuppen braun-gelblich, glattlich. Waterl. Portorico in Sümpfen 4?

Synonymen.

- Fimbristylis brevifolia Wall. f. Fimbr. brachyphylla N. 38.
 Fimbr. bromeliaefolia Ant. Spr. ist Scirpus bromeliaefolia Rudg. f. 1 Nachtr.
 Fimbr. Candelabrum Alb. Dietr. f. Fimbr. Hoffmanns-eggii N. 44.
 Fimbr. compressa R. et. Sch. ist Fimbr. ferruginea var.
 Fimbr. cylindrica Vahl. f. 1 Nachtr. ist Fimbr. mucronata var f. 1 Nachtr. N. 14.
 Fimbr. Humboldtii Presl. ist Fimbr. dichotoma Linn. Lam. f. 1 Nachtr.
 Fimbr. juncea R. Br. ist Scirpus juncea Forst. f. Lex.
 Fimbr. marginata Labill. f. Fimbr. elata N. 18.
 Fimbr. monandra R. et Schult. ist Fimbr. argentea Vahl. f. 1. Nachtr.
 Fimbr. obtusifolia Nees in Sieb. agrost. f. Fimbr. stricta Labill. N. 27.
 Fimbr. polytrichoides R. Br. ist Scirpus polytrichoides f. Lex. B. 8.
 Fimbr. propinqua R. Br. f. Fimbr. velata R. Br. N. 25.
 Fimbr. sulcata R. et Sch. ist Scirpus sulcatus Roth.
 Fimbr. tetragona Alb. Dietr. ist Scirpus tetragonus Poir. f. 1. Nachtr.
 Fimbr. VahlII Link ist Scirpus VahlII Lam. f. Lex.
 Fimbr. verrucosa Alb. Dietr. ist Scirpus depauperatus Mühlenb.
 Fischera Spreng. f. 1. Nachtrag. B. 3. S. 385.
 Fischera buxifolia Swartz ist Leiophyllum thymifolium Pers. Ledum Lam.
 Fischera scandens Cand. ist Holostemma Candolleannum Spr.
 Fissidens Hedwig. Muscor. frond. ist Decranum.
 Fissilia Psittacorum Lam. f. Lex. B. 4. S. 178. ist Olax Psittacorum Vahl.
 Fissurina Dumastii Fee. ist Graphis Dumastii Spr.
 Fissurina lactea Fee. ist Graphis lactea Spr.
 Fistulina buglossoides Bull. ist Boletus hepaticus Huds.
 Fistulina hepatica Fr. ist Boletus hepat. Huds.
 Flabellaria Desfontainii Lamoureux ist Codium membranaceum Ag.

Flacourtia Commers. Flacourtie.

Character genericus s. 1. Nachtrag. B. 3. S. 386.

Blumen didisch, oder hermaphroditisch. Kelch meist fünfstheilig. Keine Corolle. Staubfäden zahlreich, bodenständig. Fruchtknoten frei, Narbe aufstehend, 5 — 9strahlig, Beere vielsäckerig; jedes Fach enthält zwei knochenharte Saamen.

Polyandria Monogynia (Familie der Esiaceen; Flacourtien.)

Diese Gattung hat Commerson bestimmt und sie dem Herrn Flacourt zu Ehren Flacourtia genannt. Stephan Flacourt war Statthalter von Madagascar. Er hat ein Werk geliefert, in welchen die vorzüglichsten, damals in Madagascar bekannten Pflanzen vorkommen und beschrieben sind: *Histoire de la grande isle Madagascar*, Paris 1661. 4.

1. *Flacourtia rhamnoides* Burch. Wegdornartige Flacourtie.

Aeste aufrecht = abstehend, dornig. Blätter elliptisch, fast langgespißt, fast sägerandig. Blumenstiele einblümig. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. h

2. *Flac. inermis* Roxb. Unbewaffnete Flacourtie.

Aeste ohne Dornen. Blätter elliptisch = länglich, gekerbt, glatt, glänzend. Blumen traubenständig, die Zwitterblumen mit einem fünfspaltigen Griffel versehen. Vaterl. die molukesischen Inseln. h

3. *Flac. prunifolia* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. VII. t. 654.

Stamm sehr dornig, Aeste unbewehrt. Blätter elliptisch = länglich, stumpf, an der Basis verdünnt = gespißt, gekerbt, lederartig, glatt, glänzend, die Zähne unten drüsig, Blumen in winkelfständigen Trauben, 1 — 3 abgefürzt. Vaterl. Neugranada. h Blühz. Aug. September.

4. *Flac. flexuosa* Kunth. J. c. VII. p. 239. Gebogene Flacourtie.

Aestchen knieartig gebogen, dornig, Blätter eiförmig = länglich, an der Basis gerundet, grob und entfernt gezähnt, häutig, glatt, glänzend. Die männlichen Blumen bilden winkelfständige Trauben. Vaterl. Mexico, bei Xalap. h Blüht daselbst im Februar.

5. *Flac. celastrina* Kunth. J. c. VII. p. 239. Celasterartige Flacourtie.

Aestchen mit langen geraden Dornen besetzt. Blätter rundlich = umgekehrt = eiförmig, an der Basis gespißt, gekerbt, häu-

tig, glatt, fast glänzend. Die weiblichen Blumenstiele 2—3 blümig, winkelfständig. Früchte elliptisch = kugelförmig. Vaterl. Mexico. ♀ Fruchtzeit April.

6. *Flac. cordata* Kunth. J. c. VII. p. 241. Herzförmige Flacourtie.

Stamm und Aeste unbewehrt. Blätter dicht stehend, herz-förmig, gesägt, gekerbt = gezähnt, lederartig, glatt, glänzend. Die Zähne dicklich, eingebogen. Die männlichen Blumen winkelfständig, traubig, die weiblichen einzeln. Vaterl. Peru. ♀ Blüthz. August.

Die Flacourtien sind Bäume oder Sträucher, meist dornig, Blätter wechselnd stehend, ungetheilt. Blumen winkelfständig. Sie gedeihen am besten in warmen Häusern, denn die meisten kommen aus Tropenländern, N. 5. und 6. überwintert man im Glashause.

Flagellaria indica Linn. f. Lexic. B. 4.

— repens, Lour. ist *Pothos scandens* Linn.

Flaveria Jusseu. Flaverie.

Character generic. f. 1. Nachtrag. B. 3. S. 388.

Blüthendecke (Kelch) vielblättrig, fast dachziegelförmig. Fruchtboden nackt, Blümchen röhrig, zu 2 — 5 in einem besondern 2 — 5blättrigen Kelche. Saamen nackt.

Syngenesia 4 Ordu. (Familie Compolitae.)

1. *Flaveria repanda* Lag. Hierher gehört: *Naumburgia trinervata* Willd. f. Lexic. B. 6. S. 335. und *Brotera Contrayerva* Spr. f. Lexic. B. 2.

2. *Flaveria Contrayerva* (Contrayerba Pers.) ist *Milleria Contrayerva* Cav. f. Lexic. B. 6. S. 183.

3. *Flaveria angustifolia* Pers. Hierher gehört, wie vorige *Milleria angustifolia* Cav. f. Lexic. B. 6.

4. *Flaveria linearis* Lag. Linienförmige Flaverie.

Flaveria maritima Kunth. in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. IV. p. 285.

Stengel krautartig, gestreckt. Blätter gegenüberstehend, rielloß, linienförmig, an der Basis scheidenartig verbunden, fleischig, ganzrandig, ohne Rippen. Fruchtboden nackt. Blümchen zungenförmig, fast einzeln stehend. Vaterl. die Insel Cuba, bei Savannah, am Meeresufer. ☉ Blüthz. März und April.

Flindersia Rob. Brown in Flinders. Voyag. II. p. 595. Flindersie.

Cal. 5fidus, persistens. Petala ovata patentia. Urceolus perigynus 10 lobus staminifer: stamina sterilia cum fertilibus alterna. Antherae apice cornutae. Stylus pentagonus. Caps. muricata quinque valvavis. Semina compressa erecta apice alata.

Kelch fünfspaltig, stehen bleibend. Fünf eiförmige abstehende Corollenblätter. Ein trugförmiges Nectarium auf dem 10 Staubfäden stehen, davon nur fünf vollkommene Antheren tragen und mit den unfruchtbaren Fäden wechseln. Antheren an der Spitze hornförmig. Ein fünfseitiger Griffel. Kapsel weichstachelig, fünftheilig = fünfklappig. Saamen zusammengedrückt, aufrecht, an der Spitze geflügelt.

Pentandria Monogynia (Familie Rutaceen.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Flinders, in dessen Werke: Trav. or. Voyage I — 11 neue Pflanzen beschrieben und abgebildet sind.

1. *Flindersia australis* R. Brown. gen. Remark's on Bot. of Terra Austr. in Flinder's Trav. 11. t. I. Poir. Enc. Suppl. IV. p. 649. Südländische Flindersie.

Ein Baum von mittlerer Größe, dessen Aestchen fast buschartig stehen. Blätter wechselnd, an den Spitzen der Aestchen dicht stehend, gestielt, dreizählig, auch fünfzählig, oder 2 — 3paarig gefiedert. Blättchen länglich, eiförmig, manche lanzettförmig, ganzrandig, glatt, flach, durchscheinend-punktiert, 2 — 3 Zoll lang, 12 — 15 Linien breit. Die Blumen bilden reiche, sehr ästige Endrispen, sind klein, weiß, wohlriechend. Kelch auswendig filzig. Kapsel holzig, länglich, stumpf. Vaterl. Neuholland in Wäldern und an Bergen. h

2. *Flindersia amboinensis* R. Br. Moludische Flindersie.

Blätter meist fünfpaarig gefiedert. Blättchen länglich-lanzettförmig. Blumenstiele hängend, meist traubenständig. Vaterl. die moludischen Inseln. h

Kultur. Gute lockere Dammerde und Durchwinterung im Glashause. N. 2. gedeiht besser im warmen Hause. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und Stecklinge.

Flörkea Willd. f. Lexic. V. 4. S. 181.

Character generic. f. 1. Nachtrag, V. 3. S. 391.

Kelch fünftheilig. Corollenblätter 3, stumpf, leichständig. Staubfäden 6, an der Basis von Drüsen umgeben. Griffel gespalten. Zwei einsamige Schlauchfrüchte.

Hexandria Monogynia (Familie Hydrochariden.)

Im 4 Bande Lexik. habe ich schon bemerkt, daß Willdenow

diese Gattung dem trefflichen Pichenographen Herrn H. G. Flörke, Prof. in Rostock, zu Ehren Flörkea genannt hat. Sie ist mit *Nectris* Schreb. sehr nahe verwandt, aber unterschieden durch drei Corollenblätter, durch einen, nur oben getheilten Griffel, und durch die Frucht.

1. *Flörkea palustris* Nuttall. (Fl. lacustris Pers. f. I. Nachtr. B. 3.)

Fl. uliginosa Mühlenb. Fl. proserpinacoides Willd.
Nectris pinnata Pursh.

Eine zarte, saftreiche Pflanze, die in Nordamerika in Sümpfen und stehenden Wässern (Teichen) wächst. Blätter gefiedert, glatt. Einschnitte linien-lanzettförmig. Blumen einzeln stehend, gestielt, weiß.

Flotovia Spreng. Anthod. imbricatum, squamis superioribus elongatis. Recept. nudum. Flosculi omnes aequales 2 labiati, $\frac{1}{2}$ profunde partiti, ♀ et ♂ mixti. Papp. plumosus persistens. Syst. veg. III. p. 359.

Blüthenbede (Kelch) eiförmig, ziegelschuppig, obere Schuppen länger als die untern. Fruchtboden nackt. Blümchen alle gleich, zweilippig, die Unterlippe tief getheilt. Zwitterblümchen und männliche gemischt, d. h. neben und unter einander. Saamentrone federartig, stehen bleibend.

Syngenesia Sect. II. Perdicicidae (Familie Compositae.)

1. *Flotovia tomentosa* Spr. Filzige Flotovie.

Stengel strauchartig? Blätter länglich, mit drei Nerven versehen, ganzrandig, unten filzig. Vaterl. Brasilien.

2. *Flotovia glabra* Spr. Glatte Flotovie. (*Joannea brasiliensis* Spr. N. Endl.)

Ein Strauch, dessen Aeste gestreift und mit den Narben der abgefallenen Blattstiele gezeichnet sind. Blätter wechselnd, entfernt stehend, gestielt, länglich, auf beiden Seiten glatt, unten glänzend, dreirippig, ganzrandig, $\frac{1}{2}$ Zoll lang, 1 Zoll breit. Blumenstiele gipfelständig, gehäuft, fast doldentraubig, oder vollkommen doldenförmig stehend, graulich. Kelch umgekehrt-eiförmig, ziegelschuppig. Schuppen trockenrauschend, fast gewimpert, die obern länger als die untern strahlenförmig absteehend. Fruchtboden zottig-spreuig. Blümchen ungleichförmig, fünftheilig, gelb oder weißlich. Saamen eiförmig, behaart. Saamentrone federig, aufsteigend, gelblich. Vaterl. Brasilien. h

Fontanesia Labill. f. Lexic. B. 4. führt wahrscheinlich ihren Namen zu Ehren des Herrn Fel. Fontana, Herausgeber des Journ. de phys. Es ist jetzt nur eine Art: *Fontanesia phylliroides* bekannt, die weiße wohlriechende Blumen trägt.

Fontinalis Linn. Quellmoos, Hüßmoos f. Lexic. B. 4. *Membrana conica reticulata* Spr. Der häutige kegelförmige Besatz ist netz- oder gitterförmig, übrigens f. Lexic. *Cryptogamia* Sect. II. (Familie der Laubmoose.)

1. *Fontinalis capillacea* Dicks.

Stengel ästig. Blätter zerstreutstehend, schelfförmig = einseitig, linien = borstenförmig. Kapsel fast hervorragend. Wächst in Schottland und Pennsylvania.

2. *Fontinalis falcata* Hedwig (*Font. capillacea* Linn.)

Stengel ästig, Blätter lanzett = linienförmig, die obere schelfförmig = einseitig, die Rippen an der Spitze eingerollt. Kapsel lang hervorragend. Wächst in Schweden.

Forestiera porulosa Poir. ist *Borya porulosa* Willd.

Forskolea Linn. Forstkolie f. Lexic. B. 4.

Involucrum 5—6 fidum androgynum: *receptaculum* lanatum. Fl. ♂ peripherici tubulosi monandri: ♀ centrales, perianthio ☉, stylo simplici. Spr. Syst. veg.

Blumen monöisch. Hülle (gemeinschaftlicher Kelch) 5—6 theilig. Fruchtboden wollig. Männliche Blumen randständig, röhrig, einmännig. Die weiblichen Blumen stehen in der Mitte auf dem Fruchtboden. Keine Corolle; ein einfacher Griffel. Saame in Wolle gehüllt. Die Gattungskennzeichen im Lexikon B. 4. S. 188. werden gestrichen.

Monopcia Monandria (Familie der Urticeen.)

Diese Gattung hat Linné aufgestellt und sie dem berühmten schwedischen Naturforscher Forskol zu Ehren *Forskolea* genannt. Pet. Forskol (geboren 1733) war ein Schüler des alten Linné. An der Spitze einer Gesellschaft von gelehrten Männern, welche die dänische Regierung nach dem Morgenland abschickte, stand Forskol als Naturforscher. Er sammelte und entdeckte in jenen Ländern viele Pflanzen, die in seinem Nachlasse bekannt gemacht wurden, und starb 1763 zu Jerim im glücklichen Arabien.

1. *Forskolea fruticosa* Willd. Strauchige Forstkolie.

Stengel strauchig, mehr oder weniger ästig. Blätter läng-

lich, gezähnt, die Zähne mucronenspizig, grün, in der Jugend unten grau. Vaterl. Teneriffa. h Blüß. Frühling und Sommer.

Forskolea angustifolia, candida und tenacissima Linn.
f. Lexic.

— *latifolia* Retz. ist *Forskolea tenacissima* Linn.
f. Lexic.

— *scabra* Retz. ist *Forskolea candida* Linn. suppl.
f. Lexic.

Forstera f. Lexic. und 1 Nachtrag. B. 3.

— *glabra* Gaertn. ist *Athecia* f. 2. Nachtr. B. 1.
S. 444.

Forsteronia floribunda Meyer ist *Echites floribunda*
Swartz.

Forsythia Vahl. Cal. 4 partitus. Corolla campanulata, 4fida. Fructus? Enum. pl. 1. p. 39.

Diese Gattung unterscheidet sich von *Syringa* Linn. durch den viertheiligen Kelch und durch die glockenförmige Corolle. Wahrscheinlich führt sie ihren Namen zu Ehren eines Engländer's des Herrn Forsyth, der viele Pflanzen kultivirt, auch einen guten Baumkitt empfohlen hat, welcher den Baumzüchtern bekannt ist und in Baumschulen und Obstpflanzungen benützt wird.

1. *Forsythea suspensa* Vahl. ist *Syringa suspensa* Thunb. siehe die Beschreibung dieses Bierstrauches im Lexic. B. 9. S. 592.

Foscarenia spinosa Vand. *Gardenia armata* Swartz?

Follombronia angulosa Radd. ist *Jungermannia pusilla* Linn.

Fothergilla Linn. siehe Lexic. B. 4. S. 191. (Schubers Handb. 1. 357.)

Kelch abgestuht, ganzrandig. Keine Corolle. Staubfäden zahlreich, keilförmig, mit zweifächerigen Antheren gekrönt. Zwei Griffel. Kapsel zweifächerig, zweisaamig. Saamen knospenhart.

Polyandria Digynia.

Diese Gattung widmete Linné dem Andenken des Herrn Fothergill, Botanikus in England, der zu Upton einen großen botanischen Garten anlegte und viele neue und seltene Pflanzen kultivirte, welche er in einem Werke: „Hortus

uptonienfis (London 1783. 8.) bekannt gemacht hat.
(† 1780.)

1. *Fothergilla alnifolia* Linn. f. Eric. a. a. 5.

Fothergilla mirabilis Aubl. f. *Melaetoma Fothergilla* Richard.

Fouquiera Kunth in Humb. et Bonpl. Nova Gen.
et Sp. VI. p. 83.

Cal. 5phyllus, foliolis ovato-subrotundis imbricatis. Corolla monopetala tubulosa, limbo 5-partito. Filamenta inferne villosa-ciliata. Stylus apice trifidus. Germen uniloculare.

Kelch fünfblättrig, die Blättchen eysförmig-rundlich, dachziegelförmig gelagert. Corolle röhrig, der Rand fünftheilig, abstehend-zurückgeschlagen. Staubfäden zahlreich, bodenständig, an der Basis zottenhaarig-gewimpert und zusammenhängend. Antheren herzförmig, zweifächerig, der Länge nach aufspringend. Fruchtknoten einfächerig. Griffel an der Spitze dreispaltig.

Polyandria Monogynia (Familie der Portulaceen.)

1. *Fouquiera formosa* Kunth J. c. vi. t. 527. Schöne Fouquiere.

Stengel strauchig, stizig, mit kurzen geraden Dornen besetzt. Blätter einzeln, in den Winkeln der Dornen stehend, ganzrandig, fast fleischig. Blumen an den Spitzen der Aeste ährenförmig, stiellos. Vaterl. Mexico. h

Foveolaria cordata Ruiz et Pav. ist *Strigilia cordata* Poir. f. Lexic. B. 9.

Foveolaria ferruginea Ruiz et Pav. ist *Strigilia racemosa* f. Lexic. B. 9.

Foveolaria oblonga Ruiz et Pav. ist *Strigilia oblonga* Poir. f. Lexic. B. 9.

Foveolaria ovata Ruiz et Pav. ist *Strigilia ovata* Poir. f. Lexic. B. 9.

Fragaria Linn. Erdbeere f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 396.

Kelch zehnsplattig, die Einschnitte abwechselnd kleiner. Fünf Corollenblätter, die mit den Staubfäden in der Wand des Kelchs stehen. Zahlreiche nackte Saamen auf einem angeschwollenen, fleischig-saftigen Fruchtboden.

Icosandria Polygynia (Familie der Rosaceen.)

1. *Fragaria canadensis* Michaux. Canadische Erdbeere.

Blätter dreizählig, zottenhaarig. Fruchtskelche abstehend, wie die Blatt- und Blumenstiele mit sehr abstehenden weichen Haaren bekleidet. Fruchtboden und Saamen zottenhaarig. Vaterl. Canada. 24

Die übrigen hierher gehörenden Arten und Anleitung zu ihrer Kultur s. Lexic. und 1. Nachtrag.

Fragaria sterilis Linn. s. Lexic. B. 4. ist *Potentilla Fragaria* Poir.

Fragilaria Lyngb. *Fila simplicia fragilissima*, articulis solutis non cohaerentibus Spr. Syst. veg. VI. p. 314. *Cryptogamia* Sect. iv. *Amphibolae*.

Die hierher gehörenden Gewächse bestehen aus einfachen sehr zerbrechlichen Fäden, deren Aeste oder Glieder aufgelöst, nicht zusammenhängen. Sie wachsen in Sümpfen und stehenden Wässern, wie die Conserven, mit denen sie zunächst verwandt sind.

1. *Fragilaria hyemalis* Lyngb. (*Conserva hyemalis* Roth.)

Fäden einfach, flach, gelb, die Glieder meist abgekürzt. Wächst in Quellen und an nassen Felsen.

2. *Fragilaria pectinata* Lyngb. (*Conserva pectinata* Mill. C. *bronchialis* Roth. *Diatoma pect.* Ag. fl. dan.)

Fäden einfach, flach, straff, durchscheinend-grünlich, die Glieder dreimal kürzer, in der Mitte durchscheinend. Wächst in stehenden Wässern in Europa und Nordamerika.

3. *Fragilaria nummuloides* Lyngb. (*Conserva* Dillw. *Meloseria* Ag. Syst.)

Fäden einfach, walzenrund, fast angeschwollen, sehr zart. Glieder fast gleich, kugelig.

4. *Fragilaria lineata* Lyngb. (*Conserva moniliformis* Milt. C. *inflexa* Roth, C. *lineata* Dillw. *Meloseria moniliformis lineata et Jürgensii* Ag.)

Fäden einfach, sehr zart, flach gelblich. Glieder lang, mit Linien gezeichnet.

5. *Fragilaria striatula* Lyngb. (*Conserva striatula* Engl. bot. *Diatoma arcuatum* Lyngb.)

Fäden einfach, flach, gelblich. Glieder sehr kurz, gestreift.

Fragosa Ruiz et Pav. hat Kurt Sprengel zu *Bolax Commers.* gezogen s. *Bolax* Lexic. zweite Auflage B. 2. S. 517, Auch *Azorella* Juss. s. Lexic. B. 2. und 1. Nach-

trag. B. 1. gehört hierher, und muß daselbst gestrichen werden s. die Synonymen im Lexic. 2. Auflage. B. 2. S. 157.

Fragosa aretioides Kunth. ist *Bolax caespitosus* Spr.

— cladorrhiza R. et P.	—	—	cladorrhizus —
— corymbosa R. et P.	—	—	lycopodioides —
— crenata R. et P.	—	—	crenata —
— multifida R. et P.	—	—	multifidus —
— spinosa — — —	—	—	spinus —

Francoa Cavan. *Frantoa*.

Character generic. s. 1. Nachtrag. B. 3. S. 397.

Kelch 4spaltig, oben stehend. Corolle 4blättrig, 4 Nectardrüsen, 8 Staubfäden, 4 Griffel, 4 keilsförmige, vielsaamige Kapseln.

Octandria Tetragynia (Familie der Dillenien?)

Cavanilles widmete diese Gattung Herrn Franco, einem spanischen Arzt aus dem 16ten Jahrhundert (s. Schultes Geschichte d. Bot.)

1. *Francoa appendiculata* Cav. s. 1. Nachtrag. B. 3.

2. *Francoa sonchifolia* Spr. Sonchusblättrige *Francoa*.

Llaupanke Feuill. Panche sonchifolia Malin s. Lex. 1. Aufl. B. 6. S. 663. wird daselbst ausgestrichen.

Stengel rund, krautartig, hohl, filzig, aufrecht, 3—4 Fuß hoch, unten blättrig, oben nackt, einfach oder mit einigen Seitenästen, die an der Basis mit einem leyerförmigen Blatte besetzt sind. Die untern Blätter stehen wechselnd, gezährt, sind leyerförmig, gepaart, filzig, 6 — 9 Zoll lang. Der Endlappen viel größer als die seitenständigen, länglicheiförmig, stumpf, lappig-buchsig, die untern seitenständigen Lappen am Stiele herablaufend. Blumen kurz gestielt, eine reiche fast cylindrische einfache Endtraube bildend; jedes Blumenstielen ist an der Basis mit einem kleinen lanzett-pfriemenspizigen Deckblättchen (Bractee) versehen. Die Einschnitte des Kelches eiförmig, bräunlich, gestreift. Corollenblätter blaß purpurroth, länglich, ganzrandig, fast dreimal länger als der Kelch. Staubfäden kurz, pfriemenspizig. Antheren klein, länglich. Fruchtknoten mit 4 aufstehenden abstehenden Narben. Vaterl. Chili. 4 Im hiesigen Garten wird diese Art im Glashause überwintert und durch Saamen und Wurzeltheilung vermehrt. Blühz. Sommer.

Frankenia Linn. *Frankenie* s. Lexic. B. 4.

Character generic. s. 1. Nachtrag. B. 3. S. 397.

Kelch röhrig, fünfzählig, Corolle fünfblättrig. Sechs Staubfäden. Ein Griffel mit drei Narben. Kapsel 3—4 klappig; die Saamen sitzen am Rande der Klappen.

Hexandria Monogynia (Familie der Frankenieen.)

Diese Gattung hat Linné bestimmt. Höchst wahrscheinlich führt sie ihren Namen zu Ehren eines alten Botanikers Herrn Joh. Frank aus Camenz, der mit Casp. Bauhin befreundet, im Jahr 1619 ein Werk: „Hortus lusaticus“ herausgab, in welchem die Gewächse der Ober- und Niederlausitz genannt sind. Oder hat Bertoloni die Frankia ramiflora dem Herrn Joh. Frank gewidmet? oder Herrn Frank v. Frankenu? ehemals Professor zu Heidelberg, geboren 1644, gestorben 1784.

† Foliiis glabris Blätter glatt.

Hierher gehören die im Veric. und 1 Nachtrage beschriebenen Arten: Frankenia laevis, hirsuta Linn. F. Nothria Thunb. F. thymifolia Desf. F. microphylla Cav. und folgende.

1. *Frankenia tetrapetala* Labillard. Vierblättrige Frankenie.

Stengel ästig, Blätter gegenüber stehend, fast walzenrund, an der Basis abgelöset, punktiert. Blumen einzeln, gipfelfständig. Corolle vielblättrig. Vaterland: Neuhoiland; van Diemenland. 4 h

2. *Frankenia pauciflora* Cand. Wenigblümige Frankenie.

Stengel aufrecht, filzig, grau. Blätter linien-fadenförmig, zurückgerollt, glatt, nur an der Basis gewimpert. Blumen zerstreut stehend, seiten- und gipfelfständig. Vaterl. Neuhoiland. 4

3. *Frankenia fruticulosa* Cand. Staudenstrauchige Frankenie.

Stengel staudenstrauchig, aufrecht, ästig, glatt. Blätter linienförmig, am Rande zurückgerollt, an der Basis glatt. Vaterl. Neuhoiland. h

4. *Frankenia hispida* Cand. Scharfborstige Frankenie.

Frankenia hirsuta Sibth. non Linn.

Stengel strauchig, ästig fast aufrecht, wie die Aeste scharfborstig. Blätter quirlförmig stehend, linienförmig, abstechend, zurückgerollt, an der Basis fast gewimpert. Blumen einzeln, gipfelfständig. Vaterl. Kleinasien und Sibirien. h

5. *Frankenia revoluta* Forsk. Zurückgerollte Frankenie.

Stengel strauchig, ästig, weitschweifig. Aeste scharf. Blät-

ter quirlförmig stehend, länglich, abgekrüzt, zurückgerollt, dick, grau. Blumen einzeln, gipfelständig. Vaterland: Aegypten. h

6. *Frankenia nodiflora* Lam. Knotige Frankenie.

Stengel fast staudenstrauchig, gestreckt. Blätter eiförmig, gestielt, an der Basis, so wie die Kelche glatt. Blumen winkelförmig, abstehend oder aufrecht. Vaterl. das südliche Afrika. 4 h

7. *Frankenia portulacaefolia* Spr. Portulacblättrige Frankenie.

Stengel strauchig, aufrecht. Blätter rundlich, fleischig, glatt. Blumen winkelförmig? Narbe gespalten. Kapsel zweiflappig. Hierzu gehört *Beatsonia* Roxb.. Vaterl. die Insel St. Helena. h

†† *Folii pubescentibus*. Blätter filzig.

Hierher gehören: *Frank. pulverulenta* Linn. *Frank. corymbosa* Desf. 1. Nachtr. und folgende.

8. *Frankenia velutina* Brouss. Weichhaarige Frankenie.

Stengel strauchig, ästig. Blätter länglich-linienförmig, stumpf, auf beiden Seiten, so wie die Kelche zottenhaarig. Vaterl. Mauritania. h

9. *Frankenia mollis* M. a Bieb. Weichblättrige Frankenie.

Stengel sehr ästig-weitschweifig. Blätter eiförmig-lanzettförmig, gespitzt, zottenhaarig-weich. Blumen trauben-rispenständig. Vaterl. der Kaukasus. 4 h

10. *Frankenia grandifolia* Chamisso. Großblättrige Frankenie.

Stengel staudenstrauchig, gestreckt, ästig. Blätter gegenüberstehend, eiförmig, mucronenspitzig, am Rande zurückgerollt, fast lederartig, größer als bei vorigen Arten, filzig. Blumen einzeln, Kelche, wie die Aeste, scharfborstig. Vaterl. Neu-Californien. h

Die Frankenien sind meist kleine Sträucher, welche in verschiedenen Welttheilen, in Süd- und Nordamerika, in Afrika, Asien und Neuholand sich finden. In unsern botanischen Gärten zieht man sie aus Saamen und vermehrt noch überdies die strauchartigen durch Stecklinge.

Synonymen.

Frankenia canescens Presl. ist *Frankenia pulverulenta* Lexic.

Fran-

Frankenia ericaefolia C. Sm. ist *Frankenia corymbosa*
1. Nachtr.

— *hirsuta* Sibth. f. *Frankenia hispida* N. 4.

— *intermedia* Cand. ist *Frankenia hirsuta*
Linn. f. Lexic.

— *Krebsii* Schlechtend. ist *Frankenia Nothria*
Thunb. f. Lexic.

Frankia ramiflora Bertol. ist *Cicca disticha* Linn. f.
1. Nachtrag.

Franklandia Rob. Brown, zu Flinders Voy. t. 6.
Franklandie.

Cal. hypocrateriformis, limbo 4—partito plano deciduo, tubo persistenti. Antherae inclusae, calici adnatae. Squamae hypogynae in vaginam connatae Nux papposa.

Kelch (Corolle) tellerförmig, der Rand 4theilig, flach, abfallend, die Röhre stehenbleibend. Vier Nectardrüsen in eine Scheide verwachsen. Antheren eingeschlossen, röhrig verbunden. Nuß spindelförmig, gestielt, an der Spitze geflügelt, mit einer Paarkrone versehen.

Tetrandria Monogynia (Familie der Proteaceen.)

Diese Gattung widmete R. Brown dem Herrn Frankland, ein englischer Botaniker und eifriger Förderer der Wissenschaft, der viele Pflanzen kultivirt und beobachtet hat.

1. *Franklandia fuscifolia* R. Br. in Linn. Transact. x. p. 157. Gen. Remarks on Bot. of Terra austr. in Flinders Trav. (Voyage) II. p. 604. t. 6.

Ein glatter Strauch, dessen Theile mit goldgelben Warzen besetzt sind. Blätter wechselndstehend, fadenförmig, zweitheilig. Blumen in winkelfständigen Aehren. Corolle gelb, auswendig mit gelb-braunen Punkten oder Warzen versehen, fast 2 Zoll lang. Bracteen schmutziggelb. Nüsse (Karpopsen) rundig, gestreift, an der Spitze zweiflügelig, mit Paarkrone. Vaterl. das südliche Neuholland; Löwins-Land. h

Fraxinus Linn. Esche f. Lexic. B. 4. (Schubers Handb. t. 357.)

Character generic. f. 1. Nachtrag B. 3. S. 400.

Blumen polygamisch. Kelch viertheilig oder fehlt. Corolle 4theilig, abblättrig, oder fehlt. Zwei Staubfäden. Ein Griffel. Kapsel 2fächerig, zusammengebrüdt, an der Spitze lanzettförmig = geflügelt.

Dietr. Exp. 2r. Nachtr. IV. Bd.

D

Polygamia Linn. Diandria Monogamia Vahl. (Familie der Acereen.)

† Flores corollati. Blumen mit Corollenblättern (Ornus).

Fraxinus Ornus Linn. f. Lexic. Fr. rotundifolia Ait. 1 Nachtr. und folgende Arten gehören hierher.

1. *Fraxinus sriata* Spr. Fr. strigata Bosc. Mem. de Hist. 9.

Ornus strigata Alb. Dietr. in Willd. sp. pl. ed. 2. B. 1. p. 249.

Neste gestreift. Blätter 7paarig gefiedert, unten wie die Blattstiele, zottenhaarig. Blättchen gestielt, länglich, gespitzt, gezähnt.

2. *Fraxinus floribunda* Wallich in Roxb. ind. 1. p. 150. Vielblümige Esche.

Ornus floribunda Alb. Dietr. J. c. Tom. 1.

Ein ziemlich großer Baum, dessen Neste glatt, punktiert, die Nestschen zusammengedrückt sind. Blätter 3paarig gefiedert. Blättchen länglich, langgespitzt, ungleich sägeartig gezähnt, unten glatt, nehadrig, 3—4 Zoll lang, die Endblättchen größer als die untern. Die Blumen bilden reiche gipfelförmige Rispen. Corolle weiß, geruchlos, die Einschnitte linienförmig. Kapsel 1 Zoll lang, die Flügel kaum 2 Linien breit, punktiert.

3. *Fraxinus cappadocica* Juss. Bosc. J. c. 11. p. 214. (Ornus cappadocica Alb. Dietr. J. c.)

Blätter 2paarig gefiedert. Blättchen länglich-eiförmig, tief, ungleich gezähnt, glatt. Endblättchen gerundet. Kapselflügel lang gespitzt. Vaterl. Orient?

† † Flores calyculati apetal. Blumen mit Kelchen, ohne Corollenblätter.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Pericon und 1 Nachtrage beschriebene Arten: Fr. americana Linn. F. caroliniana, juglandifolia Lam. F. pubescens Walt. F. epiptera, platycarpa, quadrangulata Michx. und folgende.

4. *Fraxinus acuminata* Lamarck (F. americana Linn. Varit?)

Blätter 3paarig gefiedert. Blättchen länglich, langgespitzt, ganzrandig, glatt, oben glänzend, unten grau, gestielt. Vaterl. Nordamerika. h Blühz. Mai.

5. *Fraxinus pannosa* Venten.

Blätter 3paarig gefiedert. Blättchen gestielt, eiförmig, ganzrandig, an beiden Enden verbünnt, oben glänzend, unten zottenhaarig = filzig. Knospen gelbroth. Blumen traubenzrispenständig. Waterl. Carolina. h

6. *Fraxinus expansa* Willd. Spreng. Syst. Veg. I. p. 96.

Aeste glatt. Knospen braun. Blätter fünfsaarig gefiedert. Blättchen länglich = eiförmig, langgespitzt, ungleich sägerandig, an der Basis keilförmig, auf beiden Seiten glatt. Waterl. Nordamerika. h

7. *Fraxinus mixta* Bosc.

Blätter 5paarig gefiedert. Blättchen fast stiellos, länglich, ungleich gezähnt, oben glatt, unten an den Rippen scharfborstig. Nordamerika. h

8. *Fraxinus pulverulenta* Bosc. Pulverige Esche.

Blätter 5—6paarig gefiedert, die Stiele pulverig. Blättchen langgestielt, länglich, gespitzt, buchtig, unten filzig. Waterl. Nordamerika. h

9. *Fraxinus rubicunda* Bosc. Dunkelrothe Esche.

Aestchen und Knospen aschgrau. Blätter 3paarig gefiedert. Blättchen länglich gespitzt, fast gezähnt, lederartig, unten fast filzig, die Rippen und Stiele dunkelroth. Waterl. Nordamerika. h

10. *Fraxinus longifolia* Bosc. Langblättrige Esche.

Aeste behaart. Blätter 3paarig gefiedert. Blättchen länglich = lanzettförmig, lang gespitzt, fast gezähnt, oben glänzend, unten, so wie die Stiele filzig. Waterl. Nordamerika. h

11. *Fraxinus viridis* Bosc. Grünästige Esche.

Aeste grün, Blätter 3paarig gefiedert. Blättchen länglich, gespitzt, ungleich sägezählig, die Serraturen scharfspitzig, oben glänzend, unten an den Rippen filzig. Waterl. Nordamerika. h

12. *Fraxinus cinerea* Bosc.

Blätter dreipaarig gefiedert. Blättchen lanzettförmig, ungleich gezähnt, glatt, nur unten an den Rippen behaart. Knospen linienförmig, aschgrau = behaart. Waterl. Nordamerika. h

13. *Fraxinus alba* Bosc.

Blätter dreipaarig gefiedert. Blättchen langgespitzt, ungleich-

spizig gezähnt, unten wie die Stiele behaart. Aeste weißlichgrau. Vaterl. Nordamerika. h

14. *Fraxinus Richardi* Bosc. Richards Esche.

Aeste aschgrau, unten behaart. Blätter dreipaarig gefiedert. Blättchen länglich, gespizt, gezähnt, glatt, unten an den Rippen wenig behaart. Vaterl. Nordamerika. h

15. *Fraxinus ovata* Bosc. Eyförmige Esche.

Aeste gelbroth. Blätter dreipaarig gefiedert. Blättchen eyförmig, gespizt, ungleich gezähnt, unten filzig. Vaterl. Nordamerika. h

16. *Fraxinus elliptica* Bosc. Elliptische Esche.

Aeste braun = schwärzlich, Knospen gelbroth. Blätter dreipaarig gefiedert. Blättchen länglich = elliptisch, mucronenspizig, fast gezähnt. Vaterl. Nordamerika. h

17. *Fraxinus nigra* Bosc. Schwarze Esche.

Aeste schwärzlich. Blätter dreipaarig gefiedert, glatt. Blättchen länglich = langgespizt, buchtig = gezähnt, oben fast glänzend. Vaterl. Nordamerika. h

18. *Fraxinus fusca* Bosc. Braunästige Esche.

Aeste braun, glatt. Blätter dreipaarig gefiedert. Blättchen länglich, mucronenspizig, ungleich gezähnt, oben glatt, unten an den Rippen zottenhaarig. Vaterl. Nordamerika. h

19. *Fraxinus rufa* Bosc. Rostfarbige Esche.

Blätter zweipaarig gefiedert. Blättchen lanzettförmig, lang und feingespizt, ungleich gezähnt, unten rostfarbig behaart. Nordamerika. h

20. *Fraxinus pallida* Bosc. Aeste goldfarbig.

Blätter dreipaarig gefiedert. Blättchen fast stiellos, eylanzettförmig, gezähnt, glatt. Nordamerika. h

Manche Arten (von N. 7—20) welche Bosc. in Nordamerika entdeckt hat, bedürfen noch einer genauern Untersuchung und Bestimmung, besonders in Hinsicht auf die Gestalt und Beschaffenheit der Blüthen und Früchte, dann werden einige, z. B. N. 11, 14, 15, 16, 18, 20, nur als Varietäten zu betrachten seyn.

† † † Flores nudi. Blumen nackt.

Hierher gehören: *Fr. excelsior*, nebst Varietäten. *Fr. simplicifolia* Willd. *Fr. parvifolia* Willd. *Fr. lentiscifolia* Desf. *Fr. sambucifolia* Lam. *Fr. nona* Bosc. *Fr. oxycarpa* Willd. s. Lexic. und 1 Nachtrag, und folgende.

21. *Fraxinus argentea* Loisel. Silberfarbige Esche.

Blätter dreipaarig, gefiedert, grau-silberfarbig. Blättchen lanzettförmig, langgespitzt, sägerandig, gestielt. Waterl. Corolla. h

22. *Fraxinus chinensis* Roxb. Chinesische Esche.

Blätter dreipaarig gefiedert, glatt. Blättchen lanzettförmig, sägerandig. Waterl. China. h

Nutzen, Kultur und Fortpflanzung der Eschen siehe Lexicon. Zu den im 1 Nachtrage B. 3. S. 404. angezeigten Synonymen gehören noch folgende

Synonymen.

Fraxinus alba Bartr. ist *Fraxinus americana* Linn. f. Lexic.

Fraxinus aurea Willd. f. 1 Nachtr. ist *Fraxinus excelsior* var.

Fraxinus caroliniana Du Roi. ist *Fraxinus juglandifolia* Lam. f. Lexic.

Fraxinus crispa Bosc. ist *Fraxinus excelsior* var.

Fraxinus diversifolia Ait. Kew. f. *Fraxinus simplicifolia* Willd. f. Lexic.

Fraxinus monophylla Desf. ist *Fraxinus simplicifolia* Willd. f. Lexic.

Fraxinus oxyphylla M. a Bieb. ist *Fraxinus oxycarpa* Willd. f. 1 Nachtr.

Fraxinus pendula Ait. f. *Fraxinus excelsior*. var. f. Lexic.

Fraxinus polemonifolia Desf. ist *Fraxinus excelsior* var.

Fraxinus verrucosa Link ist *Fraxinus excelsior* var.

Freylinia cestroides Coll. ist *Beureia* Spr.

Freziera Swartz f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1 Nachtrag B. 3. S. 404.

Kelch fünftheilig, von 2 Bracteen unterstützt. Corolle fünfblättrig. Staubfäden zahlreich, bodenständig, mit glatten eiförmigen Antheren gekrönt. Narbe dreispaltig. Beere 3—5fächerig, viel-saamig.

Polyandria Monogynia (Familie Ternströmieen.)

Diese Gattung nannte Swartz *Freziera* zu Ehren des Herrn Amadeus Frezier, Kapitän der Feldmesser, der in den Jahren 1712 und 1713 Chili, Lima auch Magellanien besuchte, dann in seiner Reisebeschreibung die Pflanzen, welche er in jenen Ländern fand, angezeigt hat. Frezier ward 1682 geboren und starb im Jahr 1773?

Die 7 Arten, welche dieser Gattung angehören, siehe Lexicon und 1 Nachtrag.

Friesia Spr. (*Crotonopsis* Michaux) *Character generic.* f. 1. Nachtrag. B. 2. S. 305.)

Diese Gattung hat Kurt Sprengel dem Herrn Prof. C. M. Fries gewidmet, aber warum keine neue Gattung, sondern eine die schon Michaux *Crotonopsis* genannt hat? Herr Fries hat sich durch sein schönes Werk: *Observationes mycologicae*. (Hannov. 1815) verdient gemacht; auch schätzbare Beiträge zur schwedischen Flora geliefert. (*Novitiae flore Sueciae*. Lund. 1814—1815.) siehe *Linnea* herausgegeben von Schlechtend. 4. Jahrg. 3 Stück. p. 70.

1. *Friesia argentea* Spr. Hierher hat Spr. *Crotonopsis linearis* Michx. et Cr. *elliptica* Willd. gezogen, siehe 1 Nachtr. B. 2.

Friesia cestroides Cand. ist *Elaeocarpus peduncularis* Labill.

Fritillaria Linn. Schachblume f. Lexic. (Schuhrs Handb. t. 92.)

Character genericus f. 1 Nachtr. B. 3. S. 407.

- Corolle sechsblättrig, die Blätter inwendig an der Basis mit einer Nectargrube versehen. 6 Staubfäden. 1 Griffel. Kapsel dreifächerig, vielSaamig. Saamen zusammengedrückt, gerändert.

Hexandria Monogynia (Familie Coronarien.)

Die Fritillarien sind Zwiebelgewächse, mit krautartigen sechsblättrigen, einz oder meerblümigen krautartigen Stengeln, deren sechsblättrige glockenförmige Blumen überhängen und zur Zierde eines dem Vergnügen gewidmeten Gartens dienen. Im System sind die Arten nach dem Blüthenstande eingetheilt und geordnet.

† *Caule unifloro* Stengel einblümig.

Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Lexicon und 1 Nachtrage beschriebenen Arten: *Frit. Meleagris*, *verticillata* Linn. *F. nervosa* Willd. und folgende.

1. *Fritillaria tenella* M. a Bieb. Zarte Schachblume.

Frit. orientalis Adam. (Abbild. Wickstr. Beskrifn. t. 5.)

Stengel zart, sehr schlant. Blätter nur sehr wenige, lanzettförmig, langgespitzt, glatt. Blume glockenförmig, würfelförmig, überhängend. Vaterl. Kaukasus und Sibirien. 4

2. *Fritillaria lutea* M. a Bieb. Gelbe Schachblume.

Fr. collina Adam. Fr. lutea latifolia Ker. Bot. Mag. 1538.

Stengel krautartig, einblümig, unten nackt, nach oben mit wenigen Blättern besetzt, glatt. Blätter zerstreut stehend, lanzettförmig, abgekürzt, spizig, flach, gestreift, blaulichgrün. Corollenblätter schwefelgelb und violet, würfelförmig. Vaterl. die Alpen des Kaukasus. 4

3. *Fritillaria ruthenica* Wickstr. Russische Schachblume.

Fr. verticillata M. a Bieb. (non Willd. f. Lexic.)

Fr. pyrenaica Pall. Fr. persica S. G. Gmel. (non Linn. f. Lexic.)

Stengel glatt, etwa 1 Fuß hoch, ein oder mehrblümig. Blätter zahlreich, linien-lanzettförmig, aufrecht, untere gegenüber oder zu 3 quirlförmig, obere zerstreut stehend, in Gabelranken ausgehend. Corollenblätter purpurroth, würfelförmig. Kapsel geflügelt. (Abbild. Wickstr. Beskrifn. t. 5.) Vaterl. das südliche Rußland und Kaukasus. 4

4. *Fritillaria pudica* Spr. Syst. veg. 2. p. 64. (*Lilium pudicum* Pursh.)

Stengel krautartig. Blätter zerstreut stehend, linien-lanzettförmig, gerippt. Corollenblätter einfarbig. Nordamerika. 4

5. *Fritillaria lusitanica* Wickstr. Beskrifn. t. 5. Portugiesische Schachblume.

Stengel etwa 1 Fuß hoch, zart, schlank, einblümig. Blätter abwechselnd, zerstreut stehend, lanzettförmig, langgespizt, flach, aufrecht. Corollenblätter zweifarbig, gestreift, außen violett, innen grünlichgelb. Vaterl. Portugal. 4 Blüht. Frühling, Sommer.

6. *Fritillaria tulipifolia* M. a Bieb. Cent. ross. t. 21. Tulpenblättrige Schachblume.

Fr. caucasica Adam. Fr. obliqua bifolia Var. Ker. Bot. Mag. 1857. f. 1 Nachtr. B. 3. S. 408.

Stengel 1—2blümig; unten nackt, nach oben wenig besättert. Blätter wechselnd, eiförmig oder länglich-lanzettförmig, langgespizt. Corollenblätter einfarbig, gestreift. Vaterl. Kaukasus, auch bei Constantinopel in der Nähe der heißen Quellen. 4

7. *Fritillaria purpurea* Kunth in Humb. et Bonpl.

Nov. gen. et Sp. 1. p. 288.

Stengel meist einblümig. Blätter zerstreutstehend, linien-

förmig, langgespitzt, rinnig. Blume purpurroth, gestreift, die äussern Corollenblätter länglich-lanzettförmig, gespitzt, innere länglich, gefranzt-gewimpert. Vaterl. Neuspanien. 24 Blühz. Septemb.

8. *Fritillaria lanceolata* Pursh. fl. amer. septent. Hierher gehört: *Lilium camtschatcense* Linn. siehe Lexicon B. 5. S. 465.

Man lese daselbst: Stengel einz oder mehrblümig. Blumenblatt ungetheilt, statt ungestielt.

†† *Caule multifloro*. Stengel vielblümig.

Hierher gehören die im Lexicon beschriebenen Arten: *Fr. pyrenaica*, *persica* L. und folgende:

9. *Fritillaria cantoniensis* Lour. Fl. Chin. Chinesische Schachblume.

Stengel mehrblümig. Blätter lanzettförmig, dreirippig. Blumen zu zweien, winkelfständig. Vaterland: China. 24

10. *Fritillaria Imperialis* Linn.

Stengel 2—3 Fuß hoch, von unten bis über die Mitte mit zerstreut stehenden Blättern dicht besetzt, dann nackt bis unter die quirlständigen Blumen, am Ende, über den Blumen einen Blätterkhopf tragend. Uebrigens s. Lexicon B. 4. S. 212. wo auch die schönen Varietäten angezeigt sind. Die Zwiebel enthält scharfen, giftigen Saft.

11. *Fritillaria barbata* J. c. 1. p. 288. Bartige Schachblume.

Stengel wenigblümig; Blätter zerstreut stehend, linienförmig, lang, gespitzt. Blumen winkelfständig. Corollenblätter gestreift: äussere länglich-lanzettförmig, gespitzt, innere umgekehrt-eiförmig, gespitzt, gekerbt, mit Barthhaaren besetzt. Vaterland: Mexico, an Bergen. 24 Blühz. August.

12. *Fritillaria macrophylla* Don. Großblättrige Schachblume.

Stengel aufrecht. Blätter zerstreut stehend, linien-lanzettförmig, lang, glatt. Blumen meist zu 3 stehend, überhängend. Scheide länglich, mucronenspitig. Bracteen länger als die Blumenstielchen. Vaterl. Nepal. 24

13. *Fritillaria alba* Nuttall. Weißblühende Schachblume.

Stengel aufrecht. Blätter länglich-linienförmig, stumpf, schief, fast gestreift. Blumen fast traubenständig, weiß, einfarbig. Vaterland: Nordamerika. 24 Blühz. Sommer.

Kultur und Benutzung der Schachblumen s. Lexic. B. 4. Auf dieselbe Art und Weise werden auch die oben beschriebenen

an neuen Arten, welche in unsern Gärten unter freiem Himmel fortkommen, behandelt werden. N. 5, 6, 7, 11 und 12 überwintert man in frostfreien Behältern, in Gewächshäusern oder Zimmern.

Synonymen.

Fritillaria caucasica Adam. f. *Fritillaria tulipifolia* N. 6.
Fritillaria cirrhosa Don. ist *Fritillaria verticillata* Willd.

f. Lexic.

Fritillaria collina Adam. f. *Fritillaria lutea* M. a. B.
 N. 2.

Fritillaria messanensis Rafin ist wahrscheinlich *Fritillaria plantaginifolia* Lam. f. 1. Nachtr.

Fritillaria pyrenaica Pall. (non Linn.) f. *Fritillaria ruthenica* N. 3.

Fritillaria regia Linn. ist *Eucomis regia* Ait. f. Lexic.

Fritillaria verticillata M. a. B. f. *Fritillaria ruthenica* N. 3.

Frölichia Vahl. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 409.

Kelch vierzählig. Corolle röhrig. 4 Staubfäden; ein Griffel. Beere einsamig. Saamen mit Mantelhaut (Umschlag).

Tetrandria Monogynia. (Familie Rubiaceen.)

Diese Gattung hat Vahl aufgestellt und sie dem Herrn Fröhlich zu Ehren Frölichia genannt. Jo. Alqys Fröhlich schrieb ein Werk: de Gentiana libellus. Erlang. 1796. 8.

1. *Frölichia paniculata* Vahl f. 1. Nachtr.

Aeste vierkantig. Blätter gegenüberstehend, lanzettförmig. Blumen in gipfelständigen Rispen. Waterl. Insel Trinidad. h

2. *Frölichia uniflora* Spr. Einblumige Frölichie.

Aeste walzenrund. Blätter lanzettförmig, büschelförmig stehend. Blumenstiele einblumig, winkelfständig. Zu dieser Art hat Kurt Sprengel *Ixora multiflora* Sw. gezogen, jedoch mit ? f. Lexic. B. 5. S. 233. Waterl. Jamaica h Blühszeit Sommer.

3. *Frölichia violacea* Spr.

Aeste walzenrund. Blätter gegenüber stehend, länglich-eiförmig. Blumen in gipfelständigen, wenigblümigen Doldeutrauben. Hierher gehört *Lonicera corymbosa* Linn. f. Lexic. B. 5. Waterl. Chili, in Sainen. h

Frullania Radd. ist *Jungermannia*.

Frustulia Ag. Diatoma Cand.

Fuchsia Linn. Fuchse f. Lexic. B. 4.

Character generic. et Dedication f. 1. Nachtrag B. 3. S. 409.

Kelch gefärbt, trichterförmig, vierspaltig. Corolle vierblättrig, tutenförmig = zusammengerollt. Acht Staubfäden. Ein Griffel mit einfacher Narbe: Beere vierfächerig, viel-saamig.

Octandria Monogynia (Familie Onagren.)

Die Fuchsien sind zierliche Sträucher, deren Blätter oft zu 3 quirlförmig oder zu 2 einander gegenüber stehen, meist gezähnt, selten glattrandig sind. Blumen gestielt, winkelförmig oder gipfel-, fast trauben- = rispenständig. Kelch meist scharlachroth.

1. *Fuchsia arborescens* Sess. Baumartige Fuchse.

Stamm baumartig, 10—12 Fuß hoch. Aestchen glatt, dunkelroth. Blätter gestielt, zu 3 quirlförmig stehend, länglich, langgespitzt, an beiden Enden verdünnt, undeutlich gezähnt, glatt, 4—7 Zoll lang, 1—2 Zoll breit. Die Stiele dunkelroth. Blumen in ziemlich großen doldentraubigen Endrispen. Blumenstiele nackt, gefärbt. Kelch schön roth. Corollenblätter blaß = violettblau, ausgebreitet. Antheren gelb. (Abbild. Bot. Reg. 943. Bot. Mag. 2620. dieselbe in der Forts. des Garten-Magazins 2. B. 2. St. 1. 9.) Vaterland Mexico. ♀ Blühz. Sommer, im hiesigen Garten.

2. *Fuchsia petiolata* Kunth. in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. VI. p. 104.

Die untern Aeste und Blätter stehen zu 3, die obern einander gegenüber. Aeste und Blätter glatt. Blätter langgestielt, länglich = lanzettförmig, gespitzt, an der Basis keilförmig, entfernt gezähnt, 2 Zoll lang, 7—9 Linien breit, die Stiele feinborstig. Blumen einzeln gestielt, herabhängend, 2 Zoll lang und länger. Blumenstiele 6—8 Linien lang, fadenförmig. Kelch röhrig, gefärbt, viertheilig. Staubfäden hervorragend. Vaterl. Südamerika, bei Santa Fé de Bogota. ♀ Blühz. August. Septemb.

3. *Fuchsia quinduensis* Kunth. J. c. VI. p. 105. Quinduensis Fuchse.

Aeste rundlich. Aestchen fast vierkantig, mit angedrückten Haaren, bekleidet, wie die Blätter zu 3 quirlförmig stehend. Blätter klein, länglich, gespitzt, entfernt gezähnt, geadert, glatt, 9—11 Linien lang, 5½ Linien breit. Blumen an den Spizen der Aeste, einzeln, winkelförmig, gestielt, herabhän-

gend, $\frac{1}{2}$ Zoll lang, die Stiele fadenförmig; 6—7 Linien lang, an der Basis mit zwei kleinen pfriemenspizigen Bracteen besetzt. Kelch gefärbt, röhrig, oben erweitert, viertheilig. Die Einschnitte wenig länger als die Corollenblätter. Vaterl. die quinduenessischen Gebirge (Quito) $\frac{1}{2}$ Blühz. September. Oktober.

4. *Fuchsia loxensis* Kunth. J. c. VI. p. 84. t. 536.

Nestchen scharfborstig. Blätter zu 3 quirlförmig, die obere zu zwei gegenüberstehend, gestielt, länglich-elliptisch oder länglich-lanzettförmig, entfernt undeutlich gezähnt, fast glattrandig, $2\frac{1}{2}$ Zoll lang, 11—13 Linien breit, geadert. Blattstiele 4 Linien lang, feinborstig. Blumen einzeln, winkelfständig, langgestielt, $1\frac{1}{2}$ Zoll lang. Stiele fadenförmig, übergebogen, zartborstig. Kelch röhrig-trichterförmig, purpur- oder dunkel-scharlachroth. Corollenblätter rundlich-eiförmig. Staubfäden hervorragend. Vaterl. Neugranada. $\frac{1}{2}$ Blühz. August.

5. *Fuchsia ayavacensis* Kunth. J. c. VI. p. 107.

Neste und Blätter zartborstig. Blätter zu 3 quirlförmig stehend, länglich, langgespitzt, entfernt gezähnt. Blumen winkelfständig, gestielt. Kelch röhrig-trichterförmig, gefärbt. Einschnitte ey-lanzettförmig, schmal und langgespitzt. Corollenblätter rundlich-eiförmig. Staubfäden hervorragend. Vielleicht nur eine Varietät von der vorigen Art. Vaterl. Peru, bei Ayavaca. $\frac{1}{2}$ Blühz. Julius.

6. *Fuchsia hirtella* Kunth. J. c. VI. p. 107. Feinborstige Fuchse.

Neste borstig-behaart. Blätter zu 3 auch zu 4 quirlförmig stehend, kurzgestielt, länglich-lanzettförmig, langgespitzt, überall mit zarten Borsten besetzt. Blumen fast traubenständig. Die Einschnitte des Kelches langgespitzt. Corollenblätter länglich-lanzettförmig, spizlich. Staubfäden hervorragend. Vaterl. Neugranada, an Bergen. $\frac{1}{2}$ Blühz. August, September.

7. *Fuchsia venusta* Kunth. J. c. VI. p. 105. Liebliche Fuchse.

Neste und Blätter stehen theils zu 3 quirlförmig, theils zu 2 einander gegenüber. Nestchen zartborstig. Blätter gestielt, elliptisch, gespitzt, ganzrandig, glatt, geadert, $2\frac{1}{2}$ Zoll lang, 11—14 Linien breit. Blumen scharlach-purpurroth, einzeln winkelfständig, an den Spigen der Nester fast traubenständig, gestielt. Kelch röhrig, $1\frac{1}{2}$ Zoll lang, glatt, die Ein-

schnitte ey = lanzettförmig, langgespitzt. Corollenblätter länglich = lanzettförmig, gespitzt, wellenrandig. Staubfaden hervorragend. Bei dieser Art hat Kunth in Synops. pl. 3. p. 395. *F. multiflora* Linn. mit? citirt. Waterl. Neugranada bei Quayavalito. ♀ Blühz. Julius.

8. *Fuchsia microphylla* Kunth J. c. VI. p. 103. t. 531. Kleinblättrige Fuchse.

Neste zarthorstig. Blätter sehr klein, zu 2 einander gegenüberstehend, elliptisch = länglich, spizlich, gezähnt, glatt, fast gewimpert, glänzend, meist absteheud = zurückgebogen, 2—5 Linien lang. Blumen einzeln, winkelfständig, gestielt, 4—6 Linien lange Stiele fadenförmig, glatt, grün, fast so lang als die Blume, übergebogen. Kelch trichterförmig, purpur = oder dunkelscharlachroth, die Einschnitte eysförmig, gespitzt. Corollenblätter purpurroth, mehr oder weniger ausgekerbt, so lang als die Einschnitte des Kelches, oder fast hervorragend. Staubfäden eingeschlossen. Antheren weiß. Waterl. Mexico, an Bergen. ♀ Blüht daselbst im September, im hiesigen bot. Garten im Mai bis im Jul. Aug.

9. *Fuchsia thymifolia* Kunth. J. c. VI. p. 104. t. 535. Thymianblättrige Fuchse.

Stamm strauchig, ästig, graubraun, Neste aufrecht = absteheud, rund, röthlich, in der Jugend fast filzig. Blätter meist gegenüberstehend, gestielt, eysförmig, oder rundlich = eysförmig, glatt, ganzrandig, 4—6—7 Linien lang, 3—5 Linien breit. Blattstiele fast rinnig, roth. Blumenstiele einzeln, winkelfständig, übergebogen, fast so lang als die Blattstiele. Blumen sehr klein, kaum 2 Linien lang. Fruchtknoten glatt, grün, glänzend. Kelch und Corolle dunkel = purpurroth. Kelchtheile zurückgeschlagen, pfriemenspizig. Corollenblätter gespitzt, absteheud = zurückgeschlagen, kürzer als die Kelchtheile. Staubfäden eingeschlossen. Griffel walzenrund, roth, hervorragend. Narbe groß, dreilappig, fast fleischig, blasroth. Waterl. Mexico. ♀ Blühzeit, im hiesigen Garten bis Oktober.

10. *Fuchsia gracilis* Lindl. Bot. reg. 847. Dünnästige Fuchse.

F. decussata Graham Bot. Mag. 2507. (non Ruiz et Pav. s. 1. Nachtr.)

Saamen strauchig, ästig, grau = braun. Neste dünn, schlant, rund, glatt, gefärbt, fleisch = oder blasroth. Blätter zu 2 einander gegenüberstehend, gestielt, ey = lanzettförmig, gespitzt,

gezähnt, die Zähne fast mucronenspizig, auf beiden Seiten glatt, fast glänzend, $1\frac{1}{2}$ Zoll lang, 5—9 Linien breit, unten mit erhabenen Rippen, die Mittelrippe, wie der Stiel gefärbt. Blumenstiele, mehrere, winkelförmig, sehr lang, überhängend. Blumen wie bei *F. coccinea* Linn., aber etwas größer. Kelch scharlachroth, trichterförmig. Corollenblätter violet = blau. Staubfäden scharlachroth, lang hervorragend. Antheren weiß.

Eine schöne Species, die der *F. coccinea* zunächst verwandt ist, aber am meisten unterschieden durch größere langgestielte Blätter und durch schlankere Aeste, bei jener sind die Aestchen dunkelroth, fast filzig, die Blattstiele sehr kurz und die Mittelrippe der Blätter auf beiden Seiten dunkelroth. Vaterl. Mexico. ♀ Blüthz. im hiesigen Garten vom Juni bis Herbst.

11. *Fuchsia macrostemma* Ruiz et Pav. f. 1 Nachtrag.

Stamm strauchig, ästig, graubraun. Blätter theils zu 3, die meisten zu 2 einander gegenüber sind gestielt, länglich oder ey = lanzettförmig, ganzrandig, oder fast buchtig = gezähnt, glatt, einfarbig, 1 bis $2\frac{1}{2}$ Zoll lang, 6—10 Linien breit, einfarbig. Blumenstiele einblüthig, winkelförmig. Kelch scharlachroth. Staubfäden hervorragend. Frucht vierkantig. Vaterl. Chili. ♀ Blüthzeit im hiesigen Garten den größern Theil des Sommers.

Kultur und Benützung der Fuchsen siehe Lexicon und 1 Nachtrag B. 3. C. 413. Die oben beschriebenen neuen Arten vegetiren jetzt im hiesigen botanischen Garten und werden im Glashause oder im Erdhause (Pflanzenkeller) überwintert. Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge.

Synonymen.

Fuchsia decussata Graham f. *Fuchsia gracilis* N. 10.
Fuchsia involucrata Swartz ist *Schradera cephalotes*.
Fuchsia magellanica Lam. ist *Fuchsia coccinea* Linn.
 f. Lexic.
Fuchsia virgata Hortul. ist *Fuchsia coccinea* Linn. f.
 Lexic.

Fucus Linn. Tang; Meergras; Meertang. f. Lexic. B. 4.

Diese an Arten sehr reiche Gattung hat man genauer untersucht und nach der Gestalt und Beschaffenheit der Saamen mehrere Gattungen aufgestellt, so finden wir in einem Werke, welches Stackhouse unter dem Titel: *Nereis botanica*

ed. 2. 1816. herausgegeben hat, 35 Gattungen, zu denen viele gehören, die ich im 4. Bande Vericon nach Linné u. a. unter *Fucus* aufgeführt habe. Nach der neuern Anordnung und Bestimmung der Länge, zählt die Gattung *Fucus* nur 12 Arten, der Gattungscharakter ist im Syst. Veget. ed. Spr. so angegeben:

Frons plana aphylla subdichotoma. Receptacula turgida indus mucosa tuberculis sphaericis seminiferis fibrisque intertextis repleta.

Cryptogamia Sect. IV. (Familie der Algen.)

Die hierher gehörenden Arten sind daselbst folgendermaßen geordnet.

I. *Receptaculis terminalibus*. Fruchtböden gipfelständig.

† *Fronde costata*. Laub gerippt.

1. *Fucus vesiculosus* Linn. f. Lexic. B. 4. S. 235. N. 76.

2. *Fucus ceranoides* Linn. f. Lexic. B. 4. S. 225. N. 11. (*F. distichus* Esp.)

3. *Fucus distichus* Linn. f. Lexic. B. 4. S. 227. (*F. ceranoides* Wahlenb.)

4. *Fucus serratus* Linn. f. Lexic. B. 4. S. 234.

†† *Fronde ecostata*. Laub ohne Rippen.

5. *Fucus canaliculatus* Linn. f. Lexic. B. 4. S. 224. (*F. excisus* Linn. Flor. dan. 214. *F. furcatus* Ag. var.)

6. *Fucus peucedanifolius* Gmel.

Laub knorplich, zusammengedrückt, ästig. Nester punktiert an der Spitze gezähnt. Fruchtböden länglich, angeschwollen. Wächst im Meere in Camtschatka.

7. *Fucus gladius* Labill.

Laub linienförmig, ästig, die Einschnitte sichelförmig. Fruchtböden in die Nester eingesenkt. Wächst im Meere in Neuholland.

8. *Fucus confluens* Turner.

Laub linienförmig, gefiedert. Fiedern fast gestielt. Fruchtböden in die Nester eingesenkt. Waterl. Neuholland.

9. *Fucus compressus* Ag. (non Esp. Wolf.)

Laub linienförmig, zusammengedrückt, zweitheilig. Fruchtböden gestielt, elliptisch.

10. *Fucus tuberculatus* Huds. (*F. bifurcatus* Wither. *Cyloseira tuberculata* Ag. var.?)

Laub walzenrund, gabelästig, Fruchtböden cylindrisch, gestreift. Wächst im atlantischen Meere.

II. *Receptaculis lateralibus*. Fruchtböden seitenständig.

11. *Fucus nodosus* Linn. f. Lexic. B. 4. S. 231. (*Halidris* Lyngb. *F. scorpioides* Fl. dan. 1479. *Chordaria* Lyngb. et *Mackaii* sind Varietäten.)

12. *Fucus loreus* Linn. f. Lexic. B. 4. S. 230. (*Ulva pruniformis* Gruner. *Himanthalia lorea* Lyngb.)

Fuirena Rottb. f. Lexic. B. 4.

Character generic. 1. 1 Nachtrag. B. 3. S. 413.

Schnappen gedrängt stehend, einblüthig, gegrannt, ziegel-
dachförmig gelagert. Hülle dreiflappig, mit Borsten versehen,
oder diese fehlen. Drei Staubfäden. Ein dreispaltiger Griffel.

Triandria Monogynia (Familie der Cyperoideen.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Dr. Georg Fuiren ehemals Arzt zu Kopenhagen. Fuiren ward 1581 geboren, studirte Arzneikunde und sammelte zuerst die in Dänemark und Norwegen wildwachsenden Pflanzen, dann entdeckte er auf seinen Reisen manche ausländische Gewächse und starb 1628.

1. *Fuirena arenosa* Rob. Brown. Prodr. 1. Sandliebende Fuirene.

Stamm dreiseitig, aufrecht, wie die Blätter glatt. Dolden winkels- und gipfelständig, einfach. Aehren einzelnstehend, länglich, behaart. Granne doppelt kürzer als die Schuppe. Vaterl. Neuholland, im Sandboden.

2. *Fuirena tereticulmes* Pressl. Rundstammige Fuirene.

Stamm rund, gestreift, glatt, beblättert, 2 Fuß hoch. Scheiden groß, rund, gestreift, glatt. Blätter gewimpert, die obern neben den Blumen länger als die doppelt zusammen-
gesetzten winkels- und gipfelständigen Dolden. Aehren geknäult-
kopfförmig, stiellos, eiförmig, behaart. Schuppen breit, eiförmig, ausgekerbt, mit zurückgekrümmter Granne.

3. *Fuirena hispida* Elliott. Scharfborstige Fuirene.

Stamm aufrecht oder aufsteigend, unten glatt, oben scharfborstig, 1—2 Fuß lang. Blätter schmal, 4—5 Zoll lang, wie die Scheiden scharfborstig. Aehren in gehäuftem zahlreichem

den Köpfchen. Schuppen eiförmig, mucronenspizig, untere scharfborstig, obere filzig. Vaterl. Carolina und Georgien. 4

4. *Fuirena cephalotes* Schrad.

Wurzel kriechend. Halme dreiseitig, aufrecht, 1—2 Fuß hoch. Blätter steif, scharfrandig. Scheiden schlaff, scharfborstig. Hülle meist dreiblättrig. Aehren kopfförmig-geknault, kugel-eiförmig, kürzer als die Hüllblätter. Vaterl. Kap der guten Hoffnung. 4

5. *Fuirena verticillata* Ant. Spr. Quirelförmige Fuirene.

Stamm straff, glatt, über 1 Fuß hoch. Blätter steif, glatt, dreimal kürzer als der Stamm. Aehren walzenrundlich, schmal und an der Spitze abgestutzt, bilden gestielte Asterscheiden, die quirlförmig stehen. Schuppen feinspizig. Wächst in Brasilien.

6. *Fuirena Weigeti* Ant. Spr.

Stamm dreiseitig, glatt, 2—3 Fuß hoch. Blätter liniens-lanzettförmig, wellend, glatt, nur an der Basis gewimpert, so lang als der Stamm. Asterscheiden langgestielt, die Stiele filzig, quirlförmig stehend. Aehren rundlich, lanzettförmig-langgespitzt, glatt. Schuppen feinspizig, zu 3, einblümig. Vaterl. Surinam. 4?

7. *Fuirena pumila* Torrey. Niedrige Fuirene.

Stamm 3—6—8 Zoll hoch, eckig, glatt, nur oben filzig. Blätter liniens-lanzettförmig, flach, so lang als der Stamm. Scheiden am Rande und in der Mündung behaart. Aehren zu 3, selten einzeln, gipfelförmig. Schuppen ey-lanzettförmig, mucronenspizig. Vaterl. Nordamerika. 4?

Die übrigen hierher gehörenden Arten siehe 1 Nachtrag. B. 3.

Synonymen.

Fuirena ciliaris Roxb. ist *Fuirena glomerata* f. 1. Nachtrag.

Fuirena obtusiflora Pers. ist *Fuirena simplex* Vahl. f. 1 Nachtr.

Fuirena rubiginosa Spr. ist *Melancranis rubiginosa* Spr.

Fuligo candida Rehbent. ist *Aethalium candidum* Schlechtend.

Fuligo flava et laevis Pers. ist *Aethalium flavum* Link.

Fuligo violacea Pers. ist *Aethalium violaceum* Spr. Fu-

Fumaria Linn. Erdrauch. f. Lexic. B. 4. (Gaertn. Sem. t. 115.)

Kelch zweiblättrig. Corolle unregelmäßig, rachenförmig, fünfblättrig, 4. Blätter verbunden, das oberste an der Basis sackförmig = hohlerig oder gespornt. Staubfäden 2, breithäutig; jeder trägt drei Antheren. Kapsel (Karpopse) kugelig oder zusammengebrückt.

Diadelphia Hexandria (Familie Fumarieen.)

† **Fructibus globosis.** Früchte kugelförmig.

Hierher gehören die im Verikon beschriebenen Arten: *Fumaria officinalis*, *capreolata* Linn. *F. parviflora* Lam. und folgende.

1. *Fumaria Vaillantii* Lois. Baillants Erdrauch.

Stengel krautartig, aufrecht. Aeste ausgebreitet. Blätter doppelt zusammengesetzt, blau-grün, glatt. Einschnitte lineenförmig, flach. Blumen in wenigblümigen Trauben. Vaterl. Schlessen, das westliche Deutschland und mittlere Frankreich, an gebauten und ungebauten Orten. ☉ Blühz. Frühjahr und Sommer.

†† **Floribus compressis.** Früchte zusammengebrückt.

Fumaria spicata Linn. *F. corymbosa* Desf. f. Lex. gehören hierher und folgende.

2. *Fumaria Mundtii* Spreng. (*Discocapnos Mundtii* Schlechtend.)

Stengel krautartig, aufrecht, wie die Blätter glatt, blausch-grün. Blätter doppelt fiederspaltig, mit Gabelranken versehen, die Lappen stumpf. Blumen in Trauben, die den Blättern gegenüberstehen. Früchte zusammengebrückt, gerändert, einrippig. Vaterl. das südliche Afrika. ☉ ?

3. *Fumaria turbinata* Smith. Cand. Kreiselfrüchtiger Erdrauch.

Stengel krautartig, fast kletternd. Blattstiele an der Spitze mit Gabelranken versehen. Blätter dreifach zusammengesetzt. Blättchen oval, mucronenspitig. Blumen in Trauben gesammelt. Früchte umgekehrt eiförmig = kreiselförmig. Vaterl. Palästina?

Die übrigen Arten, welche ich im Verikon B. 4. nach Linn. n. a. unter *Fumaria* aufgeführt habe, gehören zu *Corydalis* Dillen., wie aus folgender Synonymen = Liste erhellt.

Dietr. Exr. 2r Nachtr. IV. Bd.

Ⓔ

Synonymen.

- Fumaria acaulis* Wulf f. Lexic. ist *Corydalis acaulis* Pers.
Fumaria africana Lam. f. *Fumaria corymbosa* Lexic.
Fumaria altaica Ledeb. ist *Corydalis pauciflora* Pers.
Fumaria angustifolia M. a Bieb. f. *Corydalis angustifolia* Cand. f. 2 Nachtr.
Fumaria baurita Vahl. f. *Corydalis tenuifolia* Pursh. f. 2 Nachtr.
Fumaria bracteata Willd. f. Lexic. ist *Corydalis bracteata* Pers.
Fumaria bulbosa Linn. f. Lexic. ist *Corydalis bulbosa* Pers.
Fumaria bulbosa Linn. α . ist *Corydalis bulbosa*.
Fumaria bulbosa Linn. β . ist *Corydalis fabacea* Pers.
Fumaria bulbosa Cand. ist *Corydalis Halleri* Willd.
Fumaria bulbosa Thunb. ist *Corydalis decumbens*. Pers.
Fumaria capnoides f. Lexic. ist *Corydalis capnoides* Pers.
Fumaria capreolata Lightf. ist *Fumaria officinalis* f. Lexic.
Fumaria caucasica Adam. f. *Corydalis angustifolia*.
Fumaria caudata Lam. Willd. f. Lexic. ist *Corydalis longiflora* Pers.
Fumaria claviculata Linn. f. Lexic. ist *Corydalis claviculata* Pers.
Fumaria crassifolia Desf. f. *Sarcocapnos crassifolia* Cand.
Fumaria Cucullaria f. Lexic. ist *Corydalis Cucullaria* Pers.
Fumaria decumbens Thunb. f. Lexic. ist *Corydalis decumbens* Pers.
Fumaria densiflora Cand. ist *Fumaria officinalis* var. f. Lexic.
Fumaria enneaphylla f. Lexic. ist *Sarcocapnos enneaphylla* Cand.
Fumaria eximia Ker. f. *Corydalis* 2 Nachtr.
Fumaria fabacea Retz f. Lexic. ist *Corydalis fabacea* Pers.
Fumaria flavula Rafin. ist *Corydalis aurea* f. 1. Nachtr.
Fumaria formosa Andr. f. *Corydalis formosa* 2 Nachtr.

Fumaria fungosa Ait. f. Lexic. ist *Corydalis fungosa* Vent.

Fumaria glauca Curt. ist *Corydalis glauca* Pers.

Fumaria Halleri f. Lexic. ist *Corydalis Halleria* Pers.

Fumaria incisa f. Lexic. ist *Corydalis incisa* Pers.

Fumaria intermedia Ehrh. ist *Corydalis fabacea* Pers.

Fumaria longiflora f. Lexic. ist *Corydalis longiflora* Pers.

Fumaria lutea Linn. f. Lexic. ist *Corydalis capnoides* Pers.

Fumaria lutea Thunb. f. *Corydalis pallida* Pers.

Fumaria Marshalliana Pall. f. Lexic. ist *Corydalis Marshalliana* Pers.

Fumaria media Cand. ist *Corydalis officinalis* var. f. Lexic.

Fumaria micrantha Lag. ist *Corydalis parviflora* Lam.

Fumaria nobilis Jacq. f. Lexic. ist *Corydalis nobilis* Pers.

Fumaria pæonifolia f. Lexic. ist *Corydalis paeonifolia* Pers.

Fumaria pallida f. Lexic. ist *Corydalis pallida* Pers.

Fumaria pauciflora f. Lexic. ist *Corydalis pauciflora* Pers.

Fumaria peregrina Rudolph f. *Corydalis lachenalisflora* 2 Nachtr.

Fumaria racemosa f. Lexic. ist *Corydalis racemosa* Pers.

Fumaria recta Michx. ist *Corydalis fungosa* Vent.

Fumaria rutifolia Smith. ist *Corydalis rutaefolia* Cand.

Fumaria Schangini Pall. ist *Corydalis longiflora* Pers.

Fumaria semperens f. Lexic. ist *Corydalis glauca* Pursh.

Fumaria sibirica f. Lexic. ist *Corydalis sibirica* Pers.

Fumaria solida Ehrh. ist *Corydalis Halleria* Pers.

Fumaria spectabilis f. Lexic. ist *Corydalis spectabilis*.

Fumaria uniflora Sieb. ist *Corydalis rutaefolia* Cand.

Fumaria vesicaria f. Lexic. ist *Cysticapnos africana* Gaertn.

Funaria Hedwig hist. nat. musc. 2. t. 10. f. 58. f. Lexic. B. 4. C. 246.

Diese Laubmoosgattung unterscheidet sich durch eine fast

birnförmige Kapsel, deren äußere Zähne schief stehen und an der Spitze zusammenhängen.

Cryptogamia Sect. 11. (Familie der Laubmoose.)

1. *Funaria hygrometrica* Hedw. (Mnium Linn.)

Stengel einfach, sehr kurz. Blätter länglich = eiförmig, mucronenspitzig, concav, durchscheinend, netzadrig, ganzrandig. Borste (Kapselstiel) knieartig gebogen, gekrümmt. Wächst in Europa auf lehmigen feuchten Boden.

2. *Funaria flavicans* Michx.

Stengel einfach, sehr kurz. Blätter fast wie bei voriger Art. Borste aufrecht, an der Spitze übergebogen. Wächst in Nordamerika.

3. *Funaria clavescens* Schwägr.

Stengel einfach, aufrecht. Blätter länglich = lanzettförmig, gespitzt, ganzrandig, wellend, in trockenem Zustande gedreht. Borste aufrecht. Kapsel keulensförmig, fast aufrecht. Wächst in St. Domingo und Neuholland.

4. *Funaria Fontanesii* Schwägr.

Stengel einfach, aufrecht. Blätter dicht = rosettenförmig stehend, länglich, gespitzt, fast sägerandig, netzadrig. Kapsel birnförmig, fast aufrecht. Wächst in Portugal, Aegypten und Nordafrika.

5. *Funaria hibernica* (F. calcarea Wahlenb.)

Stengel einfach, aufrecht. Blätter zerstreutstehend, lanzettförmig, langgespitzt, sägerandig, gerippt. Kapsel birnförmig, fast aufrecht. Wächst in Schweden.

6. *Funaria Mühlenbergii* Turn.

Stengel aufrecht, abgekürzt. Blätter dichtstehend, aufrecht, eiförmig, sägerandig. Kapsel birnförmig, übergebogen. Wächst in Europa und Nordamerika.

Funkia Willd. s. 1 Nachtrag ist *Astelia pumila* Spr. *Melanthium pumilum* Forst.

Funkia Spr. (*Hemerocallis* Thunb. *Hosta*. *Trattinn*.)
Funkie.

Corolla campanulata subringens. Stamina declinata basi corollae inserta. Caps. zlocularis: semina arillata, embryonibus pluribus Spr. Syst. veg. 11. p. 5.

Corolle sechstheilig, glockig, fast rachenförmig. Staubfäden sechs, niedergebogen, an der Basis der Corolle eingefügt. Ein

Griffel. Kapsel dreifächerig, vielSaamig. Saamen mit einem Umschlage versehen und enthält mehrere Keime.

Hexandria Monogynia (Familie der Coronarien.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Heinr. Christ. Funk, Apotheker zu Gefrees, der einige schätzbare Beiträge zur salzburgischen Flora lieferte und noch überdies durch die Herausgabe der kryptogamischen Gewächse des Fichtelgebirges sich um die Wissenschaft verdient gemacht hat.

1. *Funkia coerulea* Reichenb. (F. ovata Spr.) Blau blühende Funkie.

Hemerocallis coerulea Andrews Bot. repos. t. 6. (H. japonica β. Willd.)

Hosta japonica Trattinnick Archiv (s. I. Nachtr. B. 4. S. 20.)

Wurzel ästig. Blätter gestielt, eiförmig, gespißt, gerippt, die Stiele rinnenförmig, geflügelt. Stengel nackt, aufrecht, rund, meist 1—2 Fuß hoch und höher, über der Mitte bis zur Spitze mit hängenden Blumen besetzt, die eine aufrecht einseitige Traube bilden. Corolle glockig, blau = lila. Bracteen scheidenartig, häutig, ey = lanzettförmig, gespißt, gestreift. Vaterl. Japan. 4 Blühz. Sommer. (Abbild. Bot. Mag. 894.)

2. *Funkia alba* Reichenb. (F. subcordata Spr.) Weißblühende Funkie.

Hemerocallis alba Andr. Repos. t. 194. Bot. Mag. 1433.

Hemerocallis japonica Thunb. et Willd.

Wurzelblätter langgestielt, rundlich = herzförmig, gespißt, vielrippig, ganzrandig, glatt, doppelt größer als bei vorhergehender Art. Stiele rinnig. Stengel 1 Fuß hoch, aufrecht oder schief = aufsteigend, glatt, in der Mitte gewöhnlich mit einem eiförmigen, unten scheidenartig umfassenden Blatte besetzt. Blumen zu 6—8 gipfelständig, röhrig, zweilippig, sechstheilig, weiß, 4—5 Zoll lang, und verbreiten einen sehr angenehmen Geruch, fast wie Orangenblüthen. Bracteen scheidenartig, häutig, lanzettförmig, oder ey = lanzettförmig, gespißt, länger als die Blumenstiele. Vaterl. Japan. 4 Blühz. Sommer bis Herbst.

3. *Funkia lancifolia* Spr. Lanzenblättrige Funkie.

Hierher gehört: *Aletris japonica*, *Hemerocallis lan-*

cifolia et japonica Thunb. f. Lexic. B. 4. S. 594. N. 3. und 4.

Diese Gewächse dienen zur Zierde der Gärten, vornehmlich N. 2.

Sie blühen im Sommer, perenniren im hiesigen Garten im freien Lande, und lassen sich leicht durch Wurzeltheilung und durch Saamen vermehren und fortpflanzen. In kalten Wintern werden die Wurzeln mit Laub oder Gerberlohe, die schon zu Treibbeeten gedient hat, etwa 1 Fuß hoch bedeckt.

Furcellaria Agardh *Algarum* et Synops. *algarum*.

Laub fadenförmig, zweitheilig. Fruchtwurzen schotenförmig, gipfelständig.

Cryptogamia Sect. IV. (Familie Algen.)

1. *Furcellaria lumbricalis* Ag. (*Fucus lumbricalis* et *fastigiatus* S. G. Gmel. *Fucus furcellatus* Linn. Old. f. Lexic. B. 4. S. 229.)

Laub fadenförmig, gabelästig, olivenbraun, etwa 5—7 Zoll lang. Aeste walzenrund. Wurzen (Fruchtlager) schotenförmig, gipfelständig. Wächst im kaltsichen und Nordmeere.

Fusanus Linn. *Fusanus* (Lamarck Illustr. t. 73.)

Character generic. f. I. Nachtrag. B. 3. S. 418.

Corolle kelchartig, radförmig, vierspaltig. Nectarium vierlappig. Vier Staubfäden mit vierfächerigen Antheren gekrönt. Vier Narben. Steinfrucht beerartig, vierkantig, einsamig.

Tetrandria Monogynia (Familie Santaleen.)

1. *Fusanus spicatus* Rob. Brown. Prodr. Fl. nov. Holl. 1. p. 355.

Ein Baum, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter länglich-linienförmig, stumpf, unbewehrt. Blumen in winkelförmigen, zusammengesetzten Aehren. Vaterl. Neuhoiland, in der Nähe des Meeres. h

2. *Fusanus compressus* Linn. Hierher gehört *Thesium Colpoon* Thunb. f. Lexic. B. 9. *Colpoon compressum* Berg. *Evonymus* Lam.

Ein aufrechter, glatter Strauch, 2—4 Fuß hoch, dessen Aeste zusammengebrüdt: eckig sind. Blätter gestielt, eiförmig, flach, mucronenspitig, aufrecht-abstehend 1 Zoll lang. Die Stiele dreikantig, kaum eine Linie lang. Blumen in gipfelständigen, zusammengesetzten, dreitheiligen Rispen. Nuß eiförmig, glatt. Vaterl. das Kap der guten Hoffnung, auf Hügeln am Fuße des Tafelberges. h

3. *Fusanus acuminatus* R. Br. J. c.

Stamm strauichig. Blätter lanzettförmig, halenförmiglanggespitzt. Blumen in gipfelfständigen Trauben. Vaterl. und Standort wie N. 1.

4. *Fusanus crassifolius* R. Br. Dickblättriger Fusanus.

Ein Strauch, dessen Aestchen vierkantig sind. Blätter lanzettförmig, stumpf, fleischig. Blumenstiele winkelfständig, wenigblümig. Vaterl. und Standort, wie N. 1.

5. *Fusanus pedatus* Spr. (Lagenula pedata Lour.)

Stengel strauichig? Aeste kletternd, mit Gabelranken versehen. Blätter fünfzählig-fußförmig, gekerbt, flzig. Blumen in gipfelfständigen Trauben. Früchte keulenförmig? Ob diese Art, die in Cochinchina wild wächst, hierher oder zu einer andern Gattung gehört, muß noch genauer untersucht werden.

Kultur: N. 1—4 kommen aus Neuhoiland und werden in unsern Gärten im Glashause überwintert. Man vermehrt sie durch Saamen und Stecklinge.

Fusarium Link. Cryptogamia Sect. V. Coniomyctes. (Familie Keimpilze.)1. *Fusarium ciliatum* Nees (Tubercularia ciliata Alb. et Schw. Atractium ciliatum Link.)

Der Körper scheibenförmig, fast gestielt und mit langen weißen dann rothen Wimpern versehen.

2. *Fusarium roseum* Link (Atractium pulvinatum Link.)

Halbkugelig, glatt, rosenroth, wächst an trockenen Aesten verschiedener Malvenarten.

3. *Fusarium buxi* Spr. (Psilonia rosea Fr.)

Fast kugelförmig, rosenroth und findet sich an den Blättern des Buxus.

4. *Fusarium candidum* Ehrenb.

Weißes Fusarium, findet sich an Baumrinden.

5. *Fusarium lateritium* Nees.

Wächst an Aesten der Bäume.

6. *Fusarium tremelloides* Grev. (Tremella Urticae Pers. T. miniata Rebert. Dacryomyces Urtica Nees) Abbild. Grev. crypt. Scot. t. 10.**Fusidium** Link. Sporidia scobiformia s. fusiformia

fluxa Spr. Syst. veg. IV. p 382. Cryptogamia Sect. V. (Familie der Reimpilze.)

1. *Fusidium gryseum* Link.

Wächst an trocknen Buchenästen.

Zu dieser Gattung gehören noch folgende Arten: *F. flavovirens* Ditmar. *F. candidum* Link. *F. obtusatum* Link. *F. aureum* Link. *F. atrum* Spr. (*Cryptosporium* Kunz.) *F. septatum* Kunz. *Fusisporium aurantiacum* Link. ist *Camptosporum* Spr.

G.

Gaertnera Lamarck. (non Roxburgh) Gärtner.

Kelch glockenförmig, ausgeschweift. Corolle trichterförmig, der Rand fünfspaltig. Staubfäden 5, eingeschlossen. Ein Griffel. Beere zweisamig.

Pentandria Monogynia. (Familie Rubiaceae?)

Diese Gattung widmete Lamarck dem Herrn Joseph Gaertner, Verfasser eines schätzbaren Werks: *Josephi Gaertneri de fructibus et seminibus plantarum* Vol. 1-11. Stuttgart 1788. 4to, mit 180 Kupfern, wodurch er sich um die richtige Bestimmung der Früchte und Samen sehr verdient gemacht hat. Joseph Gärtner war Arzt zu Calw bei Stuttgart und starb im Jahr 1791. Dr. G. Gärtner, Mitherausgeber der ökonomisch-technischen Flora von der Wetterau, beschäftigte sich mit künstlicher Befruchtung der Blüten.

1. *Gaertnera vaginata* Lam. (*Andersonia vaginata* Willd. herb.)

Stamm baumartig. Blätter gegenüberstehend, länglich, an beiden Enden verdünnt, lederartig, glatt. Akerblätter cylindrisch, abgestutzt. Blumen in gipfelständigen, straffen Rispen. Vaterl. Mascaren Insel. ♀ Blühz. Sommer.

Gaertnera Roxburgh ist *Hiptage* Gaertn. und muß im Lexikon B. 4. S. 247. gestrichen werden.

Gaertnera obtusifolia Roxb. f. *Hiptage obtusifolia* f. 2. Nachtr.

Gaertnera racemosa Roxb. f. Lexic. ist *Hiptage Madagblota* Gaertn. f. 2. Nachtr.

Gagea compacta Radd. f. *Zygodon conoideus*.

Gagea saxatilis und *bohemica* (*Ornithogalum* Schmidt.)
 siehe die Abhandlung von Dr. Koch in der allgemeinen botanischen Zeitung N. 35. Regensburg am 21. Sept. 1834.

Gagnebina Cand. ist *Prosopis tamariscina* Spr.

Gahnia Forster. *Gahnie* (Gaertn. Sem. Suppl. t. 181.)

Character generic. f. 1. Nachtrag. B. 3. S. 418.

Aehrchen einblüthig. Schuppen zahlreich, gedrängstehend, geschlossen, die untern unfruchtbar; die obern enthalten 6 Staubfäden und einen zweispaltigen Griffel mit gespaltenen Narben. Riß knochenhart.

Hexandria Monogynia (Familie der Eyperoideen.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines schwedischen Arztes, des Herrn Dr. Henr. Gahn, der im Jahre 1753 ein Werk über die Medicinal- = Gewächse herausgab.

1. *Gahnia procera* Forster. f. Lexic. B. 4.

Stamm rund, Blätter linienförmig, pfriemenspizig. Rispe aufrecht, lang. Drei zweispaltige Narben. Waterl. Neuseeland.

2. *Gahnia psittacorum* Labill. f. 1. Nachtr. B. 3.

Stamm rund, straff. Blätter lang, linienförmig, pfriemenspizig, scharfrandig. Rispe zusammengesetzt, beblättert. Aehrchen dichtstehend, an der Basis verdünnt. Schuppen gespizt. Riß glänzend, mucronenspizig. Gah. *erythrocarpa* R. Br. gehört hierher. Waterl. Neuholland, van Diemenland. 4

3. *Gahnia leucocarpa* R. Br.

Rispe zusammengesetzt. Aehrchen an der Basis verdünnt. Schuppen spizlich. Risse an der Spitze brandig mucronenspizig. Neuholland.

4. *Gahnia trifida* Labill. f. 1. Nachtr. (*Lampocarya hexandra* R. Br.)

Blätter lang, linienförmig, pfriemenspizig. Rispe lang, die Aeste angedrückt. Aehrchen gehäuft, kopfförmig. Schuppen feinspizig. Narben einfach. Waterl. Neuholland; van Diemenland. 4

5. *Gahnia aspera* Spr. (*Lampocarya aspera* R. Br.)

Ahre zusammengesetzt, beblättert, Aehrchen gehäuft stehend. Blumen vierfädig. Schuppen stumpf. Neuholland.

6. *Gahnia melanocarpa* R. Br.

Rispe zusammengesetzt, fast zusammengezogen. Blumen dreifädig. Narben ungetheilt. Waterl. Neuholland; van Diemenland. 4

Diese Gewächse behandelt man in unsern Gärten wie andere Eppersideen, die aus Neuhollland kommen. Man zieht sie aus Saamen und vermehrt noch überdieß die perennirenden Arten durch Wurzeltheilung.

Gaillarda pulchella Fougereux ist *Galardia bicolor*.

Galactia Patr. Brown. *Galactie*.

Kelch vierzählig, von 2 Bracteen unterstützt. Corolle schmetterlingsförmig, das Fährchen breit, ausliegend. Zehn Staubfäden. Narbe stumpf. Hülsen rund.

Diadelphia Decandria (Familie der Hülsenpflanzen.)

1. *Galactia simplicifolia* Spr. Einfachblättrige *Galactie*.

Cologania procumbens Kunth in Humb. Nov. Gen. et Sp. VI. p. 412. Humb. et Bonpl. Pl. legum. p. 205. t. 57.

Stengel staudenstrauchig, gestreckt. Blätter einfach, länglich, stumpf, unten borstig. Blumenstiele winkelfständig, gepaart. Kelche seidenhaarig. Waterl. Südamerika. Popayan Columbiae. h Blühz. October.

2. *Galactia pendula* Pers. ist *Clitoria Galactia* Linn. f. Lexic. B. 3. S. 196. *Galactia coriacea* Mart. Variet.

3. *Galactia angustifolia* Spr. Schmalblättrige *Galactie*.

Clitoria angustifolia Martius Fl. bras.

Blätter dreizählig. Blättchen herz-lanzettförmig, unten seidenhaarig, nehadrig. Trauben winkelfständig. Waterl. Brasilien. h

4. *Galactia sericea* Pers. Seidenhaarige *Galactie*.

Stengel windend. Blätter dreizählig. Blättchen eiförmig, stumpf-eingekerbt, unten seidenhaarig. Blumen in winkelfständigen Trauben. Kelche zottenhaarig. Waterl. Insel Mascaren.

5. *Galactia mollis* Michaux. Weichblättrige *Galactie*, ist *Hedysarum volubile* Linn. f. Lexic. B. 4. auch *Glycine parviflora* Lam. f. Lexic. B. 4. gehört hierher.

6. *Galactia pilosa* Nuttall. Behaarte *Galactie*.

Stengel windend, behaart. Blätter dreizählig. Blättchen oval, stumpf, unten blaugrün. Blumen fast stiellos. Hülsen zottenhaarig. Waterl. Carolina und Georgien.

7. *Galactia pulchella* Spr. Liebliche *Galactie*.

Cologania pulchella Kunth. J. c. VI. p. 413.

Stengel krautartig und windet sich. Blätter dreizählig. Blättchen länglich, stumpf, borstig, unten blauschgrün. Blumenstiele winkelförmig. Kelche scharfborstig. *Cologania ovalifolia* Kunth. var. Waterl. Neuspanien. 4 Blühz. Septemb.

8. *Galactia tomentosa* Spr. Filzige Galactie.

Clitoria tomentosa Martius f. c.

Blätter dreizählig. Blättchen länglich, unten, so wie der Stengel filzig. Blumen fast kopfförmig stehend, mit Bracteen besetzt. Kelche zottenhaarig. Brasilien.

9. *Galactia glabella* Michx. Blattliche Galactie.

Stengel ästig, weitschweifig. Blätter dreizählig. Blättchen elliptisch, ausgekerbt, fast lederartig, glatt. Blumen in langen vielblumigen Trauben. Corollenblätter fast gleich. Hierher gehört: *Dolichos regularis* Linn. f. Lexic. B. 3. S. 659. Waterl. Nordamerika, Virginien.

10. *Galactia mexicana* Spr. Mexicanische Galactie.

Cologania angustifolia Humb. et Bonpl. J. c. t. 58.

Stengel krautartig, windend. Blätter dreizählig. Blättchen länglich-liniensförmig, stielig. Blumenstiele gepaart, winkelförmig. Kelche scharfborstig. Waterl. Mexico. 4 Blühz. Mai und Juni.

11. *Galactia pilosa* Nutt. Behaarte Galactie.

G. Juslæana Humb. et Bonpl. Pl. legum t. 55.

Stengel staudenstrauchig, kriechend. Blätter dreizählig. Blättchen elliptisch, fast lederartig, auf beiden Seiten seidenhaarig-silzig. Blumenstiele winkelförmig, kurz, fast traubig. Kelche silberfarbig-seidenhaarig. Waterl. am Orinoco. h Blühz. Sommer.

12. *Galactia glaucescens* Kunth. J. c. VI. p. 431.

Stengel staudenstrauchig. Blätter dreizählig. Blättchen elliptisch-länglich, stumpf, lederartig, glatt, oben glänzend, unten blauschgrün. Blumen in winkelförmigen Trauben. Kelche und Hülsen seidenhaarig. Waterl. Quito, bei Penipe am Flusse Cuella. h Blühz. Juni.

13. *Galactia pinnata* Pers. Geseederte Galactie.

Clitoria polyphylla Poir. Encycl. meth.

Stengel strauchig, kletternd. Blätter vielpaarig geseedert. Blättchen elliptisch, glatt. Blumen in winkelförmigen Trauben, die behaart und fast so lang als die Blätter sind. Bracteen lanzettförmig. Waterl. Portorico. h

14. *Galactia Elliottii* Nutt. Südearolinische Galactie.

Stengel windend. Blätter dreipaarig gefiedert, glatt. Blättchen elliptisch, stumpf-eingeserbt, fast lederartig. Blumen in wenigblümigen Trauben, die kürzer als die Blätter sind. Vaterl. Südearolina. 4?

15. *Galactia viciaeformis* Spr. Wickenförmige Galactie.

Clitoria vicioides Martius J. c.

Blätter vielpaarig gefiedert, filzig. Blumen in winkelschändigen vielblümigen Trauben. Fähnchen kreisrund. Vaterl. Brasilien.

Die Galactien sind theils strauchig oder staubenstrauchig, theils krautartige Pflanzen, deren Blätter wechselnd stehen. Blumen rosenroth oder weiß, in winkelschändige Trauben gesammelt. Man zieht sie aus Saamen, setzt hernach die Arten, welche aus Tropenländern kommen, einzeln in Topfe und stellt sie ins warme Haus oder in einen Sommerkasten; die übrigen gedeihen im freien Lande.

Galactites Mönch. Character generic. f. I. Nachtrag.

B. 3. S. 419.

Blüthendecke (Kelch) eiförmig, schuppig, die Schuppen dornig, dachziegelförmig gelagert. Fruchtboden borstig. Saamencrone gefiedert. Die geschlechtslosen Randblümchen röhrig.

Syngenesia 3 Ordn. (Familie Compositae.)

1. *Galactites tomentosa* Mönch. Hierher gehört *Centauria Galactites* Linn. f. Lexic. und 1. Nachtrag. B. 2. S. 168.

Galactodendrum Humb. Relat. hist. 11. p. 106.

130. Kunth, Synops. IV. p. 198. (Familie der Urticeen.)

1. *Galactodendrum utile* Kunth. in Humb. gen. VII. p. 163. Milchbaum; Kuhbaum.

Diesen Baum hat Prof. Kunth in Synops. pl. beschrieben, ohne Gattungskennzeichen und am Schlusse bemerkt: „An Brosimii species? habitus Ficus.“

Aeste in der Jugend eckig, mit feinem Filze bekleidet oder glatt. Blätter wechselnd stehen, gestielt, länglich, ganzrandig, geadert, fast lederartig, 8—10 Zoll lang, 3—4 Zoll breit, ausgetrocknet, oben grün, unten gelbbraun, die Stiele dick, rinnig, 8—9 Linien lang, ohne Afterblätter. Frucht apfelförmig, so groß wie eine Wallnuß, grün, fast fleischig. Vaterl. Südamerika, die Provinz Venezuela, in Wäldern und wird daselbst Palo de Vacca genannt.

Aus Stamm und Aesten dieses Baumes fließt, auf jede leichte Verwundung, ein weißer, nicht scharfer Milchsaft, der in Südamerika eben so wie in Europa die Kuhmilch benützt wird.

Galanthus Linn. Schneeglöckchen f. Lexic. B. 4.

Corolle doppelt, beide dreiblättrig. Die innere (Nectarium Linn.) viel kürzer als die äußere; ausgekerbt. Staubfäden 6, kurz. Antheren an der Spitze borstenförmig. Narbe einfach. Kapsel dreifächerig. Saamen rund.

Hexandria Monogynia (Familie der Coronarien.)

1. **Galanthus plicatus** M. a Bieb. Faltenblättriges Schneeglöckchen.

Blätter gefaltet, die Falten mit dem Rande parallel. Blumenstiele kürzer als die Scheide. Blume weiß, wohlriechend. Vaterl. Kaukasus und im mittlern Asien. 4 Blühz. März. Abbild. Bot. Mag. 2162. Edw. Bot. reg. 545.

Galardia Lamarck Illust. t. 708. Galardie.

Character generic. f. 1. Nachtrag. B. 3. S. 419.

Blüthendecke (Kelch) vielblättrig, fast gleich. Fruchtboden halbhoden, halbkugelig. Strahlblümchen umgekehrt-eiförmig, halb dreispaltig. Saamen mit 8—10 grannenartigen Spreublättchen versehen.

Syngenesia 3. Ordn. (Familie der Compositae.)

Diese Gattung hat Lamarck dem Herrn Gallard de Charentonneau zu Ehren Galardia genannt. Sie enthält jetzt nur eine Art, nämlich Gal. bicolor, die zur Zierde der Gärten dient und die ich schon im 1. Nachtrage beschrieben und die Synonymen angezeigt habe.

Synonymen.

Galardia acaulis Pursh. ist Actinea acaulis Nuttall.

Galardia aristata Pursh. ist Galardia bicolor var.

Galardia fimbriata Michx. f. 1. Nachtr. ist Leptopoda Heleneum Nutt.

Galaxaura oblongata Lamour. ist Alisium Perrini Spr.

Galaxia graminea Thunb. f. Lexic. B. 4.

Galaxia narcissoides Willd. f. Lexic. B. 4.

Galaxia ovata Thunb. f. Lexic. B. 4.

Synonymen.

Galaxia ciliata Pers. f. 1. Nachtr. ist Galaxia ovata var.

Galaxia grandiflora Andr. f. 1. Nachtr. ist Galaxia ovata var.

Galaxia multiflora Spr. ist *Galaxia ovata* var.

Galaxia obscura Cav. ist *Witsenia pumila* Vahl.

Galaxia plicata Jacq. ist *Jxia heterophylla* Willd.
Ovieda Spr.

Galaxia ramosa Cand. f. *Jxia columellaris* Ker.

Galedupa indica Lam. ist *Dalbergia arborea* Willd.

Galega Linn. Galege; Geisraute f. Lexic. B. 4. (Schluhrs
Handb. t. 208.)

Character generic. f. 1. Nachtrag. B. 3. S. 422.

Reich fünfzählig, die Zähne pfriemenspizig, gleich. Corolle schmetterlingsförmig. Hülse schief, gestreift.

Diadelphia Decandria (Familie der Hülsenpflanzen.)

1. *Galega pubescens* Lam. Filzige Geisraute. f. 1 Nachtr. B. 3.

Stengel staudenstrauchig. Blätter theils dreizählig, theils gefiedert, behaart. Blättchen elliptisch. Afterblätter pfriemenspizig. Blumentrauben kürzer als die Blätter. Hülsen sehr abstehend. Waterl. Neuspanien. ♀ Blühz. Sommer.

2. *Galega tricolor* Hooker exot. fl. t. 185. Dreifarbige Geisraute.

Stengel filzig. Blätter gefiedert. Blättchen länglich, mucronenspizig, schief, geadert. Afterblätter lanzett-halbpfelförmig. Blumen dreifarbig, übergebogen und bilden vielblümige ährenförmige Trauben. Waterl. Neuholland. ♀ ?

Zur Gattung *Galega* gehören noch zwei Arten: *G. officinalis* et *orientalis* f. Lexic. Die übrigen von Linn. Thunb. Willd. u. a. unter *Galega* aufgeführten Arten und die ich im Lexicon und 1. Nachtrage beschrieben habe, hat man neuerlich zu andern Gattungen gezogen. Es sind folgende.

Synonymen.

Galega apollinea Delil. f. *Tephrosia apollinea* Spr.

Galega argentea Lam. f. 1. Nachtr. f. *Tephrosia argentea* Pers.

Galega biflora Poir. ist *Tephrosia argentea* Pers.

Galega capensis Thunb. f. Lexic. ist *Tephrosia capensis* Pers.

Galega caribaea Jacq. f. Lexic. ist *Tephrosia caribaea* Pers.

Galega cinerea Link. f. Lexic. ist *Tephrosia cinerea* Pers.

- Galega coerulea* Linn. f. Lexic. f. *Dalea Mutisii* Kunth.
Galega Colutea Burm. f. Lexic. ist *Tephrosia colutea* Pers.
Galega coronillaefolia Desfont. ist *Tephrosia cineraria* Pers.
Galega davorica Pall. f. Lexic. ist *Tephrosia davorica* Pers.
Galega domingensis Willd. f. Lexic. ist *Tephrosia domingensis* Pers.
Galega dubia Jacq. f. Lexic. ist *Lessertia diffusa* R. Br.
Galega falcata Thunb. f. Lexic. ist *Tephrosia falcata* Pers.
Galega filiformis Jacq. f. Lexic. ist *Tephrosia filiformis* Pers.
Galega filiformis Thunb. ist *Tephrosia filifolia* Pers.
Galega genistoides Thunb. f. *Cyclopia genistoides* Vent.
Galega grandiflora Thunb. f. Lexic. ist *Tephrosia grandiflora* Pers.
Galega humilis Thunb. f. *Tephrosia pallescens* Pers.
Galega linearis Will. f. Lexic. ist *Tephrosia linearis* Pers.
Galega litoralis Murr. f. Lexic. ist *Tephrosia litoralis* Pers.
Galega litoralis Forst. ist *Tephrosia piscatoria* Pers.
Galega longifolia Jacq. f. Lexic. ist *Tephrosia longifolia* Pers.
Galega maxima Linn. f. Lexic. ist *Tephrosia maxima* Pers.
Galega mimosoides W. f. Lexic. ist *Tephrosia mimosoides* Pers.
Galega montana Schult. ist *Galega orientalis* f. Lexic.
Galega mucronata Thunb. f. 1. Nachtr. ist *Tephrosia stricta* Pers.
Galega ochroleuca Jacq. f. Lexic. ist *Tephrosia ochroleuca* Pers.
Galega pallens Ait. f. Lexic. ist *Tephrosia pallens* Pers.
Galega persica Pers. ist *Galega officinalis* f. Lexic.
Galega pinnata Thunb. f. Lexic. ist *Tephrosia pinnata* Pers.

Galega piscatoria Ait. f. Lexic. ist *Tephrosia piscatoria* Pers.

Galega pulchella Scop. Vahl. ist *Tephrosia stricta* Pers.

Galega pumila Lam. f. *Tephrosia pumila* Pers. 2 Nachtr.

Galega purpurea Linn. f. Lexic. ist *Tephrosia purpurea* Pers.

Galega pusilla Thunb. f. Lexic. ist *Tephrosia pusilla* Pers.

Galega senticosa Linn. f. Lexic. ist *Tephrosia senticosa* Pers.

Galega sericea Thunb. f. Lexic. ist *Tephrosia stricta* Pers.

Galega spicata Walt. f. *Tephrosia paucifolia* 2. Nachtr.

Galega spinosa Linn. Suppl. f. Lexic. ist *Tephrosia spinosa* Pers.

Galega striata Thunb. f. Lexic. ist *Tephrosia striata* Pers.

Galega stricta Thunb. f. Lexic. ist *Tephrosia stricta* Pers.

Galega tinctoria Linn. f. Lexic. ist *Tephrosia tinctoria* Pers.

Galega tomentosa Vahl. f. Lexic. ist *Tephrosia cinerea* Pers.

Galega totta Thunb. f. Lexic. ist *Tephrosia totta* Pers.

Galega toxicaria Swartz f. Lexic. ist *Tephrosia toxicaria* Pers.

Galega villosa Linn. f. Lexic. ist *Tephrosia villosa* Pers.

Galega virginiana Linn. f. Lexic. ist *Tephrosia virginiana* Pers.

Galenia Linn. *Galenie* f. Lexic. B. 4. (Familie der Chenopodiaceen.)

Diese Gattung widmete Linné dem Andenken des alten bekannten und berühmten Arztes Claudius Galenus. Sie enthält zwei Arten: *Gal. africana* et *procumbens* Linn. f. Lexic.

Galenia celosioides Spr. f. *Microtea debilis* 2. Nachtr.

Galenia linearis Thunb. ist *Galenia africana*.

Galeosis Linn. Hohlzahn, f. Lexic. B. 4. (Schlüssel Handbuch t. 160.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 424.

Kelch fünfzählig, die Zähne grannenartig gespißt. Corolle zwei-

zweilappig, langröhrig. Oberlippe gewölbt, mehr oder weniger gespalten; die Unterlippe dreilappig, die Seitenlappen an der Basis mit zwei hohlen Höckern versehen, der mittlere Lappen gekerbt. Die Klappen der geöffneten Antheren genimpert.

Didynamia Gymnospermia (Familie der Labiaten.)

1. *Galeopsis canescens* M. a Bieb. Grauer Hohlzahn.

Neste, Blätter und Kelche grau = filzig. Die obern Knoten des Stengels stärker als die untern. Blätter lanzettförmig, an beiden Enden schmaler, entfernt, sägezahnig, auch ganzrandig. Blumen roth. Kelchzähne stechend, dreimal kürzer als die Corolle. Bracteen pfriemenspizig, zurückgerollt. Vaterl. das mittlere Deutschland, an gebauten und ungebauten Orten. ☉ Blüht. Sommer.

2. *Galeopsis pubescens* Bess. Filziger Hohlzahn.

Gal. *Walterina* Schlechtend.

Die Knoten des Stengels fast angeschwollen, wie die Blätter filzig. Blätter eiförmig, langgespitzt, sägerandig. Bracteen sehr klein, fast drüsig. Kelche behaart, dreimal kürzer als die Corolle. Vaterl. Deutschland und Frankreich. ☉

3. *Galeopsis versicolor* Curt. Lond. Smith brit. f. 1. Nachtr. B. 3.

Stengel aufrecht, 2—3 Fuß hoch, knotig, die obern Knoten stärker als die untern, wie die Neste scharfborstig. Blätter länglich = eiförmig, gezähnt, behaart. Blumen in reichen dichten gipfelfständigen Quirlen. Corolle groß, 3—4mal größer als der Kelch, gelb mit aufgeblasenem Schlunde und violetten Lippen. Hierher gehört *G. cannabina* Roth. Willd. f. Lexic. B. 4. Vaterl. Europa, besonders England und Deutschland, an Rändern, auf niedern feuchten Waldplätzen, an gebauten und ungebauten Orten. ☉ u. 2 Blüht. Sommer. (Abbild. Curt. Fl. Lond. fasc. 6. t. 38. Engl. Bot. t. 667. Reichenb. Kupfers. t. 177.)

Synonymen.

Galeopsis angustifolia Pers. f. 1. Nachtr. ist *Galeopsis* *Ladanum* var. f. Lexic.

Galeopsis bifida Bönninghaus. ist *Galeopsis* *Tetrahit* var. f. Lexic.

Galeopsis cannabina Roth. f. *Galeopsis versicolor* N. 3.

Galeopsis Galeobdolon L. ist *Galeobdolon luteum* Smith. f. *Leonurus Galeobdolon* Lexic. B. 5. S. 40.

Dirr. 2r. 2r. Nachtr. 1V. Bb.

8

Galeopsis grandiflorum Ehrh. Willd. f. *Galeopsis villosa* f. Nachtr. B. 3.

Galeopsis intermedia Vill. ist *Galeopsis Ladanum* var.

Galeopsis ochroleuca Lam. Pers. f. *Galeopsis villosa*.

Galeopsis parviflora Lam. f. 1. Nachtr. ist *Galeopsis Ladanum* var.

Galeopsis Walterina Schlechtend. f. *Galeopsis pubescens* R. 2.

Galinsogea Ruiz et Pav. *Galinsogea*.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 426.

Blüthenhülle (Kelch) geschüpft, die Schuppen wie Dachziegel übereinander liegend. Fruchtboden spreng. Der Saame mit vielen gewimperten Spreublättchen gekrönt.

Syngenesia 2 Ordn. (Familie Compositae.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Dr. Galinsoga, erster Arzt der Königin von Spanien und Intendant des Gartens zu Madrid. (Schultes Gesch.)

1. *Galinsogea serrata* Spr. Sägerandige Galinsogea.

Mocinna serrata Lagasc.

Stengel strauichig. Blätter kurzgestielt, länglich-lanzettförmig, gespitzt, sägerandig, scharf. Blumenstiele winkelfständig, gehäuft. Vaterl. Mexico. h

2. *Galinsogea brachiata* Spr. (Mocinna Lag.)

Stengel strauichig. Aeste kriechend stehend. Blätter eiförmig, stumpf, micronenspizig. Blumen hüscheiförmig. Vaterl. Panama. h

3. *Gal. linearifolia* Spr. Fintenblättrige Galinsogea.

Gutierrezia linearifolia Lag.

Stengel staudenstrauichig, wie die Aeste glatt, harzig. Blätter linienförmig, gespitzt, ganzrandig. Blumen in wenigblümigen Doldentrauben, mit 3—4 Randblümchen versehen. Vaterl. Neuspanien. h

4. *Gal. allococarpa* Spr. ist *Allocarpus caracasanus* Kunth. f. 2. Nachtrag. B. 1. S. 158.

Stengel krautartig, fast borstig-behaart. Blätter gegenüber stehend, länglich, an beiden Enden langgespitzt, fast ganzrandig. Blumenstiele winkelfständig, doldentraubig. Blumen mit 5 Randblümchen, deren Saamen weniger Spreublättchen tragen. Vaterl. Caracas, blüht daselbst im Februar.

5. *Gal. angustifolia* Spr. Schmalblättrige Galinsogea.

Stengel staudenstrauichig, scharfborstig. Blätter schmal,

linien = lanzettförmig, gekerbt = gezähnt, obere linienförmig, ganzrandig. Blumenstiele lang, einblümig. Vaterl. Brasilien. $\frac{1}{2}$

6. *Gal. megapotamica* Spr. Südamerikanische Galinsogea.

Stengel krautartig, glatt. Blätter linienförmig, dreitheilig, ganzrandig. Aeste zu 3 stehend, einblümig, steif. Vaterl. Südamerika, am großen Flusse. 4 ?

7. *Gal. uniflora* Spr. Einblümige Galinsogea.

Stengel krautartig, sehr einfach, einblümig, oben wenigborstig. Blätter zerstreut stehend, linienförmig, mucronenspitzig, scharfrandig. Vaterl. Monte Video. \odot ?

Kultur. Die Galinsogeen vermehrt man durch die Ausfaat des Saamens, die strauchartigen auch durch Stecklinge.

Galinsogea discolor Spr. ist *Verlesina atriplicifolia* Pers.

Galipea trifoliata Aubl. f. Lexic. erste Auflage: B. 4.

S. 264. ist *Sciuris corymbosa* Spr.

Galipea Candolleana Hilar. f. *Bonplandia Candolleana*

2. Nachtr. B. 2.

Galipea cuneifolia Hilar. f. *Bonplandia cuneifolia* 2.

Nachtr. B. 2.

Galipea Cusparia Hilar. f. *Bonplandia Augustura* 2.

Nachtr. B. 2.

Galipea Fontanesiana Hilar. f. *Bonplandia Fontanesi-*

ana 2. Nachtr. B. 2.

Galipea Gaudichaudiana Hilar. ist *Bonplandia Gau-*

dichaudiana.

Galipea heterophylla Mart. f. *Bonplandia heterophylla*

2. Nachtr.

Galipea mactophylla Hil. ist *Sciuris simplicifolia* Spr.

Galipea pentagyna Hil. f. *Bonplandia pentagyna* 2.

Nachtr.

Galipea pentandra Hil. f. *Bonplandia Erythrochiton*

2. Nachtr.

Galipea resinosa Hil. f. *Bonplandia resinosa* 2. Nachtr.

Galium Linn. Tabkraut. f. Lexic. B. 4. S. 265.

Character genericus f. 1. Nachtrag. B. 3. S. 427.

Reich sehr klein. Corolle 4spaltig, fast radförmig, ausgesbreitet. Staubfäden 4, kürzer als die Corolle. Ein Griffel. Frucht: zwei kugelige verbundene Karpopsen, die an der Spitze nackt, d. h. ohne Zähne sind.

Linn. Syst. Tetrandria Monogynia. (Familie der Rubiaceen.)

I. Fructibus glabris. Früchte glatt.

† Foliis quaternis. Blätter zu 4 quirsförmig stehend.

* Floribus polygamis.

1. *Galium cruciatum* Smith. ist *Valantia cruciata* Linn.
f. Lexic. B. 10. *Valantia chersonensis* Willd.

2. *Galium pedemontanum* Allion. (*Valantia pedem.*
Bellard. Kitaib.) *Galium chloranthum* Brot.

Stengel dünn, einfach, wie die länglichen Blätter scharf-
borstig. Blumenstiele einfach, winkelförmig, behaart, zur
Zeit der Fruchtreife zurückgeschlagen. Vaterl. das südliche
Europa.

3. *Galium coronatum* Smith ist *Valantia humifusa*
Willd. f. Lexic. B. 10. S. 335.

4. *Galium Bauhini* Roem. et Schult. ist *Valantia gla-*
bra Linn. f. Lexic. B. 10. S. 334.

5. *Galium verum* Haller. (*Valantia glabra* Villars.)

Stengel wenig scharfborstig. Blätter oval, dreirippig, glatt,
fast gewimpert, etwas steif. Blumenstiele zweitheilig, blatt-
los, so lang als die Blätter. Vaterl. die Schweiz, Kärn-
then und Frankreich. 4 Böh. Frühling.

** Floribus aequalibus perfectis.

Blumen alle gleich, vollkommen (hermaphroditisch.)

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon und 1 Nach-
frage beschriebenen Arten: *Galium asperellum* et *Claytoni*
Michx. G. *corymbosum* R. et P. G. *diffusum*
Dietr. G. *fruticosum* Willd. G. *latifolium* Mx, G.
montanum L. G. *ovale* R. et P. G. *palustre rubioi-*
des et *trifidum* L. G. *uniflorum* Mx. G. *Valantioi-*
des M. B. und folgende.

6. *Galium tataricum* Trevir. Tatarisches Labkraut.

Blätter lanzettförmig, langgespitzt, einrippig, scharf. Blu-
menstiele winkelförmig, dreispaltig, wenigblüthig. Vaterl.
Astracan.

7. *Galium involucreatum* Kunth in Humb. et Bonpl.
Nov. Gen. et Sp. pl. III. p. 335. Hierher gehört *Gal-*
ium ciliatum Ruiz et Pav. f. Lexic. 1. Aufl. B. 4.
S. 268. Stengel weitschweifig, gestreckt, glatt. Blätter
gewimpert, unten scharfborstig. Blumen stiellos, eingehüllt.
Vaterl. Ouito und Brasilien. ☉

8. *Galium suberosum* Smith. Korlartiges Labkraut.

Stengel sehr ästig, weitschweifig, glatt, unten korkartig. Blätter lanzettförmig, gespißt, glatt. Blumen zu 3, gipfelsständig. Vaterl. Kreta.

9. *Galium lanuginosum* Lam. Wolliges Labkraut.

Stengel wollig, mehr oder weniger ästig. Blätter lanzettförmig, nackt, meist zu 4 stehend. Blumenstiele winkelsständig, einblümig. Vaterl. Ostindien.

10. *Galium atherodes* Spr. Blätter linien-fadenförmig, langgrannig, sehr abstehend, glatt. Blumenstiele winkelsständig, einblümig, zweiblättrig, kürzer als die Blätter, die Einschnitte der Corolle stumpf. Vaterl. Rio Grande. 4

†† Foliis senis. Blätter meist zu sechs quirlförmig um den Stengel stehend.

Die Arten, welche zu dieser Abtheilung gehören, habe ich im Lexicon und 1. Nachtrage beschrieben, nur folgende sind neu.

11. *Galium debile* Willd. Schlaffstengliges Labkraut.

Gal. uliginosum Brot. G. helodes Link.

Stengel weitschweifig, schlaff. Blätter zu 6 stehend, linienförmig, mucronenspizig, am Rande fein stachlig. Blumen in gedrängten Rispen. Vaterl. Portugal.

12. *Galium apiculatum* Smith (non Roem. et Schult.)

Stengel graulich. Blätter lanzettförmig, scharflich. Blumenstiele dreitheilig, blättrig, die Einschnitte der Corolle feingespißt. Vaterl. Griechenland an Bergen. 4

13. *Galium maximum* Moris elench. p. 55. Großes Labkraut.

Stengel sehr ästig, glattlich, 3–4 Fuß hoch. Blätter zu 6, an den Aesten zu 4 quirlförmig stehend, länglich-linienförmig, glatt, nur am Rande und auf dem Rücken scharflich, stumpf. Blumenstiele dreitheilig. Corollen weiß. Früchte glatt. Vaterl. Nordamerika? 4 Blühz. Juni.

††† Foliis octonis. Blätter meist zu 8 um den Stengel stehend.

Hierher gehören die im Lexicon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Galium verum*, *Molugo*, *sylvaticum*, *aristatum*, *purpureum*, *minutum* Linn. *G. erectum* Huds. *G. linifolium* Lam. *G. rigidum* Ait. *G. cinereum* All. *G. glomeratum* Desf. *G. paschala* Forsk. und folgende.

14. *Galium incurvum* Smith. Sibth. Fl. gr. I. 132.
Gekrümmtes Labkraut.

Stengel staudenstrauchig. Blätter linienförmig, feinspizig, gekrümmt = aufrecht, am Rande zurückgerollt. Blumenstiele asterdoldentraubig, fast blättrig, winkels- und gipfelständig, die Einschnitte der Corolle unbewehrt. Vaterl. Kreta und Sicilien. 4 h

15. *Galium papillosum* Lapeyrouse. Warziges Labkraut.

Stengel aufsteigend, an der Basis rückwärts stachlich. Meiste winkelsständig, zusammengesetzt, blättrig. Blätter zu 8 stehend, lanzettförmig, behaart, blasig = warzig, glänzend. Blumenstiele dreitheilig. Vaterl. die Pyrenäen. 4

II. Fructibus scabris, granulatis.

Früchte scharf, körnerig.

† Foliis quaternis. Blätter zu 4 stehend.

16. *Galium brachyphyllum* R. et Schult. (*G. brevifolium* Steven.)

Stengel sehr ästig, gestreckt. Blätter lanzettförmig, mucronenspizig, zurückgeschlagen. Blumenstiele meist zu 3 stehend, zurückgeschlagen. Vaterl. Kaukasus. 4

17. *Galium megapotamicum* Spr. Syst. veget. Tom. IV. p. 39.

Stengel einfach, aufrecht. Blätter steif, lanzettförmig, gespitzt, dornig = gewimpert, unten blaß, glatt. Früchte ziemlich groß, stiellos körnerig. Vaterl. Rio Grande. 4

†† Foliis senis octonis. Blätter zu 6—8 stehend.

Hierher gehören: *G. saxatile* L. *G. megalospermum* All. *G. tricornis* Smith (*G. spurium* Huds. *Valantia Aparine* Pers.) und folgende.

18. *Galium helveticum* Weig. Schweizer Labkraut.

Gal. saxatile Juss. Mem. de l' Acad. de Paris t. 15. f. 1.

Wurzel lang, schwarz. Stengel 2—5 Zoll lang, glatt, liegend. Blätter zu 5—6 stehend. Blätter umgekehrt = eiförmig, stumpf, glatt. Blumenstiele winkelsständig, ein wenig länger als die Blätter. Blumen weiß, glodig. Früchte ziemlich groß, gerunzelt. Diese Art ist dem *G. saxatile* Linn. zunächst verwandt, aber unterschieden durch die Blätter und größere warzige Früchte. Vaterl. die Alpen in der Schweiz und Frankreich. 4

19. *Galium arenarium* Loisel Fl. Gall. Sandliebendes Labkraut.

Blätter linien-lanzettförmig, scharf, in gedrückten fast dachziegelförmigen Quirlen. Blumenstiele doldenartig stehend, meist dreispaltig. Blumen blaßgelb. Früchte warzig. Diese Art haben die *Ph. Roem. et Schult. (Syst. Veg.)* zum *G. megalospermum* All. gezogen. *Waterl.* das westliche Frankreich in Sandböden. 4

III. Fructibus hispidis, pilosis, villosis.

Früchte scharfborstig, behaart oder zottenhaarig.

+ Foliis quaternis. Blätter zu 4 stehend.

Hierzu gehören die im *Lexicon* und I. Nachtrage beschriebenen Arten: *G. boreale*, *rotundifolium*, *maritimum* et *bermudianum* Linn. *G. circacizans* Mx. *G. hirtum* Lam. und folgende.

20. *Galium apricum* Smith. Sibth. Fl. Græc. t. 126.

Stengel weitschweifig behaart. Blätter umgekehrt-eiförmig, fast rundlich, glatt, scharfrandig. Blumenstiele dreispaltig, blattlos. Früchte groß, mit Borsten besetzt. *Waterl.* Griechenland, an Felsen. ☉ Blühz. Sommer.

21. *Galium Cucullaria* R. et Schult. ist *Valantia Cucullaria* Linn. f. *Lexic. B.* 10. S. 334.

Stengel sehr ästig, vielblümig. Blätter zu 2—4 stehend. Bracteen länglich, stumpf, die Früchte einhüllend.

22. *Galium Hamiltonii* Spr. Syst. veg. IV. p. 39. (*G. latifolium* Don.)

Stengel aufrecht, ästig, behaart. Blätter länglich, gespitzt, wenig behaart. Blumenstiele gipfelständig, dreitheilig, schlaff. *Waterl.* Nepal.

23. *Galium vestitum* Don. Bekleidetes Labkraut.

Stengel einfach, wie die oval-länglichen stumpfen Blätter sehr rauchhaarig. Blumenstiele winkelförmig, dreitheilig. Blumen geknaut. Früchte dicht scharfborstig-filzig. *Waterl.* Nepal.

24. *Galium ellipticum* Presl. Elliptisches Labkraut.

Stengel aufrecht. Blätter elliptisch-länglich, dreirippig, behaart. Blumen in gipfelständigen schlaffen Rispen. Früchte mit hakenförmigen Borsten besetzt. *Waterl.* Sicilien und Spanien. 4 ?

25. *Galium Teneriffae* Spr. Teneriffaisches Labkraut.

Gal. hirsutum Nees. a Esenb. *G. foliis subrotundis do-ovatis cuspidatis 3nervis cauleque hirsutis*, pe-

dunculis axillaribus foliatis cymosis, fructibus uncinato-setosis Spr. Syst. veg. 1. p. 391.

Stengel mehr oder weniger ästig, wie die Blätter behaart. Blätter rundlich-eyförmig, feinspizig, dreirippig. Blumen weiß, in gestielte blättrige winkelfständige Doldentrauben gesammelt. Früchte mit hakenförmigen Borsten besetzt. Waterl. Teneriffa.

26. *Galium elegans* Wallich. Hübsches Labkraut. (*G. ciliatum* Hamilt. Don.)

Stengel ästig, weitschweifig, behaart. Blätter rundlich-eyförmig, stumpf, dreirippig, behaart. Blumen in dreitheiligen Rispen. Früchte wie bei vorhergehender Art. Waterl. Nepal.

27. *Galium obovatum* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. III. p. 263.

Stengel schwach, viereckig, fast einfach, weitschweifig, behaart. Blätter kurzgestielt, umgekehrt-eyförmig, gespitzt, flach, glattlich, gewimpert, 7—9 Linien lang, $9\frac{1}{2}$ Linie breit. Blumen gestielt, gipfelständig, dreimal größer als die Blumen des kletternden Labkrautes. (*G. Aparine* L.) Corolle weiß, radförmig, 4—5spaltig. Früchte mit Borstenhaaren dicht bekleidet. Waterl. Peru, besonders Quito. ☉ Blühz. Januar-Februar.

28. *Galium canescens* Humb. Grauliches Labkraut.

G. ramis junioribus foliisque piloso-villosis, quaternis ovatis acuminatis triplinerviis subtus canescentibus, internodiis multo brevioribus, ramis floriferis bifidis, floribus alaribus et axillaribus solitariis terminalibus ternis, fructibus uncinato-hispidis. Kunth J. c. III. p. 262.

Stengel liegend, etwa 1 Fuß lang, ästig, wie die Aeste viereckig, glattlich, in der Jugend weichhaarig-graulich. Blätter stiellos, eyförmig, geadert-dreirippig, auf beiden Seiten zottenhaarig, unten grau, 4—5 Linien lang, $2\frac{1}{2}$ Linie breit. Blumenstiele winkelf- und gipfelständig; die winkelfständigen einzeln, die endständigen zu 3 beisammen. Corolle klein, Früchte ausgetrocknet, mit gelben kurzen hakenförmigen Borsten dicht besetzt. Waterl. Quito, in der Nähe der Hauptstadt. ☉

29. *Galium tomentosum* Thunb. Filziges Labkraut.

Stengel sehr ästig. Blätter zu 4—6 quirlförmig stehend,

länglich, sägeartig gezähnt, scharfborstig = stzig. Blumenstiele rispenständig, haarförmig, mit weißen Zottenhaaren bekleidet. Früchte scharfborstig oder glatt? Siehe Schlechtend. Linnaea B. 7. Heft 1. S. 135. Waterl. Kap d. g. Hoffu. Zoutendaels Valley Distr. Caledon.

†† Foliis senis. Blätter meist zu 6 stehend.

Hierher gehören die im Lexicon und 1. Nachtr. beschriebenen Arten: *G. triflorum* Michx. *G. parisiense* et *gracum* Linn. *G. ericoides* Lam. und folgende.

30. *Galium micranthum* Pursh. Fl. Amer. Sept. 1. p. 103. Kleinblumiges Labkraut.

G. parviflorum Rafin.

Stengel sehr ästig, ausgebreitet, mit kleinen rückwärtsstehenden Stacheln besetzt. Blätter kurz, lanzettförmig, mucronispizig, glatt, am Rande und Riele scharf = stachlich. Blumenstiele ausgesperret, meist zweiblümig. Corollen weiß, sehr klein, zahlreich. Früchte scharfborstig. Waterl. Nordamerika in Sümpfen, blüht im Sommer und ist dem *G. uliginosum* L. sehr nahe verwandt.

31. *Galium setaceum* Lam. f. 1. Nachtr. Hierher gehört *G. microcarpon* Vahl f. Lexic. und *G. floribundum* Smith. Sibth. Fl. Graec. t. 134.

Stengel und Aeste ausgesperret. Blätter linien = borstenförmig; verlängert. Blumenstiele haarförmig. Corollen braunlich = purpurroth. Früchte zottenhaarig. Waterl. Nordafrika, Kleinasien, Corsika und Südfrankreich. ☉

32. *Galium microspermum* Desf. Kleinsamiges Labkraut.

Aeste ausgesperret, wie der Stengel scharf. Blätter zu 6—8 stehend, linienförmig, gespitzt, gezähnt. Blumenstiele winkelförmig. Früchte klein, scharfborstig. *G. divaricatum* Lam. (f. 1. Nachtr.) ist nur als eine Varietät zu betrachten, welche sich am meisten durch glatte Früchte unterscheidet. Waterl. Nordafrika und Südfrankreich? ☉

33. *Galium brachiatum* Pursh. Armsförmiges Labkraut.

Stengel lang, wellend, scharfborstig. Aeste kurz. Blätter zu 6 stehend, länglich = lanzettförmig, langgespitzt, glatt, am Rande borstig = gewimpert. Blumenstiele quirlförmig stehend, lang, ausgesperret = zweitheilig. Blumenstielen zweiblümig. Corollen weiß. Früchte mit hakenförmigen Borsten besetzt. Waterl. Nordamerika auf Wiesen, an Rändern und in Wäldern. 2. Blühz. Sommer.

34. *Galium tuberosum* Lour. Fl. Cochinch. 1. p. 99.
Knolliges Labkraut.

Wurzel knollig. Stengel krautartig, gestreckt, gelbroth. Blätter zu 5—6 stehend, lanzettförmig, ganzrandig, glatt, graugrün. Blumenstiele gehäuft, winkelförmig, einblüthig. Corollen weiß, vierspaltig. Früchte scharf. Die kleinen weissen Wurzelknollen sind mehlig und essbar. Vaterl. China und Cochinchina auf Aedern. 4

+++ Foliis octonis. Blätter meist zu 8 stehend.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *G. Aparine* Linn. *G. horridum* Thunb. *G. ruthenicum* Willd. *G. tinctatum* Lam. *G. album* Forsk. *G. capillare* Cav. und folgende.

35. *Galium villosum* Lam. Encycl. meth. 2 p. 582.
Zottiges Labkraut.

Stengel 4edig, mit weissen Zottenhaaren bekleidet, über 1 Fuß lang. Aeste gegenüberstehend. Blätter zu 8 stehend, linien-lanzettförmig, grau-zottig. Blumenstiele zottig-borstig. Blumen traubig-kopfförmig. Corollen klein, weißlich-rosfarbig. Früchte behaart. Vaterl. Spanien. Abbild. Boccon Mus. II. t. 86.

36. *Galium caripense* Humb. et Bonpl. Caripeisches Labkraut.

G. caule retrorsum aculeato, foliis octonis, superioribus senis oblongo-lanceolatis mucronatis margine acculeatis internodiis multo brevioribus, floribus terminalibus subternatis pedunculatis, fructibus hispidis. Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. 3. p. 263.

Stengel ästig, viereckig, die Ecken mit Stacheln besetzt. Blätter länglich-lanzettförmig, flach, glatt, stachelrandig; untere zu 8, obere zu 6 quirlförmig stehend, $\frac{1}{2}$ Zoll lang. Blumen gipfelförmig, gestielt, die Stiele meist zu 3 stehend, an der Basis mit Bracteen bekleidet. Früchte mit zurückgeschlagenen Borsten versehen. Vaterl. Südamerika, bei Caripe. ☉ Blüht. September.

37. *Galium piliferum* Humb. et Bonpl. Paaretragendes Labkraut.

G. caule retrorsum aculeato, foliis octonis lineari-lanceolatis acuminato-piliferis glabris margine sub-revolutis nervoque medium retrorsum aculeatis in-

ternotis multo brevioribus, floribus terminalibus ternis longe pedunculatis, fructibus hispidis. Kunth J. c. 3. p. 265.

Stengel ästig, schwach, etwa 2 Fuß lang, wie die Äste viereckig, an den Ecken rückwärts stachlich. Blätter zu 8 stehend, linien-lanzettförmig, langgespitzt, schmal, am Rande zurückgerollt, stachlich, übrigens glatt, nur an der Spitze haartragend, 4—6 Linien lang, 1 Linie breit. Blumenstiele einblümig, fadenförmig, zu 3 gipfelständig. Corolle glockig, vierspaltig, auswendig mit sehr kurzen angedrückten Borsten bekleidet. Früchte scharfborstig. Vaterl. Neugranada. ☉ Blühz. October.

38. *Galium mexicanum* Humb. et Bonpl. Mexicanisches Labkraut.

G. caule retrorsum aculeato, foliis octonis linearibus acuminato-pungentibus glabris margine revolutis nervoque medio retrorsum aculeatis internotis duplo brevioribus, corymbis terminalibus subtrichotomis, fructibus hispidis. Kunth J. c. 3. p. 264.

Stengel ästig, viereckig, an den Ecken rückwärts stachlich, $1\frac{1}{2}$ Fuß lang. Blätter zu 8 stehend, linienförmig, langgespitzt-stehend, glatt, am zurückgerollten Rande und an der Mittelrippe rückwärts stachlich, oben glänzend, 6—8 Linien lang, $1\frac{1}{2}$ Linie breit. Blumen gestielt, in gipfelständigen fast dreitheiligen Doldentrauben. Corollen weiß, glockig, vier-spaltig, auswendig, scharfborstig, die Einschnitte zurückgerollt. Früchte scharfborstig. Vaterl. Mexico, bei Guanaruasto. ☉ Blühz. September.

Ueber die Bestimmung und systematische Anordnung der Labkräuter habe ich schon im 1. Nachtrage B. 3. S. 437, einige Bemerkungen beigelegt, die auch hier beachtet zu werden verdienen. Damals waren 87 Arten bekannt; jetzt sind deren (im Syst. veg. ed Spr.) 114 aufgestellt, davon aber noch manche, bei genauer Untersuchung und Vergleichung mit längst bekannten Arten nur als Varietäten zu betrachten sind. B. B. G. corsicum Spr. G. asperifolium. Wall. u. a. Auf Diagnosen und Synonymen hat Kurt Sprengel nicht immer die erforderliche Mühe und Sorgfalt verwendet, sogar zwei verschiedene Arten unter einem Namen *Galium hirsutum* aufgeführt. S. Syst. veg. B. 1. p. 390 et 391.

Zu den im 1. Nachtrage angezeigten Synonymen gehören noch folgende

Synonymen.

Galium apiculatum R. et Schult. ist *Galium diffusum*
f. 1. Nachtr.

Galium brevifolium Stev. f. *Galium brachyphyllum*
N. 16.

Galium ciliatum Hamilt. (nec Schrank) f. *Galium*
elegans N. 26.

Galium divaricatum Lam. f. *Galium microspermum*
N. 32.

Galium floribundum Smith. f. *Galium setaceum* N. 31.

Galium hirsutum Nees a Esenb. f. *Galium Teneriffæ*
N. 25.

Galium latifolium Don. f. *Galium Hamiltonii* N. 22.

Galium microcarpon Vahl (Lexic.) ist *Galium setace-*
um Lam. f. 1. Nachtr.

Galium murale All. ist *Sherardia muralis* Linn. f.
Lexic.

Galium punctatum L. Nachtr. (*punctulosum*) ist *G. ber-*
mutianum f. Lexic.

Galium reflexum Presl. ist *Valantia taurica* Pall. Willd.
f. Lexic.

Galium saccharatum All. ist *Valantia Aparine* Linn.
f. Lexic.

Galium saxatile Juss. f. *Galium helveticum* N. 18.

Galium tarmense Spr. ist *Galium diffusum* Var.? f. 1.
Nachtr.

Galium uliginosum Brot. f. *Galium debile* N. 11.

Galium verrucosum Smith. ist *Valantia Aparine* Linn.
f. Lexic.

Galopthalmum brasiliense Nees a Esenb. ist *Acti-*
nea oppositifolia Spr.

Blätter zu 2 gegenüberstehend, gestielt, länglich, sägeran-
dig. Blumen winkelfständig, fast gehäuft. Blüthendecke (Kelch)
vielsättrig, doppelt, 2—3 reihig. Fruchtboden nackt, Saa-
mentrone sprengig, vielgrannig. Vaterl. Brasilien.

Galopina circaeoides Thunb. f. Lexic. B. 4. S.
279. ist *Anthospermum Galopina* Thunb.

Galphimia Cavan. f. Lexic. B. 4. und 1. Nachtr. B.
3. S. 439.

Kelch fünfstheilig, bleibend, ohne Drüsen. Fünf eysförmige
(Eorollen)blätter mit Nägeln versehen. Staubfäden 10, boden-
ständig, an der Basis mehr oder weniger zusammenhängend.

Kapsel dreiknöpfig, die Knöpfe einsamig, auf dem Rücken der Länge nach aufspringend.

Decandria Trigynia (Familie Malpighiaceen.)

Diese Gattung ist der *Malpighia* sehr nahe verwandt, nur durch den drüsenlosen Kelch und durch die Frucht zu unterscheiden, daher konnte sie füglich mit *Malpighia* verbunden werden, so wie *Byrsonima* Kunth.

1. *Calphimia Cauca* Spr. (*Caucanthus* Forsk.)

Stengel strauchig. Blätter gegenüberstehend, freisrund, fast ausgekerbt, glatt. Blumenstiele doldentraubig, gipfelständig. Vaterl. Arabien. h

2. *Calphimia glandulosa* Cav. Jcon. 6. t. 563. Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. V. p. 172 t. 452. Drüsig Calphimie.

Stengel strauchig. Blätter gegenüberstehend, gestielt, länglich, stumpflich, an der Basis verdünnt = keilförmig, glatt, die Stiele mit 1—2 Drüsen versehen. Blumentrauben einfach, winkel- und gipfelständig. Kelche ohne Drüsen. Vaterl. Mexiko, an Bergen. h Blüh. April und Mai.

3. *Calphimia longifolia* Kunth. J. c. V. p. 173. Langblättrige Calphimie.

Blätter länglich = lanzettförmig, gespitzt, an der Basis schmal = keilförmig, glatt, die Stiele 1—2drüsig. Blumentrauben gipfelständig, ästig = zusammengesetzt. Kelche drüsig, wie bei *Malpighia*. Vaterl. Neugranada. h. Fruchtreife im Mai.

4. *Calphimia mollis* Kunth J. c. p. 173. Weiche Calphimie.

Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, lederartig, oben glatt, glänzend, unten weich grau = filzig. Die Stiele mit zwei Drüsen versehen. Blumen in winkelfständigen wenigblümigen Dolden. Kelche drüsig, wie bei voriger Art. Beide hat Kunth in Synops pl. 3 mit ? bezeichnet.

5. *Calphimia chrysophylla* Spr. f. *Byrsonima chrysophylla* im 2. Nachtrage B. 2. C. 130.

Die Calphimien sind Sträucher, deren Blätter einander gegenüber stehen. Die Blattstiele sind mit 1—2 Drüsen besetzt. Blumen traubenständig. Blumenstiele über der Basis mit zwei Bracteen versehen. Corollenblätter gelb. Man überwintert sie in Gewächshäusern und behandelt sie in Hinsicht

auf Boden, Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und Stecklinge wie die Malspighien s. Vericon B. 5. S. 712.

Galurus spiciflorus Spr. ist *Caturus spiciflorus* Linn. s. Lexic. B. 2. S. 640.

Ein Strauch, dessen länglich-eiförmige sägerandige Blätter unten wolkig sind. Blumen in langen winkelfständigen hängenden Aehren.

Galvania 2 Velloz. ist *Psychotria Marcgravii* Spr.

Galvezia R. et Pav. (*Galvesia* s. 1. Nachtrag B. 3. S. 440.) *Galvezia* Juss. ist *Russetia alternifolia* Pers. s. 1. Nachtr. B. 7. S. 331.

Garciana cochinchinensis Lour. ist *Philydrium lanuginosum* Banks.

Garcinia Linn. s. Lexic. B. 4. S. 281.

Blumen meist declinisch. Kelch und Corolle vierblättrig, Staubfäden an der Basis fast verwachsen. Narbe lappig. Beere 4—8 fächerig. Saamen mit Mantelhaut versehen.

Dodecandria Monogynia. (Familie Guttifereen.)

Wahrscheinlich führt diese Gattung ihren Namen zu Ehren eines Botanikers H. Garcin? der eine Art *G. Mangostana* Linn. in Act. angl. beschrieben und t. 1. abgebildet hat.

1. *Garcinia amboinensis* Spr. (*Oxycarpus cochinchinensis* Lour.)

Blätter oval-länglich, lederartig, nicht geadert. Blumen gehäuft, winkelfständig, herabhängend. Staubfäden an der Basis meist verbunden. Vaterl. Amboina. H

2. *Garcinia Cowa* Roxb. (*G. dioeca* Smith *Brindonia indica* Thuar.)

Blätter eiförmig, langgespitzt. Blumen polygamisch: männliche gehäuft, seitenständig. Zwitterblumen einzeln, gipfelständig. Vaterl. Ostindien. H

Die übrigen Arten, welche hierher gehören, und Anleitung zur Kultur s. Vericon.

Gardenia Linn. *Gardenie* s. Lexic. B. 4.

Character generic. s. 1. Nachtrag. B. 3. S. 441.

Cor. tubo cylindrico, laciniis limbi subcontortis. Antheræ sessiles. Bacca subbilocularis, seminibus 2—4 serialibus Spr.

Kelch fünfzählig, oder fünftheilig. Corollenröhre walzenrund, die Einschnitte des Randes meist gedreht. Antheren 5,

anfällig. Narbe 2lappig. Beere meist 2fächerig. Samen 2—4reihig.

Pentandria Monogynia. (Familie der Rubiaceen.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Dr. Alex. Garden. Er war Arzt in Carolina, und sammelte daselbst viele Pflanzen, die er dem Ritter v. Linné schickte.

I. Spinosæ. Dornige Arten.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon beschriebenen Arten: *Gard. dumetora*, *uliginosa* Retz. *G. armata* Swartz. *G. obovata et rotundifolia* Dietr. i. Nachtr. *G. multiflora* Willd. *G. spinosa*, *scandens* Thunb. und folgende.

1. *Gardenia amoena* Ker. Liebliche Gardenie.

Aeste mit winkelftändigen geraden Dornen besetzt. Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, glatt. Blumen einzeln gipfelständig. Kelche glockenförmig, stumpf, gezähnt. Vaterl. Ostindien. ♀ Blühz. Frühling und Sommer.

2. *Gardenia jamaicensis* Spr. Jamaische Gardenie.

Aeste eckig, unbehaart. Dornen winkelftändig, einander gegenüberstehend. Blätter rundlich, lederartig, glatt, spitzlich, gewimpert. Blumen stiellos, einzeln stehend, glatt. Vaterl. Jamaica. ♀

3. *Gardenia ferox* Schlechtend. Linnea 4. B. 2. Heft. S. 198. Sehr dornige Gardenie.

G. ramis subtetragonis, ramulis apice 4spinosis, spinis subpollic. rectis, foliis obovatis membranaceis subtus tomentosis, floribus cymosis, laciniis corollinis obtusissimis. D.

Ein wuchstrieender Strauch, 8—10 Fuß hoch, dessen Aeste un deutlich viereckig und die Aestchen an der Spitze mit 4 geraden, fast 1 Zoll langen Dornen versehen sind. Blätter eiförmig = elliptisch oder umgekehrt = eiförmig, häutig, unten kligig. Blumen asterdoldentraubig = gebüschelt, kurzstielig. Die Einschnitte des Kelches lanzettförmig, un deutlich gewimpert. Corolle fast lederartig, die Röhre etwa 15 Linien lang, der Schlund erweitert, fünfspaltig, die Einschnitte sehr stumpf. Früchte kugelförmig.

Dieser Strauch kommt aus Brasilien und ist, wie Dr. Schlechtendal bemerkt, der *G. armata* Swartz zunächst verwandt, aber unterschieden durch die an der Spitze weniger

verbünnten unten filzigen Blätter, und durch die sehr stumpfen Einschnitte der Corolle.

4. *Gardenia tetracantha* Spr. Hierher gehört *Muscanda tetracantha* Cav. s. Lexic. B. 6. S. 273.

Ein 10 Fuß hoher, sehr ästiger Strauch, dessen Aeste glatt und an der Spitze mit 4 Dornen versehen sind. Blätter länglich, an beiden Enden verbünnt, fein filzig. Blumen gipfelständig, gehäuft, stiellos. Kelchzähne pfriemenspizig. Corollen gelb, die Röhre 2 Zoll lang und länger, zottenhaarig. Waterl. Mexiko, bei Acapulco. h

5. *Gardenia esculenta* Spr. Eßbare Gardenie.

Genipa esculenta Lour. Fl. Cochinch. I. p. 185.

Randia triflora Don.

Stamm baumartig, aufrecht, sehr einfach, 5—8 Fuß hoch, mit langen geraden Dornen besetzt. Blätter eyrund, klein, behaart, büschelförmig stehend. Blumen gehäuft, Kelchtheile langgespizt. Corolle radförmig, fünfspaltig, weiß-grün, die Einschnitte langgespizt. Beere rundlich, so groß wie Kirschchen, einsäckrig, eßbar. Waterl. Cochinchina. h Blähz. Sommer.

6. *Gardenia propinqua* Lindl. Bot. Reg. 975.

Aeste dornig, die Dornen gerade, zu 4 stehend. Blätter herzförmig, langgespizt, wellenrandig, filzig. Blumen gipfelständig, büschelförmig. Waterl. Südamerika? h

7. *Gardenia montana* Roxb. Bergliebende Gardenie.

Ein Baum, dessen Aeste sich ausbreiten und dornig sind. Dornen kurz, winkelförmig, gepaart, gegenüber stehend. Blätter länglich, stumpf, oben glänzend, unten fast filzig. Blumen gehäuft, gipfelständig. Kelchzähne abgefürzt. Waterl. Ostindien an Bergen. h

8. *Gardenia campanulata* Roxb. Glockenblumige Gardenie.

Stamm strauchig. Dornen einzeln, fast gipfelständig. Blätter breit-lanzettförmig, auf beiden Seiten glatt. Blumen büschelförmig stehend. Kelchzähne abgefürzt. Corolle glockenförmig. Waterl. Ostindien. h

9. *Gardenia turgida* Roxb. Aufgeschwollene Gardenie.

Stamm baumartig. Rinde schwammig = aufgeschwollen, grau. Dornen gegenüberstehend, gerade. Blätter umgekehrt-eyförmig, glatt. Blumen einzeln stehend. Kelchzähne abgefürzt. Waterl. Ostindien; Butan. h

10. *Gard.*

10. *Gardenia densa* Wallich. Gehäufteblättrige Gardenie.

Stamm strauchig. Äste kreuzend einander gegenüber stehend, viereckig, dornig. Blätter sehr genähert = dichtstehend, umgekehrt = eiförmig, mucronenspizig, glatt. Blumen einzeln. Kelchtheile fast pfriemenspizig. Vaterl. Nepal. ♀ Blühz. Frühling und Sommer.

11. *Gardenia nutans* Spr. Ueberhängende Gardenie.

Posoqueria nutans Roxburgh Corom.

Ein Strauch, dessen Äste überhängen und mit winkelftändigen gegenüber horizontalstehenden Dornen besetzt sind. Blätter büschelförmig, umgekehrt = eiförmig, glatt. Blumen einzelnstehend. Kelchtheile verlängert. Vaterl. Ostindien. ♀

12. *Gardenia longispina* Spr. Langdornige Gardenie.

Posoqueria longispina Roxb. J. c.

Stamm baumartig. Äste hängend. Dornen lang, horizontal kreuzweis stehend. Blätter umgekehrt = eiförmig, glatt. Blumen einzeln stehend. Kelche glatt, die Einschnitte herzförmig, stehen bleibend. Vaterl. die Mündung von Coromandel. ♀

13. *Gardenia fasciculata* Spr. Büschelblüthige Gardenie.

Posoqueria fasciculata Roxb.

Stamm strauchig. Dornen winkelftändig, ausgebreitet. Blätter länglich = eiförmig, glatt. Blumen in winkelftändige Büschel gesammelt. Kelche scharfborstig, die Einschnitte pfriemenspizig. Vaterl. Ostindien. ♀

14. *Gardenia floribunda* Spr. Reichblühende Gardenie.

Posoqueria floribunda Roxb.

Stamm baumartig. Dornen winkelftändig. Blätter dichtstehend, umgekehrt = eiförmig, glatt. Blumen zahlreich, büschelförmig. Die Einschnitte des Kelches lanzettförmig, verlängert. Vaterl. Ostindien, Coromandel. ♀

II. Inermis Dornentlose unbewehrte Arten.

Hierher gehören die im Lexicon beschriebenen Arten: *Gardenia florida*, *Thunbergia*, *Rothmannia*, *Mussaenda*, *gummifera* Linn. *G. longiflora* R. et P. *G. radicans* Thunb. *G. latifolia* Ait. und folgende.

15. *Gardenia grandiflora* Lour. Großblümige Gardenie.

Gardenia calyculata Roxb.

G. arborea, foliis lanceolatis, calycis laciniis reflexo falcatis, baccis oblongis. Lour. Fl. Cochinch.

I. p. 182.

Dir. Ex. 2r. Nachtr. IV. Bd.

Ⓢ

Ein Baum von mittlerer Größe, dessen Aeste gebreht sind und absteilen. Blätter gegenüberstehend, gestielt, lanzettförmig, ganzrandig, glänzend. Blumen groß, einzeln, winkelförmig und gipfelförmig, wohlriechend. Die Einschnitte des Kelches schüsselförmig, zurückgeschlagen, kürzer als die Corollenröhre. Corolle weiß, die Einschnitte eiförmig, fast flach. Antheren linienförmig. Griffel keulenförmig, so lang als die Corollenröhre. Narbe groß, zweilappig. Frucht länglich. Vaterl. Cochinchina an Flüssen. ♀

16. *Gardenia macrantha* Roem. et Schult. Syst. veg. V. p. 237.

Gardenia longiflora Ait. Kew. (nec Ruiz et Pav.)

Randia longiflora Salisbury paravi. p. 93. (nec Lam.)

Stamm strauchig. Blätter länglich, glänzend. Blumen gipfelförmig, einzeln. Corollenröhre sehr lang, trichterförmig, der Rand zurückgerollt. Vaterl. das westliche Afrika. ♀

17. *Gardenia brasiliensis* Spr. Brasilische Gardenie.

Blätter länglich, lederartig. Aestchen scharfborstig. Blumenstiele winkelförmig, 2—3blüthig, kürzer als die Blätter. Die Einschnitte des Kelches pfriemenspitzig, kürzer als die Corollenröhre.

18. *Gardenia formosa* Schlechtend. Linnaea. 4. Heft. 2. p. 200. Biersche Gardenie.

G. foliis oblongo-suborbiculatis, floribus sessilibus cymosis, corolla subcoriacea, laciniis obovatis. D.

Stamm strauchig. Aeste rundlich, knotig. Blätter kurzgestielt, fast lederartig, länglich, fast kreisrund, 4 Zoll lang, 3½ Zoll breit. Afterblätter häutig, abfallend. Blumen stiellos, in Aesterdolden gesammelt. Corolle fast lederartig, die Röhre 4 Zoll lang, auswendig filzig, der Rand fünfspaltig, absteilend. Einschnitte umgekehrt-eiförmig, stumpf. Antheren lanzettförmig, fast anhängend. Griffel fadenförmig, glatt. Narbe zweilappig. Vaterl. Brasilien. ♀

19. *Gardenia Sellowiana* Schlechtend. J. c. p. 197.

G. ramis glabris, foliis elliptico et ovato-lanceolatis, floribus cymosis, corollis tubulosis, glabris, laciniis ovatis. D.

Stamm strauchig, sehr ästig. Aeste glatt, schwärzlich-grau, genarbt. Blätter breit, elliptisch oder eiförmig-lanzettförmig, ger-

weist, kurz gestielt. Austerblätter klein, gespitzt. Blumen in wenigblümigen, fast stiellosen Austerdolden. Kelchzähne sehr klein, gespitzt. Corolle langröhrig, aufrecht, fast lederartig, glatt, die Röhre 3 Zoll lang, oben erweitert, der Rand fünfspaltig. Einschnitte eysförmig. Griffel fadenförmig, so lang als die Corollenröhre. Narbe zweilappig. Vaterl. Brasilien. †

20. *Gardenia resinifera* Roth. nov. pl. spec. Harzige Gardenie.

Gardenia coronaria Buchan. *G. costata* Roxb.

Aeste glatt. Blätter länglich-eysförmig, gespitzt, etwas scharf. Austerblätter häutig, stumpf, mit einem kurzen Muschrone versehen. Blumen einzeln stehend, stiellos. Die Einschnitte des Kelches linienborstenförmig. Die Röhre und Einschnitte der Corolle gestreift. Vaterl. Ostindien. †

21. *Gardenia buffalina* Spr. (*Genipa buffalina* Lour.)

Aeste glatt. Blätter eysförmig, glatt, büschelförmig stehend. Blumen einzeln. Die Einschnitte des Kelches sehr kurz, eysförmig. Vaterl. Ostindien. †

22. *Gardenia madagascarensis* Lamarck Enc. meth. 11. p. 608.

Blätter eysförmig, lederartig, glatt. Blumen winkelfständig, einzeln, fast stiellos. Die Einschnitte des Kelches abgekürzt, stumpf. Corollenröhre lang, filzig.

Diese Art gleicht der *Gardenia Müssaenda* Linn. f. Lexic., aber unterschieden durch breitere Blätter, durch lanzettförmige, nicht pfriemenspizige Austerblätter und durch kürzere glatte Kelche. Corollen weiß, 3 Zoll lang. Vaterl. Madagascar. †

23. *Gardenia pubescens* Roth J. c. Filzige Gardenie.

Blätter rundlich-eysförmig, an beiden Enden verdünnt, in der Jugend unten braun-filzig, wie die Knoten der Aeste. Blumen in winkelfständige, zweitheilige Doldentrauben gesammelt, deren Aeste sich ausbreiten. Kelch, Corolle und Fruchtknoten filzig. Kelchzähne abgekürzt. Corolle trichterförmig. Vaterl. Ostindien. †

24. *Gardenia volubilis* Lour. Windende Gardenie.

Stamm strauchig, lang, und windet sich. Blätter lanzettförmig, langgespitzt, ganzrandig. Blumenstiele winkelfständig, meist vielblümig. Kelch fünfspaltig. Corolle trichterförmig, die Röhre in der Mitte verdickt, die Einschnitte des Randes

- lang, ausgeschweift. Narben dick, warzig, gefärbt. Beere klein, gerundet, 2fächerig. Vaterl. das südliche China. h
25. *Gardenia rigida* Hamilton. Steife Gardenie.
Stamm strauchig, sehr ästig. Blätter keilförmig, an der Spitze ausgekerbt, mit einem kleinen Nucrone versehen, glatt. Die Einschnitte des Kelches pfriemenspizig, die der Corolle spizlich. Vaterl. Nepal. h
26. *Gardenia lucida* Roxb. Glänzende Gardenie.
Stamm baumartig. Knospen harzig. Blätter länglich, hell-glänzend, parallel-geädert. Blumenstiele einzeln stehend, keulenförmig. Die Einschnitte des Kelches pfriemenspizig. Vaterl. Ostindien. h
27. *Gardenia carinata* Wallich. Rielförmige Gardenie.
Gardenia tubifera Wall. var.?
Stamm und Knospen wie bei vorhergehender Art. Blätter umgekehrt-eiförmig, unten zottenhaarig. Blumen einzeln stehend. Kelch abgestutzt, kistförmig. Corolle röhrig. Vaterl. Ins. freti Malacc. h
28. *Gardenia anisophylla* Jack.
Stamm baumartig. Blätter länglich, zottenhaarig, abwechselnd kleiner. Blumen in winkelfständige Doldentrauben gesammelt. Kelchzähne abgestutzt. Vaterl. wie vorige.
Die meisten Gardenien kommen aus Tropenländern und verlangen in unsern Gärten warme Standörter. Ueber die Kultur der Gardenien im Allgemeinen, in Beziehung auf Standort, Boden und Fortpflanzung. s. Lexicon B. 4. S. 284 und 289.

Synonymen.

- Gardenia calyculata* Roxb. f. *Gardenia grandiflora* N. 15.
Gardenia chinensis Spr. ist *Randia sinensis* 1. Nachtr. B. 7.
Gardenia coronaria Buchm. f. *Gardenia resinifera* N. 20.
Gardenia costata Roxb. f. *Gardenia resinifera* N. 20.
Gardenia ferox Roxb. ist *Randia malabarica* Lam. f. 1. Nachtr. B. 7.
Gardenia horrida Spr. ist *Randia horrida* Lour. f. 1. Nachtr. B. 7.
Gardenia longiflora Ait. f. *Gardenia macrantha* N. 16.

Gardenia Sonneratii Spr. ist *Randia parviflora* f. 1.
Nachtr. B. 7.

Gardenia tubiflora Wall. f. *Gardenia carinata* N. 27.

Gardenia gummifera Linn. f. Lexic. B. 4. S. 285.

Seite 2 von unten setze man hinter *G. inermis*: corollis
obtusis, calyce hirto, foliis oblongis obtusis.

Gardneria Wallich. *Gardnerie.*

Kelch vierspaltig. Corolle radförmig, lederartig. Vier sehr
kurze Staubfäden, an der Basis der Corolle eingefügt. Ein
fadensförmiger Griffel. Beere zweifächerig, zweisaamig.

Tetrandria Monogynia. (Familie Contorten?)

1. *Gardneria oblonga* Dietr. (*G. ovata* Wallich.)

Stengel strauchig, kletternd. Blätter zu 2 einander ge-
genüber stehend, länglich, an beiden Enden verbünnt. Blu-
men in winkelfständigen Doldentrauben, die einander gegen-
über stehen, deren Blumenstielen dreiblümig und mit Brac-
teen besetzt sind. Waterl. Nepal. ♀

2. *Gardneria glabra* Wallich. *Glatte Gardnerie.*

Stengel strauchig. Blätter länglich-eyförmig, langgespitzt.
Blumenstiele einfach, einblümig. Wächst mit vorhergehender
Art in Nepal.

Gardoquia Ruiz et Pavon. Syst. Veg. Fl. Peruv.
p. 148.

Character generic. f. 1. Nachtrag. B. 3. S. 442.

Kelch röhrig, fünfspaltig oder fünfzählig, zweilappig, die
Zähne ungleich. Corolle röhrig, viel länger als der Kelch,
die Röhre gekrümmt, im Schlunde bartig oder nackt. Der
Rand zweilappig. Die Oberlippe aufrecht, ausgekerbt, die
untere dreilappig, fast gleich. Staubfäden 4. Saamen drei-
seitig.

Didynamia Gymnospermia (Familie Lippenblumen.)

† *Pedunculis solitariis unifloris.*

Blumenstiele einzeln stehend, einblümig.

1. *Gardoquia grandiflora* Kunth in Humb. et Bonpl.
Nov. Gen. et Sp. pl. II. p. 314. Großblumige *Gardo-*
quia.

Stengel strauchig, sehr ästig. Blätter rundlich-eyförmig,
stumpf, nach der Spitze zu gezähnt, unten grauslig. Blu-
men einzeln winkelfständig. Corollen gelb. Waterl. Quito.
♂ Blühz. Junius.

2. *Gardoquia argentea* Kunth J. c. 11. p. 313. Silberfarbige Gardoquia.

Stengel strauchig, ästig, so wie die Blätter mit silberweißen Seidenhaaren besetzt. Blätter länglich-lanzettförmig, stumpf, ganzrandig, am Rande zurückgerollt. Blumen einzeln, winkelfständig. Corollen scharlachroth. Staubfäden 4. Antheren ungleich. Vaterl. Peru. ♀ Blühz. August.

3. *Gardoquia glabrata* Kunth J. c. 11. p. 313. Glatte Gardoquia.

Nestchen fzig. Blätter länglich-lanzettförmig, fast sägerandig, am Rande zurückgerollt, glatt, oben glänzend, unten drüsig punktiert. Blumenstiele abgekürzt, einzeln, winkelfständig. Vaterl. Quito. ♀ Blühz. Sommer.

4. *Gardoquia taxifolia* Kunth J. c. 11. p. 312. Larusblättrige Gardoquia.

Neste grau-zottenhaarig. Blätter linien-lanzettförmig, ganzrandig, glatt, unten punktiert. Blumenstiele kurz, einzeln, winkelfständig. Vaterl. Neugranada. ♀ Blühz. Juli.

5. *Gardoquia discolor* Kunth J. c. 11. p. 312. Zweifarbige Gardoquia.

Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, ganzrandig, geadert, unten grau-seidenhaarig-fzig. Blumenstiele einzeln, mit Bracteen versehen. Corollen purpurroth. Wahrscheinlich gehört hierher *G. stricta* R. et P. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 444. Vaterl. Neugranada und Peru. ♀ Blüht daselbst im Januar.

6. *Gardoquia microphylla* Kunth J. c. 11. p. 311. Kleinblättrige Gardoquia.

Gard. revoluta R. et P. gehört hierher f. 1. Nachtrag. B. 3. S. 443.

†† Pedunculis unifloris subverticillatis.

Blumenstiele einblümig, fast quirlständig.

7. *Gardoquia obovata* R. et P. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 443. Blätter elliptisch-umgekehrt-eiförmig, ganzrandig, auf beiden Seiten sternhaarig-fzig. Blumenstiele sehr kurz, meist zu 3 winkelfständig.

8. *Gardoquia thymoides* Kunth J. c. 11. p. 314. Thymianartige Gardoquia.

Stengel strauchig. Blätter fast herz-eiförmig, gesägt, fast sägerandig, der Rand zurückgerollt, oben glatt, unten grau-fzig. Blumenstiele quirlständig, die Quirle vielblü-

mig, entfernt stehend. Corolle gelb. Waterl. Quito. h
Blühz. Sommer. ?

+++ Pedunculis trifloris.

Blumenstiele dreiblümig.

9. *Cardoquia elegans* Kunth J. c. 11. p. 315. Zierliche Cardoquia.

Blätter rundlich = eiförmig, stumpf, gekerbt = gezähnt, unten weiß = filzig. Blumenstiele winkelförmig, meist dreiblümig. Corollen roth. *G. pulchella* Kunth ist nur eine Varietät, welche sich nur durch die am Rande wenig zurückgerollten Blätter, und durch fleischrothe gelbpunktirte Corollen unterscheidet. Waterl. Peru. h Blüht daselbst im Januar, die Varietät im August.

10. *Cardoquia tomentosa* Kunth ist *G. incana* R. et P. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 443.

Blätter rundlich = eiförmig, spitzlich, fast sägerandig, unten weiß = filzig. Blumenstiele winkelförmig, dreiblümig.

++++ Floribus capitatis s. spicatis.

Blumen in Köpfchen oder Aehren gesammelt.

11. *Cardoquia capitata* Spreng. Köpfförmige Cardoquia.

Stengel ästig, wie die Blätter scharfborstig. Blätter büschelförmig stehend, länglich = linienförmig, ganzrandig, am Rande zurückgerollt. Blumen in langgestielte Köpfchen gesammelt. Bracteen und Kelche dornig, behaart. Waterl. Rio grande. h Blühz. Sommer.

12. *Cardoquia organoides* Reichenb. Majoranartige Cardoquia.

Blätter umgekehrt = eiförmig, an der Spitze fast gezähnt, geadert. Blumenköpfchen gestielt, mit Bracteen versehen. Waterl. die Insel Trinidad.

13. *Cardoquia spicata* Spr. Aehrentragende Cardoquia.

Blätter büschelförmig stehend, spatelförmig, fast ganzrandig, scharf. Die Blumen bilden gipfelständige Aehren, die mit Zottenhaaren besetzt sind. Waterl. Rio grande. h Blühz. Sommer.

Kultur. Die Cardoquien verlangen warme Standörter, denn sie kommen aus Tropenländern. Die meisten Arten verbreiten einen starken Geruch und lassen sich sowohl durch Stecklinge als durch die Aussaat des Saamens vermehren und fortpflanzen.

Garidella Linn. Garidelle. f. Lexic. B. 4. S. 290.
(Gaertn. sem. t. 118.)

Kelch corollinisch, fünfbüdrig. Nectarien 5, zweilippig, zweispaltig. Staubfäden 10. Kapseln 2—3, zusammenhängend, vielſaamig.

Decandria Trigynia. (Familie Ranunkulaceen.)

1. **Garidella Nigellastrum** Linn. f. Lexic. B. 4. Nigellenartige Garidelle.

Stengel krautartig, dünn, 1—2 Fuß hoch. Blätter zart, fiederſpaltig. Blumen kleiner als bei den Nigellen, blauſch, meiſt zehnſädig. Nectarien anſitzend, ohne Nägel, punkirt, behaart.

2. **Garidella unguicularis** Lamarck.

Blumen vielſädig. Nectarium herzförmig, aufrecht, gegen einander gebogen, mit langen Nägeln verſehen. Wächſt in Epyrien. ☉ Blühj. Sommer.

Garrya elliptica Douglas in Edwards Botanical Reg. t. 1686.

Stamm ſtrauchig. Blätter ausdauernd. Blumen büſchlich, doldentraubig, einem Viburnum gleichend. Dieſer Zierſtrauch wurde im Jahr 1828. in England eingeführt und hat im Garten der Horticultural Society zuerſt ſeine lieblichen Blumen entwickelt. Er wird daſelbſt im Glashauſe überwintert und durch Abſieger vermehrt.

Gastonia Commers. f. 1. Nachtrag. B. 3. S. 445. Zeile 12. von unten ſtatt spinosa lies cutispongia.

1. **Gastonia Nalugu** Lam.

Blätter gefiedert. Blättchen ſägerandig. Wächſt in Oſtindien.

2. **Gastonia palmata** Roxb. Lindl. Bot. Reg. 894.

Aralia dubia Spr. Syst. veg. IV. C. p. 125.

Stengel ſtrauchig, weichſtachelig. Blätter tiefherzförmig, handförmig = ſiebentheilig, unten roſtſchwarz = ſchwarz. Einſchnitte lanzettförmig, ſägerandig. Blumen eingriffelich, in zuſammengeſetzten Dolden. Waterl. Oſtindien, h

Gastridium Patr. Brown. Gastridium.

Riſpen ährenförmig. Kelch häutig, zweiklappig, geſpitzt, an der Baſis ſaſt bauchig. Corollen kleiner als der Kelch, gezähnt, auf dem Rücken borſtig oder unbewehrt.

Triandria Digynia. (Familie Gräſer.)

1. *Gastridium australe* P. Brown. *Agrostis australis* Linn. f. *Milium lendigerum* Schreb. im Lexic. B. 6. S. 180.

Rispe fast ährenförmig, fast schlaff, grün-silberfarbig. Kelchklappen verlängert, langgespitzt, glänzend. Die Corollenklappen mit verlängerten Borsten besetzt.

2. *Gastridium muticum* Spr. (G. *scabrum* Presl.)

Rispe fast ährenförmig, straff. Kelchklappen länglich, gespitzt, scharf. Borsten undeutlich, fast fehlend. Wächst in Sicilien auf Aedern.

Synonymen.

Gastridium clavellusum Lyngb. ist *Chondria clavellosa* Ag.

Gastridium cylindrica Lyngb. ist *Solenia cylindrica* Spr.

Gastridium filiforme Lyngb. ist *Solenia filiformis* Spr.

Gastridium jubrica Lyngb. ist *Solenia jubrica* Spr.

Gastridium Opuntia Lyngb. ist *Encoelium bulbosum* Ag.

Gastridium ovale Lyngb. ist *Valonia ovalis* Ag.

Gastridium purpurascens Lyngb. ist *Chondria clavellosa* Ag.

Gastrochilus calceolaris Don. ist *Sarcochilos nepalense* Spr.

Gastrodia Rob. Brown. Prodr. Fl. Nov. Holl.

Perianthium monophyllum tubulosum, ore 5 lobo, lobis infra secundis. Labellum inclusum, librum, unguiculatum, columnae incumbens. Columna longa, apice cavo, basi antice incrassata, ubi stigma. Anthera terminalis, mobilis decidua, loculis approximatis. Massae pollinis e particulis angulatis, majusculis elastice cohaerentibus. Brown.

Gynandria Monandria (Familie der Orchideen.)

1. *Gastrodia sesamoides* R. Brown. J. a.

Wurzel fleischig, ästig, gegliedert. Schaft blattlos, nur mit abwechselnden kurzen Scheiden besetzt. Blumen weißlich oder ockergelb, in einer länglichen Traube. Blüthendecke einblütrig, röhrig, die Mündung fünflappig, die untern Lappen nach einer Seite gerichtet. Lippe eingeschlossen. Griffelsäule sehr lang, an der Spitze ausgehöhlt, an der Basis verdickt.

Anthere endstaudig, beweglich, abfallend. Pollenmasse gegliedert, eckig, elastisch.

Diese krautartig schmarozende Orchidee wächst in Neuhol-land auf der Erde. 4. Man pflanzt sie in einen mit guter Dammerde gefüllten Blumentopf und überwintert sie im Glashause.

Gastrolobium Rob. Brown.

Character generic. f. Nachtr. B. 3. S. 446.

Kelch zweilippig. Die Blätter der schmetterlingsförmigen Corolle gleich lang. Zehn freie Staubfäden. Ein Griffel, pfriemenförmig, aufsteigend. Hülse banchig, gestielt, zweisaamig.

Decandria Monogynia (Familie Hülsenpflanzen.)

1. *Gastrolobium retusum* Lindl. Bot. registr. t. 1677.

Ein kleiner aber zierlicher Strauch, aus Neuhol-land, der in unsern Gärten wie *Gastrol. bilobum* behandelt wird. f. I. Nachtr. a. a. O.

Gastronema pumila Sims. ist *Amaryllis pumila* Ait. f. A. *pumila* Lexic. und I. Nachtrag. B. 1. S. 209.

Gaudichaudia Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. pl. V. p. 158.

Calix 5partitus extus glandulosus. Petala 5, unguiculata. Stamina basi connata inaequalia. Antherae duae minores abortientes. Samarae duae.

Kelch fünfstheilig, auswendig drüsig. Fünf bodenständige Corollenblätter: mit Nägeln versehen, sehr abstehend. Fünf Staubfäden, bodenständig, an der Basis verbunden, ungleich; zwei Antheren sind kleiner als die übrigen und fehlschlagend. Drei zusammenhängende Fruchtknoten. Ein Griffel mit stumpfer Narbe.

Pentandria Monogynia. (Familie Malpighiaceen.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Hrn. Carl Gaudichaud Botanikus in Paris.

1. *Gaudichaudia cynanchoides* Kunth. J. c. V. t. 445.

G. caule volubili, foliis oppositis petiolatis cordato-oblongis, floribus racemosis. D

Eine Schlingpflanze deren braune dünne Aeste mit angebrückten kleinen Borsten besetzt sind. Blätter gegenüber stehend, gestielt, länglich-herzförmig, gespitzt, ganzrandig, unten seidenhaarig, 18—20 Linien lang, 6—8 Linien breit. Blumen gestielt, gepaart, in wenigblümigen winkels- und gi-

pfelfständigen Astersolden. Blumenstielchen mit zwei Bracteen besetzt. Kelch halbkugelig, fünfstheilig, auswendig behaart und an der Basis mit 10 Drüsen versehen. Corollenblätter 5, rundlich, glatt, gelb, mit langen Nägeln, ausgebreitet, fast gleich, gewimpert. Fünf ungleiche Staubfäden, mit runden zweiknöpfigen Antheren gekrönt, davon aber die an den 2 kleinern Fäden fehl schlagen, und mucronenartig, gespißt sind. Fruchtknoten 3, zusammenhängend, klein, aufsteigend, rundlich-eyförmig, mit angebrückten Haaren bekleidet. Griffel aufrecht, fadenförmig, so lang als die Staubfäden, glatt. Narbe stumpf. Vaterl. Mexico. h ?

2. *Gaudichaudia guaranitica* Hilar. pl. us. bras.

Stengel windend, Blätter gestielt, länglich-eyförmig, stumpf, mucronenspißig. Blumen in wenigblümigen winkelfständigen Dolden. Vaterl. Brasilien. h ?

3. *Gaudichaudia linearifolia* Hilar.

Stengel staudenstrauchig, aufrecht. Blätter fast stiellos, linienförmig. Blumen in gipfelfständige Dolden gesammelt. Vaterl. Brasilien. h

4. *Gaudichaudia sericea* Hilar.

Stengel staudenstrauchig, aufrecht. Blätter fast stiellos, länglich-lanzettförmig, unten seidenhaarig. Blumenstiele meist einblümig. Vaterl. Brasilien. h

Kultur. N. Y. überwintert man im Glashause, die übrigen im warmen Hause, denn sie kommen aus Brasilien. Fortpflanzung und Vermehrung durch die Aussaat des Saamens und durch Stecklinge in warmen Beeten.

Gaultheria Linn. Gaultherie. S. Lexic. B. 4. S. 291.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 446.

Kelch fünfspaltig, mit 2 Bracteen versehen. Corolle trug-eyförmig, fünfspaltig. Zehn Staubfäden. Antheren an der Spitze gespalten (zweihörnerig). Kapsel kugelig, fünffächerig, von dem innern Kelche bedeckt, der zur Vere wird.

Decandria Monogynia. (Familie Ericaceen.)

† Pedunculis unifloris. Blumenstiele einblümig.

1. *Gaultheria anastomosans* Kunth. Hierher gehört *Anastromeda anastomosans* Linn. Suppl. f. Lexic. B. I. und *A. glomerata* Cavan.

2. *Gaultheria purpurascens* Kunth in Humb. et Bonpl.

Nov. gen. et Sp. pl. III. p. 282. Purpurröthliche Gaultherie.

Nestchen und Blätter borstig = behaart. Blätter elliptisch = länglich, an beiden Enden gespitzt, gezähnt, unten filzig, purpurröthlich. Blumenstiele einzeln, winkelförmig. Vaterl. Neugranada. ♀

3. *Gaultheria nummularioides* Don. Pfennigtrautartige Gaultherie.

Stengel fadenförmig, gestreckt. Blätter fast stiellos, herzförmig, mucronenspitzig, oben glänzend, unten am Rande scharf. Blumenstiele sehr kurz, winkelförmig, mit Bracteen besetzt. Vaterl. Emodi montes. ♀

4. *Gaultheria myrsinoides* Bonpl. Kunth J. c. III. p. 283. Myrsinartige Gaultherie.

Nestchen und Blätter glatt. Blätter länglich = eiförmig, gespitzt, an der Spitze gekerbt = gezähnt, oben glänzend. Blumenstiele filzig. Vaterl. Neugranada. ♀ Blüht. October bis November.

5. *Gaultheria myrtilloides* Schlechtend. Heidelbeerblättrige Gaultherie.

Nestchen borstig = behaart. Blätter länglich = lanzettförmig, unten behaart. Blumenstiele sehr kurz, mit Bracteen besetzt. Vaterl. Brasilien. ♀

†† Floribus racemosis. Blumen traubenständig.

6. *Gaultheria scabra* Willd. Scharfblättrige Gaultherie.

Blätter herz = eiförmig, gespitzt, gezähnt, scharf, unten netzartig. Blumen in einfachen Trauben. Kelche drüsig = behaart. Vaterl. Caracas. ♀ Blüht. Sommer und Herbst.

7. *Gaultheria fragrantissima* Wallich. Sehr gutriechende Gaultherie.

Nestchen knieartig gebogen. Blätter herz = lanzettförmig, sägerandig, harzig = punktiert. Blumen in Trauben, die filzig sind. (G. fragrans Don.) Vaterl. Nepal. ♀ Blüht. Sommer.

8. *Gaultheria tomentosa* Kunth J. c. III. p. 287. t. 262. Filzige Gaultherie.

Gaultheria ferruginea Schlechtend.

Nestchen filzig. Blätter länglich, gespitzt, fast ganzrandig, oben glatt, glänzend, unten rostfarbig, filzig, am Rande zurückgerollt. Blumentrauben gipfelförmig, wie die Corollen filzig. Vaterl. Quito. ♀ Blüht. August.

9. *Gaultheria rigida* Kunth. J. c. III. p. 286. Streife Gaultherie.

Nestchen filzig. Blätter umgekehrt-eiförmig, gespitzt, an der Basis fast herzförmig, scharfgezähnt; glatt. Blument in gipfelständigen, fast filzigen Trauben. Corollen glatt. Vaterl. Cumana. ♀ Blüht. September.

10. *Gaultheria cordifolia* Kunth. J. c. III. p. 285. t. 201. Herzblättrige Gaultherie.

Nestchen klebrig-scharfborstig. Blätter tief, herz-eiförmig, gezähnt, runzlich, oben glatt und glänzend, unten borstig-behaart. Blumen in gipfelständigen Trauben, die wie die Corollen klebrig-behaart sind. Vaterl. Neugranada. ♀ Blüht. Oktober, November.

11. *Gaultheria coccinea* Kunth. J. c. III. p. 284, Scharlachrothe Gaultherie.

Neste fast behaart. Blätter rundlich-eiförmig, gespitzt, gezähnt, glatt, oben glänzend, unten punktiert. Blumen in gipfelständigen Trauben, die wie die scharlachrothen Corollen klebrig behaart sind. Vaterl. Caracas. ♀ Blüht daselbst im Januar.

12. *Gaultheria reticulata* Kunth. J. c. III. p. 284. Netzadrig Gaultherie.

Neste und Blätter glatt. Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, gekerbt-gezähnt, oben glänzend, unten netzförmig geadert. Blumen in gipfelständigen, filzigen Trauben. Corollen glatt. Vaterl. Quito. ♀ Blüht. August.

13. *Gaultheria antipoda* Forst. f. Lexic. B. 4. S. 291.

Neste filzig. Blätter rundlich-eiförmig, gezähnt, auf beiden Seiten glatt, netzadrig. Blumen in Trauben gesammelt, die fast borstig sind, und Rispen bilden. Corollen glatt. Vaterl. Neuseeland. ♀

Die Gaultherien sind Sträucher, einige kleine Bäume, deren Blätter wechselnd stehen. Die Blumen einzeln oder in Trauben, winkels- und gipfelständig. Corollen weiß oder roth. Die meisten dienen zur Zierde unserer Gewächshäuser und werden durch die Ausfaat des Saamens, auch durch Stecklinge in warmen Beeten vermehrt und fortgepflanzt.

Synonymen.

Gaultheria ferruginea Schlechtend. f. *Gaultheria tomentosa* N. 8.

Gaultheria fragrans Don. f. *Gaultheria fragrantissima* N. 7.

Gaultheria hispida Spreng. f. *Lussacia hispida*.

Gaultheria serpillifolia Pursh. ist *Vaccinium hispidum* Linn. f. Lexic.

Gaultheria sphagnicola Rich. f. *Epigaea repens* Lexic.

Gaura Linn. Prachtsterze f. Lexic. B. 4. S. 292. Vier Arten.

Character genericus f. 1. Nachtrag. B. 3. S. 448.

Reich röhrig, viertheilig, abfallend. Corolle vierblättrig. Staubfäden 8. Ein Griffel. Nuß (Steinfrucht) eifig, weiß einsamig.

Octandria Monogynia (Familie der Onagren.)

1. *Gaura mollis* Kunth in Hamb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. VI. p. 93. t. 529. Weichblättrige Nachsterze.

Stengel ästig, aufrecht. Aeste stielrund, seidenhaarig = filzig. Aestchen eifig. Blätter wechselnd stehend, gestielt, länglich = lanzettförmig, gespitzt, entfernt gezähnt, filzig, mit dem Stiele $1\frac{1}{4}$ Zoll lang, 4 Linien breit. Die Blumen bilden aufrechte, 5—6 Zoll lange stiellose Endähren, die mit länglich = eiförmigen filzigen Bracteen versehen sind. Corollenblätter blaßgelb, stumpf. Vaterl. Mexico. h? Blühz. Junius?

2. *Gaura epilobioides* Kunth. J. c. VI. p. 93. Epilobi-umartige Nachsterze.

Stengel aufrecht, ästig, filzig. Aeste lang, gleich hoch. Blätter zerstreut stehend, genähert, stiellos, linienförmig, ganzrandig, oder mit einigen Zähnen versehen, filzig, 1 Zoll lang und länger, $1\frac{1}{2}$ Linie breit. Blumen in gestielte gipfelförmige aufrechte Ähren gesammelt, die 3 Zoll und drüber lang sind. Bracteen pfriemenförmig. Corollenblätter rosenroth. Vaterl. Mexico, bei Actopan. 4? Blühz. Mai.

3. *Gaura chinensis* Lour. Chinesische Prachtsterze.

Stengel staudenstrauchig, viereckig, scharfborstig. Blätter lanzettförmig, sägerandig, stiellos. Blumentrauben ährenständig. Vaterl. das südliche China. h 4

4. *Gaura coccinea* Fras. Scharlachrothe Prachtsterze.

Stengel krautartig, seidenhaarig. Blätter linien = lanzettförmig, fast gezähnt. Blumen scharlachroth, in schlaffen Trauben. Vaterl. Louisiana. 4?

Gaya Spreng. Syst. veg. 1. p. 535. Cal. corollinus

marcescens. Stamina 10 basi coalita, alterna sterilia. Antherae rima dorsali dehiscentes. Cocci 5 2spermi 2valves.

Pentandria Pentagynia (Familie der Lasiopetaleen.)

1. *Gaya platyphylla* Spr. *Seringia platyphylla* Gay. Hierher gehört *Lasiopetalum arborescens* Ait. f. 1. Nachtrag. B. 4. S. 316.

Gaya canescens Kunth f. *Sida candicans*!

Gaya hermannioides Kunth f. *Sida* *Gaya*.

Gaya subtriloba Kunth f. *Sida occidentalis*.

Gaya Lussacia buxifolia Humb. f. *Lussacia buxifolia* und mehrere Arten.

Gazania Gaertn. sem. *Gazanie*. (*Gorteria* Linn. Thunb.)

Character generic. f. 1. Nachtrag. B. 3. S. 449. und 3 Arten.

Blüthendecke (Kelch) einblättrig, die Röhre mit dachziegelförmig gelagerten Blättchen bedeckt oder nackt. Fruchtboden nackt. Saamen sehr zottenhaarig. Saamentrone haarig spreuig.

Syngenesia Frustranea (Familie Compositae.)

1. *Gazania diffusa* Spr. ist *Gorteria diffusa* Thunb. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 565.
2. *Gazania integrifolia* Spr. ist *Gorteria integrifolia*. 1. Nachtr. B. 3. S. 566.
3. *Gazania pectinata* Spr. ist *Gorteria pectinata*. 1. Nachtr. B. 3. S. 566.

Geastrum Persoon Synops. method. fungor. s. observat. mycolog.

Cryptogamia Sect. V. (Familie Gastromycetes (Bauchpilze.)

Die äußere Hülle des Körpers ist sternförmig gespalten und zurückgeschlagen. Auf dieser sitzt die innere Hülle, welche an der Spitze sich öffnet und die Keimkörner mit Haargewebe enthält. (Abbild. Schmidel t. 37. 46. Nees a Esenb. t. 12.)

Diese Gattung enthält 10 Arten, welche theils auf der Erde, an feuchten Orten, theils auf faulen Blättern und andern modernden vegetabilischen Körpern sitzen und entwickeln. Es sind folgende:

† Sporangio Stipitato.

1. *Geastrum coliforme* Pers. (*Lycoperdon Dickson. Myriostoma* Desv.)

Wächst an Aestern in England.

2. *Geastrum coronatum* Pers.

In Europa auf der Erde an feuchten Orten.

3. *Geastrum pectinatum* Pers.

Die äußere Hülle vielspaltig, fast zurückgeschlagen, rindig, innere schwärzlich, die Mündung gefranzt. Wächst in Fichten- und Tannenwäldern.

4. *Geastrum quadrifidum* Pers.

Äußere Hülle vierspaltig, gewölbt, rindig, innere an der Mündung fahnenförmig. Standort wie vorhergehende Art. Hierher gehört: *Lycoperdon coronatum* Schaff. L. *forficatum* Huds. und *L. fenestratum* Batsch.

5. *Geastrum minimum* Schweinitz.

Die äußere Hülle vielspaltig, braunlich-weiß, innerer eysförmig, weiß, an der Basis flach, die Mündung kegelförmig, gewimpert. Wächst in Carolina auf der Erde. (*Lycoperdon minimum* Linn.? s. Lexic. B. 5. S. 641.)

†† Sporangio sessili.

6. *Geastrum rufescens* Pers.

Die äußere Hülle vielspaltig, braunlich, immer blaß, glatt, die Mündung gezähnt. Hierher gehört: *Lycoperdon stellatum* Schaff. s. Lexic. B. 5. S. 543. L. *radiatum* Batsch. s. Lexic. auch L. *corollinum* et *multiflorum* Batsch. Wächst auf der Erde in Nadel- und Laubwäldern.

7. *Geastrum Boltoni* Nees a Esenb. (*Lycoperdon stellatum* Bolt. t. 179.)

Die äußere Hülle vielspaltig, etwas aufrecht, braun, innere aufsteigend, in der ersten Periode ihrer Entwicklung und Ausbildung, blau, niedrig, dann glatt, braun, die Mündung ausgeschweift. Wächst in Europa, besonders England in Wäldern.

8. *Geastrum hygrometricum* Pers.

Die äußere Hülle vielspaltig, ausgetrocknet, innere kugelförmig, niedrig, einfarbig. Wächst in Wäldern in Deutschland und Nordamerika. (Abbild. Schmiedel ic. t. 27.)

9. *Geastrum fibrillosum* Schweinitz.

Die äußere Hülle vielspaltig, gelbröthlich, eingebogen, auswendig

wendig faserig = schuppig, innere aufsteigend, kugelförmig, glatt.
Wächst auf der Erde in Carolina.

10. *Geastrum Linkii* Spr. (Sterrbeckia Geastri Link.
Actinodermium Nees & Esenb.)

Geeria Blum. *Geerie*.

Blumen diöcisch. Kelch fünfblättrig, von 2 Bracteen
unterstützt. Corolle fünftheilig. Staubfäden zahlreich, an der
Basis der Corollentheile angewachsen. Griffel 3, oder 5, ver-
bunden. Narben gespitzt. Beere fünffächerig, viel-samig.

Polyandria Polygynia. (Familie Xerostremieen.)

1. *Geeria serrata* Blum. Sägezahnige *Geerie*.

Aesthen fähig. Blätter lanzettförmig, langgespitzt, säge-
randig, unten fähig. Blumen gehäuft, winkelförmig, fünf-
griffelig. Vaterl. Java. h ?

2. *Geeria angustifolia* Blum. Schmalblättrige *Geerie*.

Aesthen seidenhaarig. Blätter lanzettförmig, schmal, lang-
gespitzt, sägerandig, unten seidenhaarig. Weibliche Blumen
dreigriffelig. Vaterl. Java.

3. *Geeria glabra* Blum. Glatte *Geerie*.

Aesthen und Blätter glatt. Blätter länglich = lanzettförmig,
langgespitzt. Blumen gehäuft, winkelförmig. Vaterl.
Java.

4. *Geeria obovata* Blum.

Aesthen und Blätter glatt. Blätter umgekehrt = eiförmig,
an der Spitze stumpf eingedrückt, sägerandig. Blumen wink-
elförmig, nicht gehäuft. Vaterl. Java.

Alle vier Arten verlangen warme Standörter, denn sie
kommen aus Java. Den Saamen säet man in Blumentöpfe
(Napfe) und stellt diese in ein warmes Beet.

Geissois Labill. *Geissois*.

Kelch vierblättrig. Keine Corolle. Staubfäden 10, boden-
ständig, hervorragend. Griffel zweitheilig. Frucht schoten-
förmig, lang, zweifächerig. Saamen geflügelt, dachziegelför-
mig gelagert.

Decandria Monogynia. (Familie der Hülsenpflanzen?)

1. *Geissois racemosa* Labillard. Traubenblüthige *Geissois*.

Ein Baum, dessen Aeste absteigen. Blätter fünfzählig = ge-
fingert. Blättchen zweifarbig. Aestblätter gegenüberstehend,
groß, länglich. Blumen traubenständig. Vaterl. Neu = Cale-
donien. h

Dict. Exp. 2^e Nachtr. IV. Bd.

h

Geissorrhiza Ker. Geissorrhize. (*Geissorrhiza* Ait. Kew. 1. p. 83.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 1. S. 450.

Blumenscheide so lang als die trichterförmige Corolle, deren Rand sechsstheilig und regelmäßig ist. Staubfäden 3. Griffel niedergebogen. Narbe etwas ausgebreitet, gekranzt, über die Antheren hervorragend. Kapsel häutig, 3seitig, viel-samig. Saamen klein.

Triandria Monogynia. (Familie der Jrideen.)

1. *Geissorrhiza secunda* Ker. Bot. Mag. 592. 1105. Hierher gehört *Jxia secunda* Berg. f. Lexic. B. 5. S. 226. und *Jxia Andrews repos.* 245. (Abbild: Jacq. ic. 2. t. 277.)

2. *Geissorrhiza sublutea* Ker. (*Jxia sublutea* Lam.) Wurzelblätter eingerollt=borstig. Schaft lang, aufrecht, einblüthig. Scheide so lang als die gelbliche Corolle. Vaterl. das Vorgebirge der guten Hoffnung. 4

3. *Geissorrhiza excisa* Ker. ist *Jxia excisa* Thunb. f. Lexic. B. 5. S. 220., auch *Gladiolus excisus* Jacq. gehört hierher.

4. *Geissorrhiza hirta* Ker. ist *Jxia hirta* Thunb. f. Lexic. B. 5. S. 222. *Jxia inflexa* la Roch. Lil. Wurzelblätter schwertförmig, zottenhaarig. Schaft einfach, glatt. Blumen nach einer Seite gerichtet.

5. *Geissorrhiza imbricata* Ker. f. *Jxia imbricata* 1. Nachtr. B. 4. S. 242.

6. *Geissorrhiza setacea* Ker. f. *Jxia setacea* Thunb. 1. Nachtr. B. 4. S. 248.

7. *Geissorrhiza humilis* Ker. f. *Jxia humilis* Thunb. Lexic. B. 5. S. 222.

Diese Gewächse behandelt man in unsern Gärten wie die Jxien siehe Lexic. B. 5. S. 229. und meine Bemerkungen im ersten Nachtrage B. 4. S. 254.

Gela Lour. f. Sela Spr.

Gelidium Anthonini Lamaux. ist *Sphaerococcus* Bil-larderii var.

Gelidium pinnatifidum Lyngb. ist *Chondria pinnati-fida* Ag.

Gelidium versicolor Lamx. ist *Sphaerococcus cartila-gineus* Ag.

Gemella trifolia Lour. f. *Schmidelia cochinchinensis* Spr.

Geniostoma Forster f. Lexic. B. 4. S. 295. Borstenblume.

Kelch kreiselförmig, fünfspaltig. Einschnitte gespitzt. Corolle meist glockenförmig, fünfspaltig, inwendig zottenhaarig. Staubfäden 5, in die Corollenröhre eingefügt. Ein Griffel. Kapsel viel-saamig. Saamen eiförmig, an einem fadenförmigen freistehenden Nabel, wodurch sich diese Gattung am meisten von *Logania* R. Br. unterscheidet.

Pentandria Monogynia. (Familie der Contorten oder Gentianeen?)

1. *Geniostoma rupestris* Forst. prodr. 103. Felsenliebende Borstenblume.

Aeste eiförmig, glatt. Blätter einander gegenüber stehend, länglich-lanzettförmig, glatt, gerippt=geadert, ganzrandig. Blumen blaßroth, in gestielte winkelfständige Astersolden gesammelt. Vaterl. Insel Lanna. Nov. Hebrid. h

2. *Geniostoma brasiliense* Spr. Brasilische Borstenblume.

Aeste knotig. Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, häutig. Blumen in gestielten gipfelfständigen Astersolden, die mit Bracteen besetzt sind. Vaterl. Brasilien. h Blühz. Sommer.

3. *Geniostoma spinescens* Spr. Dornige Borstenblume.

Aeste knotig, dornig. Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, fast lederartig, unten grau=weißlich, dreifachgerippt. Blumen in gestielten gipfelfständigen Astersolden. Vaterl. Brasilien. h

4. *Geniostoma borbonicum* Spr. ist *Anassera borbonica* Lam. f. 1. Nachtrag B. 1. S. 226. 2. Nachtrag. B. 1 S. 228. *Geniostoma*.

5. *Geniostoma febrifugum* Spr. (*Anassera febrifuga* Martius.)

Blätter länglich-eiförmig, stumpflich, lederartig, an der Basis abgelöset, gerippt, unten zottenhaarig. Blumen in seitenständigen Rispen. Vaterl. Brasilien. h

6. *Geniostoma acuminata* Wallich. Malacische Borstenblume.

Aeste viereckig, fast kletternd. Blätter länglich-lanzettförmig, lang und feingespitzt, lederartig, oben glänzend, unten

strießlich. Blumen in winkelfständigen Dolden, die kürzer als die Blattstiele sind. Vaterl. Insel Freti Malac. ♀

Kultur. Gute lockere Dammerde. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und Stecklinge in warmen Gegenden.

Genipa Tournef. Genipa. (Gaertn. sem. t. 225.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 452.

Reich abgestutzt, ungetheilt. Corolle röhrig, tellerförmig, fünfspaltig. Fünf fast hervorragende Antheren. Ein Griffel mit keulenförmiger Narbe. Beere meist vierfächerig. Saamen zusammengedrückt, in breiige Substanz gebettet.

Pentandria Monogynia. (Familie Rubiaceen.)

1. *Genipa americana* Linn. Hierher gehört *Gardenia Genipa* Swartz. f. Lexic. B. 4. S. 285.

Aeste ohne Dornen. Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt. Blumenstiele fast doldentraubig. Die Einschnitte der Corolle abstehend, buchtig. Staubfäden ausgesperrt. Uebrigens f. Lexic. a. a. D.

2. *Genipa oblongifolia* Ruiz et Pav. ist *Gardenia oblongifolia* Dietr. f. Lexic. B. 4. S. 287. *G. Caruto* Kunth. Humb. et B. Nov. gen. III. p. 407.

Ein 18—20 Fuß hoher Baum, mit runden glatten Aesten. Blätter länglich = umgekehrt = eiförmig, stumpf, oben glatt, unten filzig, fast stiellos. Blumenstiele gipfelfständig, 2—3 oder mehrblüthig. Blumen gestielt, wohlriechend. Die Einschnitte der Corolle stumpf, seidenhaarig. Vaterl. Südamerika. ♀ Blüthz. Mai bis Juli.

Diese *Genipa* ist in ihrem Vaterlande unter dem Namen *Caruto* oder *Xagua* bekannt. Die Früchte sind längliche eiförmig, fleischig und essbar. Die *Genipen* empfehlen sich wie die *Gardenien*, durch Anstand und Schönheit ihrer Blumen und werden in unsern Gärten, in Hinsicht auf Standort und Fortpflanzung wie jene behandelt f. Lexic. B. 4. S. 284—290.

Genista Linn. Ginster. Kennzeichen der Gattung f. Lex. B. 4. S. 296.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 453.

Diadelphia Decandria. (Familie der Hülsenpflanzen.)

I. Inermis. Unbewehrte.

† *Foliis simplicibus.* Blätter einfach.

a. Aeste rundlich oder gefurcht.

Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Vericon und
ersten Nachtrage beschriebenen Arten: *G. ovata* Ait. *G.*
tinctoria, *sibirica*, *florida*, *pilosa*, *humifusa* Linn.
G. albida Willd. und folgende.

1. *Genista mantica* Pollin. Veroneßscher Ginster.

Aeste gefurcht = gestreift, wollig, niederliegend. Blätter
linien = lanzettförmig, sitzig. Blumen winkelfständig, fast trau-
big. Hülsen zottenseidenhaarig. Vaterl. Verona (das Ge-
biete des venetianischen Staats.) h

2. *Genista purgans* Linn. Hierher gehört *Spartium pur-*
gans Gerard. Gouan. f. Lexic. B. 9. S. 395.

3. *Genista patula* M. a Bieb. Ausgebreiteter Ginster.

Aeste rund, gestreift, ausgebreitet. Aestchen Blumen tra-
gend, abgekürzt, fast rispenständig. Blätter linien = lanzett-
förmig, langgespitzt, ganzrandig, glatt. Vaterl. Kaukasus.
h Blühz. Sommer.

4. *Genista umbellata* Cand. Hierher gehört: *Spartium*
umbellatum Desf. f. Lexic. B. 9. S. 397.

b. Aeste geflügelt, eckig, dreiseitig.

Hierher gehören die im Vericon und 1. Nachtrage beschrie-
bene Arten: *G. Sagittalis* Linn. *G. parviflora* Brot.
ganuensis Pers. *G. diffusa* Willd. und folgende.

5. *Genista depressa* M. a Bieb. Niedergedrückter Ginster.

Aeste niedergedrückt, dann aufsteigend, dreiseitig, sitzig.
Blätter lanzettförmig, gespitzt, auf beiden Seiten weiß = sei-
denhaarig. Blumenstiele winkelfständig, kurz. Corollen glatt.
Vaterl. das südliche Lantien. h

6. *Genista tetragona* Bess. Viereckiger Ginster.

Aeste 4eckig, aufsteigend. Blätter lanzettförmig, stumpf-
lich, fast seidenhaarig. Blumenstiele traubig. Corollen glatt.
Vaterl. Podolien. h

†† Foliis ternatis. Blätter dreizählig.

Genista canariensis et *triquetra* Linn. f. Lexic.
B. 4. gehören hierher und folgende.

7. *Genista alba* Lam. ist *Spartium multiflorum* Ait.
f. Lexic. B. 9.

Dieser Fierstrauch ist jetzt im hiesigen bot. Garten 6—8
Fuß hoch, und wird im Glashause überwintert. Seine Aeste
stehen wechselsweise, sind gefurcht, fast ruthenförmig und schmü-
den sich im Frühjahr mit vielen kleinen weißen winkelfständi-
gen Blumen. Die Blätter sind einfach und dreizählig, die

Blättchen umgekehrt-eiförmig, seidenhaarig. Waterl. das nördliche Afrika. ♀

II. Spinosae. Dornige Arten.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon und 1 Nachtrage beschriebene Arten: *G. lusitanica*, *anglica*, *germanica* Linn. *G. hirsuta* Vahl *G. tricuspidata* Desf. *G. triacantha* et *falcata* Brot. *G. sylvestris* Scop. und folgende.

8. *Genista Lobelii* Cand. (*G. Echinus* Willd. herb.)

Die Aeste stehen wechselsweise, sind knotig und dornig, fast knieartig gebogen. Blätter theils einfach, theils dreizählig, linienförmig, dicht anliegend. Blumenstiele gepaart, wie die Kelche zottenhaarig. Waterl. das südliche Frankreich und Corsica. ♀

9. *Genista corsica* Cand. Corsicanischer Ginster.

Aeste mit sehr zusammengesetzten abstehenden Dornen versehen. Blätter dreizählig. Blättchen länglich, glatt. Blumenstiele einzeln stehend. Corollen glatt. Waterl. Corsica. ♀

Die Fortpflanzung und Vermehrung der Ginsterarten geschieht am sichersten durch die Aussaat der Saamen, s. Lexikon B. 4. S. 303.

Synonymen.

Genista acanthoclata Cand. ist *Spartium acanthoclaton* Spr.

Genista aetnensis Spr. ist *Spartium aetnense* Riv. s. 1. Nachtr. S. 350.

Genista arborea Spr. ist *Spartium arboreum* Desf. s. Lexic.

Genista biflora Spr. ist *Spartium biflorum* Desf. s. Lexic.

Genista buxifolia Burm. ist *Cyclopia latifolia* Cand.

Genista cinerea Cand. s. *Spartium cinereum* Willd. s. Lexic.

Genista Cupani Gusson ist *Spartium Cupani* Spr.

Genista cuspidosa Cand. ist *Spartium cuspidosum* Burch.

Genista dalmatica Bartl. ist *Spartium dalmaticum* Spr.

Genista Echinus Willd. s. *Genista Lobelii* N. 8.

Genista ephedroides Cand. ist *Spartium ephedroides* Spr.

- Genista ericetorum* Hofmans. ist *Genista triacantha*
Brot. 1. Nachtr.
- Genista gracilis* Poir. ist *Spartium virgatum* Ait. f.
Lexic.
- Genista hispanica* Wulff. ist *Genista sylvestris* Scop. f.
Lexic.
- Genista humifusa* Wulff. f. *Genista diffusa* Willd. f.
Lexic.
- Genista juncea* J. Bauh. Scop. f. *Spartium junceum*
Linn. f. Lexic.
- Genista rostrata* Poir. ist *Spartium rostratum* Spr.
- Genista Salzmanni* Cand. ist *Spartium Cupani* Spr.
- Genista scandens* Lour. ist *Butea Loureirii* Spr.
- Genista scoparia* Lam. f. *Spartium scoparium* Linn.
f. Lexic.
- Genista scoparia* Vill. ist *Spartium cinereum* Willd. f.
Lexic.
- Genista sessilifolia* Cand. ist *Spartium sessilifolium*
Spr.
- Genista virgata* Willd. arb. ist *Genista tinctoria* Var.
- Genista viscosa* Willd. f. Lexic. ist *Adenocarpus ana-*
gyrus Spr.

Im 1. Nachtrage B. 3. S. 455. sind noch einige Syno-
nymen angezeigt, welche hierher gehören.

***Genoplesium* Rob. Brown Prodr. Fl. Nov. Hol-
land.**

Perianthium ringens, *galea* antica, *foliolo* postica
longiora, patula; interiora infra columnae adnata.
Labillum adscendens, indivisum, calcaratum, basi
cucullata. *Columna* semibifida, laciniis lateralibus
nullis. *Anthera* stigmati parallela, persistens, locu-
lis approximatis, R. Brown.

Gynandria Monandria. (Familie der Orchideen.)

1. *Genoplesium Baueri* R. Br. Waterl. Neuholland.

Dr. R. Brown hat diese Art in Prodr. nicht speciell be-
schrieben, sondern nur bemerkt, daß sie in Hinsicht auf
Wuchs und Tracht mit *Prosopphyllum* R. Br. zunächst
verwandt sey, aber durch den vorstehenden Character sich un-
terscheide. Sie führt ihren Speciesnamen zu Ehren des be-
rühmten Pflanzenmalers Dr. Bauer in Kew.

Genosiris fragilis Labill. ist *Patersonia glauca* R. Br.

Gentiana Linn. Enzian. f. Lexic. B. 4. S. 303—323.

Character generic. f. I. Nachtr. B. 3. S. 456.

Kelch glockenförmig, 4—5 spaltig oder fünfstheilig. Corolle röhrig, trichter- oder glockenförmig, 4—5, (auch 10 spaltig) im Schlunde nackt oder mit Barthaaren bekleidet. Fünf (selten 4) Staubfäden. Narbe 2lappig, auf dem Fruchtknoten sitzend. Kapsel einfächerig, an der Spitze 2klappig, an deren Wänden die Saamen sitzen. Saamen nicht verändert.

Pentandria Digynia. (Familie der Gentianeen.)

I. Corolla nuda. Corolle im Schlunde nackt.

+ Corolle glockenförmig, fünfspaltig.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon beschriebenen Arten: *G. purpurea*, *punctata*, *asclepiadea*, *aurea*, *scilloides*, *utriculosa*, *bavarica*, *acaulis*. Linn. *G. montana*, *saxosa* Forst. *G. macrophylla*, *algida*, *triflora*, *glauca* Pall. *G. panonica* Scop. *G. frigida* Hänk. *G. sulcata* Willd. *G. quinqueflora* Lam. *G. carinthiaca* Fröl. und folgende.

1. *Gentiana unalascensis* Ledeb. Unalaskaischer Enzian.
Gent. aleutica Chamiss.

Stengel aufrecht, 4kantig, fast ästig. Blätter lanzettförmig, gerippt, umfassend. Blumen gipfelständig, fast doldentraubig. Kelch fünfstheilig. Corolle röhrig, fünfspaltig, die Einschnitte gespitzt, der Schlund nackt oder fast bartig. Vaterl. Insel Aleut. 4?

2. *Gentiana umbellata* M. a Bieb. Doldenartiger Enzian.

Stengel edlig. Blätter länglich, dreirippig. Blumen in gipfelständigen Dolden. Kelch fünfstheilig. Corolle fünfstheilig, die Einschnitte gespitzt. Vaterl. Kaukasus. 4 Blühz. Sommer.

3. *Gentiana corymbosa* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. III. p. 171. t. 224. Doldentraubiger Enzian.

Stengel aufrecht, einfach. Blätter linien-spatelförmig, stumpf, fast ohne Adern. Blumen in eine fast ästige gipfelständige Doldentraube gesammelt. Corolle trichter-glockenförmig, fünfstheilig, violett. Vaterl. Neugranada auf Alpen. 4 Blühz. Juni — August.

4. *Gentiana dianchoides* Kunth. J. c. III. t. 223. Nelkenartiger Enzian.

Stengel aufrecht, einfach. Blätter linienförmig, gespitzt, einrippig, verbunden, untere genähert, obere entfernt stehend. Blumen in einer 4—6blumigen gipfelständigen Doldentraube. Corolle glocken-trichterförmig, fünfspaltig, rosenroth. Einschnitte stumpf, abgekürzt. Kelchtheile gespitzt. Vaterl. Peru auf Alpen. 4 Blühz. August.

5. *Gentiana foliosa* Kunth J. c. III. p. 170. Blattreicher Enzian.

Stengel einfach. Blätter lanzettförmig, gespitzt, dreirippig, scheidenartig. Blumen gipfelständig, doldentraubig = gehäuft. Kelchtheile gespitzt. Corolle glocken-trichterförmig, fünfspaltig, die Einschnitte stumpf, abgekürzt. Vaterl. und Standort wie vorhergehende Art. 4

6. *Gentiana volubilis* Don. Gewundener Enzian.

Stengel windend. Blätter gestielt, eilanzettförmig, langgespitzt, ganzrandig, dreirippig. Blumen einzeln, winkelförmig. Die Einschnitte des Kelches linien-pfriemenförmig. Corolle glockenförmig, die Einschnitte eiförmig, gespitzt. Anthesen oval. Vaterl. Nepal. 4

7. *Gentiana capitata* Hamilt. Kopfförmiger Enzian.

Stengel aufrecht, einfach. Blätter oval-länglich, mucronenspitzig, nicht gerippt. Blumen stiellos, gipfelständig, gehäuft-kopfförmig, mit Bracteen. Die Einschnitte des Kelches häutig, eiförmig, gespitzt. Corolle röhrig, die Einschnitte gerundet. Vaterl. Nepal. 4 ?

8. *Gentiana depressa* Don. Niedergedrückter Enzian.

Wurzel ästig, faserig. Stengel sehr kurz oder fehlt. Blätter wurzelständig, gehäuft, elliptisch-länglich, gespitzt, niedergedrückt, am Rande knorplich-gesägt. Blume stiellos. Die Einschnitte des Kelches, und der glockenförmigen Corolle eiförmig, mucronenspitzig. Vaterl. Nepal. 4 ?

†† Corolle fast radförmig, fünfspaltig.

9. *Gentiana lutea* Linn.

Stengel hohlröhrig, glatt, rund, eines Fingers dick, aufrecht, 3—4 Fuß hoch. Blätter ziemlich groß, eiförmig, ganzrandig, 5—7rippig, glatt, grau- oder bläulichgrün. Wurzelblätter gestielt. Stengelblätter stiellos zu 2 einander gegenüber stehend, an der Basis scheidenartig umfassend. Blumen in kurzgestielten seitenständigen Asterschirmen, die halbe Quirle bilden und mit großen lappenförmigen Bracteen (Deckblättern) versehen. Blumenstielen glatt. Kelch trocken, ge-

spalten. Corolle gelb. Uebrigens siehe Vericon B. 4. S. 310. 4 (Gent. hybrida Cand. gehört hierher.)

10. *Gentiana diffusa* Kunth J. c. III. p. 172. Weitschweifiger Enzian.

Aus der perennirenden Wurzel erheben sich weitschweifige, fast einfache Stengel. Blätter entfernt stehend, lanzettförmig, stumpf, dreirippig. Blumen meist traubenständig. Kelchtheile gespitzt. Corolle himmelblau, trichter = radförmig, fünfspaltig, im Schlund nur wenig behaart. Vaterl. Peru, auf Alpen, in den Rissen der Felsen. 4 Blühz. Juni.

11. *Gentiana limoselloides* Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. III. p. 167. t. 220. f. 1. Limosellenartiger Enzian.

Wurzel ästig, faserig. Stengel gestreckt, ästig. Blätter länglich, oder spatel = linienförmig, stumpf, meist einrippig. Blumen einzeln, gipfelständig, lang gestielt. Kelch fünfspaltig, die Einschnitte gespitzt. Corolle trichter = glockenförmig, fünfspaltig, weiß, der Schlund nackt. Gent. peduncularis Willd. herb. G. gracilis et saxifragoides Kunth gehören hierher. G. gracilis unterscheidet sich nur durch dünnere, aufsteigende fast einfache Stengel und durch blaßrosenrothe Corollen. Vaterl. die Alpen in Quito. 4 Blühz. Juni.

12. *Gentiana graminea* Bonpl. in Nov. gen. et sp. ed. Kunth. III. p. 169. Grasblättriger Enzian.

Stengel gestreckt. Aeste aufsteigend, gleichhoch, 1—3blüthig. Blätter linienförmig, gespitzt, ohne Rippen. Kelch fünfspaltig, die Einschnitte gespitzt. Corolle trichter = glockenförmig, fünfspaltig, länger als der Kelch, im Schlunde meist nackt, weiß (violet nach Bonpl.) Vaterl. die Alpen in Peru. 4 Blühz. August.

13. *Gentiana cerasioides* Kunth, J. c. III. p. 169. t. 222. Hornkrautartiger Enzian.

Stengel gestreckt, ästig. Aeste aufsteigend, meist dreiblüthig. Blätter linienförmig, stumpf, undeutlich, dreirippig, die untern nahe beisammen stehend. Die Einschnitte des Kelches gespitzt. Corolle trichter = glockenförmig, fünfspaltig, die Einschnitte stumpf, der Schlund fast bartig. Vaterl. die Alpen in Peru in der Provinz Pastoen sis. 4 Blühz. December bis Januar.

14. *Gentiana cernua* Humb. et Bonpl. J. c. p. 170. Kunth. Synops. 2. p. 263. Uebergebogener Enzian.

Stengel aufrecht, meist einfach, 1—3blüthig. Blätter länglich oder eilanzettförmig, spitzlich, fast fleischig, undentlich, dreirippig, die untern gehäuft stehend. Blumen übergebogen. Die Einschnitte des Kelches lanzettförmig. Corolle glockenförmig, fünfspaltig, länger als der Kelch, schwarzpurpurroth, der Schlund fast bartig, die Einschnitte stumpf.

Diese Art ist der *Gentiana saxosa* Forst. (siehe Lex. B. 4.) zunächst verwandt, unterscheidet sich aber durch den fast einfachen weniger blüthigen Stengel, durch die Blätter und übergebogenen Blumen. Vaterl. die Alpen des Chimbrazo. 4 Blüthz. Junius.

15. *Gentiana Gebleri* Ledeb. Geblerischer Enzian.

Stengel einfach, aufrecht. Blätter linien-lanzettförmig, verlängert. Blumen gehäuft, gipfelständig. Corolle glockenförmig, gefurcht. (Abbild. Reichenb. Icon. t. 271.)

16. *Gentiana liniflora* Humb. J. c. III. p. 171. Glashblumiger Enzian.

Gent. rapunculoides Willd. herb. Roem. et Schult. Syst. Veg. 6. p. 185.

Stengel aufrecht, ästig. Blätter linien-lanzettförmig, gespißt, dreirippig, entfernt stehend. Blumen in gipfelständige Doldentrauben gesammelt. Corolle trichter-radförmig, fünfspaltig, violett, die Staubfäden an der Basis mit Barthaa ren bekleidet. Vaterl. die Alpen in Peru. 4 Blüthz. August.

†† Corolle glocken- oder trichterförmig, meist zehnsplattig, die Einschnitte abwechselnd kleiner.

17. *Gentiana decemfida* Don. Zehnsplattiger Enzian.

Stengel ästig, weissschweißig. Wurzelblätter elliptisch-länglich, mucronenspißig. Stengelblätter klein, linien-lanzettförmig, gekielt, an der Spitze zurückgeschlagen. Blumen meist einzeln, gipfelständig. Die Einschnitte des Kelches lanzettförmig, mucronenspißig-zurückgeschlagen; die Corolle zwischen den Einschnitten mit verdeckten Graunen versehen. Vaterl. Nepal. ☉ ?

18. *Gentiana incarnata* Sims. Bot. Mag. Incarnatrother Enzian.

Stengel einfach, aufrecht. Blätter länglich, herablaufend. Blumen gehäuft, gipfelständig. Corolle bauchig, roth, länger als der Kelch. Vaterl. Carolina. ☉ ? Blüthz. August. September.

19. *Gentiana angulosa* M. a Bieb. Ediger Enzian.

Stengel zahlreich, Rasen bildend, kurz, fast nackt, einblümig. Wurzelblätter eysförmig, stumpf, dreirippig. Blume gipfelfständig. Kelch eckig = gestügelt, die Einschnitte lang = gespitzt. Corolle fast glockig, zehnspalzig, die Einschnitte fast sägezähnig, die kleinern gespalten, stumpflich. Vaterl. Kaukasus. 4 Blühz. Jul. Septemb.

20. *Gentiana humilis* M. a Bieb. Niedriger Enzian.

Gent. aquatica Pallas (nicht Linn.)

Stengel sehr kurz, zahlreich, blättrig, Rasen bildend, einblümig. Blätter spatelförmig, am Rande schwielig = knorplich. Blume gipfelfständig, fast stiellos. Kelch eckig. Corolle zehnspalzig. Einschnitte lanzettförmig, gespitzt, die innern dazwischen stehend, sehr klein. Vaterl. Kaukasus, an Ufern der Waldbäche und nassen sumpfigen Orten. 4 ?

21. *Gentiana aquatica* Linn. Wasser liebender Enzian.

Wurzel faserig. Stengel an der Basis ästig, die Aeste gabelsförmig, getheilt, einblümig. Blätter eysförmig, hant- oder knorpelrandig, abstehend. Blumen klein, einzeln, gipfelfständig. Kelch sehr abstehend. Corolle zehnspalzig, die zwischen stehenden Einschnitte fast verlängert, abstehend.

Die Beschreibung der *G. aquatica* L. kann im *Lexicon* 1. Aufl. B. 4. S. 305. gestrichen werden, desgleichen *G. squarrosa* Ledeb. im 1. Nachtrage B. 3. S. 459. N. 8, die hierher gehört. Vaterl. Sibirien in und an Wässern, Bächen und sumpfigen Orten. ○

22. *Gentiana sedifolia* Humb. Jc. III. p. 173. t. 225. Sedumblättriger Enzian.

Gent. caespitosa et Chimboracensis Willd. herb.

Stengel Rasen bildend, kriechend, ästig. Aeste blättrig, einblümig. Blätter abgekürzt, lanzettförmig. Blumen einzeln, gipfelfständig, stiellos. Kelch eckig. Corolle violett, trichterförmig, zehnspalzig, der Schlund nackt, die Einschnitte fast gleich. Vaterl. die Alpen in Quito. 4 Blühz. Mai bis Julius.

23. *Gentiana spathacea* Humb. Jc. III. p. 173. Scheidenblumiger Enzian.

Gent. plicata Willd. herb. Roem. et Schult. Syst. veg. 6. p. 184.

Stengel einfach, aufrecht. Blätter lanzettförmig, gespitzt oder länglich = lanzettförmig, dreirippig. Blumen fast gehäuft,

gipfelständig, stiellos. Kelch gespalten, scheidenartig. Corolle trichterförmig, fünfspaltig, die Einschnitte fast gleich, der Schlund nackt. Vaterl. Mexico, bei Xalapaa. 4 Blühz. Februar.

+++ Corolla 4fida. Corolle vierspaltig.

24. *Gentiana Chirayita* Roxburgh. Ostindischer Enzian. Stengel aufrecht. Blätter gestielt, lanzettförmig, 3—5 rippig, die Stiele scheidenartig. Corolle vierspaltig, radförmig, glatt. Kapsel mit zwei Furchen versehen, so lang als der Kelch. Vaterl. Ostindien an Bergen. 4

II. Corolla fauce barbata. Die Corolle im Schlunde mit Barthaaren besetzt.

25. *Gentiana plebeja* Ledeb. Gemeiner sibirischer Enzian.

Stengel einfach, fast stielrund. Blätter eiförmig, spitzlich, fast fünfrippig. Die Einschnitte des Kelches ungleich breit. Corolle aufrecht, vierspaltig. Vaterl. Sibirien.

Zu dieser zweiten Abtheilung gehören die im Verikon beschriebenen Arten: *Gent. Amarella*, *campestris* Linn. *G. auriculata*, *dichotoma* Pall. *G. caucasica* M. a. *B. G. pratensis* Fröl. *G. nana* Wulff. und folgende.

† Corolla quinquefida. Corolle fünfspaltig.

26. *Gentiana acuta* Michx. Fl. bor. Amer. Gespizter Enzian.

Stengel viereckig, blättrig, aufrecht. Blätter stiellos, umfassend, länglich = eiförmig, sehr gespitzt. Blumen klein, gehäuft, gebüschelt, gipfel = auch seitenständig. Die Einschnitte des Kelches gespitzt, abstehend. Corolle grünlich = gelb, fünfspaltig, die Einschnitte aufrecht, der Schlund behaart. Vaterl. Carolina und Canada an Bergen, bei Tadousak. ☉ ?

27. *Gentiana rupicola* Humb. J. c. III. p. 167. t. 220 f. 2.

Stengel gestreckt, ästig, Rasen bildend. Blätter spatel = oder länglich = linienförmig, stumpf, fast einrippig, nahe beisammen stehend. Blumen gestielt, einzeln, gipfelständig. Corolle purpurroth, trichter = glockenförmig, fünfspaltig, im Schlunde behaart. Vaterl. die Alpen in Quiso, an Felsen in der Schneeregion. 4 Blühz. Junius.

28. *Gentiana Rurikiana* Chamiss. Asiatischer Enzian.

Stengel vierkantig, ästig. Blätter lanzettförmig, fast dreirippig. Blumen langgestielt. Die Einschnitte des Kelches ungleich, die der Corolle langgespitzt = vorstig, Vaterl. Asien und Amerika. ☉ ?

Kultur der Enzianarten. Eine genaue und ausführliche Anleitung zur Kultur der Gentianeen findet sich im Lexikon B. 4. S. 317. bis 322. Auf gleiche Weise können auch die oben beschriebenen neuen Arten, in Beziehung auf die Ausfaat der Saamen behandelt werden; die ausländischen, welche in Tropenländern und auf Alpen wild wachsen, gedeihen am besten in Blumentöpfen in guter Damir- oder Heide-Walderde, wenn in erforderlichen Fällen etwas guter Lehm zugesetzt wird. Es versteht sich übrigens von selbst, daß alle zärtlichen Arten, welche in unsern Gärten unter freiem Himmel nicht aushalten, in Gewächshäusern überwintert werden müssen.

Synonymen.

Zu den Synonymen, welche ich im Lexikon B. 4. S. 322. und im ersten Nachtrage B. 3. S. 459. angezeigt habe, gehören noch folgende:

- Gentiana acuta* Nuttall. ist *Gentiana campestris* Linn. f. Lexic.
Gentiana aleutica Chamiss. ist *Gentiana unalascensis* Ledeb. N. 1.
Gentiana amarelloides Michx. f. 1. Nachtr. ist *Gentiana quinqueflora* Lam. f. Lexic.
Gentiana aquatica Pall. f. *Gentiana humilis* N. 20.
Gentiana biloba Cand. ist *Gentiana punctata* Linn. f. Lexic.
Gentiana campanulata Jacq. f. Lexic. ist *Gentiana panonica* Scop. f. Lexic.
Gentiana Catesbae Walt. Nutt. f. 1. Nachtr. ist *Gentiana saponaria* Linn. f. Lexic.
Gentiana Chimboracensis Willd. f. *Gentiana sedifolia* N. 22.
Gentiana detonsa Rottb. f. Lexic. ist *Gentiana barbata* Fröl. f. Lexic.
Gentiana diffusa Vahl. *Cansora* diff. R. B. f. *Pladera virgata* Roxb.
Gentiana exaltata Linn. f. Lexic. ist *Lisianthus exaltatus* Sw.
Gentiana filiformis Linn. f. *Exacum filiforme* Willd. f. Lexic.
Gentiana germanica Willd. f. Lexic. ist *Gentiana Amarella* var. f. Lexic.

- Gentiana gracilis* Kunth f. *Gentiana limoselloides* N. 11.
Gentiana hybrida Cand. f. *Gentiana lutea* Linn. N. 9.
Gentiana imbricata Fröl. f. Lexic. ist *Gentiana verna* Linn. f. Lexic.
Gentiana Koenigii Gunn. ist *Gentiana glacialis* Vill. f. Lexic.
Gentiana linarifolia Lam. ist *Erythraea linarifolia* Pers. f. 1. Nachtr.
Gentiana longiflora Lam. f. 1. Nachtr. hat Spreng. zur *Gent. altaica* gezogen.
Gentiana maritima Savi (nicht Linn.) ist *Erythraea lutea* Bertol.
Gentiana montana Nees ist *Gentiana Amarella* Var.
Gentiana nana Allion ist *Gentiana glacialis* Vill. f. Lexic.
Gentiana obtusifolia Reichenb. ist *Gentiana Amarella* Var.
Gentiana peduncularis Willd. f. *Gentiana limoselloides* N. 11.
Gentiana plicata Will. f. *Gentiana spathacea* N. 23.
Gentiana portensis Brot. f. *Erythraea portensis* 2. Nachtr. trag S. 574.
Gentiana prostrata Haenk. Jacq. f. Lexic. ist *Gentiana bavarica* Lexic.
Gentiana puberula Michx. (1. Nachtr.) ist *Gentiana linearis* Lexic.
Gentiana purpurea Walt. (nicht Linn.) ist *Gentiana angustifolia* Michx. f. 1. Nachtr.
Gentiana quadrangularis Lam. ist *Exacum quadrangulare* f. Lexic.
Gentiana ramosissima Vill. ist *Erythraea ramosissima* Pers. f. 1. Nachtr.
Gentiana ramosissima Brot. f. *Erythraea tenuiflora* Link. f. 2. Nachtr.
Gentiana saxifragoides Kunth. f. *Gentiana limoselloides* N. 11.
Gentiana serrata Gunn. Fröl. f. Lexic. ist *Gentiana barbata* Fröl. f. Lexic.
Gentiana spathulata Bartl. ist *Gentiana Amarella* var.
Gentiana squarrosa Ledeb. f. *Gentiana aquatica* N. 21.
Gentiana tetragona Lam. ist *Gentiana glacialis* f. Lex.

Gentiana uliginosa Willd. f. Lexic. † *Gentiana Amarilla* var.

Geodorum Jackson. *Geodorum*.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 460.

Kelch (Corolle Willd.) aufrecht, fast gleich. Lippe bauchig-lappenförmig, fast gespornt, anstehend. Griffelsäulchen ohne Flügel, nicht gegliedert. Anthere gipfelständig.

Gynandria Monandria (Familie der Orchideen.)

1. *Geodorum pallidum* Don. Blasses *Geodorum*.

Schaft und Blatt gleichlang. Blumen bläuroth, eine überhängende Traube bildend, die mit Bracteen besetzt ist. Nectarlippe an der Basis sackförmig, an der Spitze stumpf, fast zweilappig. Vaterl. Nepal. 4

2. *Geodorum fucatum* Lindl. Bot. reg. t. 1687.

Blätter länglich. Schaft aufrecht, wurzelständig. Blumen roth, gipfelständig, büschelförmig, überhängend. Die schöne Art wurde im Jahr 1832. aus Seylon nach England gebracht. 4 Blühz. Juli.

Die übrigen hierher gehörenden jetzt bekannten Arten f. 1. Nachtr. B. 3.

Geoffraea Jacq. Linn. Pers. (*Geoffroya* Lexic. B. 4. 1. Nachtrag. B. 3.)

Kelch fünfspaltig. Corolle schmetterlingsförmig. Fahne größer als Flügel und Schiffchen. Neun Staubfäden sind verwachsen und einer ist frei. Steinfrucht eiförmig, an beiden Seiten gefurcht und enthält eine zweilappige Nuß.

Diadelphia Decandria (Familie der Hülsenpflanzen.)

1. *Geoffraea tomentosa* Poir. Filzige Geoffraa.

Blätter meist fünfpaarig gefiedert. Blättchen ey-lanzettförmig, stumpf, unten filzig. Blumen zottenhaarig und bilden einfache seitenständige Trauben. Vaterl. Senegambia. 4

2. *Geoffraea superba* Humb. et Bonpl. Plant. aequin. I. p. 6. g. t. 100. Stolzige Geoffraa.

Ein Baum, dessen Stamm und Aeste unbewaffnet sind. Blätter ungleich (meist achtpaarig) gefiedert. Blättchen länglich, ausgekerbt, oben mit sehr kleinen angebrückten Härchen bekleidet, glänzend, unten glatt. Blumen gelb, in einfache winkelfständige Trauben gesammelt. Vaterl. Südamerika, am Amazonenflusse, bei Tomependam in der Provinz Jaen de Bracumoros und ist daselbst unter dem Namen: Almendron bekannt. 4 Blühz. August.

Ku f

Kultur. Die Arten dieser Gattung verlangen warme Standörter, denn sie kommen aus Tropenländern. Sie gedeihen am besten in einer guten lockeren Damm-Heide- oder Walderde, die mit wenig guten Lehmen gemischt. Uebrigens s. Lexicon B. 4. S. 324.

Geoglossum Persoon.

Eine Schwammgattung, welche sich durch den oben keulensförmigen Körper, der mit einer deutlich abgesetzten Schlauchschicht versehen ist, von *Clavaria* u. a. unterscheidet. Sie enthält folgende Arten.

1. *Geoglossum hirsutum* Pers. (*Clavaria ophioglossoides* Schmid. *Clav. atra* Schrad.)

Der Körper zottenhaarig, schwarz. Wächst an Bergen in Deutschland.

2. *Geoglossum glabrum* Pers. (*Clavaria ophioglossoides* Linn. s. Lexic.

3. *Geoglossum glutinosum* Pers.

Der Körper ist glatt, schwärzlich, der Strunk klebrig-schmierig. Wächst in Deutschland auf Wiesen u. a. D.

4. *Geoglossum viscosum* Pers.

Körper klebrig, schwarz, die Keulchen stielrund, mit dem Strunke zusammenfließend. Wächst auf Bergen und Tristen.

5. *Geoglossum olivaceum* Pers.

Der Körper glatt, trocken, gelbroth-olivengrünlich, zusammengebrückt. Wächst in Wäldern.

6. *Geoglossum viride* Pers. (*Clavaria virides* Vahl. Fl. dan. f. 1.

Strunk schuppig. Keulchen gebüscht, grün. Wächst in Wäldern.

7. *Geoglossum atropurpureum* Pers. (*Clavaria atropurpurea* Batsch. *Clav. mitrata* Holmsk.)

Körper glatt, schwarz, purpurroth. Wächst auf Tristen und an grassigen Orten.

Geonoma Willd. Erbpalme.

Character generic. s. I. Nachtr. B. 3. S. 462.

Allgemeine Blumen Scheide zweiflappig, doppelt. Geschlechter getrennt an einen Kolben in dessen Spindel die Blumen eingesenkt sind. Kelch und Corolle dreitheilig oder dreiblättrig. ♂ Staubfäden 6, in einem Cylinder verwachsen. ♀

Dietr. Ver. 22. Nachtr. IV. Bd.

3

Griffel 1, seitenständig. Narbe zweilappig. Steinfrucht (Beere) ausgetrocknet, einsamig.

Monecia Monadelphia Willd. *Hexandria Monogynia* Spr. Syst. veg. (Familie der Palmen.)

1. *Geonoma macrostachys* Martius Nov. gen. et Spec. palm. Fasc. 1. Großährige Erdpalme.

Wurzel ästig, faserig, braun Stod (Stamm) fehlt. Laub und Kolben wurzelständig. Laub (Wedel) 4—6 Fuß lang, einfach, lanzettförmig, an der Basis keilförmig, an der Spitze gespalten=gabelförmig, gestielt, bogenförmig gegen die Erde geneigt, dunkelgrün, glatt, unten an der Hauptrippe ein wenig filzig. Kolben sehr einfach, 3—4 Fuß hoch und höher, aufrecht, unten eilig, bis etwa zur Mitte mit Scheiden bedeckt, oben nackt. Scheiden umfassend, linienförmig, fast zweischneidig, gerippt, dann faserig, nach der Basis zu braunfilzig, an der Mündung schief abgestutzt und gespalten; die untern 3—5 Zoll, obere 1 Fuß lang. Blumen gehäuft, stiellos, zu 2 in den Gruben der Spindel sitzend; sie bilden eine aufrechte walzenrunde dichte Aehre. Der Kelch der männlichen Blume kürzer als die Corolle, strohfarbig-grün. Corolle purpurrothlich. Staubfäden an der Basis verbunden, oben frei mit umgekehrt=keulensförmigen Antheren gekrönt. ♀ An der Basis weiß, oben blaßgrün. Beere glatt, glänzend, schwarz=purpurroth. Vaterl. Brasilien in Wäldern. 4 Blühz. Januar.

2. *Geonoma ataulis* Mart. Jc. Fasc. 1. p. 18. t. 4. et 19. Stammlose Erdpalme.

Gynestrum acaule Poit.

Die Wurzel hat viele blaßbraune Fasern, so dick wie Gänsefüße, die sich horizontal ausbreiten. Der Stod (Stamm) fehlt. Laub und Kolben wurzelständig. Das Laub (Wedel) wird 4—6 Fuß hoch, ist aufrecht=abstehend, fiedersförmig=gespalten, die Fiedern (Blättchen) wechselseitig stehend, lanzettförmig, langgespitzt, bisweilen stichelförmig, die obern größer als die untern, gegenüberstehend, alle glatt. Kolben einfach, walzenrund, aufrecht, 2—3 Fuß hoch, unten mit Scheiden bedeckt, oben nackt. Scheiden zusammengedrückt, zweischneidig, faserig=häutig, gespalten, linienförmig, blaßgrün, dann trocken, braunlich. Blumen gipfelständig, eine dichte walzenrunde Aehre bildend; sie sind in die Gruben der Spindel eingesenkt, liegen dachziegelförmig über einander.

und bilden 5—6 Reihen. Waterl. Brasilien in schattigen Wäldern. 24

3. *Geonoma arundinacea* Mart. J. c. Fasc. I. p. 17. t. 18. Rohrartige Erdpalme.

Gynestrum baculiferum Poit.

Stoß aufrecht, fast einfach, rohrartig, 4—6 Fuß hoch, so dick wie ein Schwanenkeil, glatt, rund, gelblich, in der Jugend zerbrechlich, geringelt. Laub (Wedel) seitens- und gipfelständig, 1—2 Fuß lang, in der ersten Periode der Entwicklung eysförmig, an der Basis verdünnt, die Spitze gabelförmig, dann irregulär fiederspaltig oder gefiedert, glatt. Kolben einzeln, selten zu 2—3 in den untern Laubwinkeln stehend, einfach oder ästig, 6—8 Zoll lang, unbehaart, anfänglich aufrecht, grün, zur Zeit der Frucht reife überhängend, purpurröthlich=grün. Scheiden doppelt, $1\frac{1}{2}$ Zoll lang, häutig, umfassend, die äußern länger als die innern, lanzettförmig, rothrandig, die Spitze gespalten. Die Blumen sitzen zerstreut an den Kolben, in länglichen Gruben; die männlichen meist zu 2, die weiblichen einzeln, selten gepaart in einer Grube, blaßröthlich=gelblich. Beere eysförmig, violett=schwarz, inwendig weiß. Waterl. Brasilien in Wäldern, am Amazonen und schwarzen Flüsse. ♀ Blühz. Januar und Februar.

4. *Geonoma pycnostachys* Mart. J. c. Fasc. I. p. 16. t. 17. Dichtährige Erdpalme.

Gynestrum strictum Poit.

Stoß aufrecht, entfernt geringelt, 4—6 Fuß hoch, nur so dick wie das gemeine Rohrschilf (*Arundo Phragmites* Linn.) mit entfernten Ringen gezeichnet. Laub (Wedel) zahlreich, an dem obern Theile des Stoßes zerstreut stehend, 1 Fuß lang, 5—6 Zoll breit, kleiner als das untere, kurzgestielt, länglich=linienförmig, an der Spitze mehr oder weniger gespalten. Kolben einzeln in den untern Laubwinkeln, einfach, aufrecht=abstehend, 3—4 Zoll lang und länger, walzrund, unten rostfarbig=filzig, oben mit Blumen dicht besetzt. Scheiden 2 Zoll lang oder etwas länger, lanzettförmig, die äußern an der Spitze gespalten, grün, gestreift. Kelch und Corolle der männlichen Blumen fast gleichlang, strohfarbig=braunlich. Staubfäden unten becherförmig verbunden, oben frei, mit linienkeulensförmigen Antheren gekrönt. ♀ etwas größer als die ♂. Griffel weiß, mit 3 zurückgerollten Narben. Beere eysförmig, stumpf, schwarz=olivensfarbig. Was

terl. Brasilien und Peru in Wäldern und an Flüssen. h
Blühz. Decemb. und Januar.

5. *Geonoma Spixiana* Mart. J. c. Fasc. I. p. 15. t. 15.

16. Spixische Erdpalme.

Stoß aufrecht, gerade oder fast keilförmig gebogen, gerin-
gelt, 6—8 Fuß hoch, 1 Zoll im Durchmesser dick, rostfarbig-
braun. Laub (Wedel) aufrecht=abstehend, gipfelständig, un-
getheilt, lanzettförmig, unten verdünnt, an der Spitze ga-
belförmig=gespalten, 4 Fuß lang oder etwas länger, die Thei-
le (Einschnitte) 6—10 Zoll lang, lanzettförmig, ganzran-
dig, gerippt=gestreift. Kolben zwischen dem untern Laube,
meist einzeln, 1—1½ Fuß lang, an der Basis mit einem
scheiden=ringförmigen, umfassenden Wulste versehen, oben in
mehrere einfache und gabelförmige Aeste getheilt, welche mit
vielen Blumen besetzt sind, die in elliptischen Gruben sitzen.
Scheiden 6—10 Zoll lang, lanzettförmig, stumpf, häutig,
strohfarbig=braun. Blumenstiele der ♂ 1—3, die der ♀
einblüthig. Staubfäden in eine fast dreikantige Röhre ver-
wachsen und mit gepaarten Antheren gekrönt. Griffel faden-
förmig. Narbe dreispaltig, die Theile hakenförmig=zurück-
gerollt. Beere elliptisch=eyförmig, so groß wie eine Hasel-
nuß.

Diese Art widmete Hr. v. Martius seinen Reisegefährten
auf der Reise nach Brasilien Hr. Dr. v. Spix. († 1832?)
Waterl. Brasilien, in Wäldern, in der Nähe der Flüsse. h
Blühz. Januar bis März.

6. *Geonoma synanthera* Mart. J. c. Fasc. I. p. 13.
t. 13.

Stoß aufrecht, geringelt, strohfarbig, 6—10 Fuß hoch.
Laub kogenförmig=abstehend, 4—6 Fuß lang, gefiedert=ge-
spalten, die Fiedern (Blättchen) fast gegenüber stehend, lan-
zettförmig, langgespitzt, fast sichelförmig, 1 Fuß lang und
länger, unten mit braunem angebrücktem Filze bekleidet. Kol-
ben in einfache, vielblüthige Aeste getheilt, 1 Fuß lang und
drüber ♂ Blumen gehäuft, ganzrandig, röthlich=gelb, dach-
ziegelförmig gelagert und bilden 5—6 Reihen. ♀ Blume
Kelchblätter lanzettförmig, gekielt, am Rande gezähnt, auf
dem Rücken braun. Corolle dreispaltig, häutig, weiß. Beere
kugelig=eyförmig, schwarz=violet, von dem bleibenden Kelche
und der Corolle unterstützt. Waterl. Brasilien in Wäldern.
 h Blühz. Januar bis März.

7. a) *Geonoma laxiflora* Mart. J. c. Fasc. 1. p. 12. t.

11. Schlafblumige Erdpalme.

Der Stoc (Stamm) wird etwa 6 Fuß hoch, ist aufrechtstarr, so dick wie ein Schwanenteil, oben fast so dick wie ein kleiner Finger, grau-weiß, geringelt. Laub gipfelständig, selten einzeln seitenständig, gestielt, eiförmig, an der Basis verdünnt, dann fiederförmig-gespalten, gespitzt, mit dem Stiele 6 Zoll bis $1\frac{1}{2}$ Fuß lang, gerippt-gestreift, unten an der Hauptrippe fast filzig, die Stiele am Grunde mit umfassenden Scheiden versehen. Kolben einzeln zwischen dem Laube stehend, rispenartig getheilt, vielblümig, die Aeste einfach, fadenförmig, 8—12 Zoll lang, purpurröthlich-grün. Scheiden gepaart klein, lanzettförmig, auswendig, mit augenbrückten rostfarbenen Haaren bekleidet, inwendig glatt die ♂ Blumen meist einzeln zerstreut, vor der Blüthezeit bis fast zur Hälfte in die Gruben der Spindel eingesenkt. Kelch und Corolle fast gleich, glatt. Staubfäden in einem weißen Eysinder verwachsen, der oben 6spaltig ist und linien-lanzettförmige Antheren trägt. Waterl. Brasilien in Wäldern, in der Nähe des Amazonenflusses.

7. b) *Geonoma paniculigera* Mart. J. c. Fasc. 1. p. 11.

t. 10. Rispenblüthige Erdpalme.

Stämme mehrere aus einer Wurzel hervorkommend, 6—10 Fuß hoch, walzenrund, weiß, einfach, aufrecht, geringelt, 1 Zoll im Durchmesser dick. Laub (Wedel) gipfelständig, aufrecht-abstehend, einen zierlichen Schopf (Krone) bildend, 6—8 Spannen lang, gefiedert-gespalten, die Fiedern (Blättchen) fast gegenüber stehend, lanzettförmig, gespitzt, fast fiedelförmig, glatt, gerippt-gestreift. Laubstiele an der Basis scheidenartig, fast dreikantig, filzig. Kolben groß, 1—2 Fuß lang, weitschweifig-rispenartig getheilt, mit ♂ und ♀ Blumen besetzt. Blumenstiele etwa 6 Zoll lang. Blumen klein, gehäuft, zu 3—5 quirlförmig sitzend. Scheide doppelt, 6—10 Zoll lang. Kelche kürzer als die Corollen. Beere kugelig, schwarz, so groß wie eine Erbse, das Fleisch purpurröthlich. Waterl. Brasilien in Wäldern. ♀ Blüthz. Novemb. bis Januar.

8. *Geonoma interrupta* Mart. J. c. Fasc. 1. p. 8. t. 7.

(*Martinezia interrupta* Ruiz et Pav. Syst. I. p. 296?

siehe 1. Nachtr. zum Lexicon B. 4. S. 581.

Diese Palme scheint von der vorhergehenden Art N. 7. nur eine Varietät zu seyn, welche sich hauptsächlich durch ein

nen höhern Wuchs und durch das unterbrochen gefiederte Laub unterscheidet. Sie wächst in Brasilien und Peru in Wäldern.

9. *Geonoma acutiflora* Mart. J. c. Fasc. 1. p. 10. t. 9. Epiphyllumige Erdpalme.

Gynestrum maximum Poit.

Stoß (Stamm) 6—8 Fuß hoch. Laub gipfelständig, mit dem Stiele 5—8 Fuß lang, bogenförmig = abstehend, in der Jugend umgekehrt = eiförmig, an der Spitze gabelförmig gespalten, die Einschnitte fast dreieckig, sichelförmig, langgespißt, im Alter fiederspaltig, die Blättchen ungleich, länglich, gespißt, fast gegenüber stehend, 4—6 Zoll breit. Die Kolben entwickeln sich an der Basis, zwischen dem untern Laube, sind aufrecht = abstehend, 1—2 Spannen lang, oben mit einfachen Aesten versehen. Zwei lanzettförmig gespißte Scheiden, die an einer Seite der Länge nach faserig sind. Die Blumen sitzen zerstreut, längst an den cylindrischen Spindeln (Stielen) hinauf, sind klein, spizig, fast horizontal abstehend, dachziegelförmig gelagert und bilden 3—5 Reihen. Beere schwarz, kurz, elliptisch, so groß wie eine Haselnuß, inwendig fleischig. Vaterl. Brasilien, in schattigen Wäldern, am Ufer des Amazonenflusses und blüht daselbst im Januar.

10. *Geonoma multiflora* Mart. J. c. p. 7. t. 4. 5. 6. Vielblumige Erdpalme.

Gynestrum diversum Poit.

Stamm aufrecht, 6—8 Fuß hoch und höher, etwa eines Fingers dick, olivenfarbig = grün, oder gelblich, mit weißen Ringen geziert. Laub (Wedel) gipfelständig, 3—5 Fuß lang, gefiedert = gespalten, bogenförmig = abstehend, eine zierliche Krone bildend. Die Fiedern (Blättchen) fast gegenüberstehend, die obern wechselnd, alle stiellos, 1 Fuß lang, lanzettförmig, langgespißt, glatt, dunkelgrün, ganzrandig, die Endblättchen bisweilen zusammenhängend. Die Kolben sitzen dicht unter dem Laube an den Seiten des Stammes, sind rispenartig getheilt, 1 Fuß lang, und länger, abstehend, vielblumig, die gemeinschaftlichen Blumenstiele zusammengedrückt = zweischnedig, knieartig gebogen, flzig. Scheiden lanzettförmig, ganzrandig, gestreift, häutig, 3—5 Zoll lang, graubraun. Blumen zahlreich, klein, zerstreut sitzend. Kelch und Corolle fast gleich, purpurröthlich = weißlich. Beere an einer rothen verdickten Spindel, kugelig, anfänglich dunkel

roth, zart filzig, zur Zeit der Reife fast schwarz. Vaterl. Brasilien in schattigen Wäldern.

Die Erdpalmen behandelt man, in Hinsicht auf Standort, Boden und Fortpflanzung wie alle andern Palmenarten, die aus Tropenländern kommen und die wir jetzt in einigen großen Gärten, vornehmlich in Wien, München, Berlin, auf der Frauen-Insel bei Potsdam u. a. D. in Menge finden. Auch habe ich bei einigen Gattungen, z. B. *Areca*, *Borassus*, *Caryota* u. a., die im Lexicon und Nachträgen vorkommen. Die Kultur der Palmen im Allgemeinen angezeigt.

Geophila Don. Geophila.

Kelch fünfstheilig. Corolle röhrig, fünfspaltig. Staubfäden 5, eingeschlossen. Narbe gespalten. Beere zweisaamig, vom Kelche gekrönt.

Pentandria Monogynia (Familie Rubiaceen.)

1. *Geophila reniformis* Don. Prod. Fl. nep. p. 136. Nierenförmige *Geophila*.

Stengel krautartig, kriechend. Blätter nierenförmig, kriechend. Blumenstiele zweiblumig, kürzer als die Blätter. Kelch fünfstheilig. Corolle röhrig, fünfspaltig. Staubfäden 5, eingeschlossen. Narbe zweispaltig. Beere zweisaamig, mit dem bleibenden Kelche gekrönt.

Hierher gehört *Psychotria herbacea* Linn., nicht Jacq. siehe Lexic. B. 7. S. 621. Die letztere, nämlich *Ps. herbacea* Jacq. hat Kunth. in Synops. B. 3. zur *Cephalia reniformis* gezogen (s. 2. Nachtr. B. 2. S. 446.) Da nun aber Hr. v. Schlechtendal bei *Geophila reniformis* Don, *Cephaelis reniformis* H. B. K. citirt hat. s. Linnaea B. 4. S. 137., so scheint diese Pflanze noch einer nähern Untersuchung und Bestimmung zu bedürfen. Vaterl. Südamerika, 4

Georgia Spr. (Georgina Willd, Dahlia Cavan.) Georgie.

Character genericus s. 1. Nachtr. B. 3. S. 463.

Blüthendecke (gemeinschaftlicher Kelch) doppelt, äußere 5—8 blättrig, innere achttheilig, hautrandig. Fruchtboden sprenig. Scheibenblümchen röhrig, hermaphroditisch. Strahlblümchen zungenförmig, geschlechtslos. Saamen eckig, ohne Haarkrone.

Syngenesia superflua. (Familie Composita, zusammengesetzte Blumen.)

1. *Georgia scapigera* (Georgina scapigera Otto et Albert. Dietrich Gart. Zeitung 1833. S. 197.)

G. caule subnullo, scapis glaberrimis unifloris, foliis pinnatis glabris, pinis serratis aut incisio-serratis suprema decurrenti, rachi foliorum subtus puberulo, calyce exteriore pentaphyllo erecto Alb. Dietr. J. c. p. 197.

Wurzel perennirend, knollig. Stengel sehr kurz, nur 2—3 Zoll hoch, dick, blättrig, glatt. Blätter ungleich, dreipaarig gefiedert. Blättchen gestielt, oval, an beiden Enden verdünnt, sägerandig, die obern kleiner als die untern, herablaufend, mit dem ey-lanzettförmigen Endblättchen fast zusammenschießend, alle glatt oder glattlich. Blumenstiele (Schäfte) zahlreich, einblüthig, glatt, rund, über der Basis meist mit einem Blättchenpaar versehen. Blumen gipfelförmig, etwa 2 Zoll im Durchmesser breit. Kelch doppelt: äußerer fünfblättrig, glatt, glänzend, innerer einblättrig, achttheilig, die Einschnitte länglich-lanzettförmig, gesägt, hanttrandig, die Rückseite keilförmig mit brauner Streife. Fruchtboden flach, sprengig. Scheibenblümchen röhrig, gelb. Strahlblümchen zungenförmig, weiß, mit einem Griffel und zwei Narben. Saamen eckig, fast zweischneidig. Saamenkrone fehlt. Vaterl. Mexiko. 4 Blüthz. Julius bis Herbst.

Den Saamen von dieser Georgine erhielt der botanische Garten in Berlin im Herbst 1832. von dem Hrn. Dr. Schiede aus Mexiko. Sie ist zwar zu Folge der vorstehenden Charakteristik als eine selbstständige Art zu betrachten, aber ob dieselbe, nachdem sie mehrere Jahre in unsern Gärten kultivirt worden ist, so constant (beständig) bleiben wird, ist noch zu erwarten; denn vielfältige Erfahrungen haben gelehrt, daß die sehr zahlreichen Varietäten, die alle von der gemeinen Art *G. variabilis* W. abstammen, in Hinsicht auf Habitus, Tracht und Bildung der Blumen, sehr abweichen und in verschiedenen Formen erscheinen.

Georgia variabilis Willd. et *Georgia coccinea* mihi et Willd. siehe I. Nachtrag B. 3. S. 463. bis 469. S. 464. Zeile 3 von unten statt nackt lies sprengig.

Dasselbst habe ich nicht allein die genannten Arten genau beschrieben sondern auf S. 467. eine Anleitung zur Klassifikation derselben in Beziehung auf die Größe und Gestalt der Blumen beigelegt. Auf gleiche Weise habe ich daselbst auch eine auf eigene Versuche und Erfahrungen sich gründende Anleitung zur Kultur gegeben. Ueberdies finden wir auch in

den Blumen- und Gartenzeltungen die Kultur der Georginen sehr oft wiederholt und die verschiedenen oft lächerlichen Benennungen der sehr zahlreichen Varietäten angezeigt. Hieraus erhellt, daß die Georginen in unsern Tagen ein Gegenstand der Blumisten sind, und in Beziehung auf Nomenklatur und Eintheilung der Varietäten eben so wie Hyacinthen, Tulpen, Nelken u. a. behandelt werden.

Georgia bipinnata Sprengel Syst. veg. ist *Cosmea bipinnata* Willd. siehe 1. Nachtr. B. 2. S. 434.

Eine jährige krautartige Pflanze, mit einem ästigen 2—3 Fuß hohen Stengel, doppelt gefiederten Blättern und gestielten gipfelfständigen Blumen, deren Strahlblümchen rosen- oder purpurroth sind. In unsern Gärten ist sie als Bierpflanze längst bekannt.

Geranium Linn. Storchschnabel. Siehe Lexic. B. 4. S. 325. bis 340.

Character genericus s. 1. Nachtr. B. 3. S. 469.

Reich fünftheilig. Corolle fünfblättrig, regelmäßig. Fünf Nectardrüsen. Fünf einsamige Kapseln, die an der Spitze gegrannt sind, die Grannen nackt. Uebrigens siehe Lexicon B. 4. S. 325.

I. *Pedunculis unifloris*. Blumenstiele einblümig.

Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Lexicon abgehandelten Arten: *Geranium sessiliflorum* Cavan. *G. sibericum* et *sanguinum* Linn. und folgende.

+ *Subacaulis*. Fast Stengellose.

1. *Geranium sericeum* Willd. herb. Seidenartiger Storchschnabel.

Stengel niedrig, zwergig = holzig. Blattstiele ausgebreitet, getheilt. Blätter vieltheilig, seidenhaarig = zottig, die Einschnitte linienförmig. Vaterl. Südamerika. 4

2. *Geranium Humboldtii* Sprengel. Humboldtischer Storchschnabel.

G. potentilloides Willd. herb. (nicht Herit.)

Wurzel ästig, faserig. Stengel kurz, fast fehlend. Blätter fünftheilig, dick, unten grau-seidenhaarig, die Einschnitte schmal, der mittlere dreispaltig. Blumenstiele sehr kurz. Kelche und Saamenbehälter seidenhaarig. Vaterl. Südamerika? 4

3. *Geranium acaule* Willd. herb. Kunth. Synops. 3. p. 227. Stengelloser Storchschnabel.

Wurzel ästig, faserig. Kein Stengel. Blätter und Blumenstiele wurzelständig. Blätter vieltheilig, die Einschnitte linienförmig, ganzrandig. Blumenstiele einblümig. Corollenblätter rosenroth. Vaterl. die Alpen in Quito. 4 Blühz. Junius.

†† Caulescens, Gestengelte Arten.

Ger. sessiliflorum. Cav. 4. Sibiricum, Sanguineum Linn. f. Lexic. gehören hierher und folgende.

4. *Geranium potentilloides* Herit. Potentillenartiger Storchschnabel.

Stengel gestreckt, ästig. Blätter rundlich-nierenförmig, fünfstheilig, die Einschnitte dreispaltig. Blumenstiele länger als die Blattstiele, einblümig, in der Mitte mit Bracteen versehen. Vaterl. Neuhoiland. 4

5. *Geranium Philonotis* Cand.

Stengel gestreckt. Blätter nierenförmig, 3—5theilig, glatt, die Einschnitte keilförmig, an der Spitze dreizählig. Blumenstiele länger als die Blattstiele, an der Basis mit Bracteen versehen. Vaterl. Neuhoiland. 4

6. *Geranium radicans* Wallich. Wurzelntreibender Storchschnabel.

Stengel gestreckt, Wurzeln treibend. Blätter dreitheilig, die Einschnitte umgekehrt-eiförmig, grob gezähnt. Blumenstiele so lang als die Blattstiele, an der Basis mit Bracteen besetzt. Vaterl. Nepal. 4

7. *Geranium pedunculare* Willd. herb. Langstieliger Storchschnabel.

G. *potentillaefolium* Cand.

Stengel weitschweifig, ästig. Blätter fußförmig = fünfstheilig, oben behaart, unten weiß = wollig, die Einschnitte fiederspaltig. Afterblätter breit trocken-rauschend. Blumenstiele lang. Kelche wollig. Vaterl. Neuspanien. 4

8. *Geranium diffusum* Willd. herb. Kunth. J. c. 3. p. 226. Weitschweifiger Storchschnabel.

Stengel ästig, weitschweifig, mit rückwärts stehenden Haaren bekleidet. Blätter tief fünfspaltig, unten behaart, die Haare angebrückt, die Einschnitte dreilappig. Blumenstiele zottenhaarig, länger als die Blätter, einblümig. Kelchtheile mucronenspizig. Corollenblätter stumpf, auswendig seidenhaarig. Vaterl. Peru an Bergen. 4

9. *Geranium cucullatum* Kunth in Humb. et Bonpl.

Nov. Gen. et Sp. pl. V. p. 231. (179) Synops. 3. p. 226. Kappenförmiger Storchschnabel.

G. ciliatum Willd, herb. (non Cavan.)

Eine kleine, kaum 2—3 Zoll hohe Pflanze, deren Stengel Rasen bilden und die Aeste mit Blättern dicht besetzt sind. Blätter einander gegenüber stehend, gestielt, fünfstheilig, kappenförmig, glatt, nur am Rande mit Wimperhaaren besetzt, 4—4½ Linie breit, die drei innern Einschnitte länglich, 2½ Linie lang, die zwei äußeren länglich-lanzettförmig, gespitzt, ungetheilt. Blattstiele fadenförmig, 6—7 Linien lang, mit rückwärtsstehenden Haaren besetzt. Blumenstiele einblümig. Corollenblätter umgekehrt-eiförmig, stumpf, violett-roth. Vaterl. Südamerika an Bergen, blüht daselbst im November. 4

10. *Geranium arachnoideum* Hillar. Fl. Bras.

Stengel liegend, ästig, doppelt zottenhaarig. Blätter fienstheilig. Die Theile schmal-lanzettförmig, dreispaltig. Blumenstiele lang, fadenförmig. Saamenbehälter zottenhaarig, Vaterl. Brasilien, 4

11. *Geranium ayavacense* Kunth J. c. Ayavacensischer Storchschnabel.

G. partitum Willd. herb.

Stengel ästig, ausgebreitet, wie alle Theile der Pflanze glatt. Blätter fünfstheilig, handförmig, die Einschnitte lanzettförmig, zweitheilig, die mittleren dreitheilig. Blumenstiele winkelförmig, lang, einblümig. Corollenblätter weiß. Vaterl. Peru, bei Ayavaca. 4 Blühz. August.

12. *Geranium pubescens* Willd. herb. Filziger Storchschnabel.

G. chilense Kunth, J. c. Synops 3. p. 226. (chilense.)

Diese Pflanze wird etwa 1 Fuß und ist seidenhaarig, drüsig-behaart. Stengel ästig. Blätter gegenüber stehend, langgestielt, tief, fünflappig, die Lappen länglich, nach der Spitze zu tief gezähnt. Aesterblätter dreizählig, häutig. Blumenstiele einzeln, winkelförmig. Kelch drüsig-behaart. Corollenblätter weiß, umgekehrt-eiförmig, doppelt länger als der Kelch. Vaterl. Quito, bei Chillo, an temporirten Orten 4 Blüht daselbst im Februar.

II. *Pedunculis bifloris*, Blumenstiele zweiblümig.

Zu dieser Abtheilung mit zweiblümigen Blumenstielen gehören die im Pericon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten:

Geranium macrorrhizon, *friatum*, *nodosum*, *reflexum*, *phoeum*, *sylvaticum*, *pratense*, *maculatum*, *palustre*, *pyrenaicum*, *tuberosum*, *incanum*, *argenteum*, *carolinianum*, *molle*, *pusillum*, *bohemicum*, *lucidum*, *columbinum* *Robertianum* Linn. *G. anemoneae-folium*, *aconitifolium*, *canescens* Herit. *G. angulatum* Curt. *G. ibericum* Cav. *G. collinum* Steph. *G. parviflorum* Willd. *G. cristatum* Stev. *G. lanuginosum* Lam. Jacq. *G. pilosum* Forst. *G. asphodeloides* Burm. Willd. und folgende.

† Herbacea perennia. Krautartige perennirende.

13. *Geranium longipes* Cand. (*G. Londesii* Fischer.) Reichenb. hort. bot. t. 68.

Stengel aufrecht, ästig, die Aeste wenig scharfborstig. Blätter schildförmig, fünflappig, die Lappen länglich, eingeschnitten = gezähnt. Blumenstiele sehr lang. Corollenblätter ganzrandig, gestreift. Waterl. die Provinz Saratow an der Wolga. 4

14. *Geranium Ulassovianum* Fischer. Reichenb. hort. bot. t. 27.

Stengel walzenrund, mehr oder weniger ästig. Blätter fünflappig, flzig, die Lappen rautenförmig, eingeschnitten = gezähnt. Afterblätter verbunden, zweispaltig. Corollenblätter umgekehrt = eiförmig, ganzrandig, gestreift. Waterl. Davurien. 4 Blühz. Sommer.

15. *Geranium Wallichianum* Sweet. ger. Bakisch Storchschnabel.

Stengel ästig, aufrecht. Aeste eelig, seiden = zottenhaarig. Afterblätter verbunden, ungetheilt. Blätter fünfspaltig, die Einschnitte umgekehrt = eiförmig, eingeschnitten = gezähnt. Corollenblätter ausgekerbt, einfarbig. Narben sehr lang. Waterl. Nepal. 4

16. *Geranium holosericeum* Willd. Sammetartiger Storchschnabel.

Stengel krautartig, aufrecht, ästig, unbehaart. Blätter nierenförmig, fünflappig, auf beiden Seiten weich = zottenhaarig, sammtartig, die Lappen dreizählig, stumpf. Blumenstiele und Kelche mit kurzen Haaren besetzt. Waterl. Südamerika. 4

17. *Geranium hirtum* Willd. herb. Feinborstiger Storchschnabel.

G. mexicanum Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. V. p. 178.

G. Hernandesii Sess.

Stengel aufrecht, 8—12 Zoll hoch, ästig, oder einfach, an der Spitze oft zweiblümig, mit rückwärts stehenden feinen Borshaaren besetzt. Blätter fußförmig = fünfspaltig, an beiden Seiten mit angebrückten Haaren bekleidet, die Einschnitte 3—7spaltig, ausgesperrt; die untern Stengelblätter stehen wechselnd, die obern einander gegenüber. Blumen fast wie bei *G. phaeum* L. Blumenstiele und Kelche drüsig = borstig. Vaterl. Mexiko. 4 Blühz. Septemb.

18. *Geranium eristemon* Fisch. Reichenb. hort. bot. t. 9.

Stengel rund, einfach, über 1 Fuß hoch. Blätter fünflappig, gestielt, die obersten stiellos. Lappen sehr breit, eiförmig, stumpf, eingeschnitten = gezähnt. Kelchtheile grannenspitig. Corollenblätter ganzrandig, röthlichblau. Staubfäden behaart. Vaterl. Davurien. 4 Blühz. Juni Juli. Auf Alpen in Nepal. Don Fl. Nepal. p. 288.

19. *Geranium erianthon* Candolle.

Stengel rund, fast einfach, unten nackt. Blätter alle gestielt, handförmig, 5—7 lappig, die Lappen eingeschnitten, gespalzt = sägezählig, die Serraturen gespitzt. Blumenstiele zweiblümig, aber gehäuft, stehend, abgekürzt. Kelche sehr zottenhaarig. Corollenblätter ganzrandig. Staubfäden behaart. Vaterl. Kamtschatka und Nordamerika. 4

20. *Geranium coeruleum* Patr. Himmelblauer Storchschnabel.

Stengel aufrecht, gabelförmig getheilt, glatt, unten nackt. Blätter gegenüberstehend, 5—7theilig, die Theile gespitzt, fiederspaltig, Kelche sehr zottenhaarig. Corollenblätter himmelblau, ganzrandig. Staubfäden wimperhaarig. Vaterl. Davurien. 4 Blühz. Sommer.

21. *Geranium bifolium* Patr. Zweiblättriger Storchschnabel.

An der ästig = faserigen Wurzel stehen gewöhnlich nur zwei gestielte Blätter, die dreimal kürzer als der Stengel sind. Stengel wie bei voriger Art, gabelförmig getheilt, glatt, unten nackt. Blätter stiellos, gegenüberstehend, siebentheilig, mit angebrückten Zottenhaaren bekleidet, die Theile linienförmig, fiederspaltig. Kelche behaart, die Haare angebrückt. Corol-

lenblätter ganzrandig. Staubfäden wimperhaarig. Waterl. Daurien. 4

22. *Geranium barbatum* Dietr. (nicht Andrew's) Bartiger Storchschnabel.

G. davuricum Candolle.

Stengel aufrecht, glatt, unten nackt. Stengelblätter gegenüberstehend, 3—5theilig, die Lappen eingeschnitten, gespißt. Blumenstiele dreimal länger als die Blätter, anfänglich gerade, dann zurückgeschlagen. Kelche glattlich. Corollenblätter ganzrandig, an der Basis mit Barthhaaren bekleidet. Staubfäden wimperhaarig. Waterl. Daurien. 4 Blühz. Sommer.

23. *Geranium nepalense* Sweet. Nepalischer Storchschnabel.

Stengel fast eckig, ästig, weltschweißig, behaart. Blätter alle gestielt, 5theilig, die Theile länglich-keilsförmig, eingeschnitten-gezähnt. Blumenstiele ausgeperert. Saamenbehälter zottenhaarig. Waterl. Nepal. 4 Blühz. Sommer.

24. *Geranium linearilobum* Cand. (*G. tuberosum* M. a Bieb. (nicht Linn.))

Wurzel knollig. Stengel unten nackt, filzig. Blätter vieltheilig, die Theile linienförmig, ganzrandig, oder fast getheilt. Kelche mit kurzen Haaren bekleidet. Waterl. Kaukasus und an der Wolga. 4

25. *Geranium multifidum* Con. Fl. Nepal. p. 64. Vielspaltiger Storchschnabel.

Stengel fehlt. Blätter tief, fünfscheilig, unten behaart, die Theile vielspaltig, linienförmig, stumpf. Schaft vierkantig, aufsteigend, an der Spitze meist dreitheilig, zottenhaarig. Waterl. Nepal. 4

†† *Herbacea annua*. Krautartige einjährige.

26. *Geranium lanuginosum* Lamarck (nicht Jacq. hort. Schoenb.)

Stengel aufrecht, mit rückwärts stehenden Haaren besetzt. Blätter fünfscheilig, an der Basis abgestutzt-viereckförmig, auf beiden Seiten zottenhaarig, fast röllig, die Lappen keilsförmig-gleichbreit, stumpf, eingeschnitten. Blumenstiele gehäuft-dolzentraubig. Kelche zottenhaarig. Waterl. Ruundien (Landschaft in Afrika.) ☉ Blühz. Sommer.

Der wollige Storchschnabel *G. lanuginosum* Jacq., welchen Willdenow späterhin in *Enum. pl.* als selbstständig

ge Art aufgeführt hat, ist von *G. carolinianum* Linn. nicht verschieden, höchstens nur eine Varietät, daher kann *G. lanuginosum* Jacq. im 1. Nachtrage B. 3. S. 470., nebst den beigefügten Bemerkungen, gestrichen werden und als Synonym bei *G. carolina* f. Lexic. stehen bleiben.

27. *Geranium molle* Linn. f. Lexic. B. 4.

Stengel ästig, weitschweifig, wie die Blätter weichhaarig, die Theile der Blätter dreispaltig, gekerbt. Blumenstiele meist niedergebogen. Kelchtheile unbegrannt, so lang als die Corollenblätter, diese sind roth, gespalten. Uebrigens f. Lexikon a. a. O.

Kultur der Storchschnäbel f. Lexikon B. 4. S. 339. Die oben beschriebenen neuen perennirenden Arten, welche in warmen Ländern und in Neuholland wild wachsen, verlangen Durchwinterung in Gewächshäusern. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und Wurzeltheilung.

Zu den sehr zahlreichen Synonymen im ersten Nachtrage B. 3. S. 472. bis 476. gehören noch folgende

Synonymen.

- Geranium abrotanifolium* L. Supp. ist *Pelargonium abrotanifolium* f. Lexic.
Geranium africanum Cavan. f. *Pelargonium odoratissimum* f. Lexic.
Geranium albanum M. a Bieb. ist *Geranium cristatum* Stev. f. 1. Nachtr.
Geranium albicans Hillar. Fl. Brasil. ist *Geranium rotundifolium* Var. f. Lexic.
Geranium batrachoides Cav. ist *Geranium sylvaticum* Var. f. 1. Nachtr.
Geranium bifolium Cavan. (nicht Patr.) f. *Pelargonium bifolium*.
Geranium bufonifolium Andr. ist *Pelargonium bufonifolium* Pers. f. Lexic.
Geranium capillare Cav. ist *Pelargonium capillare* Willd.
Geranium carnosum Linn. f. *Pelargonium carnosum* Ait.
Geranium chilense f. *Geranium pubescens* W. N. 12.
Geranium ciliatum Willd. f. *Geranium cucullatum* N. 9.

- Geranium davuricum* Cand. f. *Geranium barbatum*
D. N. 22.
Geranium elegans Andr. ist *Pelargonium elegans* W.
f. Lexic.
Geranium ferulaceum Cav. f. *Pelargonium ferulaceum*
W. f. Lexic.
Geranium fissifolium Andr. ist *Pelargonium fissifolium*
Pers. f. 1. Nachtr. N. 5.
Geranium floribundum Andr. ist *Pelargonium floribun-*
dum R. Br. f. 2. Nachtr.
Geranium grandiflorum Cav. f. *Monsonia tenuifolia*
W. f. Lexic.
Geranium grandiflorum L. Sp. 1. f. *Grielum tenuifo-*
lium L. f. Lexic.
Geranium hermannifolium L. f. *Pelargonium her-*
mannifolium f. Lexic.
Geranium Hernandezii Sess. f. *Geranium hirtum*
N. 17.
Geranium hirtum Forsk. f. *Erodium hirtum* W.
Geranium hirtum Linn. f. *Pelargonium hirtum* Jacq.
f. Lexic.
Geranium lanuginosum Jacq. f. *Geranium carolinia-*
num f. Lexic.
Geranium Londesii Fisch. f. *Geranium longipes* N. 13.
Geranium mexicanum Kunth f. *Geranium hirtum*.
N. 17.
Geranium nemorosum Tenor. ist *Geranium pyrenai-*
cum f. Lexic.
Geranium numidicum Poir. ist *Erodium cicutarium*
f. Lexic.
Geranium oxalidifolium Andr. f. *Pelargonium oxali-*
difolium f. Lexic.
Geranium pallens M. a Bieb. ist *Geranium rotundifo-*
lium f. Lexic.
Geranium partitum Willd. f. *Geranium ayavacense*
N. 11.
Geranium pinnatifidum Cav. ist *Pelargonium carneum*
Jacq. f. Lexic.
Geranium potentillaefolium W. f. *Geranium peduncu-*
lare N. 7.
Geranium potentilloides W. f. *Geranium Humboldtii*
N. 2.

Gera-

- Geranium proliferum Cav. ist Pelargonium barbatum Jacq.
 Geranium radiculatum Lapeyr. ist Exodium glandulosum W.
 Geranium radiculatum M. a B. ist Geranium tuberosum f. Lexic.
 Geranium rapaceum Linn. ist Pelargonium rapaceum Ait.
 Geranium, reflexum Andr. ist Pelargonium reflexum Pers. f. Lexic.
 Geranium rivulare Vill. ist Geranium aconitifolium Herit. f. Lexic.
 Geranium roseum Andr. ist Pelargonium roseum Pers. f. Lexic.
 Geranium rutilans Ehrh. ist Geranium anemonifolium Herit. f. Lexic.
 Geranium scabrum Linn. ist Pelargonium scabrum Herit. f. Lexic.
 Geranium tetragonum Linn. ist Pelargonium tetragonum Herit. f. Lexic.
 Geranium tuberosum M. a B. f. Geranium linearilobum N. 24.
 Geranium undulatum Andr. Rep. 317. ist Pelargonium virgineum Pers.
 Geranium undulatum Andr. Rep. 292. ist Pelargonium undulatum R. Br.
 Geranium venosum Pers. f. Geranium angulosum f. Lexic
 Geranium viscosum Cav. f. Pelargonium glutinosum f. Lexic.
 Geranium zonale Linn. f. Pelargonium zonale f. Lexic.

Gerardia Linn. Gerardie. f. Lexic. B. 4. S. 340.

Kelch fünfspaltig, gleich. Corolle gloden = trichterförmig, der Rand zweilappig, fünflappig. Staubfäden eingeschlossen. Antheren pfeilsförmig = zweilappig. Kapsel zweifächerig, zweilappig, an der Basis aufspringend.

Didynamia Angiospermia. (Familie der Scrophularien.)

Diese Gattung hat Linné bestimmt und sie einem französischen Botaniker H. Ludw. Gerard zu Ehren Gerardia genannt. Ludw. Gerard hat sich durch ein Meisterwerk:

Diatr. Err. 2r. Nachtr. IV. Bd.

R

Flora gallo-provincialis Paris 1761. 8. um die Wissenschaft verdient gemacht.

† Flotibus rubris. Blumen roth.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon beschriebenen Arten: *Ger. glutinosa*, *delphinifolia*, *purpurea* Linn. *G. sessiliflora*, *tenuifolia* Vahl. *G. japonica*, *tubulosa*, *Negrina*, *scabra* Thunb. und folgende:

a. Blätter breit.

1. *Gerardia fruticosa* Pursh. Fl. Americ. septent. Strauchige Gerardie.

Stengel strauichig, ästig. Blätter fast gestielt, lanzettförmig, sägerandig, auf beiden Seiten glatt. Blumen in gipfelförmige Trauben gesammelt. Vaterl. Nordamerika an Bergen. h

2. *Gerardia cuneifolia* Pursh. Keilblättrige Gerardie.

Stengel staudenstrauichig, ästig. Blätter spatel-keilförmig, ungleich sägezählig, die oberen stehen wechselnd, die untern gegenüber. Blumenstiele lang, einzeln, winkelförmig. Vaterl. Nordamerika (Georgien.) h

3. *Gerardia brasiliensis* Sprengel Syst. veg. Brasilische Gerardie.

Stengel strauichig, ästig. Blätter wechselnd stehend, gestielt, länglich, ganzrandig, fast lederartig, oben glänzend, unten wie die Aeste gelbroth-silzig. Blumenstiele einzeln, winkelförmig, kürzer als die Blätter. Vaterl. Brasilien. h

b. Blätter schmal,

4. *Gerardia domingensis* Spr. Domingensische Gerardie.

Stengel krautartig, walzenrund, ästig. Blätter linienförmig, gehäuft, fast büschelförmig stehend, alle glatt. Blumen traubenständig. Kelche abgestürzt, fünfzählig. Vaterl. St. Domingo. 4 ?

5. *Gerardia maritima* Rafin. Meerstranda Gerardie.

G. crinita Eddy.

Stengel vierkantig, ästig. Blätter linienförmig, fleischig, stumpflich, glänzend. Aeste blattlos, wenigblüthig. Kelche gekerbt, kurz gestielt. Vaterl. Nov. Caesar, am Meeresufer.

6. *Gerardia linifolia* Nuttall. Linienblättrige Gerardie.

Stengel walzenrund, ästig. Aeste ruthenförmig, wenigblüthig. Blätter linienförmig, fast fleischig, gesägt. Kelche abgestutzt, der Corollenrand gewimpert. Vaterl. Carolina. 4

7. *Gerardia filifolia* Nuttall. Fadenblättrige Gerardie.

Stengel walzenrund, ästig. Blätter fadenförmig, fast büschelförmig stehend. Blumenstiele wechselnd, länger als die Blätter. Kelche spitzig-gezähnt. Vaterl. Florida.

8. *Gerardia setacea* Nuttall. Borstenblättrige Gerardie.

G. erecta Walt.

Stengel walzenrund, ästig, glatt. Aeste lang, haar-fadenförmig, einblümig. Blätter borstenförmig. Kelche undeutlich gezähnt, kürzer als die eiförmige Kapsel. Vaterl. Carolina.

9. *Gerardia aphylla* Nuttall. Blattlose Gerardie.

Stengel aufrecht, blattlos. Aeste ruthenförmig, vieredig, mit kleinen, eiförmigen Schuppen besetzt, die abfallen. Blumen gestielt, gegenüberstehend. Vaterl. Carolina.

†† Floribus flavis. Blumen gelb.

10. *Gerardia glauca* Eddy. Graugrüne Gerardie.

Stengel einfach, glatt, grau- oder blaugrün-bereift. Blätter lanzettförmig, eingeschnitten-fiederspaltig, gezähnt. Blumenstiele gegenüberstehend, fast traubig, die Einschnitte des Kelches, wie die Kapsel schnabelförmig, verlängert. Vaterl. Nordamerika. 2

11. *Gerardia quercifolia* Pursh. Eichenblättrige Gerardie.

Stengel ästig, glatt, graugrün. Die untern Blätter tief fiederspaltig. Einschnitte länglich, buchtig, fast gezähnt, obere Blätter lanzettförmig, sägerandig. Blumenstiele kurz, winkelförmig, gegenüberstehend. Die Einschnitte des Kelches gespißt. Hierher gehört: *Rhinanthus virginicus* Linn. f. Lexic. B. 8. S. 141. Vaterl. Nordamerika.

12. *Gerardia digitata* Spr. Fingerförmige Gerardie.

Stengel aufrecht, ästig. Aeste ruthenförmig, zottenhaarig. Blätter fingerförmig getheilt, die Theile linienförmig gespißt, glatt. Blumenstiele einzeln winkelförmig, einblümig. Kelche glatt. Vaterl. Brasilien. 2

13. *Gerardia virgata* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. 11. p. 344. Ruthenförmige Gerardie.

Stengel aufrecht, ästig-ruthenförmig. Blätter fiederspaltig. Einschnitte spatel-linienförmig, spitzlich, die untern eingeschnitten-sägerandig. Blumen gestielt, einzeln, winkelförmig, Aehren bildend. Corollen pomeranzfarbig. Vaterl. Mexiko. 2 Blüß. September.

14. *Gerardia prostrata* Humb. Kunth. J. c. II. p. 343.
Gestreckte Gerardie.

Stengel gestreckt, strauchig. Blätter fiederspaltig, scharf. Lappen linienförmig, mucronenspizig, untere eingeschnitten. Blumen stiellos, einzeln, winkelfständig. Die Einschnitte des Kelches fiederspaltig. Vaterl. Neu-Spanien an Bergen. ♀ Blühz. Mai.

15. *Gerardia serpyllifolia* Humb. Kunth J. c. II. p. 343. Feldthymianblättrige Gerardie.

Stengel strauchig oder staudenstrauchig, gestreckt. Blätter eiförmig, stumpf, ganzrandig, glatt. Blumen stiellos, einzeln, winkelfständig. Kelche glatt. Corollen blaßgelb. Vaterl. Neuspanien. ♀ Blühz. Mai.

Kultur. Die Gerardien zieht man aus Saamen und vermehrt noch überdieß die strauchartigen durch Stecklinge. Alle perennirenden Arten, die in warmen Ländern wild wachsen, verlangen Durchwinterung in Gewächshäusern; die Arten, welche aus Nordamerika kommen, gedeihen in unsern Gärten unter freiem Himmel.

Synonymen.

Gerardia *Afzelia* Michx. f. 1. Nachtr. B. 3. ist *Seymeria tenuifolia* Pursh.

Gerardia auriculata Michx. f. 1. Nachtr. B. 3. ist *Seymeria auriculata* Spr.

Gerardia crinita Eddy. f. *Gerardia maritima* N. 5.

Gerardia erecta Walt. f. *Gerardia setacea* N. 8.

Gerardia orobanchoides Lam. ist *Alectra capensis* Thunb. f. Lexic. erste Aufl. 1. B. S. 222. und 1. Nachtr. B. 1. S. 156.

Gerardia tuberosa Linn. f. Lexic. B. 4. ist *Ruellia rupestris* Swartz.

Gerbera Cassin. (*Arnica* Linn. Thunb.) *Gerbera*.

Blüthendecke (Kelch) dachziegelschuppig. Fruchtboden nackt. Blümchen fast zweilippig. Die Saamentrone besteht aus zahlreichen fadenförmigen Schüppchen, die fast bartig sind.

Syngenesia 2 Ord. (Familie Compositae.)

Diese Gattung hat Cassini bestimmt und sie einem Botaniker Hrn. Traugott Gerber zu Ehren *Gerbera* genannt. Gerber erhielt von der russischen Kaiserin Anna den ehrenvollen Auftrag im Jahr 1732. das östliche Rußland, besonders die Ufer des Don und der Wolga zu besuchen, wo er viele

Pflanzen sammelte, dann seine Flora von Moskau Hr. Dr. Albert v. Haller schickte. Gerber ward Feldarzt und starb zu Wiborg im Jahr 1743.

1. *Gerbera crenata* Ker. (*Arnica crenata* Thunb. f. 1. Nachtr. B. 1. S. 314.)

Wurzelblätter gestielt, umgekehrt-eiförmig, fleischig, gekerbt, glatt. Schaft einblümig, niedrig, filzig, mit Schuppen besetzt. Vaterl. das südliche Afrika.

2. *Gerbera sinuata* Spr. (*Arnica sinuata* Thunb. f. 1. Nachtr.)

Wurzelblätter gestielt, länglich, buchtig-gezähnt, oben glatt, unten filzig. Schaft einblümig, schuppig, unten filzig. Vaterl. das Kap d. g. Hoffnung.

3. *Gerbera coronopifolia* Spr. (*Arnica coronopifolia* Linn. serrata Thunb. f. 1. Nachtr.)

4. *Gerbera asplenifolia* Spr. (*Doronicum asplenifolium* Lam. *Arnica Gerbera* Linn. f. Lexic. B. 1.)

Wurzelblätter gestielt, linien-lanzettförmig, fiederspaltig, unten filzig, die Lappen stumpf. Schaft einblümig, schuppig, wollig. Vaterl. das südliche Afrika.

Gerbera cordata Schlechtend. *Linnaea* VI. p. 107. eod. *G. macrocephala* p. 85.

Germanea rotundifolia Poir. f. *Plectranthus rotundifolia* Spr.

Germanea urticifolia Lam. ist *Ocimum suave* Willd.?

Geropogon glaber et hirsutum Linn. f. Lexic. B. 4. hat Kurt Sprengel (Syst. veg.) nur als eine Species unter dem Namen *G. australis* aufgeführt.

Gerontogea Schlechtend. *Linnaea* IV. p. 154. (*Oldenlandia* Linn.)

Der Character generic. ist daselbst so gestellt:

Corolla tenera breviter tubulosa, intus villosa aut rarius glabra albida. Stamina exserta; antherae parvae orbiculares aut oblongae. Capsula subglobosa, laciniis calycinis erectis, sinu dilatato sejunctis coronata; maturitate vertice discoideo intra calycem bilabiata hians; loculi poly(myrio)spermi.

Tetrandria Monogynia (Familie der Rubiaceen?)

1. *Gerontogea racemosa* Schlechtend. J. c. ist *Hedyotis racemosa* Lamarck f. Lexic. B. 4. S. 522. *Oldenlandia paniculata* Burm. Linn.

2. *Gerontogea biflora* Schlechtend. ist *Oldenlandia biflora* Linn. f. Lexic. B. 6. S. 425. *Hedyotis biflora* Ries. *Oldenlandia pentandra* Retz. ist eine Varietät. Höchst wahrscheinlich gehören noch einige Arten der Gattung *Oldenlandia* und *Hedyotis* hierher.

Gerjonia crassifolia Schrank ist *Saxifraga crassifolia* Linn. f. Lexic.

Gesneria Plum. Linn. (*Gesnera*) *Gesnerie* f. Lexic. B. 4. S. 344.

Character genericus f. 1. Nachtrag B. 3. S. 477. nebst D.

Kelch fünfstheilig, auf dem Fruchtknoten sitzend. Corolle röhrig = glockenförmig, oder cylindrisch, der Rand zweilappig. Oberlippe ausgerandet = zweilappig. Unterlippe dreispaltig. Vier ungleich lange Staubfäden und ein Griffel mit zweilappiger Narbe. Kapsel einsächerig, zweilappig, viel-samig, mit zwei Mutterkuchen, an denen die zarten Saamen hängen.

Didynamia Angiospermia (Familie der Personaten.)

† *Fruicosae*. Strauchige.

1. *Gesneria elongata* Humb. Kunth. Nov. gen. et Sp. pl. II. p. 396. t. 192. Langstielige *Gesnerie*.

Stengel strauchig oder staudenstrauchig. Blätter gegenüberstehend, länglich = eiförmig, langgespitzt, fast gekerbt = gezähnt, oben striegelig = scharf, unten braunlich = filzig. Blumenstiele winkelfständig, lang, vierblümig. Corolle scharlachroth, röhrig. *Gesnera Dippeana* Schlechtend. in *Linnaea* 5. B. p. 100. Variet.? Waterl. Quitto? h

2. *Gesneria longiflora* Humb. Kunth. J. c. p. 396. Langblümige *Gesnerie*.

Blätter gegenüberstehend, schief, eiförmig, gespitzt, gekerbt, an der Basis verdünnt, oben feinborstig, behaart, unten filzig. Blumenstiele winkelfständig, zweiblümig. Corolle lang, röhrig, purpurroth. Waterl. Quitto? h

3. *Gesneria mollis* Humb. Kunth. J. c. II. p. 395. t. 191. Weiche *Gesnerie*.

Blätter gegenüberstehend, schief, länglich = eiförmig, langgespitzt, an der Basis gerundet, fast herzförmig, gekerbt = sägezählig, weichfilzig, unten silberweiß = seidenhaarig. Blumenstiele winkelfständig, dreiblümig. Corolle röhrig = bauchig, scharlachroth. Waterl. Neugranada. h

4. *Gesneria hirsuta* Humb. Kunth. J. c. II. p. 394. t. 189. Rauche Gesnerie.

Blätter gegenüberstehend, länglich = eiförmig, langgespitzt, an der Basis gerundet, gekerbt = sägerandig, oben filzig = behaart, unten wollig. Blumenstiele gepaart, winkelförmig, einblümig. Corolle röhrig = bauchig, purpurroth. Vaterl. Cumana, in temperirten Gegenden. ♀ Blühz. September.

5. *Gesneria ulmifolia* Humb. Kunth. J. c. II. p. 394. Rusterblättrige Gesnerie.

Blätter schief, fast herz = eiförmig, gespitzt, gekerbt, oben runzlig = blässig, scharf, unten netzartig, borstig = filzig. Blumenstiele winkelförmig, fast gehäuft. Corolle röhrig = aufgebblasen, scharlachroth. Vaterl. Duito. ♀ Blühz. Julius.

6. *Gesneria prasinata* Ker. Bot. Reg. 321. Brasilische Gesnerie.

Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, sägerandig, unten seidenhaarig = filzig. Blumenstiele winkelförmig, kürzer als die Blätter, meist dreiblümig. Corolle grün, auswendig filzig = zottenhaarig, der Schlund erweitert, die Einschnitte zurückgerollt. Vaterl. Brasilien. ♀ Blühz. Jul. September.

7. *Gesneria spicata* Humb. Kunth. J. c. II. p. 393. t. 188. Aehrenblüthige Gesnerie.

Blätter zu 3 quirlförmig stehend, kurzgestielt, länglich = lanzettförmig, langgespitzt, gekerbt, oben friegelig = behaart, unten wollig = filzig. Blumen quirlförmig stehend, eine Aehre bildend, die Quirle meist zehnbülmig, gedrängt. Vaterl. Neugranada an sumpfigen Orten. ♀ Blühz. October.

8. *Gesneria macrantha* Spreng. Syst. veg. II. p. 839.

Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, undeutlich gezähnt, gewimpert. Blumenstiele einblümig, winkelförmig. Corolle groß, röhrig = glockenförmig, gekrümmt. Vaterl. Brasilien. ♀

9. *Gesneria* (*Gesneria lasiantha* Zuccarini.)

Stengel standenstrauchig, ästig, mit grauen angebrückten Borstenhaaren bekleidet. Blätter kreuzweis einander gegenüberstehend, gestielt, ey = lanzettförmig, langgespitzt, sägeartig gezähnt, weich = seidenhaarig = borstig. Blumenstiele winkelförmig, meist vierblümig. Corolle röhrig, an der Basis mit fünf gleichen Höckern versehen. Staubfäden behaart. Vaterl. Mexico. ♀ ? Blühz. August bis September.

†† *Herbaceae* Krautartige.

10. *Gesneria hondensis* Humb. Kunth. J. c. II. p. 395. t. 190.

Blätter fast schief, länglich-eiförmig, oben glatt, unten weiß-wollig. Blumenstiele einblümig, zu 2—3 beisammen in Blattwinkeln stehend. Corolle gelb-grünlich. Waterl. Neugranada. 4 Blühz. Junius.

11. *Gesneria chelonioides* Humb. Kunth. J. c. II. p. 392. Chelonenartige Gesnerie.

Stengel krautartig, einfach. Blätter sehr kurz gestielt, gegenüberstehend, länglich, gespitzt, an der Basis stumpf, grob gegerbt, auf beiden Seiten behaart-borstig, unten graulich. Blumen ährenständig, einzeln oder gepaart. Corolle fleischroth. Waterl. Neugranada. 4 Blühz. Novemb.

12. *Gesneria barbata* Martius Fl. bras. Bartige Gesnerie.

Stengel krautartig. Blätter gestielt, gegenüberstehend, länglich, langgespitzt, fast gegerbt, unten scharf. Blumenstiele meist einzeln. Corolle auswendig behaart. Waterl. Brasilien. 4

13. *Gesneria elatior* Humb. Kunth. J. c. II. p. 393. Hohe Gesnerie.

Stengel krautartig. Blätter fast stiellos, zu 3 quirlförmig stehend, lanzettförmig, an beiden Enden stumpf, gegerbt, behaart-borstig. Blumen quirlförmige Ähren bildend, die Quirle dreiblümig, entfernt stehend. Corolle roth. Waterl. Neuandalusien an schattigen Orten. 4 Blühz. September.

14. *Gesneria sylvatica* Humb. Kunth. J. c. II. p. 393. Waldliebende Gesnerie.

Stengel krautartig, einfach. Blätter zu 3—4 quirlförmig stehend, fast stiellos, länglich-lanzettförmig, langgespitzt, ganzrandig, auf beiden Seiten, vornehmlich oben mit Strichborsten besetzt. Blumen in Quirlen, die eine Aehre bilden; die Quirle 2—4blümig, obere genähert, untere entfernt stehend. Corolle scharlachroth. Waterl. am Amazonenflusse. 4 Blühz. August.

15. *Gesneria aggregata* Ker. Bot. Reg. 329. Gehäuftblüthige Gesnerie.

Stengel krautartig. Blätter gegenüberstehend, eiförmig, gegerbt, unten filzig. Blumenstiele quirlständig, einblümig. Corollen zottenhaarig, scharlachroth, röhrig, an der Basis

mit zwei Höckern versehen, der Rand fast aufrecht, fast gleich.
Waterl. Brasilien. 4

16. *Gesneria tribracteata* Otto et Dietr. Gartenj. 1834.

Gesneria, foliis oppositis oblongis breviter petiolatis crenatis hirsutis, racemis spicatis, floribus oppositis tribracteatis, corolla tubulosa, limbo quinquelobo regulari. Albert Dietrich J. c.

Wurzel knollig. Stengel krautartig, aufrecht, rund, zottenhaarig, 2—3 Fuß hoch. Blätter gegenüberstehend, kurzgestielt, länglich, gelerbt, behaart, 2—3 Zoll lang, 1½ Zoll breit, die untern größer als die obern. Blumen gestielt, zu 2 einander gegenüberstehend, eine ährenförmige Endtraube bildend; unter jeder Blume sitzen drei Deckblätter (Bracteen), die am Kelche liegen, davon das untere größere herzförmig ist und mit der Basis die 2 seitenständig schmälern bedeckt. Kelch mit weißen Haaren bekleidet, glockenförmig, höckerig, fünfspaltig. Corolle röhrig, etwa ½ Zoll lang, die Röhre an der Basis fast höckerig, blaßgelb, oben zinnoberroth, zottenhaarig, der Rand regelmäßig fünfkappig, die Lippen umgekehrt-eiförmig, scharlachroth. Staubfaden und Griffel zottenhaarig.

Den Saamen von dieser neuen Art erhielt der bot. Garten bei Berlin aus Brasilien. 4

17. *Gesneria bulbosa* Ker. Bot. Reg. 343. Zwiebelwurzliche Gesnerie.

Wurzel zwiebelartig-knollig. Stengel krautartig, aufrecht, braun-silzig. Blätter gegenüberstehend, untere kurzgestielt, obere stiellos, alle elliptisch-herzförmig, gespitzt, gelerbt-gesähnekt, unten mit gelblich-braunem Filze bekleidet, die untern 4—5 Zoll lang, 3 Zoll breit. Blumenstiele winkels- und gipfelständig, 3—6blüthig, doldentraubig. Corolle scharlachroth, röhrig, die Oberlippe anfänglich eingeschlagen, die Spitze an der abgestutzten Unterlippe liegend, dann ausgebreitet. Antheren weißgelblich, zusammenhängend, kreisförmig. Waterl. Brasilien. 4 Blüthz. im hiesigen bot. Garten Juni — August.

18. *Gesneria latifolia* Martius. Breitblättrige Gesnerie.

Gesneria radice tuberosa, caule superne rufo-villoso, foliis oppositis villosis, crenatis, inferioribus late et suborbiculari ovatis, obtusis, petiolatis, superioribus subsessilibus acutisculis; racemis axillaribus 6—10 floris, corollis cylindricis, limbo erecto.

risculo brevi subaequali (tubo basi sursum lato bigiboso.) Schlechtend. in den Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues. Zehnte Lief. S. 219. t. I.

Wurzelknolle sehr dick, niedergedrückt-kugelig, braun. Stengel mehrere aus einer Wurzel, aufrecht, 3—4 Fuß hoch, einfach, walzenrund, oben mit braunen Stottenhaaren bekleidet. Blätter gegenüberstehend, gestielt, herz-eiförmig, gezähnt, stottenhaarig, mittlere 6 Zoll lang, 4 Zoll breit, mit kurzer Spitze, obere kleiner, stiellos. Blumenstiele winkelförmig, 3—9—12 blümig, doldentraubig. Kelch glockenförmig, die Theile gespitzt. Corolle röhrig, mehr oder weniger überhängend, scharlachroth, die Einschnitte des Randes fast gleich, gerundet, aufrecht-abstehend. Staubfäden so lang als die Corollenröhre. Griffel hervorragend, purpurroth. Kapsel einsächerig, von dem Kelche bedeckt.

Diese schöne Species ist der vorhergehenden *G. hulbosa* N. 17. zunächst verwandt, aber unterschieden durch die Blätter, hauptsächlich durch die etwas kürzere fast regelmäßige Corolle mit gerundeten Einschnitten. Vaterl. Brasilien. 4 Blüßz. Frühling und Sommer.

Eine Anleitung zur Kultur der Gesnerien im Allgemeinen s. Perikon B. 4. S. 346. Auf gleiche Weise können auch die oben beschriebenen neuen Arten behandelt werden. Sie kommen aus Tropenländern und verlangen in unsern Gärten warme Standörter.

Gesneria fimbriata Lam. s. *Gesneria Craniolaria* Lexic.

Gethyllis Linn. Papiertulie s. Lexic. B. 4. S. 347. Dasselbst Seite 14. statt: oben lies: an der Wurzel.

Gethyllis plicata Jacq. s. Lexic. ist *Curculigo plicata* Dryand.

Gethyra occidentalis Salisb. ist *Alpinia occidentalis* Swartz.

Geum Linn. *Geum* s. Lexic. B. 4. S. 349.

Character generic. s. 1. Nachtrag B. 3. S. 479.

Kelch zehnspaltig; die Einschnitte abwechselnd kleiner. Fünf Corollenblätter. Karpopsen (Schaalsaamen) mit dem bleibenden geknickten Griffel (Granne) gekrönt.

Icosandria Polygynia (Familie Rosaceen.)

1. *Geum coccineum* Smith. Scharlachrothes *Geum*.

Wurzel ästig, faserig. Stengel rund, filzig, aufsteigend, oben meist zweitheilig, 1 Fuß lang oder länger. Wurzelblätter leyerförmig = unterbrochen gefiedert. Endblättchen groß, rundlich, herz = nierenförmig, lappig, eingeschnitten = gezähnt. Stengelblätter wechselnd stehend, gestielt, untere unterbrochen gefiedert. Endblättchen dreitheilig, obere dreilappig, die Lappen eingeschnitten = gezähnt, alle feinhaarig = filzig. Asterblätter dreispaltig, gezähnt. Blumen gestielt, aufrecht, groß, über 1 Zoll im Durchmesser breit, aufrecht. Kelchtheile in der Blüthezeit zurückgeschlagen. Corollenblätter schön scharlachroth, rundlich, ausgekerbt, fast wellenrandig, abstehend. Staubfäden viel kürzer als die Corollenblätter, mit kleinen aufsteigenden Antheren gekrönt. Vaterl. Kleinasien. 4 Blüth. Mai und Juni.

2. *Geum Quellyon* Sweet. Brit. Flower Garden. t. 238.

Der vorigen Art *G. coccineum* ähnlich, aber verschieden und fast noch schöner als jene. Vaterl. Chili. 4

3. *Geum hispidum* Fries. Scharfborstiges Geum.

Stengel und Blätter scharfborstig = rauch. Wurzelblätter fast gleich = gefiedert. Stengelblätter fiederspaltig. Blumen aufrecht. Corollenblätter länger als der Kelch. Saamengranen oben scharfborstig. Dieses Geum wächst im südlichen Schweden und scheint noch einer nähern Untersuchung zu bedürfen, vielleicht nur eine Varietät von einer andern längst bekannten Art?

4. *Geum agrimonoides* Pursh. Odermennigartiges Geum, (*Potentilla confertiflora* Torr?)

Stengelblätter gleich gefiedert. Blättchen eingeschnitten. Aster meist ungetheilt. Blumen aufrecht. Corollenblätter so lang als der Kelch. Vaterl. Nordamerika. 4

5. *Geum ciliatum* Pursh. Gewimpertes Geum.

Stengelblätter fiederspaltig, auch handförmig getheilt, glattlich, die Lappen linienförmig, eingeschnitten, gewimpert. Blumen doldentraubig. Vaterl. Nordamerika an Bergen. 4

6. *Geum Peckii* Pursh. Pectisches Geum.

Wurzelblätter langgestielt, nierenförmig, eingeschnitten = gezähnt, am Stiele fast geohrlappig. Stengel einblüthig. Corollenblätter so lang als der Kelch. Vaterl. Nordamerika. 4

Die Geumarten gedeihen in unsern Gärten unter freiem Himmel und kommen fast in jedem Boden fort, am besten in einem guten lockeren Erdreich. N. 1. verlangt, in hiesi-

gem Garten in kalten Wintern eine Bedeckung oder Durchwinterung in einem frostfreien Behälter. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und Wurzeltheilung.

Synonymen.

- Geum alepicum** Jacq. f. **Geum strictum** Lexic.
 — **canadense** Murr. f. **Geum strictum** Lexic.
 — **canadense** Jacq. f. **Geum album** Lexic.
 — **geniculatum** Michx. f. 1. Nachtr. ist **Geum virginicum** Var.
 — **glaciale** Adam f. **Sieversia glacialis** Spr.
 — **hederaefolium** C. C. Gmel. ist **Geum urbanum** Lexic.
 — **Geum hirtum** Wahlenb. ist **Geum urbanum** Lexic.
 — **intermedium** Fisch. (non Ehrh.) ist **Geum strictum** Lexic.
 — **montanum** Linn. f. Lexic. ist **Sieversia montana** Spr.
 — **radiatum** Michx. f. 1. Nachtr. ist **Geum macrophyllum** Var.
 — **reptans** Linn. f. Lexic. ist **Sieversia reptans** Spr.
 — **sylvaticum** Pourr. Cand. ist **Geum atlanticum** Desf. f. Lexic.
 — **triflorum** Pursh. ist **Sieversia triflora** Spr.
 — **intermedium** Ehrh. et Willd. f. 1. Nachtr. hat Sprengel in Syst. veg. als Varietäten zu **Geum urbanum** gezogen.

Ghinia mutica Swartz. f. Lexic. B. 4. ist **Tamonea mutica** Pers.

Ghinia verbenacea Swartz f. **Tamonea verbenacea** Spr.

Gegartina Lamarux et Lyngb. ist **Chondria** Ag. et **Sphaerococcus** Stackh. (Familie der Lange Fuci.)

Gilia Ruiz et Pavon Fl. peruv. et Chil. 1. t. 4. Gilie f. Lexic. B. 4.

Kelch fast glockenförmig, fünfspaltig. Corolle trichterförmig, fünfspaltig. Fünf Staubfäden, im Schlunde der Corolle eingefügt. Ein Griffel mit dreispaltiger Narbe. Kapsel dreifächerig, dreiklappig, viel-saamig. Saamen eifig, nackt, in doppelten Reihen sitzend.

Pentandria Monogynia (Familie der Polemoniaceen.)

Diese Gattung haben die H. Ruiz et Pavon bestimmt. Sie führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Philipp Gil, Botaniker in Spanien, der in Verbindung mit E. Xuares ein phytologisches Werk über exotische Pflanzen, die in Italien, besonders in der Gegend von Rom vorkommen, herausgegeben hat.

1. *Gilia capitata* Dunglas. Sweet Brit. Flow. Garden. t. 287. Kopfförmige Gilie.

G. caule erecto ramoso, foliis alternis pinnatifidis, cauleque glabris, laciniis lanceolatis integerrimis, floribus aggregatis seu capitatis longe pedunculatis.

Wurzel ästig, faserig. Stengel krautartig, aufrecht, ästig, wie die Blätter und Blumenstiele glatt, 2—3 Fuß hoch. Blätter wechselnd stehend, fast stiellos, tief fiederspaltig oder fast gefiedert. Einschnitte lanzettförmig oder linien-lanzettförmig, die obersten neben den Blumenstielen 2—3 theilig, sehr schmal linien-fadenförmig. Blumenstiele lang, nackt. Blumen gipfelständig, zahlreich, gehäuft = kopfförmig. Corollen trichterförmig, fünfspaltig, schön himmelblau, die Einschnitte mit drei Rippen versehen, die oben zusammenfließen. Vaterl. die nordwestlichen Gegenden von Nordamerika. ☉ Blüht im hiesigen Garten vom Mai und Juni bis im Herbst, nachdem der Saame ausgesät wird. Auch pflanzt sie sich durch Saamenausfall selbst fort und dient zur Bierre der Rabatten und Blumenbeeten.

2. *Gilia aggregata* Spreng. Gehäuftblätthige Gilie.

Cantua aggregata Pursh f. Lexic. 2te Aufl. B. 2.

6. 528.

Ipomeria aggregata Nuttall.

Wurzel ästig, faserig. Stengel aufrecht, wie die Blätter glatt, 2 Fuß hoch. Die untersten Blätter fiederspaltig, mit länglich-eyförmigen, gespizten Einschnitten, die mittlern und obern Stengelblätter zart gefiedert, die Blättchen sehr schmal, linien-lanzettförmig, ganzrandig, gespizt. Blumenstiele lang, nackt oder mit einigen zarten Blättchen besetzt. Blumen gipfelständig, gehäuft, fast geknaut kopfförmig, fast stiellos. Corolle röhrig trichterförmig, tief fünfspaltig, himmelblau, die Einschnitte schmal, aufrecht, so lang als die Staubfäden. Griffel eingeschlossen. Vaterl. Nordamerika, am Mississippi-Stusse. ☉ Blüht. Sommer.

Auch diese Pflanze kommt in Gärten oft unter dem Namen

Gilia capitata var., oder wird nur als eine Varietät betrachtet, welche sich durch die zarteren Stengelblätter und durch die mehr getheilten Blumenköpfchen unterscheidet. Sie gedeiht wie jene im freien Lande, gedeiht fast in jedem Boden und pflanzt sich durch den ausfallenden Saamen fort.

3. *Gilia glomeriflora* Spr. Geknautte Gilie.

Cantua glomeriflora Juss. Hierher gehört *Phlox pinnata* Cav. Lexic. B. 7.

Wurzel ästig, faserig. Stengel staudenstrauchig. Blätter fiederspaltig, glatt. Einschnitte schmal, linienförmig, lang, fast fadenförmig. Blumen gestielt, winkelförmig, geknaut, klein. Corollen fünfspaltig, dreimal länger als der Kelch, weiß oder gelblich. Vaterl. Monte Video und Buenos Ayres. ♀ Blühz. Sommer. Kultur: gute lockere Erde und Durchwinterung im Glashause oder temperirtes Haus.

4. *Gilia coronopifolia* Pers. Fiederspaltige Gilie.

G. foliis lineari-pinnatifidis, seminibus cubicis Willd. Sp. pl. Pers. Synops. I. p. 187.

Jpomeria coronopifolia Nuttall. *Polemonium rubrum* Linn. *Cantua pinnatifida* Lam. *C. coronopifolia* Willd. *C. thyrsoides* Juss. *Jpomopsis elegans* Michx. f. Spr. Syst. Veg. I. p. 625.

Unter dem Namen: *Jpomopsis elegans* Michx. hat der hiesige bot. Garten eine Pflanze erhalten, die jetzt (im September) in voller Blüthe steht.

Stengel krautartig, einfach, rund, fast filzig, 3—4 Fuß hoch und von unten bis zur Spitze mit Blättern dicht besetzt. Diese stehen wechselnd=zerstreut, sind stiellos, fiederspaltig oder gefiedert, glatt, grau oder fast blauschgrün, die untern 3 oder 3½ Zoll lang, übergebogen, oder fast hängend, größer als die obern. Einschnitte (Blättchen) linien=fadenförmig, gespitzt, ganzrandig, fast fleischig. Blumen am obern Theile des Stengels, fast rispenständig, übergebogen, zu 2—3 oder mehrere beisammenstehend. Kelchtheile pfriemenförmig, wenig filzig. Corolle röhrig=trichterförmig, schön scharlachroth, die Röhre eckig=gestreift, 6—8 Linien lang, der Rand fünfspaltig, offen stehend, 5—7 Linien im Durchmesser breit. Einschnitte elliptisch=eyförmig, gespitzt, ganzrandig, inwendig nach der Basis zu weißlich geädert. Staubfäden 5, haarförmig, scharlachroth, in die Corollenröhre eingefügt, kürzer als die Einschnitte der Corolle. Antheren klein, rundlich. Griffel scharlachroth. Narbe dreispaltig.

Gilia parviflora Spr. ist *Cantua parviflora* Pursh. f. Lexic. 2 Aufl. B. 2. S. 530.

Gilibertia Willd. Spec. pl. f. Lexic. B. 4. S. 35.

Quivisia Commers. Persoon Synops. et Cavan. diss.

7. Spreng. Syst. Veg. 3.

Gilibertia Ruiz et Pav. Spr. Syst. Veg. 2 habe ich unter *Ginannia* aufgeführt f. 1. Nachtr. B. 3. S. 483. Hierzu gehört auch *Wangenheimia*, die von *Ginannia* (*Gilibertia umbellata* R. et P.) nicht verschieden ist und daher im Verikon B. 10. ausgestrichen wird.

Gillenia stipulacea Nuttall. f. *Spiraea stipulacea* f. 1. Nachtr. B. 8. S. 405.

Gillenia trifoliata Moench ist *Spiraea trifoliata* Linn. f. Lexic.

Gilliesia Lindley. Gilliesie.

Blüthendecke doppelt, die Blättchen abstehend, zuweilen fleischig, lippenförmig. Drei vollkommene Staubfäden, die an der Basis krug- oder napfförmig verbunden sind, die übrigen 3 sind unfruchtbar und zahnförmig. Narbe kopfförmig, dreieckig, zuweilen dreispaltig. Kapsel dreifächerig, 3 klappig.

Triandria Monogynia.

1. *Gilliesia graminea* Lindl. Bot. registr. 992. Grasartige Gilliesie.

Wurzel knollig. Blätter wurzelständig, grasartig, grün. Schaft walzenrund. Blumen doldenständig. Waterl. Chili. 4 Glash.

Gimbernata Ruiz et Pav. ist *Chunchoa* Pers. (*Chunchoa* Juss.) f. 1. Nachtr. B. 2. S. 244. und meine Beschreibung im 2. Nachtr. B. 2. S. 557.

Ginannia guianensis Schreb. ist *Brownea pauciflora* Willd. f. Lexic. B. 2. *Paloue guianensis* Aubl. (*Paloue* Pers.) f. 1. Nachtr. B. 5.

Ginginsia brevicaulis Candoll. f. *Pharnaceum brevicaulis* 2. Nachtr.

Ginginsia conferta Cand. ist *Pharnaceum incanum* L. f. Lexic.

Gissonia collina Salisb. ist *Leucadendron plumosum* R. Br.

Glabraria L. Willd. ist *Litsaea* Pers. f. 1. Nachtr. *Tetranthera tersa* Spr.

Gladiolus Linn. Siegwurz f. Perizon B. 4.

Character genericus f. 1. Nachtr. B. 3. S. 484. nebst meinen Bemerkungen in Beziehung auf die Trennung der Arten und Aufstellung neuer Gattungen (auch S. 502.) Dasselbst habe ich die Arten in 2 Abtheilungen aufgeführt und S. 503—506 eine Synonymen-Liste beigelegt.

Gladiolus. Scheide zweiflappig. Corolle röhrig, der Rand sechstheilig, irregulär. Staubfäden aufsteigend. Antheren länglich. Narben fadenförmig, ungetheilt. Saamen geflügelt.

Triandria Monogynia (Familie Euphorbiaceen; Coronarien.

† Foliis angustissimis. Blätter sehr schmal.

1. *Gladiolus edulis* Bruchell. Ker. Bot. reg. 169. f. 1. Nachtr. B. 10. Anhang S. 100.

Blätter schmal, linienförmig, mit zwei Furchen versehen. Aehre meist zusammengesetzt. Die Einschnitte der Corolle eysförmig, langgespitzt, wellenrandig, die untern schmaler als die obern. Vaterl. das südliche Afrika. 4

2. *Gladiolus scaber* Link in Jahrbücher der Gewächskunde I. B. 3. Heft. S. 70.

Blätter linienförmig, zusammengeroßelt, scharfrandig, die untern länger als der wenigblüthige Schaft. Scheidenklappen länger als die Corollenröhre. Die Unterlippe der Corolle hervorstechend. Vaterl. das Vorgeb. d. g. Hoffnung. 4

3. *Gladiolus trichonemifolius* Bot. Mag. 1483.

Zwiebel fast kugelig, so groß wie eine Wallnuß. Blätter schmal, linienförmig, 4seitig, gefurcht, straff, glänzend, lang-röhrig=scheidenartig, die untern länger als der Schaft. Dieser ist 6—9 Zoll hoch, einfach, dünn, aufrecht, 2—3 blüthig. Blumen fast einseitig, sehr wohlriechend. Scheidenklappen eingerollt, gestreift. Corolle $1\frac{1}{2}$ Zoll lang, trichterförmig, dunkelgelb, im Schlunde purpurroth, gestreift, desgleichen die fast gleichlangen Einschnitte. Antheren fast so lang als die Staubfäden. Narben schmal, linienförmig. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. 4 Blüthz. Frühl. und Sommer.

4. *Gladiolus pappilaceus* Lichtenst. Schmetterlingsblüthige Siegwurz. f. 1. Nachtr. B. 10. Anhang S. 99.

†† Foliis latioribus ensiformibus. Blätter breit, schwertförmig.

5. *Gladiolus psittacinus* Hook. Bot. Mag. 3032. Lindl. Bot. reg. 1442.

Sten-

Stengel (Schaft) aufrecht, an der Basis purpurroth, oben grün, so lang als die schwertförmigen, langgespizten Blätter, die in der Mitte gerippt sind. Blumen in eine gipfelspandige 1 Fuß lange Aehre gesammelt. Scheidenklappen purpurrothlich, so lang als die Corollenröhre. Corolle glockenförmig, gelb, mit scharlachrothen Punkten und Streifen geziert; die 3 untern Einschnitte breit, eiförmig, stumpf, fast mucronenspizig, die 2 obern länglich-liniensförmig, der oberste umgekehrt-eiförmig, gewölbt. Waterl. Kap d. g. Hoffmann. 4

6. *Gladiolus alatus* Linn. Geflügelte Siegwurz.

Zwiebel rund, zusammengedrückt. Blätter linien-schwertförmig, steif, fast lederartig. Schaft 6—10 Zoll hoch, aufrecht, knieartig gebogen, halb zweischneidig. Scheidenklappen länger als die Corollenröhre, Blumen 5—10. Corolle ausgeperrt-rachenförmig, kurzröhrig, scharlachroth, die untern Einschnitte an der Basis gelb-grün. Abbild. Curt. bot. Mag. t. 586. *Gladiolus alatus* Jacq. f. Lexic. und 1. Nachtr. B. 3. S. 496. N. 38. ist *Glad. viperatus* Ker. in bot. Mag. 688. Auch *Gl. virescens* Thunh. scheint nur eine Varietät zu seyn, die hierher gehört. Waterl. Kap d. g. Hoffm. 4

7. *Gladiolus rudis* Lichtenst. in Roem. et Schult. Syst. veg. I. p. 408. siehe I. Nachtrag. B. 10. Anhang. S. 99.

8. *Gladiolus pratensis* Alb. Dietr. Flor. Boruss. t. 43. Wiesen-Siegwurz.

Glad. communis Hag. Preuß. Fl. I. p. 36.

Zwiebel doppelt, klein. Blätter linien-schwertförmig, sehr gespizt, gerippt. Schaft einfach, aufrecht, dünn, rund, 1½ Fuß hoch und höher. Blumen (4—5) horizontal abstehend, fast übergebogen, nach einer Seite gerichtet, eine Endähre bildend. Scheidenklappen linien-lanzettförmig, langgespizt, am Rande eingerollt. Corolle 14 Linien lang, karmoisinroth, fast rachenförmig, die Röhre gekrümmt, 2 Linien lang, die untern Einschnitte inwendig gefleckt. Waterl. das nördliche Europa auf Wiesen. 4 Blüthz. Jun. Jul.

Die Kennzeichen, wodurch sich diese Art von *Glad. communis* et *Glad. imbricatus* Linn. unterscheidet, sind in folgender Schrift genau angegeben: Linnaea (ein Journal für die Botanik) herausgegeben von Prof. Dr. Schlechtendal B. 7. Heft 4. S. 485—490.

Dietr. Ver. 2r Nachtr. IV. Bd.

2

9. *Gladiolus imbricatus* Linn. Alb. Dietr. Flor. Bo-
russ. t. 44.

Gl. neglectus R. et Schult. Syst. veg. 1. p. 418.
Mert. et Koch d. Flor. 1. p. 440.

Gl. galiciensis Besser Fl. gal. 1. p. 9.

— *Marsalli* Poir. Encycl. Meth. Suppl. 2. p. 789.

— *tenuis* Marsh. a Bieb. taur. caucas. 1. p. 29.

— *rossicus* Pers. Synops. 1. p. 46.

— *palustris* Gaud. Fl. helv. 1. p. 97.

— *communis* Krok. Fl. sil. 1. p. 50.

Zwiebel rundlich, so groß wie eine Haselnuß, mit einer faserigen Haut bedeckt. Stengel walzenrund, dünn, aufrecht, 1—2 Fuß hoch, mit Blättern besetzt. Blätter schwertförmig, gerippt, 4—5 Linien breit. Aehre vielblümig. Blumen gehäuft, fast überhängend, einseitig, dachziegelförmig über einander liegend. Scheidenklappen lanzettförmig, ungleich. Corolle fast rachenförmig, 1 oder $1\frac{1}{2}$ Zoll lang, karmoisinroth, die Röhre gekrümmt. Diese Art unterscheidet sich von der gemeinen Siegwurz (*Gl. communis* L.) durch etwas kleinere zahlreiche Blumen, die gedrängt=dachziegelförmig über einander stehen, und durch einige andere Merkmale. Vaterl. Europa auf Wiesen und am Kaukasus. 4 Blühz. Sommer.

Kultur der Siegwurzarten, in Hinsicht auf Standort, Boden, Fortpflanzung und Vermehrung siehe Lexicon B. 4. S. 370—71. 1. Nachtr. B. 3. S. 505.

In dem Behälter für Zwiebel- und Knollengewächse, welchen ich in meinen frühern Schriften, besonders im Handbuche der bot. Lustgärtnerei ausführlich beschrieben habe, gedeihen auch die meisten Gladiolen vom Kap d. g. Hoffn.

Zu den zahlreichen Synonymen im 1. Nachtr. B. 3. S. 503—505, gehören noch folgende, nebst einigen Berichtigungen.

Gladiolus abbreviatus Andr. f. Lexic. ist *Antholyza quadrangularis* Vahl. f. Lexic.

— *alatus* Jacq. f. Lexic. ist *Gladiolus viperatus* Ker. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 496.

— *ambiguus* Lam. ist *Gladiolus hirsutus* Linn.

— *anceps* Thunb. f. Lexic. ist *Ovieda anceps* Spr.

— *bicolor* Thunb. ist *Sparaxis bicolor* Ker.

— *pudibundus* Sweet. Fl. Gard. t. 176. ist ein Bastard von *Gl. cardinalis* und *Gl. blandus*

Ait. f. Lexic.

- Gladiolus campanulatus** Andr. Repos. t. 187. ist eine selbstständige Art, und von *Gl. blandus* Ait. hauptsächlich durch eine größere fast glockenförmige purpurne Corolle zu unterscheiden.
- **cuspidatus** Andr. ist *Gladiolus carneus* Jacq. f. Lexic.
- **debilis** Bot. Mag. ist *Gladiolus gracilis* Jacq. f. Lexic.
- **fragrans** Jacq. f. 1. Nachtr. ist *Babiana disticha* Ker. f. 2. Nachtr.
- **inflatus** Vahl. Thunb. f. 1. Nachtr. ist *Gladiolus blandus* Ait. f. Lexic.
- **longiflorus** Andr. f. *Babiana tubiflora* Ker.
- **mollis** Vahl. 1. Nachtr. f. *Babiana stricta* Ker.
- **neglectus** R. et Schult. f. *Gladiolus imbricatus* N. 9.
- **Orobanche** Red. ist *Gladiolus blandus* Ait. f. Lexic.
- **paleaceus** Vahl. f. 1. Nachtr. ist *Babiana spathacea* Ker. f. 2. Nachtr.
- **palustris** Gaud. f. *Gladiolus imbricatus* N. 9.
- **quadrangularis** Ker. f. *Antholyza quadrangularis* Lexic.
- **reflexus** Lichtenst. ist *Babiana villosa* Ker.
- **Jxia villosa** Ait. *punicea et purpurea* Jacq. f. Lexic.
- **rossicus** Bess. f. *Gladiolus imbricatus* N. 9.
- **sambucinus** Jacq. f. 1. Nachtr. ist *Babiana sambucina* Ker. f. 2. Nachtr.
- **strictiflorus** Redout. ist *Watsonia strictiflora* Ker.
- **tenuis** M. a Bieb. f. *Gladiolus imbricatus* N. 9.
- **triticeus** Thunb. ist *Watsonia triticea* Spr.
- **venosus** Willd. f. 1. Nachtr. ist *Gladiolus versicolor* Andr. var.

Glaphyria Jackson. Glaphyrie.

Kelch fünfspaltig. Corollenblätter 5, wie die Staubfäden leichständig. Beere fünffächerig, vielseedig, die Saamen in doppelten Reihen in der Mitte des Kuchens angeheftet.

Jcosandria Monogynia (Familie Myrteen.)

1. *Glaphyria nitida* Jack. Glänzende Glaphyrie.

Ein Baum in Sumatra wildwachsend, mit umgekehrt-eiförmigen, glänzenden Blättern.

2. *Glaphyria sericea* Jack. Seidenhaarige Glaphyrie.

Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden am meisten durch lanzettförmige, langgespitzt-seidenhaarige Blätter. Beide scheinen in Deutschland jetzt noch unbekannt zu seyn, denn ich finde sie in keinem mir bekannten Pflanzen-Cataloge angezeigt.

Glaucium Tournef. Hornmohn.

Character genericus f. 1. Nachtr. B. 3. S. 506.

Kelch zweiblättrig. Corolle 4blättrig. Narbe zweilappig. Kapsel schotenartig 2 (3—4) fächerig. Saamen mehrere auf einem schwammigen Kuchen sitzend.

Polyandria Monogynia (Familie Papavereae Mohnarten.)

1. *Glaucium luteum* Scopol. Smith. Hierher gehört *Chelidonium Glaucium* Linn. f. Lexic. *Glaucium fulvum* Sm. f. 1. Nachtr. ist nur als eine Varietät zu betrachten.

2. *Glaucium phoeniceum* Smith f. *Chelidonium corniculatum* Lexic. 2. Aufl.

3. *Glaucium rubrum* Smith. Rother Hornmohn.

Stengelblätter fiederspaltig, eingeschnitten, wie der Stengel behaart. Corollenblätter roth. Schote zottenhaarig. Vaterl. Griechenland und Kleinasien. ☉ ☾ Frl.

4. *Glaucium mesopotamicum* Spr. Mesopotamischer Hornmohn.

Roemeria bivalva Candolle.

Stengel mehr oder weniger ästig, mit scharfen Borsten besetzt. Blätter doppelt fiederspaltig. Einschnitte lineenförmig. Schote meist gekrümmt, mit Borsten bekleidet, zweilappig. Vaterl. Mesopotamien (Landschaft in Asien.)

5. *Glaucium refractum* Steven. Zurückgekrümmter Hornmohn.

Blätter doppelt, fiederspaltig. Einschnitte stumpflich. Blumenstiele zur Zeit der Fruchtreife zurückgekrümmt. Schote glatt, fast vierlappig. Vaterl. das nördliche Persien.

6. *Glaucium violaceum* Smith (*Roemeria hybrida* Cand.) Hierher gehört *Chelidonium hybridum* Linn. f. Lexic.

Glecoma (Glechoma) Lexic. Gundermann.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. und Lexicon B. 4. S. 373.

Didynamia Gymnospermia (Familie Labiaten.)

1. **Glechoma indicum** Spr. (Gl. hindostana Roth.)

Blätter rundlich-herzförmig, gefeibt, wie der Stengel be-
haart. Blumenstiele winkelftändig, doldentraubig. Kelche
mit langen Graunen versehen. Vaterl. Ostindien. 4?

Synonymen.

Glechoma erecta Roxb. ist **Calamintha nepetoides**
Don.

— **grandiflora** Cand. ist **Stachys corsica** Pers.

— **hirsutum** Kitaib. f. 1. Nachtr. ist Gl. hede-
raceum Var.

— **magnum** Merat ist Gl. hederaceum Var.

Glechom Sprengel. Syst. veg. IV. Curae posteriores
p. 222. Poley.

Kelch röhrig, fünfzählig, die Mündung sehr zottenhaarig.
Corolle rachenförmig, zweilippig. Oberlippe gewölbt, der
Echlund mit seitenständigen Zähnen versehen. Unterlippe un-
getheilt.

Didynamia Gymnospermia (Familie Labiaten, Lip-
penblumen.)

1. **Glechom thymoides** Spr. Thymianartige Poley.

Stengel staudenstrauchig, aufrecht. Blätter umgekehrt-ey-
förmig, stumpf, gezähnt, geadert, glattlich. Blumen fast
einzeln, winkelftändig, fast stiellos. Vaterl. Südamerika, am
Flusse Rio grande. h

Kultur. Gute lockere leichte Erde und einen warmen
Standort. Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge in
warmen Beeten.

Gleditschia Linn. Gleditschie f. Lexic. B. 4 S. 374.

Character genericus f. 1. Nachtr. B. 3. S. 608.

Polygamia. (Familie Hülsenpflanzen.) "

1. **Gleditschia brachycarpa** Pursh. (Gled. triacantha
ß. Michx.)

Ein Baum, dessen Aeste mit dicken kurzen bogenförmigen
Dornen besetzt sind, die meist zu 3 beisammen stehen. Blät-
ter gefiedert. Blättchen länglich, stumpf. Hülsen kurz. Va-
terl. Virginien. h

2. *Gleditschia ferox* Desfont. Sehr dornige Gleditschie.
Gleditschia macrantha Willd. Baumzucht.

Aeste sehr dornig. Dornen winkelförmig, dreispaltig, zusammengedrückt, keulenförmig verdickt. Blätter gefiedert. Blättchen lanzettförmig, fast sägeartig gezähnt. Hülsen spiralförmig gedreht. Vaterl. Carolina. ♀

Die Kultur der Gleditschien, in Beziehung auf Standorter und Fortpflanzung durch Saamen u. habe ich im Verikon B. 4. angegeben. Auf gleiche Weise können auch die vorstehenden zwei neuen Arten behandelt werden.

- Gleichenia* Smith. Gleichenie s. Lexic. B. 4. S. 379.

Fruchthäuschen (Kapseln) auf der Rückseite des Laubes zu 3—4 beisammen sitzend, gleichsam eingesenkt, ohne Schleichen (Deckhaut) mit einem breiten gestreiften Ring oder Streifen umgeben, der fast den ganzen Umfang einnimmt (Abbild. Schraders neues Journal B. 1. S. 2. t. 3. f. 14.)

Cryptogamia Sectio 1. (Gleichenaeae) Farrenkräuter.

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines berühmten Naturforschers des Hrn. Wilhelm Friedrich v. Gleichen genannt Rußwurm, Herr auf Greifenstein u. Er ward in Bayreuth den 14. Januar 1717 geboren und nach einer sehr vernachlässigten Erziehung wurde er in seinem 15ten Jahre in das adeliche Cadetencorps in Dresden aufgenommen. Er lernte Ledermüllers mikroskopische Augen- und Gemüthsbergung kennen, welche in ihm die Lust zur Beobachtung der Natur erweckten. Mit Eifer trieb er nun die mikroskopischen Untersuchungen und lieferte einige sehr schätzbare Werke, auch über Befruchtung der Blumen († den 16. Juni 1783.)

Mit der Gattung *Gleichenia* Sm. hat Kurt Sprengel (Syst. veg.) *Mertensia* Willd. vereinigt und folgende Arten aufgeführt.

† Frönde simplici Laub (Wedel) einfach.

1. *Gleichenia nervosa* Spr. (*Mertensia nervosa* Kaulf.)

Laub (Wedel) gepaart, gefiedert. Blättchen linsenförmig, stumpf, unten rostfarbig-silzig. Kapseln meist zu 6 sitzend. Vaterl. Brasilien. 4

2. *Gleichenia Speluncae* R. Brown. Prod. Nov. Holl.

Laub einfach, gabelförmig gefiedert. Blättchen fiederspaltig, glatt, unten grau- oder blaulich-grün, die Einschnitte halbkreisförmig, häutig. Kapseln zu 3 stehend, hervorragend. Vaterl. Neuholand. 4

3. *Gleichenia japonica* Spreng. (*Mertensia glauca* Sw.)

Hierher gehört *Polypodium glaucum* Thunb. f. Lexic.

N. 7. S. 426. Kapseln zu 4—6 beisammen stehend.

†† Fronde dichotoma: gemmis in dichotomia abortivis vel proliferis. Laub gabelsförmig getheilt, die Knospen in den Theilungswinkeln fehl-
schlagend oder sprossend.

a. Laub glatt.

4. *Gleichenia javanica* Spr. (*Mertensia laevigata* Willd.)

Laub gefiedert, glatt, glänzend, auf beiden Seiten einsar-
big. Blättchen linien-lanzettförmig, herablaufend. Der ge-
meinschaftliche Blattstiel unten an beiden Seiten mit Spreu-
blättchen besetzt. Fruchthäuschen in 2 Reihen. Vaterl. Java,
an schattigen feuchten Orten. 4

5. *Gleichenia truncata* Spr. Abgestuzte Gleichenie.

Mertensia truncata Willd. M. obtusa Desv.

Laub gefiedert, glatt, einsarbig. Blättchen linien-lanzett-
förmig, an der Spitze abgestuzt, herablaufend. Fruchthäuschen
zwei Reihen bildend. Vaterl. Java, 4

6. *Gleichenia flagellaris* Spr. (*Mertensia flagellaris*
Bory. Willd.)

Stunk zweitheilig, mit Spreublättchen bekleidet, Laub
gefiedert, glatt, unten grau- oder blau-grün. Blättchen li-
nien-lanzettförmig, herablaufend. Vaterl. Mascaren-Ins-
sel. 4

7. *Gleichenia lanigera* Don. Wollige Gleichenie.

Stunk und Aeste mit brauner Wolle bekleidet. Laub ga-
belstg. Blätter tief fiederspaltig, glatt, unten grau-grün.
Einschnitte linienförmig, nachaderig, am Rande zurückgerollt,
an der Spitze ausgekerbt. Vaterl. Nepal. 4

8. *Gleichenia pedalis* Spr. (*Mertensia pedalis* Kaulf.)

Stunk gabelsförmig getheilt, fast zweischneidig, oben spreu-
ig. Knospen fast sprossend. Laub gepaart, tief, fiederspalt-
ig, glatt, grau-grün. Einschnitte linienförmig, am Rande
zurückgerollt. Vaterl. Chili und Guinea. 4

9. *Gleichenia pectinata* Presl. Kammförmige Gleichenie. 4

Mertensia pectinata Willd. Spec. pl. V. p. 73.

Stunk zweitheilig, walzenrund. Laub gepaart, glatt. Knos-
pen gestielt. Blättchen wechselnd stehend, linien-lanzettförmig,
an der Spitze stumpf-eingedrückt. Fruchthäuschen zwei
Reihen bildend. Vaterl. Neugranada. 4

10. *Gleichenia Hermanni* R. Br. Prodr. Fl. nov. Holl.
Mertensia dichotoma Sw. Willd. Hierher gehört *Polypodium dichotomum* Forst. Thunb. f. Lexic. B. 7.
 S. 424. Waterl. Neuseeland, Neuholland, Japan. 4
11. *Gleichenia nitida* Presl. Glänzende Gleichenie.
 Strunk ästig, oben rostfarbig = filzig, die letzten Aeste mit
 zwei Reihen Stottenhaaren besetzt. Laub zweitheilig, sprossend.
 Blätter fiederspaltig, oben glatt, glänzend. Einschnitte liniens-
 förmig, ausgekerbt. Kapseln gehäuft. Waterl. Mexiko. 4
12. *Gleichenia rupestris* R. Br. Felsen-Gleichenie.
 Laub doppelt gefiedert, unten graugrün. Einschnitte rund-
 lich, lederartig, am Rande zurückgerollt. Kapseln zu 3—4,
 fast hervorragend. Waterl. Neuholland, an Felsen. 4
13. *Gleichenia polypodioides* Swartz. (*Osmunda poly-
 podioides* Linn.)
Gleichenia glauca Sw. et *argentea* Kaulf. sind Va-
 rietäten.
 Strunk zweitheilig, sprossend. Laub doppelt gefiedert, unten
 grau = oder blaulich = grün. Blättchen linienförmig. Einschnitte
 eiförmig, stumpflich. Der gemeinschaftliche Blattstiel fast fil-
 zig. Kapseln zu 3—4, eingesenkt. Waterl. Kap. d. g. Hoff-
 nung. 4
14. *Gleichenia alpina* R. Br. Alpen-Gleichenie.
 Strunk zweitheilig, sprossend. Laub doppelt gefiedert, glatt.
 Einschnitte freisrund, unten gewölbt. Der gemeinschaftliche
 Blattstiel filzig, die besondern schuppig. Waterl. Neuholland
 (van Diemenland) auf Alpen, an Felsen. 4
15. *Gleichenia dicarpa* R. Br. Zweifrüchtige Gleichenie.
 Strunk zweitheilig. Laub doppelt gefiedert. Einschnitte
 freisrund, unten gewölbt, gerändert. Fruchthäuschen zu zwei
 beisammen sitzend. Waterl. van Diemenland. 4
16. *Gleichenia microphylla* R. Br. Kleinblättrige Gleis-
 chenie.
Gleichenia circinata Swartz. Gl. semivestita La-
 bill.
 Strunk zweitheilig, ausgesperret. Laub doppelt fiederspaltig,
 glatt. Einschnitte rundlich, am Rande zurückgerollt. Der
 gemeinschaftliche Laubstiel behaart. Kapseln zu 3—4, hervor-
 ragend. Waterl. Neuholland; Neu-Caledonien. 4
17. *Gleichenia furcata* Spr. Gabelförmige Gleichenie.
Acrostichum furcatum Linn.

***Polypodium furcatum* Swartz. *Mertensia* Willd.**

Stumpf aufrecht, 2—3 Fuß hoch, gabelförmig getheilt, mit braunen Spreublättchen bedeckt. Laub gefiedert, glatt. Blättchen wechselnd stehend, linien-lanzettförmig, stumpflich, ganzrandig, grün, die untersten abgekürzt. Kapseln zerstreutstehend = zweireihig, hervorragend. Vaterl. Ostindien; Jamaika. 4

18. *Gleichenia glaucescens* Kaulf. Grauliche Gleichenie.

Mertensia glaucescens Willd. Spec. pl. V. p. 72.

Stumpf aufrecht, 2 — 3 theilig, glatt, glänzend gelblich, 2 Fuß hoch, in den Theilungswinkeln mit kleinen länglichen braunen zottenhaarigen Knospen versehen. Laub gefiedert (doppelt fiederspaltig). Einschnitte länglich-liniensförmig, ausgeleert, unten graulich = grün. Kapseln zu 1—8 beisammen stehend. Vaterl. Neugranada. 4

19. *Gleichenia muricata* Kaulf. Weichstachelige Gleichenie.

Stumpf zweitheilig, wie die Laubstiele weichstachelig. Laub doppelt gefiedert, glatt. Blättchen alle herablaufend, unten graugrün. Kapseln meist zu 3 stehend, hervorragend. Vaterl. Insel Mascaren. 4

20. *Gleichenia remota* Spr. (*Mertensia remota* Kaulf.)

Laub gabelästig. Aeste sprossend. Blätter doppelt gefiedert, unten graugrün. Blättchen entfernt stehend, liniensförmig. Vaterl. Brasilien. 4

b. Laub filzig.

21. *Gleichenia flabellata* R. Br. Fächerförmige Gleichenie.

Stumpf an der Basis spreuig, Laub zweitheilig, sprossend, fächerförmig. Blättchen tief fiederspaltig, unten filzig. Einschnitte linien-lanzettförmig, fast sägerandig. Kapseln zu 4—6 hervorragend. Vaterl. Neu-Caledonien. 4

22. *Gleichenia tenera* R. Br. Zärtliche Gleichenie.

Stumpf und Laubstiele spreuig. Laub gabelästig, sprossend, fiederspaltig, unten wenig zottenhaarig. Einschnitte liniensförmig, ganzrandig, ausgesperrt. Kapseln zu 3—5 hervorragend. Vaterl. Neuholland. 4

23. *Gleichenia tomentosa* Spr. Filzige Gleichenie.

Mertensia tomentosa Willd. Sp. pl. V. p. 75.
Swartz Synops. filic. 164.

Stumpf und Spindel spreuig. Laub gabelästig, gabelförmig getheilt, sprossend, gefiedert, unten filzig-zottenhaarig.

Einschnitte linienförmig, stumpflich. Kapseln meist zu 4 stehend, hervorragend. Vaterl. Peru; Brasilien. 24

24. *Gleichenia pubescens* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. p. 1.

Gleichenia tenuis Presl.

Martensia pubescens Willd. Spec. pl. V. p. 73.

Stunk zweitheilig, unten glatt, glänzend, braun, oben weiß = filzig, 2 Fuß hoch. Laub dreifach = zweitheilig. Blättchen tief fiederspaltig. Einschnitte breit, linienförmig, stumpf, oben glatt, unten graulich = filzig, schuppig. Kapseln meist zu 4 stehend. Vaterl. Neugranada und Brasilien. 24

25. *Gleichenia revoluta* Kunth J. c. I. p. 29. Zurückgerollte Gleichenie.

Mertensia ferruginea Desv.

Stunk glatt. Laub vierfach = zweitheilig, tief fiederspaltig, unten graugrün. Einschnitte länglich, stumpf, am Rande zurückgerollt, die Rippen oben filzig, unten rostfarbig = schuppig gefranzt. Vaterl. Cayenne, Quito. 24

26. *Gleichenia brasiliensis* Spr. Brasilische Gleichenie.

Mertensia brasiliensis Desv. M. canescens Kaulf.

Stunk an der Basis scharf. Laub zweitheilig. Nester zweischneidig. Blätter gepaart, tief fiederspaltig. Einschnitte länglich = linienförmig, unten graugrün, rostfarbig = filzig. Vaterl. Brasilien. 24

27. *Gleichenia bifida* Spr. Zweispaltige Gleichenie.

Stunk zweispaltig, fast filzig. Laub gefiedert, unten weiß = filzig. Blättchen linien = lanzettförmig, herablaufend, an der Spitze abgestutzt. Vaterl. Neugranada. 24

28. *Gleichenia immersa* Spr. (*Mertensia immersa* Kaulf.)

Laub zweitheilig, ästig, sprossend. Blätter tief fiederspaltig, unten rostfarbig = filzig. Einschnitte linienförmig. Kapseln zu 4 filzig, eingesenkt. Vaterl. Brasilien. 24

Kultur; Die meisten Gleichenien kommen aus Tropenländern und verlangen in unsern Gärten warme Standörter; die in Neuholand einheimischen Arten nehmen auch mit Durchwinterung im Glashause vorlieb. Sie lieben alle leichte gute Dummerde, Wald- oder Heideerde. Fortpflanzung und Vermehrung durch Samen und Wurzeltheilung.

Glinus Linn. Glinus f. Lexic. B. 4. S. 380.

Reich fünfblättrig, fast corollinisch. Fünf Nectarborsten, die

an der Spitze gespalten sind und sich von den Staubfäden unterscheiden. Kapsel fünffächerig, vielSaamig.

Dodecandria Pentagyni. 11. (Familie Nigoiden.)

1. *Glinus trianthemoides* Roth. Ostindischer Glinus.

Stengel krautartig, mehr oder weniger ästig, wie die Blätter glatt. Blätter umgekehrt-eiförmig. Blumen rispenständig. Vaterl. Ostindien.

2. *Glinus mozambicensis* Spr. (*Miltus africana* Lour.)

Stengel staudenstrauchig, wie die Blätter glatt. Blätter länglich-umgekehrt eiförmig, fast stiellos. Blumenstiele gehäuft, seitenständig. Vaterl. die Insel Mozambique im östlichen Afrika. h

Kultur: Gute lockere Dammerde. Fortpflanzung durch Saamen in warmen Beeten. N. 2. auch durch Stecklinge.

Globba Linn. f. Lexic. B. 4. S. 381. Globbe.

Kelch dreispaltig. Corolle einblättrig, der äußere und innere Rand dreitheilig; der unterste Einschnitt lippenförmig. Ein sehr langer Staubfaden mit zwei seitenständigen halbmondförmigen Lappchen versehen. Anthere doppelt, mit Anhängen oder nackt. Ein fadenförmiger Griffel mit verdickter Narbe. Kapsel dreifächerig, vielSaamig.

Monandria Monogynia (Familie Scitamineen.)

1. *Globba orixensis* Roxb. corom. 3. t. 29. Orixenische Globbe.

Wurzel fast fleischig. Stengel 2—3 Fuß hoch, oben blättrig, unten mit Scheiden besetzt. Blätter länglich, langgespitzt, 8—10 Zoll lang, 2—4 Zoll breit. Blumen stiellos, mit Bracteen versehen, in eine längliche aufrechte Endrispe gesammelt. Corollenröhre wenig gekrümmt, der obere Einschnitt des Randes größer als die untern, fast aufrecht, vertieft (hohl). Lippe zweilappig, groß, pomeranzenfarbig. Anthere nackt. Kapsel warzig. Vaterl. Ostindien, in Thäälern. D. ?

2. *Globba Hura* Roxb. Malaccanische Globbe.

Gl. versicolor Smith Exot. botan. t. 117. f. a. c.

Gl. Koenigiana Spr. Syst. veg. IV. Cur. pos p. 8.

Hura siamensium Koenig apud Retz. obs. 3. p. 49.

Wurzel knotig. Stengel fast aufrecht. Blätter länglich-eiförmig, glatt, untere gespitzt, obere langgespitzt. Blumenstauhe einfach. Bracteen länglich-eiförmig, gespitzt, hinfällig.

fig. Corolle goldgelb. Die Röhre dünn, fadenförmig, die Einschnitte des Randes länglich-eyförmig gespißt. Lippe zweitheilig, fast ausgehöhlt, abstehend. Anthere häutig gekrönt. Vaterl. Seylon und Malacca. 4

3. *Globba racemosa* Smith exot. bot. 2. t. 117. Traubenblüthige Globbe.

Stengel aufrecht, 3 Fuß hoch und höher. Blätter länglich-eyförmig, filzig. Blatthäutchen gespalten, stumpf. Blumenstielen an der Spitze verdickt, 2—3 blüthig, eine gipfelständige aufrechte Traube bildend. Bracteen länglich, stumpf, abfallend. Kelch grün roth punkirt. Corolle gelb = pomeranzenfarbig. Einschnitte zurückgeschlagen. Der Staubfaden mit pfeilförmigen Lappchen versehen. Vaterl. Nepal. 4 Blüth. Sommer.

4. *Globba pendula* Roxb. corom. 3. t. 282. Hängende Globbe.

Wurzel ästig, faserig. Blätter lanzettförmig, glatt. Scheiden filzig. Trauben gipfelständig, zusammengesetzt, viel länger als die Blätter, hängend. Blumen eyförmig. Corollenröhre dünn, lang. Lippe keilförmig, gespalten, gelb. Anthere mit zwei Sporen versehen. Vaterl. Ostindien. (Insula Pula-Pinang.) 4

5. *Globba Careyana* Roxb. ind. 1. p. 77. Loddig. Bot. Cabin. 691.

Wurzel knollig. Stengel, mehrere aus einer Wurzel, 2 Fuß hoch, überall mit Blattscheiden bedeckt. Blätter fast stiellos, ey-lanzettförmig, langgespißt. Trauben zusammengesetzt, gipfelständig, zwiebelutragend. (Knollchen) Corolle fast zottenhaarig, dunkelgelb. Die Einschnitte des äußern Randes eyförmig, an den Seiten zurückgeschlagen, die des innern 2 hängen an der Spitze gekrümmt. Lippe zurückgeschlagen, gespalten. Anthere fast kreisrund, nackt. Vaterl. Pegu. 4

6. *Globba saltatoria* Roscoe mon. pl. t. 16.

Gl. purpurea Andrew, Repos. t. 117.

Gl. subulata Roxb. ind. 1. p. 78.

Gl. radicalis Roxb. Corom. 3. t. 250.

Mantisia saltatoria Sims. Bot. Mag. 1320.

Wurzel fleischig, faserig. Blumentraube oder Rispe wurzelständig, 8—12 Zoll lang, aufrecht, an der Basis mit pyramidenförmigen Scheiden besetzt. Blumen einzeln, wechselt-

weise stehend, ansehend. Bracteen einzeln, länglich-eiförmig, gespitzt, häutig, purpur-violet oder blaulich, so lang als die Blume oder etwas länger. Corolle dünnröhrig, der äußere Rand purpurviolet, der obere Einschnitt aufrecht, die seitenständigen zurückgeschlagen. Lippe keilsförmig, zweitheilig, gelb-pomeranzensfarbig, hervorragend. Der Staubfaden mit zwei pirimenspizigen und die Anthere mit zwei halbmondförmigen, purpur-violeten Flügeln versehen. Nach geendigter Blühzeit erheben sich aus der Wurzel krautartige dünne Stengel 2 Fuß hoch. Blätter wechselnd stehend, länglich-linien-lanzettförmig, lang und feingespitzt, gerippt-gestreift, fast filzig, 6—9 Zoll lang. Vaterl. Ostindien, in Wäldern, in der Provinz Chittagon. 4 Blüh. im hiesigen bot. Garten im warmen Hause Januar — März.

7. *Globba spathulata* Roxb. ind. 1. p. 80. Spatelförmige Globbe.

Mantisia spathulata Roem. et Schult. Syst. veg. Mant. 1. p. 49.

Rispe wurzelständig, aufrecht, 8—12 Zoll lang, wie die Bracteen himmelblau. Corollenröhre dünn, gekrümmt, zottenhaarig. Lippe wie bei vorhergehender Art gelb, aber weniger getheilt. Die Flügel an den Staubfäden spatelförmig, die an der Anthere halbmondförmig. Vaterl. die Provinz Silhet in Ostindien. 4

8. *Globba sessiliflora* Sims. Bot. Mag. 1428. Stiellose Globbe.

Blätter länglich, langgespitzt, glatt. Aehre fast quersförmig, gipfelständig. Bracteen lanzettförmig, gewimpert. Anthere mit herzförmigen Lappchen versehen. Am Stengel an der Blumenähre bilden sich kleine winkelfständige Knöllchen, daher ist zu vermuthen, daß *Globba bulbifera* Roxb. hierher gehört, oder nur als Varietät zu betrachten ist. Vaterl. Pegu. (Sims) in Circars (Roxb.) 4

9. *Globba cuspidata* Nees et Martius N. Act. Felsenspitze Globbe.

Wurzel büschelförmig. Stengel 1—2 Fuß hoch, und höher, schief aufsteigend. Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, glatt, nur unten an der Mittelrippe filzig. Aehre klein, ansehend, von der Blattscheide umschlossen. Bracteen eif-lanzettförmig, feingespitzt. Blumen safrangelb. Vaterl. Brasilien. 4

10. *Globba parviflora* Presl. Kleinblumige Globbe.

Wurzel spindel-fadenförmig. Stengel aufrecht, 1—2 Fuß hoch. Blätter stiellos, lanzettförmig, häutig, 4—5 Zoll lang, mit gestreiften Scheiden. Rippe gipfelständig, 2—3 Zoll lang, eiförmig, die Aeste vielblümig, abstehend. Blumenstielchen sehr kurz, einblümig. Bracteen eiförmig, sehr zart, häutig, weiß. Blumen klein, nur 3 Linien lang. Corolle gelblich. Anthere mit 2 Pappchen versehen. Kapsel oval, fast kugelig. Waterl. Portum Sorzagon in Insula Luzon. 4

11. *Globba subsessilis* Nees et Mart. N. Act. Fast stiellose Globbe.

Stengel sehr kurz, kaum 2 Zoll lang. Blätter eiförmig, langgespitzt, filzig, an der Basis keilförmig. Scheiden geschligt. Blumen groß, blaßgelb, eine stiellose Aehre bildend, von Blattscheiden umschlossen. Bracteen filzig. Waterl. Brasilien.

Kultur: wie andere Scitamineen, die aus Tropenländern kommen, siehe *Alpinia* im 1. B. Lexic. 2. Aufl. S. 319. *Hedychium* 2. Nachtr.

Synonymen.

Globba bulbifera Roxb. f. *Globba sessiliflora* N. 8.

- *erecta* Red. ist *Alpinia calcarata* Rosc.
- *Koenigiana* Spr. f. *Globba Hura* N. 2.
- *purpurea* Andr. f. *Globba saltatoria* N. 6.
- *radicalis* Roxb. f. *Globba saltatoria* N. 6.
- *subulata* Roxb. f. *Globba saltatoria* N. 6.
- *versicolor* Smith. f. *Globba Hura* N. 2.

Globifera umbrosa Pers. f. *Micranthemum orbiculatum* 1. Nachtr.

Globularia Linn. Kugelblume. f. Lexic. B. 4. S. 382.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 510.

Gemeinschaftliche Hülle ziegelschuppig. Fruchtboden mit Spreublättchen besetzt. Kelch fünfspaltig, bleibend. Corolle unregelmäßig, fünfspaltig. Saamen in Kelch geschlossen.

Tetrandria Monogynia (Familie Globularineen.)

1. *Globularia linifolia* Lamarck. Flachtblättrige Kugelblume.

Globularia vulgaris Brot.

Stengel sehr einfach. Wurzelblätter spatelförmig, dreizählig. Stengelblätter liniensförmig. Blume kugelig. Vielleicht

nur eine Varietät von *Globularia vulgaris* L., deren Wurzelblätter oft dreizählig, die Stengelblätter aber lanzettförmig sind und dadurch am meisten von *Glob. linifolia* Lam., die in Spanien und Portugal wild wächst, zu unterscheiden ist.

2. *Globularia bellidifolia* Tenor. Matliebenblättrige Kugelblume.

Stengel strauchig, kriechend. Blätter keilförmig, gefleht. Blumenstiele nackt. Vaterl. Kalabrien. \bar{h} Gish.

Globularia salicina Lam. ist *Glob. longifolia* Ait. f. Lexic. B. 4.

Glochidion ramiflorum Forst. f. *Bradleya Glochidion* Li Nachtr.

Glonium bellatum Mühlenb. Schweinitz ist *Solenarium byssoideum* Spr.

Gloriosa Linn. Prachtlilie. f. Lexic. B. 4. S. 366. Nebst Anleitung zur Kultur.

Corolle sechsblättrig, die Blätter lang, wellenrandig, zurückgeschlagen. Staubfäden 6, abstehend. Griffel niedergebogen. Narbe dreilappig. Kapsel dreifächerig. Saamen kugelförmig.

Hexandria Monogynia (Familie Coronarien. Gruppe Liliaceen.)

1. *Gloriosa virescens* Lindl. Bot. Mag. 2539. Grünliche Prachtlilie.

Stengel krautartig. Blätter an der Spitze mit einer Ranne. Blumenstiele hängend. Corollenblätter nur an der Spitze wellenrandig. Vaterl. Senegambien. 4 Kultur wie *Glor. superba* f. Lexic.

Gloriosa simplex Don. ist nur eine Varietät von *Gl. superba* L.; sie unterscheidet sich bloß durch schmalere Blätter. Vaterl. Nepal.

Gloscomia tenera Don. ist *Campanula thalictrifolia* Spr.

Glossarrhen Martius Nova gen. et Spec. Pl. Fass. 2. p. 21.

Kelch fünfblättrig, die zwei innern Blätter kleiner als die übrigen. Corolle fünfblättrig, unregelmäßig; das fünfte untere Blatt ist größer als die übrigen, an der Basis zweischneidig, gespornt. Staubfäden 5, häutig, gespißt, zwei an der

Basiss mit Lappchen versehen (gespornt.) Kapsel einfächerig, dreiflappig, viel-saamig.

Pentandria Monogynia (Familie Jambien)

1. *Glossarrhen floribundus* Mart. Jc. Fass. 2. p. 22. t. 15.

Ein sehr ästiger Strauch, 3—5 Fuß hoch, mit grauer rissiger Rinde. Aeste abstehend, in der Jugend braun-rosfarbig, fast knieartig gebogen. Blätter wechselnd stehend, kurzgestielt, länglich-lanzettförmig, an der Basis verdünnt, keilförmig, ganzrandig, nur von der Mitte bis zur Spitze sägerandig, 1—2 Zoll breit. Die Blattstiele an der Basis mit gepaarten Aestblättern besetzt. Blumenstiele einzeln, winkelförmig, fadenförmig, einblüthig, in der Mitte mit zwei kleinen lanzettförmigen, ganzrandigen Bracteen besetzt. Blume überhängend, so groß wie die der *Vio:la odorata hortensis*. Corolle weiß, fünfblättrig, die obersten Blätter klein, viel kürzer als der Kelch; das unterste groß, lippenförmig erweitert, hinten spornförmig verlängert, weiß mit purpurrothen Adern geziert, in der Mitte gelb mit zwei kleinen bartigen Schwielen. Die drei obern Staubfäden mit Anhängen oder Fortsätzen versehen. Antheren länglich, zweifächerig. Griffel einfach, oben verdickt. Narbe mondförmig-zweiflappig. Kapsel eiförmig, einfächerig, dreiflappig, die Saamen an den Klappen angeheftet. Vaterl. Brasilien in Waldbergen. ♀ Blüth. Septemb. — Oktob.

2. *Glossarrhen pauciflorus* Mart. J. c. Fass. 2. p. 23.

Diese Art gleicht der vorigen, ist aber in allen Theilen kleiner, der Strauch niedrig und hat hängende Aeste. Blätter spatelförmig, stumpf, gekerbt-gesägt, an der Basis lang verdünnt. Blumenstiele winkelförmig. Vaterl. Brasilien, an schattigen, steinigten Orten, am Flusse Itahype, in der Provinz Bahiensis. ♀ Blüth daselbst im Dezember.

Kultur: Leichte gute Dammerde, Wald- oder Heideerde mit Sand und etwas Lehm (von alten Wänden zc.) gemischt, und warme Standörter. Fortpflanzung durch Stecklinge und Saamen in warmen Beeten.

Glossapis Spreng. Syst. veg. III. p. 675. (*Glossula* Lindley.)

Blumenblätter gewölbt. Lippe dreitheilig, an der Basis mit dem Griffelsäulchen verbunden, die seitenständigen Einschnitte

schnitte sehr lang, fadenförmig. Der Sporn aufgeblasen, oval. Pollenmasse einfach, drüsig.

Gynandria Monandria (Familie Orchideen.)

1. *Glossapis tentaculata* Spr. J. c. III. p. 694.

Wurzel knollig. Wurzelblätter länglich, gerippt. Schaft mit Schuppen besetzt. Blumen ährenständig, weiß-grünlich. Vaterl. China. 4 Blühz. Sommer. Kultur: leichte Erde Kreibh. oder Glash.

Glossodia R. Brown. Prodr. Fl. Nov. Holl.

Character generic. f. I. Nachtr. B. 3. S. 512.

Blumenblätter 5, gleich, abstehend. Lippe kurz, ungetheilt, Anhänge zwischen der Lippe und dem Griffelsäulchen, dessen häutige, ausgebreitete Spitze die Anthere trägt. Pollenmasse 2, zusammengedrückt.

Gynandria Monandria (Familie Orchideen.)

1. *Glossodia major* R. Br. J. c. Große Glossodie.

Zwiebel rundlich, ungetheilt, oft nur ein Blatt treibend, welches an der Basis mit einer umfassenden Scheide versehen und wie der Schaft mehr oder weniger zottenhaarig ist. Schaft ein, selten 2—3 blümig. Blume blau. Der Anhang zwischen Lippe und Griffelsäulchen halb zweitheilig, die Lappen abstehend, gelappt, fast wie eine Schlängenzunge gebildet. Vaterl. Neuhollland. 4 Glash.

2. *Glossodia minor* R. Br.

Diese Art gleicht der vorhergehenden, ist aber in allen Theilen kleiner und noch überdies durch den zweitheiligen Anhang zwischen Lippe und Griffelsäulchen, dessen Einschnitte parallel stehen und stumpf sind, zu unterscheiden.

Beide Arten kommen aus Neuhollland, sind krautartige perennirende Pflanzen und nehmen in unsern Gärten mit Durchwinterung im Glashause vorlieb. In Hinsicht auf Boden und Fortpflanzung behandelt man sie wie andere ausländische Orchideen, die in ihrer Wildniß in der Erde (nicht auf Baumstämmen) wachsen.

Glossostemon Desfont. Calyx 5partitus. Petala 5. Ligulae 5 petaloideae lateribus staminiferarum, antheris reniformibus stigma 5fidum. Caps. 5locularis echinata, loculis polyspermis Syst. Veg. cur. Spr. III. p. 331.

Polyadelphia (Familie Tiliaceae.)

1. *Glossostemon Bruguierii* Desf.

Detr. Ber. ar. Nachtr. IV. Bd.

W

Stamm krautig. Blätter groß, rundlich, eilig = gezähnt, scharfborstig, fünfrippig. Blumen rosenroth, in reiche Doldentrauben gesammelt. Kelch fünfstheilig. Corolle fünfblättrig. Fünf zungenförmige, den Corollenblättern ähnliche Lappen, die Staubfäden tragend. Antheren nierenförmig. Narbe fünfspaltig. Kapsel fünffächerig, weichstachlig, die Fächer viel saamig. Vaterl. Asien ? h

Glossula Lindl. f. Glossapis.

Glottidium floridanum Desv. Cand. ist Phaca floridana Willd. f. Lexic. B. 7.

Gloxinia Herit. Glorinie f. Lexic. B. 4. S. 389.

Kelch fünfstheilig. Corolle glockenförmig, der Rand schief, lippenförmig, ungleich, fünfspaltig. Staubfäden 5, davon nur 4 fruchtbare, zusammenhängende Antheren tragen; der fünfte Faden fehlschlagend, d. h. ohne fruchtbare Anthere. Griffel fadenförmig. Narbe stumpf. Kapsel viel saamig, von oben bis zur Mitte aufspringend, zweiflappig.

Didynamia Angiospermia (Familie Bignoniaceen.)

1. *Gloxinia speciosa* Ker. Bot. Reg. 213. Prächtige Glorinie.

Wurzel dick, knollig. Stengel rund, 2—6—8 Zoll hoch, dunkelbraun oder schmutzigroth. Blätter zu 2 einander gegenüberstehend, gestielt, länglich = elliptisch, gekerbt = gezähnt, filzig, unten grau = seidenhaarig. Blumenstiele winkelförmig, filzig, 3—5 Zoll lang, meist aufrecht. Kelchtheile lanzettförmig, langgespitzt, ganzrandig. Corolle 2 Zoll lang, glockenförmig, fünflappig, überhängend, violett, inwendig weiß, purpurroth punktiert. Eine schöne Varietät trägt weiße oder blaßblaue Corollen, inwendig am Grunde violett. Vaterl. Brasilien. 4 Abbild. Reichenb. Magaz. d. ästhet. Bot. Heft 1. t. IV.

2. *Gloxinia macrophylla* Martius. Großblättrige Glorinie.

Gloxinia hirsuta Lindl. Bot. Reg. 1004.

Stengel sehr kurz, fast fehlend. Blätter stiellos, groß, länglich = herzförmig, stumpf, gekerbt, auf beiden Seiten behaart. Kelchtheile gespalzt. Corolle glockenförmig, fünflappig, die Lappen ausgerandet. Vaterl. Brasilien. 4

Die Glorinien verlangen warme Standörter, im Treibhause oder Sommerkasten, denn sie kommen aus Tropenländern. N. 1. behandelt man entweder wie *Gl. maculata* f.

Lexic. und läßt die Wurzel im Winter trocken stehen, oder die Pflanze wird das ganze Jahr hindurch in der Kultur und Wachsthum erhalten, d. h. man besetzt die Erde so oft sie des Wassers bedarf, dann entwickeln sich die Blumen zu verschiedenen Zeiten, vom Februar und März bis im Sommer. *Gl. maculata* Herit. empfiehlt sich durch Anstand und Bildung der lieblichen blaßblauen wohlriechenden Blumen. Kultur s. Lexic. a. a. D.

Glyceria fluitans R. Brown. ist *Festuca fluitans* Linn.
Glyceria repanda Nuttall. ist *Hydrocotyle erecta* Linn.
repanda Pers. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 33.

Glycine Linn. *Glycine* f. Lexic. B. 4. S. 391.
 Character generic. Willd. Enum. f. 1. Nachtrag B. 3.

Kelch vierspaltig, fast gleich, der obere Einschnitt gespalten. Fährchen umgekehrt-eiförmig. Die Flügel an der Basis mit zwei Fährchen versehen. Staubfäden 10, 9 verwachsen 1 frei. Fruchtknoten am Grunde nackt. Hülse länglich, zweisaamig.

Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflanzen.)

Manche Arten, die Linn. Thunb. u. a. unter *Glycine* aufgeführt haben, gehören jetzt andern Gattungen an, s. die Synonymen-Liste am Schlusse dieses Artikels.

† *Folii simplicibus*. Blätter einfach.

1. *Glycine reniformis* Pursh. Nierenförmige *Glycine*.

Trifolium simplicifolium Walt.

Gl. monophylla Michx. Nuttall. *Gl. tomentosa* var.

Stengel krautartig, niedrig, stzig. Blätter nierenförmig, rundlich, nefsförmig geädert. Blumentrauben fast stiellos, wenigblümig. Vaterl. Carolina und Florida.

2. *Glycine simplicifolia* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. VI. p. 419.

Stengel staudenstrauchig, ästig, weisßweißig. Blätter einzeln, linien-lanzettförmig oder herz-lanzettförmig, fast muscronenspitzig, glatt. Blumenstiele kurz, 3—4 blümig. Kelche mit angebrückten Paaren bekleidet. Vaterl. am Orinoko. h Blühz. Mai.

†† *Folii ternatis*. Blätter dreizählig.

A. Stengel strauchig oder staudenstrauchig.

Hierher gehören die im Lexikon beschriebenen Arten:

Glycine picta Vahl. *G. cana* Willd. *G. caribaea*,
angustifolia Jacq. *G. reticulata*, *phaseoloides* Swartz
 und folgende.

3. *Glycine glabra* Spr. Glatte Glycine.

Stengel strauchig. Blätter dreizählig. Blättchen lanzett-
 förmig, lederartig, oben glatt, nehaderig, unten grau-braun-
 lich. Blumentrauben gestielt, länger als die Blätter. Hüls-
 sen glatt. Waterl. Kap d. g. Hoffn. h Blühz. Sommer.

4. *Glycine pondicheriensis* Spr. (*Glyc. monosperma*
 Willd. herb.)

Stengel strauchig, windend. Blättchen rundlich-eyförmig,
 runzlig-nehadrig, auf beiden Seiten etwas zottenhaarig.
 Blumenstiele winkelförmig, verlängert, meist einblümig. Die
 Einschnitte des Kelches stumpf. Hülse einsamig, flzig. Wa-
 terl. Ostindien. h

5. *Glycine rufescens* Willd. Rostfarbige Glycine.

Stengel strauchig, aufrecht, wie die Blätter rostfarbig-zot-
 tenhaarig. Blättchen rundlich-eyförmig, dreirippig. Blumen-
 stiele winkelförmig, dreiblümig. Hülse glatt. Waterl. Ostin-
 dien. h

6. *Glycine viscida* Pers. (*Hedysarum viscidum* Linn.)

Stengel aufrecht, zottenhaarig, oben klebrig. Blättchen
 rundlich-eyförmig, unten zottig. Blumen in verlängerten
 Trauben. Blumenstiele abstehend. Hülsen zottenhaarig-kle-
 brig. Ostindien. h

7. *Glycine atomaria* Willd. herb. Spr. Syst. Veg. III.
 p. 196.

Aeste ausgesperret. Blättchen rundlich-eyförmig, dreirippig,
 unten flzig, schwarz-punktirt. Blumen in sehr langen ge-
 stielten Trauben. Hülsen zottenhaarig. Waterl. Südameri-
 ka. h

8. *Glycine Memnonia* Spr. (*Dolichos Memnonia* De-
 lil.)

Stengel ästig, gewunden. Blättchen umgekehrt-eyförmig,
 mit weißen Zottenhaaren bekleidet. Blumen entfernt stehend,
 lange ährenförmige Trauben bildend. Hülsen länglich. Waterl.
 Aegypten. h

9. *Glycine diffusa* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov.
 gen. et spec. pl. VI. p. 420. t. 572. Weisschweifige
 Glycine.

Stengel strachig, gestreckt, weitschweifig. Blätter dreizählig. Blättchen lanzettförmig, fast mucronenspizig, oben flzig. Blume in kurzen vielblümigen Trauben. Kelche seidenshaarig. Vaterl. Neugranada an Bergen. Blüht daselbst im November. †

10. *Glycine crinita* Kunth J. c. VI. p. 421. t. 573. Langhaarige Glycine.

Stengel staudenstrachig, aufrecht, behaart, die Haare lang, abste hend, weich. Blättchen linien = lanzettförmig, mucronenspizig. Blumen in kurze Trauben gesammelt. Vaterl. Neuandalusien. † Blühz. September.

11. *Glycine pulchella* Kunth J. c. p. 422. Bierliche Glycine.

Stengel staudenstrachig, wie die Aeste und Blätter seidenshaarig = flzig = behaart. Blättchen länglich = lanzettförmig, gespizt, an der Basis gerundet, auf beiden Seiten weich = flzig. Blumenstiele kurz, meist sechsblumig. Kelche weichhaarig. Der *Glycine tomentosa* Mich. sehr nahe verwandt. Vaterl. Neugranada, am Orinoko. † Blühz. Mai, Juni.

12. *Glycine rufo* Kunth J. c. VI. p. 423. t. 574.

Stengel staudenstrachig, aufrecht, wie die Aeste und Blätter mit weichen rostfarbenen Haaren bekleidet. Blättchen fast lederartig, länglich, an beiden Enden gerundet. Blumen in reichen Trauben, die kürzer als die Blätter sind. Diese Art gleicht sehr der *Crotalaria lineata* Lam. Vaterl. Neuandalusien. † Blühz. September.

13. *Glycine Lamarckii* Kunth J. c. VI. p. 424. Lamards Glycine.

Stengel windend. Blättchen gespizt, flzig, punktiert, die seitenständigen rundlich = eysförmig, ungleich, alle dreirippig. Blumen in langen schlaffen Trauben. Kelche flzig, fein punktiert. Hierher gehört *Dolichos minimus* Linn. s. Lexic. B. 3. wird daselbst gestrichen. Vaterl. Insel Cuba, Jamaika. † Blühz. März, April.

14. *Glycine macrophylla* Kunth J. c. VI. p. 426. Großblättrige Glycine.

Stengel windend, Aeste dreieckig, weich = zottenhaarig. Blättchen fast lederartig, zottenhaarig, drüsig = punktiert, dreirippig; das mittlere oder Endblättchen rauten = eysförmig, die seitenständigen ungleich = eysförmig. Blumen in reichen Trauben.

Kelche seidenhaarig. Waterl. Cuba, bei Havannah. ♀ Blüth. März, April.

15. *Glycine malacophylla* Spr. (Gl. mollis Hooker exot. Fl. t. 201.)

Stengel windend. Blättchen eysförmig, spitzlich, zottenhaarig, harzig-punktirt. Blumen in gestielten Trauben, die kürzer als die Blätter sind, das Hähnenchen der Schmetterlingsförmigen Corolle umgekehrt = eysförmig. Waterl. das östliche Afrika. ♀ ?

B. Herbaceae. Stengel krautartig.

16. *Glycine menispermoides* Spr. (R. ynchosia menispermoides Cand.)

Stengel krautartig und windet sich. Blätter dreizählig. Blättchen nierenförmig, flzig. Afterblätter eysförmig. Trauben fast stiellos, wenigblümig. Einschnitte des Kelches lanzettförmig, dreirippig. Waterl. Neuspanien. 4 ?

17. *Glycine elongata* Roth.

Blättchen rundlich, gespitzt. Trauben winkelfständig, fast kopfförmig, kürzer als der Blattstiel. Hülsen behaart, runzlich. Waterl. Ostindien.

18. *Glycine caroliniana* Spr. (Gl. erecta Nuttall.)

Stengel aufrecht. Blättchen umgekehrt = eysförmig, stumpf, seidenhaarig = zottig. Blumentrauben winkelfständig, länger als die Blätter. Waterl. Carolina und Florida.

19. *Glycine rosea* Forst. siehe Lexic. B. 4. S. 400. N. 32. trägt eine große Hülse und soll dieselbe seyn, welche Cooks Mannschaft gegen den Scorbut gebraucht hat und dadurch von dieser Krankheit befreit worden ist. s. Nichotas Reise nach und in Neuseeland. S. 378.

Glycine sagittata Humb. und *Gl. stricta* Linn. Suppl. mit strauchigen gewundenen Stengeln sind noch zweifelhafte Arten. Die erste *Gl. sagittata* trägt einfach pfeilsförmige langgespitzte Blätter, deren Stiele geflügelt und an der Spitze mit zwei Grannen versehen sind; die zweite *Gl. stricta* L. dreizählige Blätter, deren Blättchen länglich-granzottenhaarig sind. Trauben winkelfständig, so lang als die Blätter. Hülsen sehr rauchhaarig. Beide wachsen in Südamerika.

Kultur der Glycinen im Allgemeinen s. Pericon B. 4. Auf gleiche Weise können auch die oben beschriebenen neuen Arten behandelt werden; man pflanzt sie in gute Dammerde

(Laub-, Wald- oder Mistbeeterde, mit Sand und etwas Lehm von alten Wänden gemischt) und vermehrt sie durch die Ausfaat der Saamen in warmen Beeten. Die jungen Pflanzen setzt man einzeln in Töpfe und stellt sie an einen ihrem Vaterlande angemessenen Orte. N. 1. und 18. gedeihen im freien Lande. Die meisten Arten entwickeln ihre lieblichen Blumen im Frühjahr und Sommer.

Synonymen.

Glycine angulosa Mühlenb. Willd. f. Lexic. ist *Phaseolus angulosus* Ort.

— *Apios* Linn. f. Lexic. ist *Apios tuberosa* Pursh.

— *bimaculata* Curt. f. Lexic. ist *Kennedia monophylla* Vent.

— *bituminosa* Linn. f. Lexic. ist *Crotalaria bituminosa* Spr.

— *bracteata et comosa* Linn. ist *Cryptolobus americanus* Spr.

— *chinensis* Curt. ist *Apios chinensis* Spr.

— *clandestina* Wendl. ist *Tetramnus clandestina* Spr.

— *coccinea* Curt. f. Lexic. ist *Kennedia coccinea* Vent.

— *Comtoniana* Andr. f. *Kennedia Comtoniana* Link.

— *erecta* Nutt. f. *Glycine caroliniana* N. 18.

— *frutescens* Linn. f. Lexic. ist *Wistaria speciosa* Nutt.

— *hedysaroides* Willd. f. Lexic. ist *Tetramnus hedysaroides* Spr.

— *labialis* L. suppl. f. Lexic. ist *Tetramnus labialis* Spr.

— *mollis* Hook. f. *Glycine malacophylla* N. 15.

— *monoeca* Linn. ist *Cryptolobus americanus* Spr.

— *monoeca* Schk. ist *Cryptolobus sarmentosa* Spr.

— *monophylla* Michx. et Nutt. f. *Glycine reniformis* N. 1.

— *parviflora* Lam. f. Lexic. ist *Galactia mollis* Michx. f. 2. Nachtr.

- Glycine pentandra* Spr. ist *Tetramnus hedysaroides* Spr.
 — *pulcherrima* Willd herb. ist *Robinia sturensis* Spr.
 — *punctata* Willd. f. Lexic. ist *Turpinia punctata* Pers.
 — *reflexa* Nutt. ist *Glycine caribaea* Jacq. f. Lexic.
 — *rubicunda* Curt. f. Lexic. ist *Kennedia rubicunda* Vent.
 — *sarmentosa* Roth ist *Cryptolobus sarmentosus* Spr.
 — *subterranea* Linn. f. Lexic. ist *Cryptolobus africanus* Spr.
 — *tenuiflora* Willd. f. Lexic. ist *Tetramnus tenuiflora* Spr.
 — *tomentosa* v. f. *Glycine reniformis* N. 1.
 — *umbellata* Mühlenb. Willd. f. Lexic. ist *Dolichos helvolus* Nutt.
 — *vincentina* Ker. ist *Bönninghausia vincentina* Spr.

Glycosmis Correa. *Glycosmis*.

Kelch fünfspaltig. Corolle fünfblättrig. Staubfäden 10, gleich. Narbe einfach. Frucht fleischig, 1—2 fächerig, wodurch sich diese Gattung am meisten von *Limonia* Linn. unterscheidet; bei jener ist die Apfelfrucht fünffächerig, fünfsaamig, wie bei *Cookia*.

Decandria Monogynia (Familie Aurantia.)

Zu dieser Gattung hat Correa die Arten gezogen, welche dem vorstehenden Charakter in Beziehung auf die Frucht vollkommen entsprechen.

1. *Glycosmis arborea* Corr. Hierher gehört *Limonia arborea* Roxb. f. 1. Nachtr. B 4. S. 391.

Blätter gefiedert. Blättchen länglich-liniensförmig, gezähnt. Frucht 2—3 fächerig. Waterl. Insel Mascar. h

2. *Glycosmis pentaphylla* Corr. (*Sclerostylis* Blum) *Limonia pentaphylla* Roxb.

Blätter fünfzählig-gefiedert. Blättchen eiförmig, ganzrandig. Waterl. Ostindien. h

3. *Glycosmis cyanocarpa* Spr. (*Cookia cyanocarpa* Blum.)

Blätter gefiedert. Blättchen länglich, stumpflich. Blumen

in winkel- und gipfelständige Doldentrauben gesammelt. Waterl. Java. h

4. *Glycosmis chlorosperma* Spr. (*Cookia chlorosperma* Blum.)

Blätter gefiedert. Blättchen länglich-lanzettförmig. Blumentrauben zusammengesetzt, gipfelständig. Waterl. Java. h

5. *Glycosmis trifolia* Spr. (*Sclerostylis* Blum.)

Blätter theils einfach, theils dreizählig, die Blättchen länglich-lanzettförmig; stumpf. Blumentrauben sehr kurz, winkelförmig. Waterl. Java.

6. *Glycosmis simplicifolia* Spr. (*Sclerostylis lanceolata* Blum.)

Blätter einfach, länglich-lanzettförmig, stumpflich. Blumentrauben sehr kurz, winkelförmig. Waterl. Java.

Kultur. Die Arten dieser Gattung lieben gute lockere Erde und warme Standörter, denn sie kommen aus Tropenländern. Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.

Glycyrrhiza Linn. Süßholz. f. Lexic. B. 4. S. 405. (Schubert's Handb. t. 205.)

Reich zweilippig, an der Basis höckerig. Corolle schmetterlingsförmig, das Fähnchen an beiden Seiten eingebogen, Flügel und Schiffechen bedeckend. Hülse zusammengedrückt, länglich-eiförmig, meist zweisaamig.

Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflanzen)

1. *Glycyrrhiza lapidota* Pursh. Schildruges Süßholz.

Stengel krautartig, oder fast staudenstrauchig. Blätter gefiedert. Blättchen länglich-lanzettförmig, gespitzt, zottenhaarig und mit sehr kleinen glänzenden Schüppchen besetzt, schilbrig. Blumen in dichten Aehren. Hülsen mit hakenförmigen Borsten besetzt. Waterl. Nordamerika, am Missouri-Flusse. 4 Grl.

Glycyrrhiza asperima Linn. f. Lexic. hat Sprengel zur *Coronilla* gezogen.

Glyphis Acharius Lichenograph. (Familie Licheneen's Flechten.)

Im Syst. Veg. ed. Spr. sind zwei Arten angezeigt: *Glyphis cicatricosa* et *savulosa* Ach. Beide wachsen in Tropenländern auf Baumrinden. Desgleichen *Glyph. repens* Meyer in Brasilien auf Rinden. Kruste weiß, weitschneidend, pulverig.

Glyphocarpa R. Brown.

Kapsel fast kugelig, gefurcht. (Familie Laubmoose.)

1. *Glyphocarpa quadrata* Schwägr. (Bartamia quadrata Hook.)

2. *Glyphocarpa capensis* Schwägr. (Bart. sericea Hornsch. *Gymnostomum capense* Hook.)

Blätter gerippt, seidenhaarig. Beide Arten wachsen auf dem Rasen der guten Hoffnung.

Glyphomitrium Brid. Schwägr.

Die Büchse (Kapsel) trägt eine glockenförmige Haube; der Mund mit 16 Zähnen versehen, die paarweise gedrängt stehen. (Familie Laubmoose.)

1. *Glyphomitrium Daviesii* Bridel.

Ein kleines aufrechtes Laubmoos. Stengel fast ästig. Blätter abstehend, linien-lanzettförmig, trocknend, gedreht. Kapselstiel (Vorste) aufrecht. Kapsel kreffelförmig, mit einem schnabelförmigen Deckel versehen. (*Bryum Daviesii* Dickson, *Grimmia* Turn.) Waterl. England am Meerufer.

Gmelina Linn. Gmeline s. Lexikon B. 4. S. 408.

Character generic. s. 1. Nachtr. B. 3. S. 515.

1. *Gmelina arborea* Roxb. Corom. Baumartige Gmeline,

Stamm und Aeste unbewaffnet. Blätter herzförmig, flüßig. Blumen rispenständig. Waterl. Ostindien. h

Gnaphalium Linn. Ruhrkraut s. Lexikon B. 4.

Character generic. s. 1. Nachtr. B. 3. S. 516.

Blüthendecke (Kelch) vielblättrig, die Blätter schuppenförmig, wie Dachziegel über einander liegend, die innern trocken, rauchend, meist gefärbt. Fruchtboden nackt, grubig. Blümchen röhrig; die innern (Scheibenblümchen) zwitтерblümigen (♀) die äußern (Randblümchen) weiblich oder unvollkommen oder fehlen. Saamentrone haarförmig, bei einigen an der Spitze federartig oder pinselförmig. Bei einigen Arten, z. B. Gn. dioicum, quintuplinerve, Timmus u. a. sind die Geschlechter ganz getrennt.

Syngenesia 2 Ordn. (Familie Compositae s. Corymbiferae.)

1. *Fruticosa* s. *suffruticosa*. Stengel strauchig oder staudenstrauchig.

† *Leucocoma*. Kelchschuppen weiß.

In dieser Abtheilung gehören die im Verſen beſchriebenen Arten: *Gnaphalium grandiflorum*, *heliathanemifolium*, *fruticans*, *coronatum*, *mucronatum*, *patulum*, *terreſt-ſolium* Linn. *G. hispidum* Thunb. (die übrigen ſ. 1. Nachtr. B. 3. S. 516—523.) und folgende neue Arten.

1. *Gnaphalium celosioides* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Spec. pl. IV. p. 78. t. 319. Hahnenkamm-artiges Ruhrkraut.

Stengel holzig, ſtrauchig, äſtig, walzenrund, wie die Aeſte und Blätter grau-wollig. Blätter wechſelnd ſtehend, ſtielos, elliptiſch = umgekehrt, eiförmig, geſpitzt, ganzrandig, oben weiß, unten grau- oder braunwollig, 9—10 Linien lang, 6 Linien breit. Blumen ſehr klein, gipfelſtändig, kopf-förmig = geknaut, die Knäule ſehr gedrängt ſtehend, faſt kugel-lig. Kelchſchuppen trocken, durchſcheinend, glänzend. Frucht-boden weiß fünfblümig. Waterl. Peru. h Blühz. Julius.

2. *Gnaphalium reticulatum* Spr.

Blumen in gedrängten gipfelſtändigen Riſpen. Hierher ge-hört *Chrysocoma reticulata* Labill. ſ. 1. Nachtr. B. 2.

3. *Gnaphalium rosmarinifolium* Sieber. Roſmarinblätt-riges Ruhrkraut.

Blätter zerſtreut ſtehend, linienförmig, mucronenſpitzig, am Rande zurückgerollt, wie die Aeſte ſilzig. Blumen in Dol-dentrauben, die weitichweiſſige gipfelſtändige Riſpen bilden. Kelch kugelig. Waterl. Neuholand. h Blühz. Sommer.

4. *Gnaphalium acuminatum* Link. Enum. 2. p. 317. Langgeſpitztes Ruhrkraut.

Aeſte ſilzig. Blätter linien = lanzettförmig, ſehr langge-spitzt, oben glatt, unten feinſilzig. Blumen in Doldentrau-ben geſammelt, die gipfelſtändige Riſpen bilden. Kelch cy-lindriſch, die Schuppen ſehr ſtumpf. Waterl. Kap d. g. Hoffa-nung. h

5. *Gnaphalium diosmaefolium* Venten. Diosma-blättriges Ruhrkraut.

Blätter zerſtreut gehäuft ſtehend, linienförmig, geſpitzt, ge-krümmt, unten am Rande zurückgerollt, ſilzig. Blumen in gipfelſtändigen doldentraubigen Riſpen. Kap d. g. Hoffu. h

6. *Gnaphalium tephrodes* Link. J. c.

Dieſe Art gleicht in Hinſicht auf Wuchs und Tracht dem *Gn. ericoides* Linn. ſ. Lexic. und kommt auch unter dieſem Namen in mehreren Gärten vor, ſie unterſcheidet ſich

aber durch linienförmige dünnere Blätter, die fast zurückgeschlagen sind, und durch lanzettförmige, gespitzte, schmutzig weiße Kelchschuppen; bei *Gn. ericoides* L. sind die Blätter mehr gehäuft, schmaler, linien = pfriemenspizig, die Kelchschuppen roth oder röthlich, stumpf und zerschliff. Kap d. g. Poffn. †

†† Kelchschuppen roth oder röthlich.

Hierher gehören die im Verikon abgehandelten Arten: *Gn. serratum*, *arboreum*, *discolor*, *ericoides*, *cylindricum* Linn. *G. appendiculatum*, *scabrum*, *humile*, *polyanthes*; *umbellatum* Thunb. *G. congestum*, *satureioides* Lam. (die übrigen im I. Nachtr.) und folgende Arten.

7. *Gnaphalium elatum* Lam. Hohes Ruhrkraut.

Blätter länglich, wellenrandig, filzig, untere gestielt, obere stiellos, umfassend. Blumen rispenständig. Kelchschuppen röthlich. Höchst wahrscheinlich gehört hierher *G. crispum* Linn. s. Lexic.

8. *Gnaphalium modestum* Hooker bot. Mag. 2710. (*Astasma modestum* Sieb.)

Stengel strauchig, wie die Aeste mit weißem Filze dicht bekleidet, Blätter wechselnd stehend, linien = spatelförmig, rinnig. Blumenstiele einzeln, gipfelsständig. Kelchschuppen oval, an der Basis filzig, oben verdünnt, nackt, roth = braun, zurückgeschlagen. Waterl. Kap d. g. Poffnung. † Blühz. Sommer.

9. *Gnaphalium Teneriffae* Spr. (*Gn. multiflorum* Poir. non Willd.)

Blätter entfernt stehend, linien = fadenförmig, stumpf, wie die Aeste weiß = filzig. Blumen straufförmig stehend. Kelchschuppen glatt, langespitzt. Waterl. Teneriffa. †

††† Kelchschuppen gelblich oder gelb.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Verikon beschriebenen Ruhrkräuter: *Gn. maritimum*, *orientale*, *stoechas*, *mucronatum* Linn. (die übrigen s. 1. Nachtr. dritte Abtheilung) und folgende Arten.

10. *Gnaphalium velutinum* Willd. herb.

Blätter fast spatel = lanzettförmig, wechselnd angewachsen herablaufend, wie die Aeste mit Wolle dicht bekleidet. Blumen in Köpfchen gesammelt, die Doldentrauben bilden. Kelchschuppen spizig. Kap d. g. Poffn. ?

11. *Gnaphalium conglobatum* Viv. Geballtes Ruhrkraut.
Gn. pendulum Presl. *G. scandens* Sieb. sub *Varies*
 tätén.

Blätter zerstreut stehend, spatel-liniensförmig, am Rande zurückgerollt, unten weiß-silzig. Blumen fast stiellos, gehäuft-geballt, gipfelständig. Kelche kegelförmig, die Schuppen angedrückt, spizlich. Waterl. das nördliche Afrika, Aegypten und Sicilien. h

12. *Gnaphalium strictum* Lamarck. Straßes Ruhrkraut.

Blätter zerstreut stehend, lang, liniensförmig, stumpf, am Rande fast zurückgerollt, aufrecht, wie die Aeste wollig. Blumen geknaut, stiellos, und bilden Doldentrauben. Kelchschuppen stumpf. Waterl. Kap d. g. Hoffn. h

13. *Gnaphalium compressum* Poir. Zusammengebrücktes Ruhrkraut.

Aeste zusammengebrückt, wie die Blätter schneeweiß-wollig. Blätter zerstreut stehend, liniensförmig, stumpf. Blumen in gipfelständige Doldentrauben gesammelt. Kelchschuppen gewimpert. Waterl. die Canarischen Inseln. h Blähz. Sommer.

14. *Gnaphalium foliosum* Poir. Vielblättriges Ruhrkraut.

Aeste und Blätter wollig. Blätter gehäuft stehend, dachziegelförmig, über einander liegend, liniensförmig, spizlich. Blumen gehäuft, gipfelständig. Waterl. Ins. Mascaren. h

15. *Gnaphalium Pallasii* Spr. Pallasens Ruhrkraut. (*Gn. monanthum* Willd.)

Stengel niedrig, staudenstrauchig. Blätter zerstreut stehend, spatel-liniensförmig, etwas verlängert, auf beiden Seiten grau-silzig. Blumenköpfchen wenigblümig. Kelchschuppen stumpf, gezähnt. Waterl. Sibirien. h 4

16. *Gnaphalium parviflorum* Lamarck. Kleinblumiges Ruhrkraut.

Blätter gehäuft, stiellos, lanzettförmig, abstehend, wellenrandig-gekräuselt, auf beiden Seiten grau, pulverig-silzig. Blumen klein, in doldentraubigen Rispen. Kelchschuppen eiförmig.

II. Herbacea. Krautartige Ruhrkräuter.

+ *Erythrocoma*. Kelchschuppen gelb oder röthlich.

Hierzu gehören die im Verikon beschriebenen Arten: *Gn. eximium*, *squarrosum*, *purpureum*, *stellatum*, *sanguineum*, *imbricatum* Linn. *Gn. japonicum* Thunb. (die übrigen im I. Nachtr.) und folgende.

17. *Gnaphalium Commersonii* Spr. (*Serratula acutifolia* Poir.)

Blätter gehäuft stehend, lanzettförmig, gespitzt, stiellos, umfassend, filzig. Blumen stiellos, winkelfständig. Kelchschuppen glatt. Waterl. Monte Video.

18. *Gnaphalium sinuatum* Lour. Fl. cochinch. Buchtiges Ruhrkraut.

Blätter wechselnd stehend, ey-lanzettförmig, eingeschnitten-buchtig gezähnt, auf beiden Seiten filzig. Blumen rispenständig. Waterl. Cochinchina. 4.

19. *Gnaphalium roseum* Kunth in H. et B. gen. et Sp. pl. IV. p. 63. Rosenrothes Ruhrkraut.

Stengel krautartig, aufrecht, 2—3 Fuß hoch, oben ästig, wie die Aeste und Blätter grau-filzig-wollig. Blätter wechselnd stehend, stiellos, halb umfassend, lanzettförmig, ganzrandig, weidenförmig, 2 Zoll lang, 3 Linien breit. Blumen geknaut, stiellos, die Knäulchen fast kugelförmig, so groß wie eine kleine Kirsche, rispenständig. Kelchschuppen trocken, durchscheinend, blaßrosenroth, glänzend, äußere an der Basis wollig, innere glatt. Waterl. Neuspanien. 4 Blühz. August, Septemb.

20. *Gnaphalium bogotense* Kunth. J. c. IV. p. 61. Bogotenisches Ruhrkraut.

Stengel krautartig, aufrecht, etwa 1 Fuß hoch, blättrig, oben ästig, grau-seidenhaarig. Blätter wechselnd stehend, stiellos, herablaufend, linienförmig, gespitzt, ganzrandig, oben grün, unten grau-seidenhaarig, fast 2 Zoll lang, 1 Linie breit. Blumen gipfelständig, stiellos, gehäuft-geknaut, fast doldenständig. Kelchschuppen gelbroth. Fruchtboden flach; er trägt gewöhnlich fünf Blümchen, drei weibliche und zwei Zwitterblümchen. Diese Art ist der folgenden auch *Gn. saturejioides* (s. 1. Nachtr.) sehr nahe verwandt, vielleicht nur eine Varietät? Waterl. Bogotense (in Neugranada) zwischen den Städten Santa Fé und Bogotá. 4 Blühz. Septemb.

21. *Gnaphalium ferrugineum* Pers. (nicht Wendl.) Gelbrothes Ruhrkraut.

Gn. rufescens Kunth. J. c. IV. p. 61.

Stengel 1—2 Fuß hoch, blättrig, oben rispenartig getheilt, wie die Aeste und Blätter weiß-wollig. Blätter wechselnd stehend, stiellos, herablaufend, linien-lanzettförmig, gespitzt

ganstrandig, am Rande zurückgerollt, $1\frac{1}{2}$ Zoll lang, 2 Linien breit. Blumen geknaut = rispenständig. Kelchschuppen gelbroth. Waterl. Peru. 24. *Gnaphalium ferrugineum* Wendl. f. Lexic. erste Auflage B. 4. S. 416. ist *Elichrysium vestitum* var.

22. *Gnaphalium Thuarsii* Spr. (*Gn. pyramidale* Thunb.)

Stengel krautartig. Blätter spatelförmig, mucronenspitzig. Blumen ährenständig, mit Bracteen versehen. Ins. Tristan d'Acunha. 24 ?

23. *Gnaphalium dichotomum* Willd. herb. Zweitheiliges Ruhrkraut.

Stengel krautartig, 2—3 Fuß hoch, gabelästig. Blätter lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt, stiellos, unten wie die Aeste weiß = wollig. Blumen geknaut, gipfelständig. Kelch cylindrisch, die Schuppen gegen einander geneigt. Waterl. Europa. 24

24. *Gnaphalium Persoonii* Dietr. (*Gn. peruvianum* Spr. *Gn. asperum* Pers. nicht Thunb.)

Stengel krautartig, aufrecht oder aufsteigend. Blätter lineenförmig, oben körnerig = scharf, unten weiß = filzig. Blumen kopfförmig = doldentraubig. Waterl. Peru. 24 ?

†† *Xanthoma* f. *Chrysocoma*. Kelchschuppen gelb.

In dieser Abtheilung gehören die im Vericon aufgeführten Arten: *Gn. odoratissimum*, *pedunculare*, *nudifolium*, *cymosum*, *luteo - album*, *rutilans*, *repens* Linn. *Gn. ascendens*, *trifidum* Thunb. *Gn. apiculatum* Labill. (f. 1. Nachtr.) und folgende.

25. *Gnaphalium quinquenerve* Thunb. Fünfrippiges Ruhrkraut.

Stengel krautartig. Blätter stiellos, umfassend, oben glatt, unten filzig, die untern herzförmig, gespitzt, fünfrippig, die obern lanzettförmig. Blumen in reichen gedrängten Rispen. In dieser Art hat Spr. *Gn. latifolium* Thunb. gezogen, und zwar als Varietät, daher kann *Gn. latifolium* im 1. Nachtr. B. 3. S. 544. ausgestrichen werden. Waterl. das südliche Afrika. 24

26. *Gnaphalium bracteatum* Lamarck (non Willd.)

Stengel krautartig, länglich = spatelförmig, halb umfassend, weiß = filzig. Blumen in zusammengesetzten Doldentrauben, die mit Bracteen besetzt sind. Kelche gehäuft stehend, glatt,

die obern Schuppen abgestuft, gefaltet. Waterl. Kap. d. g. Hoffn. 4

27. *Gnaphalium candicans* Kunth. J. c. IV. p. 62.

Stengel krautartig, gefurcht, 1 Fuß hoch, an der Basis ästig, wie die Blätter weißwollig. Blätter wechselnd stehend, stiellos, lanzettspatelförmig, gespitzt, ganzrandig, 14—15 Linien lang, $3\frac{1}{2}$ Linie breit. Blumen stiellos, kaum 2 Linien lang, kopfförmig geknaut, die Knäule fast kugelförmig. Kelchschuppen gelblich, durchscheinend, glatt, glänzend, gegen einander geneigt. Waterl. Südamerika, das Reich Quito. 4 Blühz Julius.

28. *Gnaphalium graveolens* M. a Bieb. Starkriechendes Ruhrkraut.

Stengel krautartig, wie die Blätter grauwollig. Wurzelblätter spatelförmig, dreirippig. Stengelblätter linienlanzettförmig, gespitzt. Blumen in zusammengesetzten Doldentrauben. Kelchschuppen abgestuft. Waterl. der Kaukasus und Laurien. 4

29. *Gnaphalium affine* Don. (Gn. arenarium Thunb. non Linn.)

Stengel krautartig, einfach. Blätter auf beiden Seiten weißwollig, untere lanzettförmig, gespitzt, obere linienförmig. Blumen geknaut. Kelchschuppen goldgelb, stumpf. Waterl. Japan in Sandböden. ☉?

30. *Gnaphalium candidissimum* M. a Bieb. Weißes Ruhrkraut.

Stengel krautartig. Blätter stiellos, fast spatellanzettförmig, mit schneeweißer Wolle dicht bekleidet. Blumen doldentraubig. Kelche fast glockenförmig, die Schuppen auswendig filzig. Waterl. Kaukasus.

31. *Gnaphalium solidaginoides* Poiret. Goldruthenartiges Ruhrkraut.

Stengel krautartig, aufrecht. Blätter stiellos, fast spatellanzettförmig, unten filzig, an der Basis filzig gerändert. Die Blumen bilden seitenständige beblätterte traubenförmige Aehren. Kelchschuppen pfriemenspitzig, anfänglich gerade, dann zurückgeschlagen. Waterl. die Antillischen Inseln. 4 Blühz. Sommer.

32. *Gnaphalium montevidense* Spr. Montevidensisches Ruhrkraut.

Stengel krautartig, einfach, aufsteigend, wie die Blätter mit

mit grauer Wolke bekleidet. Blätter zerstreut stehend, umfassend, spatel = lanzett = liniensförmig, spitzlich, flach. Blumen stielloß, geknaut, gipfelständig. Waterl. Monte Wides. 4 Blühz. Juli — August.

33. *Gnaphalium flavissimum* Sieber. Hochgelbes Ruhrkraut.

Stengel krautartig, einfach, wie die Blätter borstig = wollig. Blätter zerstreut stehend, liniensförmig, aufrecht, mit braunen Spizen. Blumen gipfelständig, fast geknaut. Kelchschuppen abstehend, gespißt, goldgelb = zottenhaarig, gewimpert. Neuholland.

34. *Gnaphalium alatum* Kunth J. c. IV. p. 62. Geflügeltes Ruhrkraut.

Stengel krautartig, aufrecht, 1 Fuß hoch, oben ästig, durch die herablaufenden Blätter gleichsam geflügelt. Blätter wechselnd stehend, stielloß, schmal, lanzettförmig, gespißt, gearbert = dreifachgerippt, auf beiden Seiten mit zerstreut stehenden langen Haaren bekleidet, 3 Zoll lang und länger, 3—4 Linien breit. Blumen sehr dicht stehend, kopfförmig = geknaut, stielloß, in Doldentrauben gesammelt, die gipfelständige Rispen bilden. Waterl. das Reich Quito. 4 Blühz. Juli — Septemb.

35. *Gnaphalium incanum* Kunth J. c. IV. p. 62. Graues Ruhrkraut.

Stengel krautartig, einfach, rundlich, 1 Fuß hoch, wie die Blätter mit grauer Wolke bekleidet. Blätter wechselnd stehend, stielloß, linien = lanzettförmig, gespißt, ganzrandig, 2½ Zoll lang. Blumen stielloß, kopfförmig = geknaut, 2 Linien lang, und bilden eine gipfelständige Doldentraube, deren Aeste mit Blättern besetzt sind. Fruchtboden vielblümig. Kelchschuppen gespißt. Waterl. Peru. 4 Blühz. August.

36. *Gnaphalium elegans* Kunth J. c. IV. p. 63. Schönes Ruhrkraut.

Stengel krautartig, einfach, 2—3 Fuß hoch, mit weißer Wolke dicht bekleidet. Blätter wechselnd stehend, kurzgestielt, lanzettförmig, gespißt, an der Basis schmal, wellenrandig, oben scharf, unten weißwollig, 3 Zoll lang, 5—6 Linien breit. Blumen geknaut = kopfförmig und bilden eine gipfelständige blättrige Doldentraube. Kelch halbkugelig = glockenförmig. Schuppen trocken durchscheinend, gelb, glänzend, die äußeren an der Basis wollig. Waterl. Südamerika; Quito, bei Chilko und Chambamba. 4 Blühz. Juni.

Dietr. Erz. 27. Nachtr. IV. Bd.

N

37. *Gnaphalium dysodes* Spr. (Gn. graveolens Kunth.)

Stengel krautartig, aufrecht, einfach, mit feiner weißer Wolle bekleidet, 1 Fuß hoch. Blätter wechselnd stehend, stiellos, herablaufend, ey-lanzettförmig, langgespitzt, ganzrandig, wellenförmig, oben glattlich, grün, unten weißwollig, 2 Zoll lang und länger, an der Basis 1 Zoll breit. Blumen stiellos, geknaut, und bilden gipfelständige, sehr ästige Doldentrauben, deren Äste weißwollig und mit Blättern besetzt sind. Kelchschuppen gelbglänzend. Die ganze Pflanze verbreitet einen starken Geruch. Vaterl. Standort und Blühz. wie N. 36. 4

38. *Gnaphalium viscosum* Kunth J. c. IV. p. 64. Klebriges Ruhrkraut.

Stengel krautartig, aufrecht, fast einfach, 3—4 Fuß hoch, mit Blättern dicht besetzt. Blätter wechselnd stehend, stiellos, linienförmig, am Rande zurückgerollt, oben klebrig-borstig, unten weißwollig, 2 Zoll lang, 1 Linie breit. Blumen stiellos, geknaut-kopfförmig, eine gipfelständige ästige Doldentraube bildend. Kelchschuppen gelb, glänzend. *Gnaph. hirtum* Kunth J. c. ist nur als eine Varietät zu betrachten, welche sich durch den weniger beblätterten Stengel, durch die unten grauen, nicht wolligen Blätter, und durch etwas größere Blumen unterscheidet. Vaterl. Mexico, bei der Hauptstadt. 4 Blühz. April.

39. *Gnaphalium gracile* Kunth J. c. IV. p. 65. Dünnes Ruhrkraut.

Wurzel sehr ästig, fast holzig. Stengel (mehrere) einfach, aufrecht, dünn, gestreift, 1—2 Fuß hoch, oben weißwollig. Blätter wechselnd stehend, stiellos, herablaufend, linienförmig, ganzrandig, in der Jugend am Rande zurückgerollt, unten weißwollig, 18—20 Linien lang, $\frac{1}{2}$ Zoll breit. Wurzelblätter linien-spatelförmig. Blumen stiellos in gipfelständige Köpfchen gesammelt. Kelchschuppen gelb. Gn. tenue Kunth. ist nur eine Varietät. Vaterl. Mexico. 4 Blühz. September.

40. *Gnaphalium stramineum* Kunth. J. c. IV. p. 66. Strohfarbiges Ruhrkraut.

Stengel krautartig, aufsteigend, an der Spitze gabelästig, weißwollig, fast 1 Fuß hoch. Blätter wechselnd stehend, linienförmig, am Rande zurückgerollt, oben grau, unten weißwollig, $1\frac{1}{2}$ Zoll lang, 1 Linie breit. Blumenköpfchen gipfelständig, einzeln oder zu 3 beisammen auf kurzen Stielen.

ten. Kelchschuppen blaßgelb, oder weißlichgelb, (strohfarbig) glänzend. Vaterl. Mexico, in temperirten Gegenden. 24 Blühz. Mai.

41. *Gnaphalium siculum* Spr. Sicilisches Ruhrkraut. (Gn. caespitosum Presl.)

Stengel krautartig, aufsteigend, Rasen bildend. Blätter wechselnd stehend, linienförmig, stumpf, am Rande zurückgerollt, filzig. Blumen eine gipfelständige einfache Doldentraube bildend. Kelchschuppen lanzettförmig, gespitzt. Vaterl. Sicilien. 24

42. *Gnaphalium humillimum* Spr. (Gn. nanum Kunth.)

Stengel krautartig, nur 2—3 Zoll hoch, mit Wolle besetzt. Blätter wechselnd stehend, stiellos, bogenförmig am Stengel gedrückt, lanzettförmig, gespitzt, ganzrandig, einrippig, fast flach, fein borstig-wollig, 7—8 Linien lang. Blumen kopfförmig-geknaut, gipfelständig, einzeln oder zu 3. Kelchschuppen blaß- oder ochergelb, stumpf, glatt, glänzend. Vaterl. die Alpen in Peru. 24 ?

††† L u ocoma. Kelchschuppen weiß.

Hierher gehören die im Lexicon beschriebenen Arten: Gn. pilosellum, plantaginifolium, dioicum, denudatum, obtusifolium, undulatum, foetidum, crispum, margaritaceum, alpinum, declinatum Linn. Gn. Oculus cati Thunb. (Die übrigen s. 1. Nachtrag.) und folgende.

43. *Gnaphalium quintuplinerve* Hamilton. (Antennaria triplinervis Don. Gn. cynoglossoides Triver.)

Stengel krautartig. Blätter elliptisch, mucronenspitzig, fünfrippig, oben zottenhaarig, unten mit Wolle dicht bekleidet. Blumen eine gipfelständige einfache Doldentraube bildend. Geschlechter ganz getrennt. Kelchschuppen spizlich. Nepal. 24

44. *Gnaphalium Timmua* Hamilt. (Antennaria Timmua Don.)

Stengel krautartig. Blätter lanzettförmig, langgespitzt, dreirippig, den Stengel umfassend, oben fast nackt, unten wollig. Blumen in zusammengefügter blättriger Doldentraube. Geschlechter ganz getrennt. Nepal.

45. *Gnaphalium carpathicum* Wahlenb. (Gn. alpinum Willd. Antennaria R. Br.)

Stengel krautartig, aufrecht, sehr einfach. Blätter linears

lanzettförmig, mucronenspizig, dreirippig, wollig. Blumen in gedrängten Ästern. Kelchschuppen langgespitzt. Geschlechter ganz getrennt. Vaterl. die Alpen in Lappland, der Schweiz und Karpathen. 4

46. *Gnaphalium polyccephalum* Michaux. Vielköpfiges Ruhrkraut.

Stengel krautartig, wie die untere Seite der Blätter mit weißer Wolle bekleidet. Blätter linien-lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt, stiellos, oben grün. Die Blumen bilden doldentraubige Rispen. Kelchschuppen stumpflich. Vaterl. Nordamerika.

47. *Gnaphalium decurrens* Jves.

Stengel krautartig, weiß-wollig. Blätter linien-lanzettförmig, herablaufend, oben scharf, unten wollig. Blumen rispenständig. Kelchschuppen lanzettförmig, gespitzt. Vielleicht nur eine Varietät einer längst bekannten Art. Vaterl. Nova Caesar.

48. *Gnaphalium Busua* Don.

Blätter linienförmig, langgespitzt, verlängert, herablaufend, weiß-wollig. Blumen geknaut, die obere Kelchschuppen stumpf. Repal.

49. *Gnaphalium contortum* Hamilt. Gedrehtes Ruhrkraut. (Antennaria Don.)

Stengel krautartig. Blätter herz-linienförmig, mucronenspizig, am Rande zurückgerollt, halb umfassend, niedergebogen, oben glattlich, unten wollig. Blumen eine dichte Doldentraube bildend. Geschlechter ganz getrennt. Repal.

††† Filagines (Filago Linn) s. 1. Nachtr. B. 3. S. 534.

Die Blumen sind mit Hüllen versehen oder an der Basis fast nackt.

a. Mit Hüllen. *Leontopodia* R. Brown.

50. *Gnaphalium Lamarckii* Dietr. Lamarcks Ruhrkraut.

Stengel krautartig, einfach. Blätter spatelförmig, unten wollig. Blumen gipfelständig, kopfförmig, mit einer Hülle versehen, deren Blättchen spatelförmig und mit weißer Wolle bekleidet sind. Vaterl. Monte Widen.

Im Syst. Veget. hat Kunt Sprengel zwei verschiedene Pflanzen unter *Gnaphalium bracteatum* Lam. aufgeführt und zwar N. 94. und 163., deswegen habe ich die letztere Art *Gn. Lamarckii* genannt.

51. *Gnaphalium asterisciflorum* Lam. Sternblumiges Ruhrkraut.

Stengel krautartig, sehr einfach. Blätter gehäuft stehend, linien-lanzettförmig, filzig. Blumen stiellos, gehäuft, gipfelständig. Hüllblätter abstehend, wie die Stengelblätter gestaltet, filzig. Kelchschuppen glatt, lanzettförmig, gespitzt. Diese Art gleicht unserem Gn. *Leontopodium* L. unterscheidet sich aber am meisten durch die Blätter und durch die geringere Wilkosität. Vaterl. Neuspanien.

b. Blumen fast nackt.

52. *Gnaphalium chilense* Spr. Chilisches Ruhrkraut. (Gn. *Piravira* Molin. *Schlechten*, Linnaea 6. p. 227.)

Blätter auf beiden Seiten grauwollig, untere spatelförmig, obere linienförmig. Blumen geknaut, die Knaut gestielt, wenigblumig, winkel- und gipfelständig. Kelchschuppen glänzend, gespitzt. Bei dieser Art hat Sprengel Gn. *lanuginosum* Kunth, citirt, jedoch mit? Vaterl. Peru. 4 Blühz. August.

53. *Gnaphalium sphacelatum* Kunth. J. c. IV. p. 67. Brandiges Ruhrkraut.

Wurzel sehr ästig, braun. Stengel aufsteigend, einfach, seidenhaarig-wollig, 8 Zoll bis 1 Fuß hoch. Blätter wechselnd stehend, gestielt, linienförmig, gespitzt, ganzrandig, flach, unten silberfarbig-wollig. Blumen stiellos, geknaut, und bilden eine cylindrische Endähre, die mit Blättern besetzt, kaum $1\frac{1}{2}$ Zoll lang ist. Kelchschuppen grün, an der Spitze brandig oder braun. Vaterl. Mexico. 4 Blühz. Mai.

54. *Gnaphalium niliacum* Spr. (Gn. *spathulatum* Delil non Lam.)

Stengel, mehrere aus einer Wurzel, wie die Blätter wollig. Blätter spatelförmig, mucronenspitzig. Blumen geknaut-ährenförmig, winkel- und gipfelständig. Kelchschuppen aufrecht, braun. Wächst am Nil-Flusse. 4 ?

55. *Gnaphalium crispatum* Delil. Gefräuselltes Ruhrkraut.

Stengel krautartig, niedrig, ästig. Blätter spatel-linienförmig, wellenrandig-gefräuselt, weiß-wollig-filzig. Blumen kopf-ährenförmig, mit Wolke dicht bekleidet. Kelchschuppen weiß, gespitzt. Vaterl. und Standort wie vorige N. 54.

56. *Gnaphalium conoideum* Kunth, J. c. IV. p. 67. Kegelförmiges Ruhrkraut.

Stengel krautartig, aufrecht, einfach, weiß-wollig, 1 Fuß hoch. Blätter wechselnd stehend, stiellos, linienförmig, gespißt, am Rande zurückgerollt, weiß-wollig, $1\frac{1}{2}$ Zoll lang, 1 Linie breit. Blumen stiellos, geknaut, und bilden eine dichte ey-kegelförmige Endähre, die über 1 Zoll lang und mit Blättern besetzt ist. Kelchschuppen glänzend, spizlich. Vaterl. Mexico, bei der Hauptstadt. 4. Blühz. Mai.

57. *Gnaphalium supracanum* Smith.

Stengel krautartig, aufsteigend. Blätter spatel-linienförmig, gekielt, oben wollig. Blumen einzeln, winkelfständig. Griechenland. ☉ ?

58. *Gnaphalium pilulare* Wahlenb.

Stengel niedrig, ästig-weißschweißig. Blätter lanzettförmig, glattlich. Blumen gehäuft, fast kegelförmig, winkelfständig, die weiblichen feinborstig. Vaterl. Cypseland.

Seit der Erscheinung des Lexikons B. 4. und des 1. Nachtrags B. 3. hat die Gattung *Gnaphalium* einen beträchtlichen Zuwachs an neuen Arten erhalten. Kurt Sprengel hat (Sylt. Veget. B. 3.) 192 Arten aufgestellt, unter denen höchst wahrscheinlich noch manche einer nähern Untersuchung und Bestimmung bedürfen und die nach genauer Beobachtung und Vergleichung nur als Varietäten längst bekannter Arten zu betrachten sind, daher habe ich einige, die mir als selbstständige Arten noch zweifelhaft scheinen, nicht aufgenommen.

Eine Anleitung über die Kultur der Ruhrkräuter im Allgemeinen s. Lexikon B. 4. am Schluß dieses Artikels (*Gnaphalium*) und 1. Nachtr. B. 3. S. 547.

Zu den Synonymen, welche ich im 1. Nachtr. B. 3. S. 548—550. angezeigt habe, gehören noch folgende.

Synonymen.

- Gnaphalium achilleoides* Lam. ist *Gnaphalium declinatum* L. Suppl. s. Lexic.
 — aegypticum Pers. ist *Gnaphalium verticillatum* Thunb. s. Lexic.
 — alpinum Willd. s. *Gnaphalium carpathicum* N. 45.
 — ambiguum Pers. ist *Gnaphalium Stoechas* s. Lexic.
 — angustifolium Lam. ist *Gnaphalium Stoechas* var. Lexic.

- Gnaphalium arenarium Thunb. f. Gnaphalium affine
N. 29.
- asperum Pers. f. Gnaphalium Persoonii
N. 21.
- aureo-fulvum Berg. ist Gnaphalium odoratissimum Lexic.
- caespitosum Pers. f. Gnaphalium siculum
N. 42.
- carneum Lam. ist Gnaphalium capitatum
Thunb. f. Lexic.
- conicum Willd. Suppl. ist Gnaphalium orientale Var. f. Lexic.
- crassifolium Lam. ist Gnaphalium Stoechas Var. f. Lexic.
- cynoglossoides Trever. f. Gnaphalium quintuplinerve N. 43.
- domingense Lam. ist Gnaphalium multicaule Lam. f. 1. Nachtr.
- fulvum Lam. ist Gnaphalium patulum
Linn. f. Lexic.
- graveolens Kunth. f. Gnaphalium dysotes
Spr. N. 37.
- hirtum Kunth. f. Gnaphalium viscosum
N. 38.
- latifolium Thunb. f. Gnaphalium quinquenerve N. 25.
- monanthum Willd. f. Gnaphalium Pallasii N. 15.
- multiflorum Poir. f. Gnaphalium Teneiffae N. 9.
- Peravira Molin. f. Gnaph. chilense N. 52.
- pyramidale Thuar. f. Gnaphalium Thuararsi N. 22.
- rufescens Kunth. f. Gnaphalium ferrugineum N. 21.
- spathulatum Delil. f. Gnaphalium niljicum N. 54.
- tenue Kunth. f. Gnaphalium gracile
N. 39.
- tinctum Thunb. f. 1. Nachtr. ist Gnaphalium squarrosum f. Lexic.

Gnemon sylvestris Rumph. f. Gnetum ovalifolium.

Gnetum Linn. Gnemonbaum f. Lexic. B. 4. S. 430.
 Monoecia Monandria. (Familie Urticeen?)

1. *Gnetum ovalifolium* Poir. (*Gnemon sylvestris* Rumph.)
 Blätter oval-länglich, an beiden Seiten verdünnt. Blumen in Köpfen. Früchte eiförmig, gespitzt. Vaterl. die malaisischen Inseln. ♀ Erbh.

Gnidia Linn. Gnidie f. Lexic. B. 4. S. 430.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 550.

Kelch corollinisch, röhrig, vierspaltig, im Schlunde mit 4 Schuppen versehen. Antheren 8, in die Kelchröhre eingefügt. Nuss einsamig.

Octandria Monogynia. (Familie Thymeleen.)

† Foliis angustis. Blätter schmal.

Hierher gehören die im Lexicon beschriebenen Arten: *Gnidia pinifolia*, *simplex* Linn. *G. biflora*, *scabra* Thunb. *G. imberbis* Dryand. und folgende.

1. *Gnidia juniperifolia* Linn. (*G. pinifolia* Linn. Suppl. *G. acerosa* Gmelin.)

Stamm strauchig, die Aeste und Blätter glatt. Blätter schmal, linien-pfriemenförmig. Blumen meist gepaart, glatt. Die Blätter neben den Blumen den Abblättern gleichend. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. ♀

2. *Gnidia linoides* Wikström. (*Passerina linoides* Thunb.)

Blätter gegenüberstehend, stiellos, linien-lanzettförmig, pfriemenförmig, glatt, unten dreirippig. Blumen einzeln, gipfelständig, seidenhaarig. Einschnitte lanzettförmig, gespitzt. Kap d. g. Hoffn. ♀

3. *Gnidia nana* Wikstr. ist *Struthiola nana* Thunb. f. 1. Nachtr. B. 8. S. 533. genau beschrieben.

†† Foliis latioribus. Blätter breit.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexicon aufgeführten Arten: *Gnidia oppositifolia*, *racemosa*, *tomentosa*, *argentea* Thunb. *G. sericea* Linn., *imbricata*, *filamentosa* Linn. fil. und folgende.

4. *Gnidia denudata* Lindl. Bot. reg. t. 757.

Blätter gegenüberstehend, zweireihig, lanzettförmig, aufrecht, dreirippig, anfänglich gewimpert, dann glatt. Blumen gipfelständig, gehäuft. Die Einschnitte lanzettförmig, stumpflich, gewimpert. Kap d. g. Hoffn. ♀

5. *Gnidia stricta* Wikstr. Straffe Gnidie. (*Passerina stricta* Thunb. f. Lexic. B. 6.)

Ästchen kurz, straff, warzig. Blätter sehr klein, länglich, spitzlich, auf beiden Seiten fast zottenhaarig. Blumen gehäuft, gipfelständig, fast sitzig, die Einschnitte blau, liniensförmig, stumpflich. Kap d. g. Hoffn. h

6. *Gnidia setosa* Wikstr. Borstige Gnidie. (*Passerina setosa* Thunb.)

Blätter zerstreut stehend, lanzettförmig, gesägt, glatt, unten fänfrispig. Blumen gipfelständig, büschelförmig, auswendig mit Borsten besetzt. Einschnitte länglich, stumpf. Kap d. g. Hoffn. h

7. *Gnidia virescens* Wikstr. Grünliche Gnidie.

Blätter zerstreut stehend, länglich, stumpf, sitzig. Blumen gipfelständig, fast gehäuft, grünlich, zottenhaarig. Einschnitte lanzettförmig, stumpflich. Ist eine Varietät von *Passerina anthylloides* L. Suppl. f. Lexic. B. 6. S. 683. Kap d. g. Hoffn. h

Kultur. Die Gnidien kommen von dem Vorgebirge der guten Hoffnung, und gedeihen am besten in guter Dammerde, Wald- oder Heideerde mit Sand und etwas Lehm (von alten Wänden zc.) gemischt. Man überwintert sie im Glashause oder in ähnlichen frostfreien Behältern. Fortpflanzung und Vermehrung siehe Lexikon I. Aufl. B. 4. S. 433. Dasselbst Seite 3. von unten lese man Wurzelsprossen u. junge Wurzeln.

Synonymen.

Gnidia acerosa Gmel. f. *Gnidia juniperifolia* N. 1.

— *acutifolia* Wikstr. ist *Gnidia biflora* Thunb. f. Lexic.

— *carinata* Thunb. f. Lexic. ist *Gnidia biflora* Thunb. f. Lexic.

— *glauca* Sims. ist *Gnidia filamentosa* f. Lexic.

— *laevigata* Thunb. f. Lexic. ist *Gnidia oppositifolia* Linn. f. Lexic.

— *oppositifolia* Thunb. ist *Passerina Thunbergii* Wikstr.

— *pinifolia* L. Suppl. f. *Gnidia juniperifolia* N. 1.

— *pinifolia* Wendl. ist *Gnidia imberbis* Dryand. f. 1. Nachtr.

Gnidia radiata Wendl. ist *Gnidia penifolia* L. f. Lex.
— *simplex* Andr. ist *Gnidia imberbis*.

Gochnatia Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. IV. p. 20. (*Stiftia* Mikan.)

Blüthendecke (Kelch) ziegelschuppig, glockenförmig, die Schuppen unbewaffnet. Fruchtboden nackt, grubig. Blümchen alle zwittrig, röhrig, fünfspaltig, gleich. Antheren an der Basis mit 2 Borsten versehen. Saamentrone haarig.

Syngenesia I Ordn. (Familie Eynareen.)

1. *Gochnatia vernonioides* Kunth. J. c. IV. t. 309.

Stengel strauchig, unbewaffnet. Blätter wechselnd stehend, länglich, gespitzt, ganzrandig, an der Basis gerundet, unten, wie die Aestchen weiß-silzig. Blumen gipfelständig, gepaart. Kelchschuppen stachelspizig. Blümchen gelb. Vaterl. am Amazonenflusse, in der Provinz Bracamorensis. h Blühz. August.

Kultur. Gute lockere Dammerde. Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten. Standort im warmen oder temperirten Hause.

Godoya Ruiz et Pav. (*Godovia* Pers.) *Godoya*.

Character generic. f. I. Nachtr. B. 3.

Kelch fünfstheilig, oder fünfblättrig, gefärbt. Fünf Corollenblätter. Fünf Reihen Wimperhaare. Staubfäden 10 oder mehrere, bodenständig. Antheren an der Spitze mit zwei Bödern versehen. Narbe auf dem Fruchtknoten sitzend, fünfstädig. Kapsel fünffächerig, fünfklappig, vielsaamig. Saamen geflügelt.

Decandria (eigentlich *Polyandria*) *Monogynia* (Familie Guttiferen.)

1. *Godoya gemmiflora* Mart. nov. gener. t. 74.

Blätter länglich, stumpf, undentlich, sägeartig, gezähnt. Blumen in zusammengefesten verlängerten Trauben. Kelche knospenförmig, zehublättrig. Vaterl. Brasilien. h

Goeppertia Schlechtend. *Linnaea* 6. p. 337. f. *Marantia zebrina* et *spicata*.

Göthea Martius nov. gener. *Göthea*.

G. Invol. 4—6 partitum vesicarium amplum. Cal. abbreviatus 5fidus. Antherae biloculares. Stylus elongatus, stigmatibus 8—10. Caps. scoriaceae monosperma Mart.

Monadelphia Polyandria, (Familie Malvaceen, Pentapoteen.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des ehem. Großherzogl. Sächs. Weimarischen Staatsministers Herrn Wolfgang von Goethe, dessen zahlreiche Schriften allgemein bekannt und beliebt sind. Mit diesem hochgeehrten Herrn von Goethe reisete ich im Juni 1785. als Botanikus nach Carlsbad und in die böhmischen Gebirge. Siehe die Beschreibung der Reise ins Carlsbad in einer besondern Schrift: Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie u. von Göthe 1. B. 1. Heft. S. 23. Dann schrieb er ein Werk: Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären von J. W. von Göthe. (Gotha b. Ettinger 1790), wodurch er sich um die Botanik großes Verdienst erworben hat, und daher mit Recht ein solches Denkmal verdient. Göthes Lebensgeschichte siehe Conversations-Lexikon u. a. D.

1. *Goethea semperflorens* Mart. Immer blühende Göthea.

Blätter länglich, an der Spitze sägerandig. Blumen meist gipfelständig. Hülle (äußerer Kelch) groß, aufgeblasen, sechs-spaltig, innerer abgekürzt. Fünf Corollenblätter. Antheren zweifächerig. Griffel lang. Narben 8—10. Fünf lederartige einsamige Kapseln. Vaterl. Brasilien.

2. *Goethea cauliflora* Mart. Stammblumige Göthea.

Blätter länglich, ganzrandig. Blumen am Stamme sitzend. Hülle vier-spaltig. Brasilien.

Beide Arten verlangen warme Standörter, denn sie kommen aus Brasilien. Fortpflanzung durch Saamen in warmen Betten.

Goldbachia de Candolle. Goldbachie.

Kelch aufrecht. Frucht länglich, schotenförmig, mit zwei Gliedern, zweisaamig, die Saamen hängend. Griffel fast fehlend.

Tetrandria Siliquosa. (Familie der Kreuzblumen-Pflanzen.)

Diese Gattung widmete de Candolle einem Botaniker Herrn Dr. Goldbach.

1. *Goldbachia laevigata* Cand. (*Raphanus laevigatus* M. a Bieb.)

Stengel krautartig, wie die Blätter glatt, obere Blätter Pfeilsförmig. Früchte viereckig-zusammengedrückt, schnabelförmig, runzlig, hängend. Wächst an der Wolga.

2. *Goldbachia torulosa* Cand.

Stengel krautartig, obere Blätter länglich. Früchte fast walzenrund, sehr kurz geschnabelt, angeschwollen, aufsteigend. Perlen.

Beide Arten gedeihen in unsern Gärten unter freiem Himmel und werden aus Saamen gezogen.

Goldbachia Mikani Trin. ist *Aira brasiliensis*. Spr.

1. *Gomaria Ruiz et Pav.* Fl. peruv. Gomarie.

Kelch fünfstheilig. Corolle röhrig, in der Mitte zusammengezogen, der Rand zweispiglig, der Anhang krugförmig. Narbe kopfförmig. Kapsel zweifächerig, die Klappen gespalten.

Didynamia Angiospermia (Familie Personaten)

1. *Gomaria racemosa* R. et Pav. Traubenblüthige Gomarie.

Ein Baum, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter länglich-lanzettförmig, an der Spitze gezähnt. Blumen traubenständig. Waterl. Peru. 5

Diesen Baum pflanzt man in Dammerde (Laub- oder Walderde) die gehörig mit Sand und etwas gutem lehmigem Erdreich oder Rasenerde gemischt ist, und stellt ihn ins warme oder temperirte Haus. Fortpflanzung und Vermehrung auf die bekannte Art und Weise, nämlich durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.

Gomesia Rob. Brown. Gomeße.

Sepala 2 inferiora connata sub labello breviori indivisa sessili 2cristato, cum basi columnae apterae liberae continuo. Massae pollinis 2lobae, retinaculo communi Spr. Syst. Veg. 3. p. 680.

Gynandria Monandria. (Familie Orchideen.)

1. *Gomesia recurva* R. Br. Gefrümmte Gomeße.

Zwiebel länglich. Blätter lanzettförmig, gerippt, gefaltet. Schaft abwärts gebogen. Blumen ährenförmig, hängend. Die zwei untern Blumenblätter verbunden. Lippe flach, mit 2 Kämme. Pollenmasse zweispiglig. Waterl. Brasilien. 24

2. *Gomesia stricta* Spr. Straffe Gomeße.

Physanthera callistachys Bertol.

Der Stengel trägt gewöhnlich nur ein Blatt. Dieses ist länglich-lanzettförmig, stumpf, lederartig. Schaft straff. Blumen traubenständig, mit lappenförmigen Bracteen. Waterl. Jamaica. 24

Kultur: Man behandelt die Gomeßen in Hinsicht auf

Standort und Boden wie andere Orchideen, die aus Tropenländern kommen, siehe *Cymbidium* n. a.

Gomphia Linn. Gomphie. (Nagelbeere) f. Lexic. B. 4.

Kelch und Corolle fünfblättrig. Zehn fast anstehende verlängerte Antheren, die an der Spitze mit zwei Poren sich öffnen. Steinfrucht fünffach, fleischig.

Decandria Monogynia (Familie Schöoneen.)

Die Arten dieser Gattung sind Bäume und Sträucher, deren Blätter wechselnd stehen, einfach und meist mit zwei kleinen Ackerblättern versehen sind. Blumen trauben- oder rispenständig.

† Foliis integerrimis. Blätter ganzrandig.

1. *Gomphia grandiflora* Candolle. Großblumige Gomphie. (Correia Veloz. Vandel.)

Blätter länglich-eiförmig, langgespitzt, ganzrandig. Blumen in gipfelständigen straffen Rispen. Corollenblätter rundlich, länger als der Kelch. Vaterl. Brasilien. ♀ Blühz. Sommer.

2. *Gomphia aquatica* Kunth. Humb. et Bonpl. Nov. gen. VI. p. 14. Wasserlebende Gomphie. Ind. Onocochenini.

Blätter länglich-eiförmig, spitzlich, un deutlich geädert, glatt. Blumentrauben lang, fast einfach. Corollenblätter gelb, ein wenig länger als der Kelch. Vaterl. Südamerika, am Orinoco-Flusse. ♀ Blühz. Mai.

3. *Gomphia oleasfolia* Hilar. Fl. brasil. Oelbaumblättrige Gomphie.

Blätter länglich-lanzettförmig, stumpflich, am Rande zurückgerollt, filzig. Blumen rispenständig. Corollenblätter länger als der Kelch. Vaterl. Brasilien. ♀

4. *Gomphia longifolia* Lamarck. Langblättrige Gomphie. Ouratea guianensis Aubl.

Blätter länglich, gespitzt, verlängert, an der Basis fast herzförmig, glatt. Blumen in weitschweifigen Rispen. Vaterl. Guadalupe und Guiana. ♀

5. *Gomphia guianensis* Richard. Guianische Gomphie.

Blätter länglich, stumpf, fast ausgekerbt, meist ganzrandig. Die Blumen bilden Rispen, deren Aeste büschelförmig stehen. Kelchblätter länglich, stumpflich. Vaterl. Guiana. ♀

6. *Gomphia obtusifolia* Cand. Stumpfblättrige Gomphie.

Ochna oktusifolia Lam. *G. laevigata* Vahl. f. Lex.

B. 4. gehört hierher.

Blätter länglich-spatelförmig, stumpf. Blumen in zusammengefügten Trauben, deren Aeste dreispaltig sind. Kelchblätter lanzettförmig, langgespitzt. Vaterl. Madagascar. h

7. *Gomphia cassinaefolia* Cand. Cassinablättrige Gomphia.

Blätter herz-eiförmig, stumpf. Blumen in einfachen gipfelfständigen Trauben. Vaterl. Brasilien. h

†† Foliis subserratis, serratis, dentatis. Blätter fast sägerandig, vollkommen sägerandig oder gezähnt.

8. *Gomphia parviflora* Cand. Kleinblumige Gomphia.

Blätter lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt, undeutlich gefeibt. Blumen rispenständig. Corollenblätter so lang als der Kelch. Vaterl. Brasilien. h

9. *Gomphia parvifolia* Hilar. Kleinblättrige Gomphia.

Blätter stiellos, klein, eiförmig, fast ganzrandig, unten wie die Aestchen filzig. Blumen traufförmig stehend, mit Bracteen. Corollenblätter kreisrund Vaterl. Brasilien. h

10. *Gomphia ceylanica* Cand. (*Ochna ceylanica* Lam.)

Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, fast gezähnt. Blumen in langen gipfelfständigen Trauben. Steinfrucht kugelig. Vaterl. Seylon. h

11. *Gomphia dependens* Cand. Herabhängende Gomphia.

Blätter länglich-lanzettförmig, verlängert, meist gezähnt. Aestblätter lanzettförmig, stehen bleibend. Blumentrauben einfach, sehr lang, herabhängend. Vaterl. Madagascar. h

12. *Gomphia malabarica* Cand. Malabarische Gomphia.

Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, gezähnt, ohne Rippen, glänzend. Blumen in Trauben, die Rippen bilden. Vielleicht nur eine Varietät von einer andern Art. Vaterl. Malabar. h

13. *Gomphia angulata* Cand. Eckige Gomphia.

Blätter länglich-umgekehrt-eiförmig, an der Basis verdünnt, fast herzförmig, sägerandig. Die Blumen bilden lange, fast zusammengefügte Trauben, deren Aeste eckig sind. Vaterl. Madagascar. h

14. *Gomphia glaberrima* P. Brown. Glatte Gomphia.

Blätter länglich-lanzettförmig, langgespitzt, an der Spitze

sägerandig, fast ohne Adern, glatt, glänzend. Blumentrauben einfach. Waterl. Guinea. h

15. *Gomphia mexicana* Humb. et Bonpl. Plant. aequin. 2. p. 21. t. 74.

Blätter länglich, gespitzt, sägeartig gezähnt, die Serraturen scharf. Blumentrauben kurz, fast einfach. Corollenblätter gelb, kaum länger als der Kelch. Steinfrucht länglich=keulenförmig. Waterl. Mexiko, zwischen Acapulco und Chilpancingo, am südlichen Meerufer. h Blüht daselbst im April.

16. *Gomphia reticulata* P. Br. Negeradrig Gomphie.

Blätter länglich=lanzettförmig, gespitzt, sägerandig, negeradrig. Blumen rispenständig. Waterl. Guiana. h

17. *Gomphia cardiosperma* Cand. (*Ochna cardiosperma* Lam.)

Blätter länglich=lanzettförmig, fein sägerandig, geadert. Blumen in straffen Rispen. Frucht umgekehrt, herzförmig=weilappig. Guiana. h

18. *Gomphia acuminata* Cand. Langgespizte Gomphie.

Blätter länglich, langgespitzt, unten blaßgrün, an der Spitze sägerandig, Blumen rispenständig. Waterl. Brasilien. h

19. *Gomphia squamosa* Cand. Schuppige Gomphie.

Blätter länglich=lanzettförmig, fast sägerandig, geadert. Afterblätter gehäuft, schuppenförmig, gegrannt, stehen bleibend. Blumentrauben fast rispenständig. Waterl. die caribäischen Inseln. h

20. *Gomphia casianaeifolia* Cand. Kastanienblättrige Gomphie.

Correia 1 Vandelli.

Blätter länglich, gespitzt, sägerandig, die Serraturen scharf. Blumen in sehr ästigen Rispen. Corollenblätter so lang als der Kelch. Brasilien.

21. *Gomphia ilicifolia* Cand. Hülsenblättrige Gomphie.

Blätter oval=länglich, hornig=gezähnt, glatt. Blumen eine gipfelständige, pyramidenförmige-Rispe bildend. Waterl. St. Domingo.

22. *Gomphia floribunda* Hilar. Vielblümige Gomphie.

Blätter länglich, langgespitzt, fast ganzrandig, wie Dachziegeln über einander liegend. Blumen in reichen gipfelständigen Rispen, die mit Bracteen besetzt sind. Corollenblätter umgekehrt, eiförmig=kreisrund. Waterl. Brasilien.

23. *Gomphia suaveolens* Hilar. Gutriechende Gomphia.
Blätter länglich, langgespitzt, fast ganzrandig, fast ohne Rippen. Blumen sehr zahlreich, klein, strauchförmig stehend. Kelch und Corollenblätter von gleicher Länge. Antheren glatt. Vaterl. Brasilien. h
24. *Gomphia cuspidata* Hilar. Feinspitzige Gomphia.
Blätter länglich, stumpf, mit einer feinen mucronenartigen Spitze versehen. Blumentrauben gipfelfständig. Antheren mit querlaufenden Runzeln bezeichnet. Vaterl. Brasilien. h
25. *Gomphia hexasperma* Hilar. Sechssäamige Gomphia.
Blätter länglich-lanzettförmig, langgespitzt, undeutlich, sägerandig, unten aberlos. Blumen in gipfelfständigen Rippen. Früchte sechssäamig? Vaterl. Brasilien. h
26. *Gomphia olivaeformis* Hilar. Olivenförmige Gomphia.
Aeste und Blätter glatt. Blätter länglich, langgespitzt, undeutlich sägerandig. Blumen in gipfelfständige Trauben gesammelt. Antheren glattlich. Fruchtboden fleischig, kreiselförmig. Vaterl. Brasilien. h
27. *Gomphia curvata* Hilar. Gekrümmte Gomphia. h
Blätter länglich-eyförmig, gespitzt, lederartig, geadert, an der Spitze sägerandig, wie die Aeste glatt. Die Blumen bilden compacte gekrümmte Trauben, deren Stielchen mit kleinen Warzen besetzt sind. Corollenblätter länger als die Kelche. Vaterl. Brasilien. h
28. *Gomphia glaucescens* Hilar. Grauliche Gomphia.
Aeste, Blätter und Blumenstiele glatt. Blätter fast herzförmig-länglich, mucronenspitzig, an der Spitze sägerandig, grau- oder blaulichgrün. Blumentrauben gipfelfständig. Corollenblätter umgekehrt-eyförmig, länger als der Kelch. Antheren mit querlaufenden Runzeln versehen. Vaterl. Brasilien. h
29. *Gomphia lucens* Kunth. J. c. VII. p. 249. Leuchtende oder scheinende Gomphia.
Blätter länglich-lanzettförmig-langespitzt, an der Basis keilförmig, entfernt gezähnt, undeutlich geadert, glatt, leuchtend-glänzend. Blumentrauben gipfelfständig, zusammengesetzt. Corollenblätter gelb. Vaterl. Neugranada. h Frucht reife April.
30. *Gomphia semiserrata* Martius. Halbsägerandige Gomphia.

Blät

Blätter elliptisch, lederartig, vor sich sägezähmig. Blumen rispenständig. Corollenblätter kreisrund. Vaterl. Brasilien. h

31. *Gomphia persistens* Hilar. Gomphie mit bleibenden Kelchblättern.

Aeste und Blätter glatt. Blätter länglich, langgespitzt, sägerandig, lederartig. Blumen in gipfelförmige Rispen gesammelt. Kelchblätter stehen bleibend. Corollenblätter fast so lang als der Kelch. Vaterl. Brasilien. h

32. *Gomphia venosa* Spr. (*G. nervosa* Hilar.) Geaderte Gomphie.

Blätter lanzettförmig, langgespitzt, gezähnt, unten geadert. Blumen in Trauben, die Rispen bilden. Antheren mit querlaufenden Runzeln versehen. Vaterl. Brasilien. h

33. *Gomphia humilis* Hilar. Niedrige Gomphie.

Stengel staudenstrauchig, wie die Blätter glatt. Blätter länglich, lederartig, fast sägerandig. Blumen in Trauben, die Rispen bilden. Corollenblätter umgekehrt-eiförmig, länger als der Kelch. Antheren mit querlaufenden Runzeln versehen. Vaterl. Brasilien. h

34. *Gomphia nana* Hilar. Zwergige Gomphie.

Stengel staudenstrauchig. Blätter länglich-eiförmig, gespitzt, sägerandig. Aesterblätter stehen bleibend. Die Blumen bilden theils winkelförmige Trauben, theils gipfelförmige Rispen. Corollenblätter fast so lang als der Kelch. Antheren mit querlaufenden Runzeln versehen. Vaterl. Brasilien. h

Kultur. Die Gomphien (Nagelbeere) gedeihen am besten in warmen Häusern, doch können auch einige Arten z. B. N. 15, 18. den Sommer über an einem beschützten Orte im Freien stehen. N. 2. verlangt mehr Wasser als die übrigen Arten, denn sie wächst in ihrem Vaterlande in und an Bässern, am Ufer des Orinoco-Flusses; den Topf, in welchem die junge Pflanze steht, stellt man in einen Untersatz und füllt letztern so oft es nöthig ist, mit Fluß oder Regenwasser. Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge. Uebrigens s. Vericon B. 4.

- Gomphocarpus* Rob. Brown. (*Asclepias* Linn. u. a.)

Character generic. s. 1. Nachtr. B. 3. S. 552.

Kranz (innere Corolle) aus fünf Klappen bestehend, die lappenförmig und mit einem Zahn versehen sind. Balgklappen aufgeblasen und weichschlig.

Dietr. Ver. 2r Nachtr. IV. Bd.

D

Pentandria Digynia (Familie Contorten, Gruppe Asclepiadeen.)

1. *Gomphocarpus arborescens* R. Br. ist *Asclepias arborescens* Linné. f. Lexic. 1. Aufl. 1. B.

Stengel baum- oder strauchartig. Die Aeste zottenhaarig. Blätter zu 2 einander gegenüberstehend, länglich-eyförmig, mucronenspitzig, glatte. Blumen weiß, in gipfelständige Dolden gesammelt. Balgkapseln rundlich-eyförmig oder länglich, aufgeblasen, weichstachlig. Waterl. Kap d. g. Hoffm. h

2. *Gomphocarpus crispus* R. Br. (*Asclepias crispa* Linn. f. Lexic. 1. Aufl. B. 1. S. 759.)

Stengel strauchig, aufrecht, filzig, unten ästig. Blätter gegenüberstehend, fast stiellos, herz- oder lanzettförmig, wellenrandig-gekräuselt, scharfborstig. Blumen purpurroth, in gestielten gipfelständigen Dolden. Waterl. Kap d. g. Hoffm. h

3. *Gomphocarpus fruticosus* R. Br. (*Asclepias fruticosa* Linn.) f. Lexic. 1. Aufl. B. 1. S. 770.

Stengel strauchig, aufrecht. Aeste filzig. Blätter gegenüberstehend, linien- oder lanzettförmig, feinspitzig, am Rande zurückgerollt. Blumen weiß und bilden seitenständige überhängende Dolden. Balgkapseln eyförmig, aufgeblasen, gespitzt, weichstachlich- oder borstig. *Asclepias crassifolia* Linn. Syst. Veg. p. 214. ist eine Varietät. Waterl. Kap d. g. Hoffm. h

4. *Gomphocarpus viridis* Spr. Grüner Gomphocarpus. *Asclepias viridis* Walt. *Anantherix* Nuttall.

Stengel krautartig. Blätter gegenüberstehend, länglich, mucronenspitzig, filzig. Blumen in seitenständigen Dolden. Waterl. Florida. 2 Frl.

5. *Gomphocarpus viridiflorus* Spr. Grünblumiger Gomphocarpus.

Asclepias viridiflora Walt. Carol.

Stengel krautartig, rauchhaarig. Blätter fast stiellos, lanzettförmig, stumpflich, auf beiden Seiten filzig- oder behaart. Blumen grün; sie bilden seitenständige fast stiellose kugelige Dolden, die überhängen. Waterl. Nordamerika. 2

6. *Gomphocarpus longifolius* Spr. (*Asclepias incarnata* Walt. *Acerates* Elliott. *Asclep. longifolia* Michaux. f. 1. Nachtr. B. 1. S. 345. Auch *Asclep. floridana*

Lam. f. 1. Nachtr. hat Spreng. Syst. Veg. mit dieser Art vereinigt.)

Stengel krautartig, liegend. Blätter wechselnd stehend, lineenförmig, verlängert, filzig. Dolden seitenständig, aufrecht. Vaterl. Carolina.

7. *Gomphocarpus setosus* R. Br. Hierher gehört *Asclepias setosa* Forsk. f. Lexic.

Stengel strauchig, knieartig gebogen. Blätter gegenüberstehend, lineenförmig, am Rande zurückgerollt. Dolden aufrecht, wenigblumig. Vaterl. Arabien. h

Kultur. N. 4., 5. und 6. gedeihen unter freiem Himmel und kommen fast in jedem Boden fort. Die übrigen, mit strauchigem Stengel, pflanzt man in Töpfe in gute lockere Erde und überwintert sie im temperirten oder Glashaufe. Fortpflanzung durch Saamen.

Gompholobium Smith Gompholobium.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 552.

Kelch fünftheilig, fast gleich. Corolle schmetterlingsförmig. Fährchen flach. Zehn freistehende Staubfäden. Ein Griffel. Hülse fast kugelförmig, sehr stumpf, vielSaamig.

Decandria Monogynia. (Familie Hülsenpflanzen.)

1. *Gompholobium grandiflorum* Smith. f. 1. Nachtr. Hierzu gehört: *Gompholobium setifolium* Sieber als Varietät, die sich bloß durch schmälere und längere borstenförmige Blätter unterscheidet.

2. *Gompholobium barbigerum* Cand. Bartiges Gompholobium.

Stamm strauchig. Blätter dreizählig. Blättchen spatellinienförmig, mucronenspitzig, glatt. Blumenstiele einzeln stehend. Das Fährchen der schmetterlingsförmigen Corolle groß, über den Kelch hervorragend, das Schiffehen an der Spitze mit Barthhaaren dicht besetzt. Zu dieser Art gehört *Gompholobium fimbriatum* Sieber. Vaterl. Neuhoiland. h Blühz. Frühling und Sommer.

3. *Gompholobium virgatum* Sieber. Ruthenförmiges Gompholobium.

Stengel strauchig. Aeste walzenrund, ruthenförmig. Blätter dreizählig. Blättchen aufrecht, lineenförmig, stumpflich. an der Spitze schwielig. Blumenstiele fast traubenständig. Das Schiffehen der Corolle nackt. Vaterl. Neuhoiland. h

4. *Gompholobium tetrathecoides* Sieb. Tetrathecaartiges Gompholobium.

Neste walzenrund, sehr kurz, zottenhaarig. Blättchen linien-fadenförmig, mit einem kurzen Mucrone versehen. Blumen meist gipfelfständig, das Schiffchen nackt. Vaterl. Neuholland. $\frac{1}{2}$

5. *Gompholobium pedunculare* Cand. Langstieliges Gompholobium.

Blättchen ungleich, untere umgekehrt-eiförmig, mucronenspitzig, obere linien-lanzettförmig, langgespitzt. Afterblätter so lang als der Blattstiel. Blumenstiele lang, an der Basis und Spitze mit zwei Bracteen versehen. Vaterl. Neuhol- land. $\frac{1}{2}$

Die Gompholobien entwickeln ihre lieblichen Blumen im Frühlinge und Sommer. Eine Anleitung zu ihrer Kultur im Allgemeinen s. 1. Nachtr. B. 3. S. 556. Zu den daselbst angezeigten Synonymen gehören noch folgende.

Synonymen.

Gompholobium fimbriatum Sieb. f. *Gompholobium*
barbigerum N. 2.

———— furcellatum Bonpl. ist *Jacksonia furcel-*
lata 2. Nachtr.

———— minus Sm. ist *Burtonia minor*. Cand.

———— pinnatum Sm. ist *Gompholobium ve-*
nustum R. B. s. 1. Nachtr.

———— setifolium Sieb. f. *Gompholobium gran-*
diflorum N. 1.

Gomphrena Linn. Winterblume; Kugelamaranth; *Gom-*
phrena s. Lexic. B. 4.

Character generie. s. 1. Nachtr. B. 3. S. 556.

Kelch gefärbt, fünfblättrig, von zwei gegen einander sich neigenden Bracteen unterstützt. Fünf einsächerige Antheren auf einer cylindrischen Staubfadenröhre, die oft mit abwechselnden Zähnen (Nectarshuppen) versehen ist. Ein halbgespaltener Griffel. Kapsel einsamig, in der Basis der Staubfadenröhre eingeschlossen.

Pentandria Monogynia (Familie Chenopodeen.)

I. Capitatae. Blumen gedrängt, in Köpfen gesammelt.

† Erectae. Stengel aufrecht oder aufsteigend.

a. Capitulis basi foliatis. Blumenköpfchen an der Basis von Blättern unterstützt.

In dieser ersten Abtheilung gehören die im Lexikon beschriebenen Arten: *Gomphrena globosa*, *perennis*, *serrata*, *arborescens*, *hispida* Linn. *G. angustifolia* Vahl. und folgende.

1. *Gomphrena officinalis* Martius Reise in Brasilien 1. p. 280. Officinelle Gomphrena; Kugelamaranth.

Bragantia Vandelli. p. 50. ed. Roem.

Wurzel dick, knollig. Stengel aufsteigend, blättrig, wie die Blättchen rauchhaarig. Blätter eiförmig, spiglich, mucronenspigig, die obersten, neben den Blumen, gedrängt stehend, eine vielblättrige Hülle bildend. Blumenköpfschen halbkugelig, gipfelständig. Bracteen keilsförmig, kammförmig = gezähnt. Kelche an der Basis wollig, so lang als die Bracteen.

Herr v. Martius sagt: „die Pflanze gehört wegen der großen hochrothen glänzenden Blumen, welche sie am Ende des niedrigen Stengels trägt, zu den prächtigsten Zierden der Fluren. Die Wurzel wird von dem Landmanne (in Brasilien) als ein Universalmittel gegen allgemeine Schwäche, Dispesie, Magenkrampf, intermittirende Fieber u. s. w. gebraucht und geschätzt.“ Waterl. Brasilien. 4 Blühz. Sommer.

2. *Gomphrena gnaphaloides* Vahl. Ruhrkrautartiger Kugelamaranth.

Celosia gnaphaloides Linn. *C. lanata* Poir. Pfaffia Mart.

Stengel krautig, wie die Blätter wollig. Blätter länglich = eiförmig, mucronenspigig. Blumenköpfschen kugelig, gipfelständig, von zwei Blättern unterstützt. Waterl. Monte Video. h

3. *Gomphrena canescens* R. Brown. Graulicher Kugelamaranth.

Stengel wollig. Blätter linienförmig, filzig = graulich. Blumenköpfschen meist zweiblättrig. Waterl. Neuhoiland.

4. *Gomphrena macrocephala* Hilar. plant. us. brasil. 1. 32. Großköpfiger Kugelamaranth; Gomphrena.

Stengel aufsteigend, wie die Blätter sehr rauchhaarig. Blätter gestielt, länglich = lanzettförmig mit gelbrothen Haaren bekleidet. Blumenköpfe groß, halbkugelig, vielblättrig, die Hüllblättchen sehr lang. Bracteen gezähnt = kammförmig. Waterl. Brasilien.

5. *Gomphrena desertorum* Mart. Fl. brasil.

Stengel aufrecht, zweispaltig. Blätter lanzettförmig, unten wie der Stengel sitzig. Blumenköpfchen langgestielt, zweiblättrig. Bracteen keilförmig, dann fahnenförmig. Vaterl. Brasilien.

6. *Gomphrena leucocephala* Mart. Weißköpfige Gomphrena; Kugelamaranth.

Stengel aufrecht, zart, gabelästig. Blätter lanzettförmig, unten zottenhaarig. Blumenköpfchen weiß, vierblättrig. Bracteen keilförmig, am Riele sägeartig gezähnt. Kelche dicht wollig. Vaterl. Brasilien.

7. *Gomphrena eriophylla* Mart. Wollblättriger Kugelamaranth.

Stengel aufrecht, einfach, wie die Blätter mit Wolle dicht bekleidet. Blätter eiförmig, gespitzt. Blumenköpfchen stiellos, kugelig, zweiblättrig. Bracteen kürzer als die Kelche. Vaterl. Brasilien.

8. *Gomphrena Haenkeana* Mart. Hänkescher Kugelamaranth.

Stengel aufsteigend, ästig. Blätter lanzettförmig, gespitzt, wie der Stengel sitzig. Blumenstiele lang, blättrig. Blumenköpfchen zweiblättrig. Vaterl. Brasilien.

9. *Gomphrena celosioides* Mart. Fahnenkammartige Gomphrena.

Stengel aufsteigend, armförmig-ästig, wie die Blätter behaart. Blätter eiförmig-lanzettförmig. Blumenstiele lang, gipfelförmig. Blumen walzenrunde Aehren bildend, die Aehren mit zwei Blättern versehen. Vaterl. Brasilien. (Ad. fl. Platan.)

10. *Gomphrena pulchella* Mart. Zierlicher Kugelamaranth.

Stengel aufsteigend, ästig, wie die Blätter, mit Stacheln besetzt. Blätter lanzettförmig, gespitzt. Blumenköpfchen langgestielt, kugelig, zweiblättrig. Bracteen dreimal kürzer als der Kelch. Vaterl. Monte Video.

11. *Gomphrena villosa* Mart. Zottenhaariger Kugelamaranth.

Stengel einfach. Blätter eiförmig-lanzettförmig, mucronenspitig, zottenhaarig. Blumenköpfchen kugelig, zweiblättrig. Bracteen kürzer als die Kelche. Vaterl. Monte Video.

12. *Gomphrena agrestis* Mart. Feldliebender Kugelamaranth.

Stengel aufrecht, fast einfach, wie die Blätter stiellos-

zottenhaarig. Blätter lanzettförmig. Blumenköpfchen seitens- und gipfelständig, zweiblättrig. Bracteen fast so lang als die Kelche. Vaterl. Brasilien, auf Aedern.

13. *Gomphrena nigricans* Mart. Schwärzlicher Kugelamaranth.

Stengel fast einfach. Blätter lanzettförmig, unten, wie der Stengel wollig-zottenhaarig. Blumenstiele lang, strichlig. Köpfchen zweiblättrig. Bracteen so lang als die Kelche. Vaterl. Brasilien.

14. *Gomphrena scapigera* Mart. Schaftartiger Kugelamaranth.

Stengel aufrecht, einfach, oben nackt, schaftartig, wie die Blätter sehr rauchhaarig. Wurzelblätter lanzettförmig. Blumenköpfchen kugelförmig, von 3—5 Blättern unterstützt. Bracteen fast gegrannt, so lang als die Kelche. Vaterl. Brasilien.

β. Capitulis aphylla. Blumenköpfchen blattlos.

Gomphrena flava, *brasiliensis* Linn. f. Lexic. B.

4. gehören hierher und folgende Arten.

15. *Gomphrena macrorrhiza* Mart. Dickwurzeliger Kugelamaranth.

Wurzel dick, rübenförmig. Stengel gabelästig. Blätter lanzettförmig, unten zottenhaarig. Blumenköpfchen gestielt, kugelig. Bracteen kürzer als die Kelche. Vaterl. Brasilien.

24

16. *Gomphrena debilis* Mart. Schwachstengeliger Kugelamaranth.

Stengel aufrecht, an der Basis getheilt. Blätter lineal-lanzettförmig, unten zottenhaarig. Blumenstiele lang, fadenförmig. Blumenköpfchen kugelförmig. Bracteen filzig, kürzer als die Kelche. Vaterl. Brasilien. ○

17. *Gomphrena sericantha* Mart. Quirlblättriger Kugelamaranth.

Wurzel holzig, ästig, faserig. Stengel aufrecht, fast einfach. Blätter lanzettförmig, unten dichtfilzig, oberste quirlförmig stehend. Blumenstiele lang. Kelche seidenhaarig. Vaterl. Brasilien. 24

18. *Gomphrena mollis* Mart. Weichblättriger Kugelamaranth.

Stengel aufrecht, ästig. Blätter lanzettförmig, gespitzt,

grau = zottenhaarig, weich, fast seidenhaarig. Bracteen eiförmig, kürzer als die Kelche. Vaterl. Brasilien.

19. *Gomphrena rupestris* Nees & Esenb. Felsen = Kugelamaranth.

Gomphrena Schultesia Martius.

Stengel aufrecht, getheilt. Blätter linienförmig, gespitzt, weiß = zottenhaarig. Blumenköpfchen langstielig, kugelig. Bracteen kürzer als die Kelche. Vielleicht nur eine Varietät von einer der vorhergehenden Arten. Vaterl. Brasilien.

20. *Gomphrena virgata* Mart. Ruthenförmiger Kugelamaranth.

Stengel ästig, ruthenförmig, filzig. Blätter linienförmig, gespitzt, glatt. Blumenköpfchen ährenförmig, wechselnd stehend. Bracteen kürzer als die Kelche. Vaterl. Brasilien.

21. *Gomphrena vaga* Mart. Zweitheiliger Kugelamaranth.

Stengel aufrecht, zweitheilig. Blätter gestielt, länglich = eiförmig, gespitzt, unten zottenhaarig, wie mit Spinnengewebe bedeckt. Blumenköpfchen gestielt, fast zu 3 stehend. Bracteen kürzer als die Kelche. Vaterl. Brasilien.

22. *Gomphrena elegans* Mart. Schöner Kugelamaranth.

Stengel aufrecht, gabelästig, rostfarbig = filzig. Blätter gestielt, länglich, unten an den Adern gelb = zottenhaarig. Blumenköpfchen gestielt, kugelig. Bracteen kürzer als die Kelche. Vaterl. Brasilien.

23. *Gomphrena incana* Mart. Grauhaariger Kugelamaranth.

Stengel aufrecht, fast einfach, oben blattlos. Wurzelblätter länglich = lanzettförmig, grau = zottenhaarig. Blumenköpfchen winkeln- und gipfelständig. Bracteen kürzer als die Kelche. Vaterl. Brasilien.

†† Procumbentes. Stengel gestreckt; niederliegend.

Gomphrena decumbens Jacq. *G. vermiculata* Sw. f. Lexic. B. 4. gehören hierher, und folgende Arten.

24. *Gomphrena prostrata* Mart. Gestreckter Kugelamaranth.

Stengel gestreckt, ästig. Blätter fast herz = eiförmig, gespitzt, zottenhaarig. Blumenköpfchen gestielt, kugelig. Bracteen kürzer als der Kelch. Vaterl. Brasilien.

25. *Gomphrena demissa* Mart.

Stengel gestreckt, gespalten. Blätter lanzettförmig, gespitzt, unten wie der Stengel filzig. Blumenköpfchen zweiblättrig.

Bracteen lammsförmig, so lang als die Kelche. Waterl. Brasilien.

26. *Gomphrena bicolor* Mart. Zweifarbiger Kugelamaranth.

Stengel gestreckt, ästig, mit Strichborsten besetzt. Aestchen braun. Blätter lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt. Blumenköpfchen halbkugelförmig, stiellos, die Blätter neben den Blumen an der Spitze brandig. Bracteen gezähnt-geflügelt. Waterl. Brasilien.

27. *Gomphrena humilis* R. Brown. Niedriger Kugelamaranth.

Stengel liegend, flzig. Blätter liniensförmig, fast zottenshaarig. Blumenköpfchen blattlos. Kelche wollig. Waterl. Neuholland.

II. *Spicatae*; calycibus ventricosus, stigmate capitata. Die Blumen bilden Aehren. Kelche aufblasen. Narben kopfförmig.

28. *Gomphrena angustiflora* Mart. Nov. gen. t. 121. Schmalblümige (schmalblättrige) Gomphrena.

Stengel dünn, aufrecht, ästig, eilig. Blätter liniensförmig, sehr schmal, graulich, wie der Stengel glatt. Die Blumen bilden fast vierreihige blattlose schlaife Aehren. Bracteen sehr kurz. Kelche corollinisch, röhrig, verlängert. Waterl. Brasilien. ☉

29. *Gomphrena Humboldtiana* Roem. et Schult. Syst. veg. (*G. lanata* Kunth. *Hoplotheca lanata* Mart.)

Stengel an der Basis liegend, dann aufsteigend. Blätter länglich-lanzettförmig, unten, wie der Stengel, flzig-wollig. Die Blumen bilden dichte, an der Basis unterbrochene Aehren, die unten entfernt, aber an der Spitze des Stengels zu 2 einander gegenüber stehen und stiellos sind. Bracteen vertieft, (hohl) kürzer als die bauchig-röhrigen Kelche. Narbe vielspaltig. Waterl. Südamerika, im Sandboden, am Orinoco-Flusse. ☉ Blühz. Mai — Juni.

30. *Gomphrena floridana* Spr. (*Oplotheca florida* Nuttall.)

Stengel aufrecht, drüsig. Blätter lanzettförmig, gespitzt, behaart. Blumen in entfernten gegenüberstehenden Aehren, die Rippen bilden. Waterl. Florida.

31. *Gomphrena amaranthoides* Roth. Amaranthenartige Gomphrena.

Stengel aufrecht, fleischig gebogen. Blätter eiförmig, langgespißt, glatt. Blumen in fadenförmigen unterbrochenen Aehren. Kelche glatt. Narben fünf. Hierher gehört *Achyranthes amaranthoides* Lam. Pers. f. 1. Nachtr. B. 1. S. 90.

Die Gomphrenen sind krautartige Pflanzen (selten baum- oder strauchartig) deren Blätter einander gegenüber stehen. Blumen in zierliche Köpfchen oder Aehren gesammelt. Die meisten kommen aus Tropenländern und blühen im Sommer. Man zieht sie aus Saamen, in warmen Beeten, setzt hernach die Pflanzen einzeln in Töpfe, in gute leichte Dammerde und stellt sie an einen ihrem Vaterlande angemessenen Ort.

Synonymen.

- Gomphrena aggregata* Willd. f. *Philoxerus aggregatus* I. Nachtr. B. 6.
 — *brasiliensis* Jacq. (non Linn.) f. *Mogipharus brasiliensis* Mart.
 — *conica* Spr. ist *Philoxerus conicus* R. Br. f. 1. Nachtr. B. 6.
 — *crassifolia* Spr. ist *Philoxerus crassifolius* Kunth f. 1. Nachtr. B. 6.
 — *diffusa* Spr. ist *Philoxerus diffusa* Kunth f. 1. Nachtr. B. 6.
 — *ficoides* Linn. ist *Illecebrum ficoideum* Willd. f. Lexic. B. 5.
 — *flaccida* R. Br. ist *Gomphrena angustifolia* Vahl. f. Lexic. B. 4.
 — *lanata* Kunth. f. *Gomphrena* N. 29.
 — *polygonoides* Linn. ist *Illecebrum polygonoides*.
 — *Schultesia* Mart. f. *Gomphrena rupestris* Nees N. 19.
 — *sericea* Spr. f. *Pfaffia sericea* Mart.
 — *stenophylla* Spr. f. *Pfaffia glauca*.
 — *tuberosum* Spr. f. *Pfaffia sericea*.

Gomutus Rumph. *Gomutus*.

Blumen monöcis, stiellos. Kelch und Corolle dreiblättrig. Antheren zahlreich, mucronenspißig. Beere dreisaamig. Embryo seitenständig.

Monoecia Polyandria (Polyandria Trigynia Spr.) (Familie Palmen.)

1. *Gomutus saccharifer* Spr. Syst. veg. 2: p. 624.
(*Areng. saccharifer* Labill.)

Stoek (Stamm) von mittlerer Stärke und Höhe. Laub (Wedel) gefiedert, sehr lang. Laubstiele unbewaffnet. Kolben herabhängend. Weibliche Blumen mit drei Griffeln versehen. Waterl. die Moluckischen Inseln und Cochinchina. h. Treibh.

Gonatocarpus Willd. Spec. pl. 1 f. Lexic. B. 4. f. *Goniocarpus*.

Gongora Ruiz. et Pavon. Gongore.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 556.

Die drei äußern Blumenblätter abstehend, die innern klein, am Rande des Griffelsäulchens eingefügt, herablaufend. Nectarlippe höckerig, pfugfschaarförmig, langgespißt, gezähntbuchtig. Griffelsäulchen fast keulensförmig.

Gynandria Monandria (Familie Orchideen.)

1. *Gongora quinquenervia* R. et P. f. 1. Nachtr.

Blätter lanzettförmig, säufrippig. Die äußern Blumenblätter vertieft (hohl) Lippe mit 2 Zähnen versehen.

2. *Gongora atropurpurea* Hooker. Exot. fl. t. 178.
Purpurrothe Gongore.

Blätter länglich, gerippt, gefaltet. Blumenblätter schwarzpurpurroth, äußere flach. Lippe fast siebenzählig. Waterl. Insel Trinidad. 4

Kultur: wie andere Orchideen, die aus Tropenländern kommen. S. *Dendrobium*, *Cymbidium* u. a.

Goniocarpus Thunb. Spreng. Syst. veg. (*Gonatocarpus* Willd. Sp. pl.)

Keuch viertheilig. Corolle vierblättrig. Vier Staubfäden. Vier Narben. Ruß achtedig, einsamig.

Tetrandria Tetragynia (Familie Onagreen.)

1. *Goniocarpus micranthus* Thunb. f. *Gonatocarpus micranthus* Lexic.

2. *Goniocarpus salsoloides* Reichenb.

Blätter linienförmig, glatt. Blumen gehäuft, gipfelständig. Waterl. Neuholland.

3. *Goniocarpus scaber* König.

Blätter lanzettförmig, eingeschnitten, sägezählig, scharf. Blumendhyren zusammengesetzt. Waterl. Macao.

Goniocheton arborescens Blum, f. *Trichilia arborescens* Spr.

Gonocarpus tetragyna Labill. f. *Halorachis Gonocarpus*.

Gonolobus Rob. Brown. Michaux. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 557.

Corolle radförmig. Kranz (innere Corolle) lappig, ringförmig. Balgkapseln gerippt oder stachelig. Saamen mit Haarkronen versehen.

Pentandria Digynia (Familie Contorten; Apocynen.)

Die Arten dieser Gattung sind Sträucher oder Staudensträucher, theils krautartige perennirende Pflanzen, deren Stengel sich winden; die Blätter stehen einander gegenüber, die Blumenstiele meist zwischen Stengel und Blättern, auch an den Enden der Stengel und Aeste. Blumen in Dolden oder Traubendolden.

I. Floribus umbellatis. Blumen doldenständig.

† Foliis glabris. Blätter glatt.

1. *Gonolobus guianensis* Spr. (*Cynanchum viridiflorum* Meyer. Fl. Essequib. p. 141.)

Stengel krautartig, windend, knieartig gebogen. Blätter gestielt, herz-eiförmig, langgespitzt, ganzrandig, 2—3 Zoll lang, glatt, unten negaderig. Dolden gestielt, winkelförmig, wenigblüthig. Kelch fünftheilig. Corolle radförmig, grünlich, doppelt länger als der Kelch. Waterl. Guiana, im Gesträuch. 4 Blüthz. April — August.

2. *Gonolobus Nuttallianus* Spr. (*Cynanchum viridiflorum* Nuttall)

Stengel krautartig oder staudenstrauchig, gewunden. Blätter fast nieren-herzförmig, gespitzt, langgestielt. Corolle grünlich, die Einschnitte länglich, stumpf. Waterl. Nordamerika, am Mississippi. 4

3. *Gonolobus undulatus* Rob. Brown. ist *Cynanchum undulatum* Linn. f. Lexic.

4. *Gonolobus laevis* Michx.

Blätter fast herz-eiförmig, langgespitzt, glatt. Blumen doldenständig, glatt. Waterl. Nordamerika.

5. *Gonolobus albus* Poir. Weißblättriger *Gonolobus*.

Blätter fast herz-eiförmig, gespitzt, unten weiß. Dolden vielblüthig. Waterl. Peru.

6. *Gonolobus barbatus* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. 3. t. 239.

Stengel windend. Aeste fähig. Blätter eiförmig, langge-

spitzt, glatt. Dolben gestielt, vielblümig. Einschnitte des Kelches länglich-lanzettförmig, gespitzt. Corolle radförmig, die Einschnitte eiförmig, fast langgespitzt, bartig, doppelt länger als der Kelch. Narbe fünfstheilig. Vaterl. Mexico am Meerufer bei Campeche. ♀?

†† Foliis pubescentibus. Blätter filzig.

7. *Gonolobus diadematus* Ker. Gezierter Gonolobus.

Stengel und Blätter mit gelbrothen Haaren geziert. Blätter länglich-herzförmig, gespitzt, buchtig-wellenrandig. Dolben zusammen gezogen. Corolle radförmig, die Einschnitte abstehend. Vaterl. Mexico.

8. *Gonolobus carolinensis* R. Br. Hierher gehört: *Vinca lutea* Linn. *Echites truncata* Lam. *Cynanchum carolinense* Jacq. und *Gonolobus macrophyllus* Michx.

9. *Gonolobus hirsutus* Michx. Rauchhaariger Gonolobus.

Stengel und Blätter sehr haarig. Blätter länglich-herzförmig, gespitzt. Corolle radförmig, die Einschnitte stumpf. Balgkapsel weichstachlig. Vaterl. Nordamerika.

10. *Gonolobus obliquus* R. Br. ist *Cynanchum obliquum* Jacq. f. Lexic.

11. *Gonolobus hirtus* R. Br. ist *Cynanchum hirtum* Linn. f. Lexic.

12. *Gonolobus rostratus* R. Br. ist *Cynanchum rostratum* Vahl. f. Lexic.

13. *Gonolobus grandiflorus* R. Br. ist *Cynanchum grandiflorum* Cav. f. Lexic.

14. *Gonolobus maritimus* R. Br. ist *Cynanchum maritimum* Linn. f. Lexic.

II. Floribus racemoso - corymboso. Blumen in Trauben - Dolbentrauben.

15. *Gonolobus discolor* Roem. et Schult. (*Cynanchum discolor* Sims. Bot. Mag. t. 1273.)

Stengel gewunden, scharfborstig. Blätter herzförmig. Blumenstiele länger als die Blattstiele. Blumen dolbentraubig. Corolle grün, in der Mitte braun-kupferfarbig. Einschnitte linien-lanzettförmig. Vaterl. Nordamerika. 24

16. *Gonolobus racemosus* R. Br. ist *Cynanchum racemosum* Linn. f. Lexic.

17. *Gonolobus riparius* Kunth J. c. 3. p. 208. Synops. pl. 2. p. 285.

Neste behaart. Blätter eysförmig, langgespitzt, unten wenig behaart. Blumenstiele vielblümig. Corolle radförmig. Einschnitte länglich = lanzettförmig, glatt, dreimal länger als die Kelche. Vaterl. Neugranada, an Quellen und am Magdalena = Flüsse. ♀ ? Blühz. Mai.

18. *Gonolobus crispiflorus* R. Br. ist *Cynanchum crispiflorum* Ait. f. Lexic.

19. *Gonolobus planiflorus* R. Br. ist *Cynanchum planiflorum* Linn. f. Lexic.

20. *Gonolobus niger* R. Br. ist *Cynanchum nigrum* Cav. f. Lexic.

21. *Gonolobus suberosus* R. Br. ist *Cynanchum suberosum* Linn. f. Lexic.

22. *Gonolobus prostratus* R. Br. ist *Cynanchum prostratum* Cav. f. Lexic.

23. *Gonolobus floccosus* Bertol.

Blätter herzförmig, langgespitzt, unten filzig = flockig. Blumen geknaut = traubig. Balgkapseln weichstachelig. Vaterl. Guadalupe.

24. *Gonolobus aristolochioides* Kunth J. c. 3. p. 208. Synops. 2. p. 285.

Blätter herz = eysförmig, gespitzt, unten, wie die Nistchen, filzig. Blumenstiele vielblümig, doldentraubig. Die Einschnitte der Corolle länglich = eysförmig, spitzlich, glatt, viermal länger als der Kelch. Vaterl. Caracas, an niedern feuchten Orten. ♀ Blühz. März — April.

25. *Gonolobus pauciflorus* Spr. Wenigblümiger *Gonolobus*.

Stengel strachig, glatt. Neste filzig. Blätter länglich, stumpf. Blumenstiele meist dreiblümig, winkelfständig. Vaterl. St. Domingo ♀

+++ *Floribus solitariis*. Blumen einzeln stehend.

26. *Gonolobus uniflorus* Kunth J. c. 3. p. 207. t. 238. Einblümiger *Gonolobus*.

Neste und Blätter filzig. Blätter länglich = herzförmig, sehr lang, gespitzt. Blumenstiele einblümig. Die Einschnitte der Corolle eysförmig, langgespitzt, bartig, doppelt länger als die lanzettförmigen Einschnitte des Kelches. Vaterl. Mexico, bei der Hauptstadt. ♀ ? Blühz. Juli.

Kultur. N. 2, 8, 15 gedeihen in unsern Gärten un-

ter freiem Himmel, und kommen fast in jedem Boden fort. Die übrigen Arten überwintert man in Gewächshäusern. Fortpflanzung durch Saamen; die Sträucher durch Ableger und Stecklinge, die perennirenden auch durch Sprossen und Wurzeltheilung.

Gonolobus macrophyllus Michx. f. *Gonolobus carolinensis* N. 8.

Gonolobus veridiflorus Nutt. f. *Gonolobus Nuttallianus* N. 2.

Gonus amarissimus Lour. f. *Brucea sumatrana* Roxb. f. Lexic.

Gonyanthes Blum. Spreng. Syst. veg. curante p. 306.

Blumen monöisch. Kelch corollinisch, röhrig, dreizählig. Antheren 3, im Schlunde eingefügt. Narben dreilappig, an den Antheren Lappen angewachsen. Kapsel unten stehend, dreiseitig, einfächerig. Saamen klein gekantet.

Monoecia Triandria (Familie Eyteneen.)

1. *Gonyanthes candida* Blum.

Eine zarte krautartige Schwammpflanze, deren Schaft vieredig ist und 3—4 Blumen trägt. Sie wächst in Java und ist in Annal. des scienc. nat. 3. p. 369. beschrieben.

Gonytrichum caesium Nees & Esenb. ist *Sporotrichum verticillatum* Spr.

Gonzalea Pers. (*Gonzalagun* Ruiz et Pav.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. C. 557.

Kelch glocken=krugförmig, vierspaltig, stehen bleibend. Corolle meist trichterförmig, langröhrig, der Rand viertheilig, abstehend. Staubfäden 4, eingeschlossen. Narbe kopfförmig, vierlappig. Steinfrucht niedergedrückt=kugelig, fast vierknöpfig, 4 einfächerige, vielkörnige Hüfte.

Tetrandria Monogynia (Familie Rubiaceen.)

1. *Gonzalea cornifolia* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. 3. p. 325.

Diese Art hat Kurt Sprengel im Syst. veg. 1. p. 417. zur *Gonzalea panamensis* Pers. gezogen f. 1. Nachtr. Aeste walzenrund. Blätter gegenüber stehend, kurzgestielt, länglich=eyförmig, langgespitzt. Austerblätter zwischen den Blattstielen, pfriemenspitzig, sitzig. Die Blumen bilden einzelne dünne gipfelstäubige Aehren, 9—10 Zoll lang; die obern Blumen stehen zerstreut, die untern büschelförmig=ge-

häuft, mit 3—4 liniensförmigen Bracteen. Vaterl. Neugranada. \bar{h} Blühz. Junius.

2. *Gonzalea parviflora* Schlechtend. Linn. B. 6. Heft 3. p. 414.

Blätter gegenüberstehend, elliptisch = lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt, 5—6 Zoll lang. Blumen klein, blaß, rosenroth, in einfache Trauben gesammelt. Corolle 2 Linien lang, röhrig = präsentirtellerförmig, inwendig behaart. Einschnitte gerundet. Vaterl. Südamerika? \bar{h}

3. *Gonzalea pulverulenta* Humb. et Bonpl. Plant. equin. 1. p. 228. Kunth J. c. 3. p. 416.

Blätter lanzettförmig, an der Basis stumpf, unten, wie die Aeste, pulverig = filzig. Aetherblätter pfriemenspizig. Blumentrauben rispenständig. Vaterl. Peru. \bar{h}

4. *Gonzalea tomentosa* Humb. et Bonpl. Pl. equin. 1. p. 225. t. 61.

Dieser Strauch wird 6—9 Fuß hoch, ist sehr ästig und hat weiß = filzige Aeste, deren Knoten zusammengedrückt sind. Blätter gestielt, gegenüberstehend, länglich, langgespitzt, ganzrandig, geadert, unten weiß = filzig. Aetherblätter abgekürzt = eiförmig, langgespitzt, filzig, kürzer als die Blattstiele. Blumen in gestielte, 6—7 Zoll lange, aufrechte Aehren gesammelt, die gipfelständige Rispen bilden. Kelch napf = oder trugförmig, undeutlich vierzählig, stehen bleibend, auswendig filzig. Corolle fast tellerförmig, weiß, filzig, der Rand vierspaltig, der Eingang zur Röhre behaart. Antheren liniensförmig, eingeschlossen. Steinfrucht fast ausgetrocknet, zusammengedrückt = kugelig, viereckig, filzig. Vaterl. Peru, in heißen Gegenden. \bar{h}

Die Gonzaleen verlangen gute lockere Dammerde und warme Standörter, denn sie kommen aus Tropenländern. Fortpflanzung durch die Ausaat des Saamens und durch Stecklinge in warmen Beeten.

Goodenia Smith. Goodenia. f. Lexic. B. 4. S. 441.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 558.

Kelch fünfstheilig. Corolle der Länge nach gespalten, zweilippig, auch einlippig, die Einschnitte geflügelt. Fünf freistehende Antheren. Narbe trugförmig, mit einem oft gewimperten Schleierchen versehen. Kapsel zweifächerig, meist viel-saamig, die Scheidewand parallel. Saamen zusammengedrückt.

Pen-

Pentandria Monogynia (Familie der Stodenblumen, Gruppe Lobeliaceen.)

I. Corolla bilabiata, flava. Corolle zweilippig, gelb.
† Pedunculis terminalibus. Blumenstiele gipfels-
ständig, mit Bracteen versehen.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon beschriebenen
Arten: *Goodenia bellidifolia*, *paniculata* Smith. und
folgende.

1. *Goodenia stelligera* Rob. Brown. Sternhaarige Goodenie.

Stengel krautartig, fast nackt. Wurzelblätter fleischig, halbs-
cylindrisch, glatt, an der Spitze gezähnt. Blumen ährenstän-
dig, sternhaarig = filzig. Waterl. Neuholland. 2

2. *Goodenia humilis* R. Br. Niedrige Goodenie.

Wurzelblätter verlängert = lanzettförmig, fast gezähnt. Der
Stengel niedrig, nur mit wenigen Blättern besetzt, die wech-
selnd stehen. Blumen in einfachen filzigen Rispen. Fruchtkno-
ten mit einfachen Haaren bekleidet. Waterl. Neuholland. 2

3. *Goodenia gracilis* R. Br. Dünnstengliche Goodenie.

Wurzelblätter linien = lanzettförmig, verlängert, dicklich.
Stengel dünn, wenig blättrig, wie die einfache Blumenrispe,
glatt. Corolle auswendig drüsig = filzig. Waterl. Neuhol-
land. 2

4. *Goodenia armerifolia* Sieber. Armerienblättrige Goodenie.

Stengel kraut, nur mit wenigen Blättern besetzt, glatt.
Blätter wechselnd stehend, abgekürzt, linienförmig, ganzran-
dig. Blumenstiele zottenhaarig, kurz. Corollen bartig. Wa-
terl. Neuholland. 2

5. *Goodenia decurrens* R. Br. Herablaufende Goodenie.

Stengel blättrig, glatt. Blätter wechselnd stehend, läng-
lich, gezähnt, herablaufend. Blumen trauben = ährenständig.
Corolle auswendig filzig. Neuholland.

†† Pedunculis axillaribus. Blumenstiele winkels-
ständig.

Goodenia ovata, *heterophylla*, *hederacea* Smith.,
grandiflora Sims. s. Lexic. und 1. Nachtr. gehören hiers-
her und folgende Arten.

6. *Goodenia acuminata* R. Br. Langgespitzte Goodenie.

Stengel staudenstrauchig, wie die Blätter pulverig, fast
filzig. Blätter eiförmig, langgespitzt, sägeartig gezähnt.

Dietr. Ex. st. Nachtr. IV. Bd.

9

Blumenstiele winkelförmig, dreispaltig. Die Einschnitte des Kelches flach. Saamen zweireihig. Vaterl. Neuhollland. h

7. *Goodenia varia* R. Br. Bunte Goodenie.

Stengel staudenstrauchig, wie die Blätter glatt. Blätter umgekehrt = eiförmig, spitzlich, gezähnt, lederartig. Blumenstiele theils dreispaltig, theils einfach. Corolle und Griffel glatt. Vaterl. Neuhollland. h

8. *Goodenia rotundifolia* R. Br. Rundblättrige Goodenie.

Stengel krautartig, wie die Blätter glattlich. Blätter rundlich, eingeschnitten = gesägt. Blumenstiele einfach, mit kurzen Bracteen besetzt. Griffel glatt. Neuhollland.

9. *Goodenia pubescens* Sieb. Filzige Goodenie.

Stengel aufrecht. Aestchen filzig. Blätter umgekehrt = eiförmig, eingeschnitten = gezähnt, glattlich. Blumen fast stiellos. Vielleicht nur eine Varietät von einer andern Art, die Smith und R. Br. bestimmt haben.

10. *Goodenia barbata* R. Br. Bartige Goodenie.

Stengel krautartig, wie die Blätter, drüsig = filzig. Blätter linien = lanzettförmig, ganzrandig. Blumenstiele einblüthig. Corolle im Schlunde bartig = haarig. Griffel behaart. Kapsel einsächerig, meist dreisaamig. Vaterl. Neuhollland, die Insel van Diemen. 4

11. *Goodenia geniculata* R. Br. Gelenkige Goodenie.

Stengel krautartig, wie die Blätter filzig. Blätter linien = lanzettförmig, ungetheilt. Blumenstiele lang, zur Seite der Fruchtreife gelenkig = zurückgeschlagen. Vaterl. Neuhollland.

12. *Goodenia lanata* R. Br. Wollige Goodenie.

Stengel kurz, fast fehlend. Aeste gestreckt. Blätter umgekehrt = eiförmig, fast gezähnt, behaart, in der Jugend, so wie der Fruchtknoten wollig. Blumenstiele verlängert. Corolle gewimpert. Vaterl. Insel van Diemen.

13. *Goodenia glabra* R. Br. Glatte Goodenie.

Stengel kurz, fast fehlend. Aeste gestreckt, wie die Blätter glatt. Blätter spatelförmig, fast gezähnt. Blumenstiele einblüthig. Corolle am Rande nackt. Vaterl. Neuhollland.

+++ Redunculis obraceatis. Blumenstiele nackt, ohne Bracteen.

14. *Goodenia mollis* R. Br. Weichblättrige Goodenie.

Blätter fast herz = eiförmig, gespitzt, sägerandig, weichzottenhaarig. Blumenstiele winkelförmig. Corollenröhre sackförmig. Vaterl. Neuhollland.

15. *Goodenia elongata* Labill. nov. holl. 1. p. 52. t. 75.
Langstielige Goodenie.

Stengel aufrecht, fadenförmig, wie die Blätter behaart. Wurzelblätter länglich = spatelförmig, gezähnt. Stengelblätter wechselnd stehend, lanzettförmig, fast ganzrandig, an der Basis verdünnt. Blumenstiele lang, winkels- und gipfelfständig. Fruchtstiele zurückgeschlagen. Kelche scharfborstig. Waterl. Insel van Diemen. 4

16. *Goodenia hispida* R. Br. Scharfborstige Goodenie.

Stengel aufrecht, wie die Blätter strichborstig. Blätter stiellos, lanzettförmig, verlängert, fast gezähnt. Blumenstiele lang, einzeln, winkelfständig. Fruchtstiele aufrecht. Kelche scharfborstig. Waterl. Neuholland.

17. *Goodenia coronopifolia* R. Br. Schlipblättrige Goodenie.

Blätter linienförmig, wie der Stengel und Blumenstiele glatt. Wurzelblätter fiederspaltig = gezähnt. Stengelblätter ganzrandig. Blumenstiele einzeln, winkelfständig, zur Zeit der Fruchtreife (Fruchtstiele) aufrecht. Waterl. Neuholland. 4

18. *Goodenia tenella* R. Br. Zarte Goodenie.

Wurzelblätter spatel = lanzettförmig, fast filzig. Stengel kurz, fast fehlend. Blumenstiele lang, wenig behaart, zur Zeit der Fruchtreife aufrecht. Waterl. Neuholland.

19. *Goodenia filiformis* R. Br. Fadenförmige Goodenie.

Stengel einfach, wie die Blätter glatt. Wurzelblätter fadenförmig. Stengelblätter klein. Blumenstiele gipfelfständig, fast doldenartig. Waterl. Neuholland.

20. *Goodenia quadrilocularis* R. Br. Vierfächerige Goodenie.

Stengel aufrecht, wie die Blätter glatt. Blätter fast oval, gezähnt. Blumen in winkelfständige Aehren gesammelt. Kapsel vierfächerig? Waterl. Neuholland.

21. *Goodenia dubia* Spr. (*Calogyne pilosa* R. Br.)

Stengel krautartig, wie die Blätter behaart. Blätter einzeln geschnitten - gezähnt. Blumenstiele einblümig, winkelfständig. Corolle gelb? Griffel dreispaltig. Kapsel meist einsächerig. Waterl. Neuholland. ☉?

II. *Corolla bilabiata coerulea*. Corolle zweilippig, blau oder purpurröthlich.

22. *Goodenia purpurascens* R. Br. Purpurröthliche Goodenie.

Stengel nackt, wie die Blätter glatt. Wurzelblätter lanzettförmig, verlängert. Die Blumen bilden weitschweifige Rispen. Waterl. Neuholland.

23. *Goodenia pterygosperma* R. Br. Geschleirte Goodenie.

Stengel fast einfach, wenigblümig, wie die Wurzelblätter linienförmig, meist gezähnt. Blumen wechselnd stehend. Die Einschnitte des Kelches stumpflich, wie der Fruchtknoten glatt. Narbe mit einem gewimperten Schleierchen versehen. Waterl. Neuholland.

24. *Goodenia coerulea* R. Br. Himmelblane Goodenie.

Der Stengel getheilt, oder fast einfach, wenigblümig. Wurzelblätter linienförmig, wie der Stengel, glatt. Die Einschnitte des Kelches gespitzt, wie der Fruchtknoten drüsig. Corolle zweiflappig, blau. Waterl. Neuholland.

25. *Goodenia incana* R. Br. Grau = filzige Goodenie.

Stengel fast einfach, wie die Blätter grau = filzig. Blätter länglich = linienförmig, entfernt wechselnd stehend. Corolle blau, auswendig, wie der Fruchtknoten wollig. Waterl. Neuholland.

III. Corolla unilabiata. Corolle einslippig, die Einschnitte gespitzt. Narbe zweiflappig.

26. *Goodenia scapigera* R. Br. Schaftartige Goodenie.

Schaft aufrecht, wie die Blätter glatt. Blätter lanzettförmig, gezähnt. Blumen eine gestielte gipfelständige Aehre bildend. Die Einschnitte des Kelches pfriemenspitzig. Waterl. Neuholland.

27. *Goodenia viscida* R. Br. Klebrige Goodenie.

Stengel aufrecht, lang, schaftförmig, wie die Blätter glatt, klebrig. Blätter lanzettförmig, gezähnt. Blumenstiele winkelförmig, sehr kurz, einblümig. Narbe zweispaltig. Neuholland.

28. *Goodenia repens* Labill. nov. holl. 1. t. 76. Kriechende Goodenie.

Stengel kriechend. Blätter lanzettförmig, fleischig. Blumenstiele einblümig, mit zwei Bracteen besetzt. Corolle fast einslippig, purpurröthlich. Waterl. Neuholland.

29. *Goodenia Pumilio* R. Br.

Stengel kriechend = filzig. Blätter eiförmig, filzig, häutig. Blumenstiele einblümig. Waterl. Neuholland.

Die Goodenien sind krautartige Pflanzen (nur wenige stau-

Fig oder Staudenstrauchig), meist gestengelt. Blätter wechselnd stehend, ungetheilt, gezähnt oder eingeschnitten-fiederspaltig. Alle Arten kommen aus Neuholand und werden in unsern Gärten in Glashäusern oder in ähnlichen frostfreien Behältern überwintert. Ihre Dauer hängt oft vom Standorte und der übrigen Behandlung ab; sie sind dann perennirend oder einjährig und blühen im Frühlinge und Sommer. Eine Anweisung zu ihrer Kultur, im Allgemeinen siehe Lexikon B. 4. S. 442.

Synonymen.

- Goodenia alba* Smith ist *Scaevola microcarpa* Cav.
 — *calendulacea* Andr. f. *Scaevola suaveolens* R. Br.
 — *laevigata* Lexic. f. *Scaevola microcarpa* 1. Nachtr.
 — *radicans* Pers. f. *Selliera radicans* Cav.
 — *ramosissima* Smith f. *Scaevola hispida* Cav.
 — *tenella* Andr. non R. Br. f. *Velleria trinervia* Labill.

Goodia Salisbury. Charact. generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 561. und 2 Arten.

Goodia polysperma Cand. ist *Cytisus tomentosus* Andrews.

Goodia simplicifolia Spr.

Blätter einfach, lanzettförmig. Blumen in winkelförmigen Trauben, die Rispen bilden. (*Platychilum Celsianum* Delaun. herb. amat. t. 187. Cand.) Waterl. Neuholand.

Goodyera Rob. Brown. *Goodyere*.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 562.

Kelch (Corolle) zweilippig, rachenförmig, die zwei untern Blätter unter der sackförmig ungetheilten Lippe stehend. Griffelsäulen frei, die Narbe auf einem besondern Fortsatze. Die Anthere verbindet eine Drüse. Pollenmasse eifig.

Gynandria Monandria (Familie Orchideen.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines ehemaligen Botanikers in England, Herrn John Goodyer.

1. *Goodyera repens* R. Br. Kriechende *Goodyere* ist *Satyrion repens* Linn. siehe *Neottia repens* Swartz Lex. B. 6. S. 345.

2. *Goodyera discolor* Ker, Zweifarbiges *Goodyere*.

Wurzel kriechend? Blätter länglich, gerippt, unten gefärbt. Blumen in eine zottenhaarige Aehre gesammelt. Bracteen häutig, verlängert, Blumenblätter helmförmig. Lippe an der Basis gedreht und mit zwei sackförmigen Höckern versehen. Vaterl. Brasilien. 4

3. *Goodyera nuda* Thuars. Nackte Goodyere.

Wurzel kriechend, Blätter eiförmig, nehaderig-gerippt. Die Blumen bilden eine aufrechte nackte glatte Aehre. Blumenblätter und Lippe länglich, stumpf, Griffelsäulchen mit zwei Knien. Vaterl. Mascaren-Insel. 4

4. *Goodyera occulta* Thuars. Verborgene oder heimliche Goodyere.

Blätter länglich, gerippt, Blumen in eine dichte Aehre gesammelt. Bracteen so lang als die Blumen, deren Blätter und Lippe lanzettförmig und gewimpert sind. Griffelsäulchen an der Spitze mit zwei Furchen versehen, Pollenmassen fast zu 4. Vaterl. Mascaren-Insel. 4

5. *Goodyera procera* Hook. exot. fl. (*Neottia procera* Ker.)

Blätter lanzettförmig, gerippt. Blumen in einer langen aufrechten glatten Aehre, Bracteen abgefürzt, Blumenblätter und Lippe eiförmig, spitzlich. Vaterl. Nepal. 4

Kultur. N. 1, wächst in Europa und kommt in unsern botanischen Gärten fast in jedem guten Gartenboden fort. Die übrigen Arten überwintert man in Gewächshäusern, Fortpflanzung durch Samen und Wurzeln.

Gordonia Linn, *Gordonie*, f. Lexic, B. 4.

Character generic, f. 1, Nachtr, B. 3. S. 563.

Kelch einfach, fünfblättrig. Fünf Corollenblätter, die an der Basis zusammenhängen und mit den Staubfäden verbunden sind, Griffel fünfkantig. Narbe fünfkappig. Kapsel fünfkächerig; jedes Fach enthält zwei geflügelte Samen.

Monadelphica Polyandria (Familie Malvaceen.)

1. *Gordonia Wallichii* Cand. Wallische Gordonie.

Gord, *Chilaunea* Don-Schima, *Noronhae* Reinw. Var.

Blätter länglich, langgespitzt, ganzrandig. Blumenstiele abgefürzt. Kelchblätter gewimpert, Vaterl. Nepal. h

2. *Gordonia excelsa* Blum. (*Schima excelsa* Reinw.) Hohe Gordonie.

Blätter länglich-lanzettförmig, langgespitzt, sägeartig ge-

zähne. Blumenstiele winkelförmig, einblüthig, kürzer als die Blätter. Waterl. Java. h

3. *Gordonia anomala* Spr. (*Camellia axillaris* Sims. Bot. Mag.)

Blätter spatel- oder lanzettförmig, lederartig, obere ganzrandig, glänzend. Blumenstiele einzeln, winkelförmig, fast stiellos, eingekeult. Kelch von Bracteen unterstützt. Waterl. die Meerenge von Malacca. h

Die zierlichen Blumen der Gordonia entwickeln sich vom Juni und Juli bis in Herbst. Man pflanzt sie in gute lo- derre Erde und überwintert sie in Gewächshäusern. Fortpflan- zung durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.

Synonymen.

Gordonia Chilaunea Don. f. *Gordonia Wallichii* N. 1.

— *Franklinii* Herit. f. Lexic. ist *Gordonia pu- bescent* Var.

— *semiserrata* Spr. ist *Wikstroemia fruticosa* Schrad. *Haemocharis semiserrata* Mart.

— *tomentosa* Spr. ist *Haemocharis* Mart.

Gorteria Linn. Gorterie.

Von dieser Gattung hat Sprengel in Syst. Veg. nur zwei Arten; *G. ciliata* Thunb. und *personata* Linn. aufge- stellt, die übrigen, welche ich im Lexikon und 1 Nachtr. nach Linn. und Thunb. beschrieben habe, zu andern Gattungen gezogen; *Berkheya*, *Gazania*, *Cullumia*. Die Gattung *Mussinia* Willd., in der auch einige Gorterien als Synonymen vorkommen, hat Sprengel gar nicht erwähnt, und auch die Synonymen im Register nicht angezeigt.

Gossypium Linn. Baumwolle f. Lexic. B. 4.

Kelch doppelt: äußerer (Hülle) groß, dreitheilig, die Theile gespalten oder gezähnt; innerer trugförmig, fünfspaltig oder fünfzählig. Corolle fünfblättrig. Narben 3—5. Kapsel 3—5 fächerig, vielkammerig. Saamen rundlich, in Wolle gehüllt.

Monadelphia Polyandria (Familie Malvaceen.)

1. *Gossypium religiosum* Linn.

Stengel baum- oder strauchartig. Blätter herzförmig, unten an der Mittelrippe drüsig. Die äußern Kelchtheile (Hüll- blätter) gespalten; übrigen siehe Lexikon a. a. O.

2. *Gossypium barbadense* Linn. f. Lexic. (*Goss. purpurascens et racemosum* Poir.)

Aeste, Blattstiele und Blattrippen schwarz punktiert. Blätter herzförmig, glatt, ungetheilt oder 3-5 lappig, unten mit drei Drüsen versehen. Die Theile des äußern Kelches gespalten. Saamen frei. Vaterl. die caraisischen Inseln. h Kultur der Baumwollenarten f. Lexikon B. 4.

Synonymen.

Gossypium eglandulosum Cav. ist *Gossypium indicum*

Lam. f. Lexic.

— *javanicum* Blum. ist *Gossypium herbaceum*
Linn. f. Lexic.

— *latifolium* Murr. f. Lexic. ist *Gossypium*
vitifolium Var. f. Lexic.

— *obtusifolium* Roxb. ist *Gossypium micran-*
thum Cav. f. Lexic.

— *purpurascens* Poir. f. *Gossypium barbaden-*
se N. 2.

— *racemosum* Poir. f. *Gossypium barbaden-*
se N. 2.

Gothofreda cordifolia Vent. f. *Oxypetalum Gothofreda*.

Gouania Linn. f. Lexic. B. 4. (*Gouania*.)

Charact. generic. f. I. Nachtr. B. 3. S. 568.

Blumen polygamisch. Kelch glockenförmig, fünfstheilig. Fünf schuppenförmige Corollenblätter, die im Schlunde des Kelches eingefügt sind, und fünf längliche Antheren bedecken. Griffel halb dreispaltig. Kapsel dreifächerig, meist geflügelt, dreisamig.

Pentandria Monogynia (Familie Rhamneen.)

1. *Gouania paniculata* Spr. Rispenblüthige Gouanie.

Blätter eiförmig, gespitzt, sägerandig, dreifach gerippt, glatt. Blumen in Aehren gesammelt, die lange Rispen bilden. Keine Gabeltrauben. Vaterl. Westindien. h

2. *Gouania smilacina* Smith. Smilaxartige Gouanie.

Blätter herzförmig, gespitzt, sägeartig gezähnt, glattlich. Asterblätter pfriemenspizig. Blumenstiele doldenartig, fast so lang als die Blätter. Vaterl. Brasilien ?

3. *Gouania cordifolia* Radd. Herzförmige Gouanie.

Blätter herz-eiförmig, sägeartig gezähnt, glattlich. Asterblätter sehr klein. Blumenköpfchen winkelig und gipfelförmig, scharfborstig. Vaterl. Brasilien. h

4. *Gouania Erythrolia* Radd. Haselstrauchblättrige Gouanie.

Blätter fast herz-eiförmig, gespitzt, fast gezähnt = drüsig, unten flzig. Die Blumen bilden lange winkels und gipfelsständige Trauben. Vaterl. Brasilien. ♀

5. *Gouania canescens* Richard. Grauliche Gouanie.

Blätter länglich = lanzettförmig, gespitzt, unten graulich. Blumentrauben winkels und gipfelsständig. Vaterl. Guiana. ♀ Diese Art bedarf noch einer genauern Untersuchung und Bestimmung.

6. *Gouania stipularis* Cand. Mexicanische Gouanie.

Blätter fast herz-eiförmig, langgespitzt, sägerandig, glattlich. Afterblätter groß, halb pfeilsförmig, langgespitzt. Blumen traubenständig? Früchte mit drei Flügeln versehen. Vaterl. Mexico. ♀

7. *Gouania cyclocarpa* Smith. Rundflügelige Gouanie.

Blätter elliptisch = länglich, gespitzt, undeutlich sägerandig, in der Jugend rostfarbig = seidenhaarig. Fruchtflügel schmal, kreisrund. Vaterl. Westindien?

8. *Gouania aptera* Cand. Ungeflügelte Gouanie.

Blätter fast herz-eiförmig, spitzlich, grob gezähnt = sägerandig, auf beiden Seiten zottenhaarig. Blumentrauben winkels und gipfelsständig. Früchte umgekehrt-eiförmig, ohne Flügel. Vaterl. Südamerika.

9. *Gouania denticulata* Smith. Gezähnelte Gouanie.

Blätter eiförmig, langgespitzt, an der Spitze gezähnt, unten scharfborstig. Blumentrauben winkelsständig, an der Spitze mit Gabelranken versehen. Vaterl. Ostindien. ♀?

10. *Gouania Retinaria* Cand. (*G. microcarpa* Cand. Var. *Retinaria scandens* Gaertn.)

Blätter eiförmig, spitzlich, fast sägerandig, unten flzig. Blumentrauben länger als die Blätter. Früchte mit drei Flügeln versehen. Vaterl. Mascaren-Insel.

Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören, habe ich im ersten Nachtrage beschrieben. Sie kommen alle aus Tropenländern und gedeihen in unsern Gärten am besten in warmen Häusern, doch können auch einige Arten den Sommer über an einem beschützten sonnenreichen Orte unter freiem Himmel stehen; im Herbst, oder sobald die Witterung den Aufenthalt im Freien nicht mehr gestattet, werden sie ins Treib-

haus zurückgebracht. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.

Synonymen.

Gouania domingensis Aubl. (non Linn. et Lam.) f.

Lexic. ist *Gouania stricta*?

— *incisa* Vahl. f. 1. Nachtr. ist *Gouania mauritana* Lam. Var.

— *microcarpa* Cand. f. *Gouania Retinaria* N.

— *nepalensis* Wallich ist *Gouania tiliifolia* Lam. f. 1. Nachtr.

Goupia glabra Aubl. ist *Glossopetalum glabrum* Willd.

Goupia tomentosa Aubl. ist *Glossopetalum tomentosum* Willd.

Grabowskia boerhaaviaefolia Schlechtend. *Limnaea* B.

7. Heft 1. p. 72. ist *Lycium boerhaaviaefolium* Linn. f. Lexic. B. 5. S. 63.

Graemia Hooker f. *Grahamia* Spr.

Grahamia Spr. Syst. Veg. curante p. 297.

Blüthendecke (Kelch) einfach, vielblättrig, die Blätter zurückgeschlagen. Fruchtboden warzig, spreuig. Die Saamenkrone besteht aus fünf gewimperten geglätteten Spreublättern.

Syngenesia Aequalis (Familie Compositae, Gruppe Eupatarinae.)

Diese neue Gattung widmete Kurt Sprengel dem Herrn Botanikus Graham, der sich durch einige schätzbare Schriften um die Wissenschaft verdient gemacht hat. Es ist jetzt nur folgende Art bekannt.

1. *Grahamia aromatica* Spr. (*Graemia aromatica* Hooker exot. fl. t. 189.)

Stengel krautartig, ästig, aufrecht, wie die Blätter glatt, drüsig-klebrig. Blätter wechselnd stehend, linien-lanzettförmig, gezähnt, die untern fiederspaltig. Blumenstiele einzeln, gipfelständig. Blumen gelb. Vaterl. Chili. ☉ Blüht. Sommer.

Die ganze Pflanze verbreitet einen ziemlich starken aromatischen Geruch, kommt im hiesigen bot. Garten fast in jedem Boden fort, ist ästig und wird 1 bis 1½ Fuß hoch. Der Saame wird in einem temperirten Mistbeete ausgesät, dann werden die jungen Pflanzen, wenn kein Frost mehr zu fürchten ist, ins freie Land gesetzt.

Grammica aphylla Lour. ist *Cuscuta carinata* R. Br.

Grammitis Swartz. Strichfarn. (Abbild. Schubr's Filic. t. 7.)

Fruchthäuschen (Kapseln) länglich, in geraden abgebrochenen Linien, an den Rippen auf der Rückseite des Laubes; sie sind nackt, d. h. ohne Schleierchen.

Cryptogamia Sect. I. (Filices Farnkräuter.)

† *Fronde simplici*. Laub (Wedel) einfach.

1. *Grammitis linearis* Swartz. Linienförmiger Strichfarn. *Polypodium gramineum* Sw. fl. ind. occid. 3. p. 1631.

Asplenium angustifolium Jacquin. Jc. var. 1. t. 199. Schk. 7.

Laub (Wedel) einfach, linienförmig, längespitzt, ganzrandig. Fruchthäuschen elliptisch, eingesenkt. Strunk (Laubstiel) an der Basis behaart. Vaterl. die blauen Berge in Jamaika. 4

2. *Grammitis tenella* Kaulf. Zarter Strichfarn.

Laub linienförmig, stumpf, glatt, ausgeschweift. Fruchthäuschen länglich. Strunk zart, fadenförmig, mit Epren besetzt. Vaterl. Sandwich-Inseln.

3. *Grammitis obtusa* Willd. herb. Stumpfer Strichfarn.

Laub stumpf, gerändert, wie der Stiel, gezähnt-borstig. Fruchthäuschen länglich. Stiel fadenförmig. Vaterl. Insel Mascaren. 4

4. *Grammitis Billardieri* Willd. Billarderischer Strichfarn.

Gramm. linearis Billard, in litt. Gr. australis R. Brown.

Laub 3—4 Zoll lang, linienförmig, langgespitzt, ganzrandig, an der Basis verdünnt. Fruchthäuschen flach, linienförmig. Strunk kurz, behaart. Vaterl. Neuholland. Kap van Diemen. 4

5. *Grammitis magellanica* Desv. (*Polypodium gramineum* Poir.)

Laub linien-lanzettförmig, stumpf, dicklich, fast ohne Adern, an der Basis herablaufend. Fruchthäuschen umgekehrt-eiförmig, flach. Strunk sehr kurz, glatt. Vaterl. Magellanische Meerenge. 4

6. *Grammitis marginella* Swartz. Gerandeter Strichfarn.

Polypodium marginellum Sw. Fl. ind. occid. 3. p. 1631.

Laub linienförmig, stumpf, ganzrandig, braun-gerändert, gewimpert, an der Basis verdünnt. Fruchthäuschen elliptisch. Stunk sehr kurz. Vaterl. Jamaica und die Ins. Helena. 4

7. *Grammitis involuta* Don. Eingerollter Strichfarn.

Laub lanzettförmig, langgespitzt, ganzrandig, lederartig, am Rande eingerollt. Fruchthäuschen aufgeschwollen, gerade. Vaterl. Nepal. 4

8. *Grammitis coriacea* Kaulf. Lederartiger Strichfarn.

Laub lanzettförmig, langgespitzt, lederartig, ohne Adern, ganzrandig, der Rand flach. Fruchthäuschen linienförmig, verlängert. Vaterl. Ins. Mascaren. 4

9. *Grammitis lanceolata* Swartz. Lanzettblättriger Strichfarn.

Asplenium plantagineum β. Lamarck. Encycl. p. 301. Illustr. gen. t. 867. f. 1.

Laub lanzettförmig, langgespitzt, ganzrandig, an der Basis verdünnt. Fruchthäuschen an den Rippen ununterbrochen fortlaufend, meist schief. Vaterl. Ins. Mascaren (Mauritii). 4

10. *Grammitis elongata* Swartz. Verlängerter Strichfarn.

Grammitis lanceolata Schkuhr. crypt. p. 9. t. 7.

Laub lanzettförmig, lang, ganzrandig, an beiden Enden verdünnt, fast stiellos. Das fruchttragende Laub linien-lanzettförmig. Fruchthäuschen linienförmig, die Rippen parallel liegend. Vaterl. Jamaica. 4

†† Fronde composita. Laub zusammengesetzt.

11. *Grammitis rutaefolia* Rob. Brown. Rautenblättriger Strichfarn.

Laub gefiedert, fädig. Blättchen keilförmig, ganzrandig oder eingeschnitten. Vaterl. Neuhollland; Ins. oder Kap van Diemen. 4

Die Strichfarn, welche aus Tropenländern kommen, pflanzt man in gute leichte Dammerde (Laub-, Wald- oder Heideerde) und stellt sie ins warme Haus. N. 5. 11. und einige andere nehmen auch mit Durchwinterung im Glashause oder Tepidarium vorlieb. Fortpflanzung durch Saamen und Wurzeltheilung.

Synonymen.

Grammitis asplenioides Pres. f. *Gymnogramme asplenioides*.

Grammitis aurea et *Ceterach*. Sw. f. *Gymnogramme*
Ceterach.

— *australe* R. Br. f. *Grammitis Billardieri*
N. 4.

— *cheilanthoides* Sw. f. *Gymnogramme fili-*
pendulaefolia.

— *flexuosa* Humb. f. *Gymnogramme flexu-*
osa.

— *graminoides* Sw. f. *Monogrammes fur-*
cata.

— *heterophylla* Labill. f. *Xiphopteris hetero-*
phylla.

— *hirta* Kunth. f. *Gymnogramme hirta*.

— *lanceolata* Schk. f. *Grammitis elongata*
N. 10.

— *leptophylla* Sw. f. *Gymnogramme lepto-*
phylla.

— *myosuroides* Sw. f. *Xiphopteris myosuroides*.

— *pumila* Sw. f. *Monogramme linearis*.

— *revoluta* Spr. Willd. f. *Pleopeltis revoluta*.

— *seminuda* Willd. f. *Taenitis pumila*.

Grangea bicolor Desf. f. *Cotula bicolor*.

— *chinensis* Lam. f. *Cotula cuneifolia* Willd.

— *decumbens* Desf. f. *Cotula minuta* Forst.

— *maderaspatana* Lam. f. *Cotula maderaspatana*.

Graphophorum cynosuroides Kön. Roth. ist *Triodia*
cynosuroides Spr. ..

Graphis Adans.

Der Thallus ist krustenartig, die Apothecien (Scheinfrüchte)
sind länglich und mit einer häutigen Hülle versehen.

Cryptogamia Sect. III. (Familie Lichenes, Gruppe
Hymenocarpi Meyer.)

In dieser Gattung hat Sprengel *Opegrapha* Ach. Fec.
n. a. gezogen und 66 Arten aufgeführt. Es sind Krustens-
flechten, die an Baumrinden in Tropenländern, manche auf
Ehinarinden vegetiren und daher in unsern bot. Gärten nicht
vorkommen.

Grateloupia Ag. Grateloupie.

Laub flach oder ästig, fadenförmig. Wargen an den Ver-
ästelungen gehäuft, durchbohrt. Fruchthäufchen elliptisch.

Cryptogamia Sect. IV. (Familie Algen, Gruppe Flo-
ridae.)

1. *Grateloupia crenata* Ag. Gekerbte Grateloupie.

Laub länglich-linienförmig. Einschnitte gleichbreit, an der Basis verdünnt, wellenrandig. Hierher gehört *Fucus ornatus* Linn. Wächst am Meerstrand im südlichen Afrika. ?

2. *Grateloupia filicina* Ag. (*Fucus filicinus* Wulff.)

Laub knorrig-gallertartig, linienförmig. Nesselchen zweitheilig, horizontal ausgebreitet. Wächst im mittelländischen Meere.

Gratiola Linn. Purgierkraut; Gnadenkraut s. Lexic. B. 4.

Character generic. s. 1. Nachtr. B. 3. S. 570.

Reich fünfstheilig, von drei Bracteen unterstützt. Die Corolle hat eine verkehrte Lage und vier ungleiche Einschnitte. Staubfäden 4, davon zwei unfruchtbar, einfach oder gespalten sind. Ein Griffel. Narbe zweilappig. Kapsel zweifächerig, vielsamig, die Scheidewand in der Mitte verdicke.

Diandria Monogynia. (Familie Personatae. Massensblumen.)

I. *Filamentis sterilibus integris.*

Die unfruchtbaren Staubfäden ungetheilt.

† *Calycibus bracteatis.*

Reiche von Bracteen unterstützt.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Verikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *G. virginica*, *pusilla* Linn. *G. pilosa* Michx. *G. ocimifolia* Vahl. *G. hispidula* Comm. *G. punctata* Colsm. *G. stricta*, *rugosa* Lour. und folgende.

1. *Gratiola officinalis* Linn.

Wurzel kriechend, gegliedert. Stengel krautartig, aufrecht, einfach oder unten mit einigen kurzen Aesten versehen, 12—18 Zoll hoch. Blätter gezähnt. Uebrigens siehe Verikon B. 4.

2. *Gratiola linifolia* Vahl. Enum. Hoffmans. et Link. Fl. port.

Grat. officinalis Brot. Fl. lusit. 1. p. 15.

Stengel krautartig, vieredig, aufsteigend, wenig ästig, 6—10 Zoll hoch, wie die Blätter glatt. Blätter gegenüberstehend, stiellos, umfassend, linienförmig, ganzrandig, gespitzt. Blumen einzeln, winkelförmig, gestielt. Kelchtheile linienförmig, gespitzt. Corolle purpurbölich-weiß. Der Helm gespalten. Unterlippe dreispaltig. Vaterl. Portugal. 4

3. *Gratiola crassifolia* Lagasc. Dickblättriges Purgierkraut; Gratiola.

Stengel aufrecht, unten Wurzeln treibend. Blätter dick, lanzettförmig, ganzrandig. Blumenstiele einblüthig. Narbe zweilappig. Vaterl. Spanien. 2.

4. *Cratiola caroliniensis* Pers. Carolinisches Purgirkraut. *Crat. virginica* Walt. *Gr. officinalis* Michx. (non Linn.)

Stengel krautartig, wenig ästig, wie die Blätter glatt, an der Basis gestreckt, unten walzenrund, oben fast viereckig. Blätter stiellos, länglich-lanzettförmig, stumpflich, gezähnt, dreirippig. Blumenstiele kurz, filzig. Kelchtheile linien-lanzettförmig, gleich. Corolle weiß, inwendig filzig. Die unfruchtbaren Staubfäden nackt. Vaterl. Carolina und Florida. 2.

5. *Cratiola viscosa* Schweinitz. Klebriges Purgirkraut; Klebrige Cratiola.

Gr. virginica Elliott. Bot. of. Carol. 1. p. 12.

Stengel fast rund, aufsteigend, klebrig-filzig. Blätter eilanzettförmig, gespitzt, gezähnt, dreirippig, glatt, stiellos. Blumenstiele lang. Kelchtheile linien-lanzettförmig, gleich. Corolle weiß, purpurroth gestreift, inwendig filzig, die Röhre gelb. Kapsel eiförmig, so lang als der Kelch. Vaterl. Virginien und das nördliche Carolina. 2.

6. *Cratiola aurea* Mühlenb. Pursh. Fl. amer. sept. 1. p. 12. Gelbblumige Cratiola.

Stengel viereckig, ästig, an der Basis kriechend, wie die Blätter glatt. Blätter stiellos, länglich-lanzettförmig, punktförmig, oder ganzrandig, oder gezähnt. Blumenstiele einzeln, winkelförmig, borstenförmig. Corolle gelb, inwendig filzig. Vaterl. Nordamerika, bei New-York und in Florida. 2.

7. *Cratiola amara* Roxb. Bittere Cratiola.

Curanga amara Vahl. Enum. 1. p. 100.

Stengel und Aeste kriechend, viereckig, gefärbt, wie die Blätter glatt. Blätter gestielt, herzförmig, sägerandig. Blumenstiele winkelförmig, 4—6 blüthig. Die äußern Kelchblätter herzförmig oft gefleckt. Corollenröhre in der Mitte zusammengezogen, die Oberlippe gerade, schmal, an der Spitze gespalten. Unterlippe dreilappig, herabhängend. Narbe zweilappig. Kapsel eiförmig. Vaterl. die moluckischen Inseln. ① Wählg. Sommer.

8. *Cratiola peruviana* Linn.

Stengel aufrecht, 4—6 Zoll hoch, einfach oder ästig. Blät-

ter länglich = lanzettförmig, sägerandig, fast fünkrüppig. Blumen stiellos, winkelförmig. Der Kelch ist an der Basis mit zwei linienförmigen gespitzten Bracteen versehen. Uebrigens siehe Verikon B. 4.

9. *Gratiola latifolia* R. Brown. Breitblättrige Gratiola.

Stengel und Blätter glatt. Blätter eiförmig, unidentisch gekerbt oder ganzrandig. Blumen stiellos. Waterl. Neuhol- land.

10. *Gratiola pubescens* R. Br. Filzige Gratiola.

Stengel und Blätter sind drüsig = filzig. Blätter lanzett- förmig, gezähnt. Blumen stiellos. Waterl. Neuhollland.

11. *Gratiola pedunculata* R. Br. Gestielte Gratiola.

Stengel und Blätter pulverig = filzig. Blätter lanzettförmig, über der Mitte gezähnt. Blumenstiele kaum länger als die Blätter. Waterl. Neuhollland.

12. *Gratiola involucrata* Roxb. Fl. ind. I. p. 138. Ein- gehüllte Gratiola.

Stengel krautartig. Blätter ungleich, gestielt, rundlich- herzförmig, die Lappen gerundet, groß, vielkrüppig, sägeartig gezähnt, zottenhaarig. Blumen in langgestielte Köpfchen gesammelt, die mit Bracteen versehen sind. Kapsel in zottigem hö- drigem Kelche. Waterl. die moluckischen Inseln.

13. *Gratiola minima* Roth. Kleines Purgirkraut; Gra- tiola.

Stengel fadenförmig, aufrecht, 3—4 Zoll hoch, sehr ein- fach, wie die Blätter glatt. Blätter stiellos, länglich, ent- fernt sägezähnt, wie die Kelchtheile zart gewimpert, die obern, neben den Blumen einzeln, einseitig. Blumenstiele den Blättern gegenüberstehend. Kapsel länglich. Waterl. Ostindien.

14. *Gratiola quadridentata* Michx. Vierzähnlige Gra- tiola.

Grat. ramosa Walt. Carol. p. 61. Gr. virginica Lam. Jll. 1. t. 16. f. 2.

Stengel gestreckt, glatt, fast flebrig. Blätter stiellos, lan- zettförmig, gespitzt, fast punktiert, vierzählig. Blumenstiele so lang als die Blätter. Bracteen sehr klein, fast fehlend. Kelchtheile linienförmig, ungleich. Corolle weiß, inwendig filzig, die Röhre gelb. Das Synonym Grat. quadriden- tata wird im 1. Nachtrage B. 3. S. 577. ausgestrichen. Waterl. Carolina und Florida. A " "

†† Caly-

†† Calycibus ebracteatis. Kelche ohne Bracteen.

15. *Cratiola integrifolia* Roxb. ind. 1. p. 138. Ganzblättrige Cratiola.

Stengel krautartig, ästig, in der Jugend aufrecht, dann ausgebreitet, die Aeste ausgesperret. Blätter stiellos, eiförmig, dreirippig, ganzrandig. Blumenstiele einzeln, winkelfständig, einblümig. Kapsel so lang als der Kelch. Vaterl. Bengalen. ☉

16. *Cratiola Chamaedrys* Roth Nov. plant. Sp. p. 10. Gamanderartige Cratiola.

Stengel aufrecht, gabelästig, eckig, die Aeste gegenüberstehend, ausgebreitet, schlaff, fast behaart. Blätter gegenüberstehend, eiförmig, am Stiele verdünnt, dreirippig, sägerandig, gewölbert, unten mit angebrückten Haaren bekleidet. Blumenstiele winkelfständig, länger als die Blätter, einblümig. Kelch unten glatt, oben fast filzig. Corollenröhre länger als der Kelch. Vaterl. Ostindien.

17. *Cratiola tetragona* Elliott. Vieredige Cratiola.

Stengel glatt, vieredig. Blätter lanzettförmig, fast gezähnt, dreirippig. Blumenstiele winkelfständig, einblümig. Höchst wahrscheinlich nur eine Varietät von einer andern Art, vielleicht *G. dilatata*. Vaterl. Carolina.

II. Filamen sterilibus bifidis.

Die unfruchtbaren Staubfäden gespalten.

18. *Cratiola parviflora* Roth. Kleinblumige Cratiola.

Stengel krautartig, aufrecht, vieredig, die Ecken scharf, 6—8 Zoll hoch. Blätter stiellos, länglich-eiförmig, gespitzt, sägerandig, dreirippig. Blumen klein, langgestielt, einzeln. Die unfruchtbaren Staubfäden gespalten. Kapseln länglich, gespitzt, länger als der Kelch. Vaterl. Bengalen. ☉

19. *Cratiola dilatata* Mühlenb. Ausgebreitete Cratiola.

Grat. inaequalis Walt. carol. p. 61.

Grat. anagallidea Michx. amer. 1. p. 5? f. 1. Nachfr. B. 3. S. 571. *Lindernia pyxidaria* L. f. Spr. Syst. veg.

Lindernia dilatata Elliott. Bot. of. carv. 1. p. 16.

Lindernia pyxidaria Pers. (non Linn.)

Stengel gestreckt, vieredig, sparrig, glatt. Blätter stiellos, umfassend, länglich-eiförmig, stumpf, fast sägerandig, an der Basis ausgebreitet, dreirippig. Blumen einzeln, winkelfständig, länger als die Blätter, einblümig. Kelchtheile

Diets. Ex. 2r. Nachtr. IV. Bd.

D

fast ungleich, flzig, gewimpert. Corolle doppelt länger als der Kelch, blaß purpurroth, verkehrt liegend, vierlappig, der obere Lappen breit, ungetheilt. Unterlippe dreispaltig. Die unfruchtbaren Staubfäden so lang als die Corollenröhre, die fruchtbaren kürzer, mit weißen Antheren gekrönt. Narbe zusammengedrückt, zweilappig. Vaterl. Nordamerika. ☉

20. *Gratiola attenuata* Spr. (*Lindernia attenuata* Mühlenb.)

Stengel sparrig, gestreckt, viereckig. Blätter spatel- = lanzettförmig, sägerandig, an der Basis verdünnt. Blumenstiele einblümig, dreimal kürzer als die Blätter. Kelchtheile gleich, gezähnt, die unfruchtbaren Staubfäden zottenhaarig. Vaterl. Carolina und Georgien. ☉

* *Caule aphylla*. Stengel ohne Blätter.

21. *Gratiola lobelioides* Retz. Lobelienartige *Gratiola*. f. Lexic. B. 4.

Wurzelblätter länglich = lanzettförmig, fast fleischig, concav, fünfrippig, ganzrandig. Stengel oben ästig, traubig, nur mit Axtblätter besetzt, 6—10 oder 18 Zoll hoch, wie die Wurzelblätter glatt. Blumen eine gipfelständige Traube oder zweitheilige Rispe bildend. Kelchtheile länglich, stumpf, am Rande trocken. Kapsel kugelförmig. Vaterl. Ostindien. ☉

22. *Gratiola cuneifolia* Roxb. ind. 1. p. 143. Keilblättrige *Gratiola*.

Stengel aufrecht, einfach, fast nackt, nur mit einigen keilförmigen Blättern besetzt, davon eines um das andere kleiner ist. Blumen einzeln, langgestielt. Kapseln rund. Vaterl. Coromandel am Meeresufer und feuchten Orten. ☉

23. *Gratiola nudicaulis* Willd. Nacktstenglige *Gratiola*. *Grat. aphylla* Roth. Nov. pl. spec. p. 7.

Stengel fadenförmig, aufrecht, einfach, purpurröthlich, glatt, über der Basis bis zur Spitze nackt, oben zweitheilig, 2—4 Zoll hoch. Blätter gegenüberstehend, gestielt, länglich, fast fleischig, ganzrandig, geädert, kaum über eine Linie lang, abstehend. Blumenstielen an der Basis mit zwei gegenüberstehenden lanzett- = pfriemensförmigen Bracteen besetzt. Kelchtheile linien- = lanzettförmig, pfriemenspizig. Corolle größer als der Kelch, blau- violett, die Röhre gelb. Kapsel oval- länglich. Vaterl. Ostindien.

Die übrigen Arten, welche ich im Lexikon und ersten Nachtrage beschrieben habe, hat Sprengel in Syst. Veg. zur Bonnaya Link gezogen.

Die Gattung *Bonnaya* Link unterscheidet sich von *Gratiola* Linn. hauptsächlich durch eine zweilappige Corolle, durch die fehlenden unfruchtbaren Staubfäden, und durch die linienförmige oder pfriemenförmige vielSaamige Kapsel, mit freiem Rücken. Link hat nur eine Art aufgeführt.

1. *Bonnaya brachiata* Link et Otto Jcon. plant. select. p. 25. t. 11.

Stengel viereckig, ästig, aufrecht, wie alle Theile der Pflanze glatt, 6—10 Zoll hoch. Blätter gegenüberstehend, stiellos, länglich, gespitzt, sägerandig, die Serraturen mucronenpigig, der Rand fast knorplich=weiß, 1 Zoll 4 Linien lang. Blumen in gipfelständigen Trauben. Corolle ein wenig größer als der Kelch, weiß, die Unterlippe dreilappig, roth punktiert. Kapsel linienförmig, fast viereckig, gespitzt, 6—7 Linien lang. Hierher gehört: *Gratiola serrata* Roxb. et *Ruellia antipoda* Linn.? Waterl. Bengalen. ☉

Gratiola alata Roxb. *Bonnaya alata* Spr.

Blätter gestielt, eiförmig, sägerandig. Blumen in gipfelständige Trauben gesammelt. Kelch fünfflügelig. Waterl. die moludischen Inseln.

Gratiola reptans Roxb. *Bonnaya reptans* Spr.

Stengel kriechend, rundlich oder länglich, sägerandig. Blumen in gipfelständigen Trauben. Waterl. wie die vorhergehende Art.

Kultur im Allgemeinen siehe Verikon B. 4. Alle Arten, die in Tropenländern wild wachsen, verlangen warme Standörter.

Synonymen.

Gratiola acuminata Walt. f. 1. Nachtr. ist *Conoclea borealis* Spr.

— *aphylla* Roth. f. *Gratiola nudicaulis* N. 23.

— *aspera* Roth. ist *Morgania aspera* Spr.

— *chamaedryfolia* Lam. f. *Limnophila trifida* Spr.

— *ciliata* Colsm. f. 1. Nachtr. ist *Bonnaya ciliata* Spr.

— *grandiflora* Retz. f. Lexic. ist *Bonnaya grandiflora* Spr.

— *hyssopifolia* Linn. f. Lexic. ist *Unedalia hyssopifolia* Spr.

- Gratiola inundata* Kitaib. f. 1. Nachtr. ist *Lindernia pyxidaria*.
- *lucida* Vahl f. 1. Nachtr. ist *Unedalia lucida* Spr.
- *marginata* Colsm. f. 1. Nachtr. ist *Bonnaya marginata* Spr.
- *officinalis* Brot. f. *Gratiola linifolia* N. 2.
- *officinalis* Walt. f. *Gratiola caroliniensis* N. 4.
- *oppositifolia* Retz f. Lexic. ist *Bonnaya oppositifolia* Spr.
- *organifolia* Vahl f. 1. Nachtr. ist *Bonnaya organifolia* Spr.
- *pulegifolia* Vahl f. 1. Nachtr. ist *Bonnaya pulegifolia* Spr.
- *racemosa* Roxb. ist *Bonnaya verbenaeifolia* Spr.
- *reptans* Roxb. ist *Bonnaya reptans* Spr.
- *rotundifolia* Linn. f. Lexic. ist *Morgania rotundifolia* Spr.
- *ruelloides* Colsm. f. 1. Nachtr. ist *Bonnaya ruelloides* Spr.
- *strigosa* Roth. ist *Morgania strigosa* Spr.
- *tenuifolia* Colsm. ist *Bonnaya tenuifolia* Spr.
- *trifida* Willd. f. Lexic. B. 4. ist *Limnophila trifida* Spr.
- *verbenaeifolia* Colsm. f. 1. Nachtr. ist *Bonnaya verbenaeifolia* Spr.
- *veronicaefolia* Retz. f. Lexic. ist *Bonnaya veronicaefolia* Spr.
- *virginica* Michx. f. *Gratiola caroliniensis* N. 4.
- *virginica* Elliott. f. *Gratiola viscosa* N. 5.
- *virginica* Lam: f. *Gratiola quadridentata* N. 14.

Grevillea Rob. Brown. Bauer Jll. Nov. Holland.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. C. 578. t. 9.

Grevillea.

Kelch (Corolle) vierblättrig, unregelmäßig; in dem ausgehöhlten Ende eines jeden Corollenblattes sitzt eine Anthere, und am Fruchtknoten eine halbe Drüse. Narbe schief. Walzkapsel lederartig, einschlerig, zweisaamig, (mit einem Fach in der Mitte). Saamen gerändert oder an der Spitze mit einer kurzen Flügelhaut versehen.

Tetrandria Monogynia (Familie Proteaceen, Gruppe Embotbrieen.)

Diese Gattung widmete Robert Brown dem Herrn Carl Franz Greville, berühmten Naturforscher, vornehmlich Mineralog und Botaniker in England? Die ihr zugehörten Arten sind Sträucher (selten Bäume) deren Blätter wechselnd stehend, ungetheilt oder gefiedert sind. Blumen in Dolden- trauben oder büschelförmig stehend, gelb, dunkelroth oder hoch- roth.

I. Seminibus apice brevissime alatis.

Die Saamen an der Spitze mit sehr kurzen Flügeln versehen.

† Lissostylis. Griffel glatt. Balgkapsel gerippt. Blätter ganzrandig.

Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im ersten Nachtrage beschriebenen Arten: *Grevillea sericea*, *linearis* R. Br. und folgende.

1. *Grevillea punicea* R. Brown. Hochrothe Grevillea.

Grev. dubia R. Br. *Embothrium sericeum* β Smith. Nov. Holl. t. 9. f. 5.

Aeste filzig. Blätter länglich, am Rande zurückgerollt. Blumen hochroth, in abgekürzten, gekrümmten Trauben. Kelche (Corollen) inwendig bartig. Waterl. Neuhoiland. h

2. *Grevillea laurifolia* Sieber. Lorbeerblättrige Grevillea.

Blätter länglich, langgespitzt, fast lederartig, geadert, unten mit Strichborsten besetzt. Trauben vielblümig, ährenförmig. Fruchtknoten zottenhaarig. Waterl. Neuhoiland. h

3. *Grevillea stricta* R. Br. Straffe Grevillea.

Blätter linien-lanzettförmig, feingespitzt, am zurückgerollten Rande, sowie an den Rippen gezähnt-scharf. Griffel an der Spitze seidenhaarig. Waterl. Neuhoiland. h

4. *Grevillea riparia* R. Br. Ufer liebende Grevillea.

Blätter verlängert-liniensförmig, glatt, am Rande zurückgerollt. Fruchtknoten gestielt, hervorragend. Corolle inwendig dicht mit Barthhaaren besetzt. Waterl. Neuhoiland, au Ufern. h

5. *Grevillea parviflora* R. Br. Kleinblumige Grevillea.

Aeste glattlich. Blätter linien-psriemensförmig, glatt, am Rande zurückgerollt. Blumenblätter rothfarbig-bartig. Fruchtknoten gestielt. Waterl. Neuhoiland. h

6. *Grevillea juniperina* R. Br. Wachholderartige Grevillea.

Aestchen zottenhaarig, rundlich. Blätter büschelförmig ste-

- hend, ausgesperrt, pfriemensförmig. Griffel viermal länger als der Stiel des Fruchtknotens. Vaterl. Neuhollland. h
7. *Grevillea australis* R. Br. Südliche Grevillea.
Neste walzenrund, filzig. Blätter lanzett = pfriemensförmig, abgekürzt, unten seidenhaarig. Vaterl. Insel van Diemen. h
8. *Grevillea tenuifolia* R. Br. Dünablättrige Grevillea.
Blätter stiellos, büschelförmig stehend, pfriemensförmig, am Rande zurückgerollt. Eins oder einige kürzer als die übrigen. Griffel abgekürzt. Vaterl. Insel van Diemen. h
9. *Grevillea pauciflora* R. Br. Wenigblumige Grevillea.
Blätter länglich = linienförmig, stumpf, mucronenspizig, oben glatt, unten seidenhaarig. Blumenstiele meist dreiblümig. Blumenblätter fast nackt, fast so lang als der Griffel. Vaterl. Neuhollland. h
10. *Grevillea aspera* R. Br. Scharfblättrige Grevillea.
Neste abgekürzt, gekrümmt. Blätter länglich = linienförmig, stumpf, mucronenspizig, oben scharf, unten silberfarbig. Griffel sehr kurz. Narbe löffelförmig. Vaterl. Neuhollland. h
11. *Grevillea concinna* R. Br. Zierliche Grevillea.
Blätter linienförmig, aufrecht, glatt, am Rande zurückgerollt. Blumentrauben gekrümmt, einseitig, vielblümig. Fruchtknoten wollig. Griffel glatt, doppelt länger als die Blumenblätter, die fast seidenhaarig sind. Vaterl. Neuhollland. h
12. *Grevillea acifolia* Sieber. Nadelblättrige Grevillea.
Blätter linien = fadenförmig, steif, abstehend, oben rinnenförmig, glatt. Blumentrauben abgekürzt. Griffel sehr lang, glatt. Vaterl. Neuhollland. h
- †† *Ptychocarpa*. Griffel behaart. Balgkapsel gerippt. Blätter ganzrandig.
- Hierher gehören die im 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Grev. arenaria*, *acuminata* R. Br. und folgende.
13. *Grevillea montana* R. Br. Berg = Grevillea.
Blätter lanzettförmig, gespizt, unten seidenhaarig. Blumenstiele gepaart, glatt. Blumenblätter fast nackt, fast gleich. Vaterl. Neuhollland.
14. *Grevillea cinerea* R. Br. Graue Grevillea.
Blätter spatelförmig, mucronenspizig, oben fast scharf, unten grau = filzig. Blumentrauben wenigblümig, gekrümmt, die Stiele wie die Blumenblätter wollig. Vaterl. Neuhollland. h

14. *Grevillea diffusa* Sieber. Weisschweifige Grevillea.
 Aeste ausgebreitet = weisshweifig. Blätter linien = lanzettförmig, mucronenspizig, unten seidenhaarig. Blumenbüschel gesammelt, gipfelständig. Waterl. Neuhoiland. h
15. *Grevillea mucronulata* R. Br. Feinspizige Grevillea.
 Blätter umgekehrt = eiförmig, fein mucronenspizig, oben scharf, unten fast seidenhaarig. Trauben abgekürzt. Blumenblätter filzig. Waterl. Neuhoiland. h
16. *Grevillea Baueri* R. Br. Bauersche Grevillea.
 Grev. daphnoides Sieber Nov. Holl.
 Blätter länglich, stumpf, mucronenspizig, auf beiden Seiten glatt. Trauben abgekürzt. Stiele und Blumenblätter glatt. Waterl. Neuhoiland. h
17. *Grevillea pubescens* Hooker. exot. fl. t. 216. Filzige Grevillea.
 Blätter länglich = spatelförmig, mucronenspizig, auf beiden Seiten filzig. Blumen doldentraubig, die Stielehen und Blumenblätter glatt. Waterl. Neuhoiland. h
18. *Grevillea ferruginea* Sieber. Rostfarbige Grevillea.
 Aeste behaart. Blätter länglich = lanzettförmig, mucronenspizig, geadert, unten rostfarbig = filzig. Balgkapseln zottenhaarig. Waterl. Neuhoiland. h
 ††† Eriostylis. Balgkapseln gerippt. Griffel wollig. Blätter ganzrandig.
 Grev. buxifolia f. 1. Nachtr. B. 3. und folgende Arten gehören hierher.
19. *Grevillea occidentalis* R. Br. Westliche Grevillea.
 Grev. oleoides Sieber Nov. Holl.
 Blätter lanzettförmig, oben scharf = punktiert, unten seidenhaarig. Blumen in winkel = und gipfelständige Büschel gesammelt. Blumenblätter wollig. Narbe unbewehrt. Waterl. Neuhoiland. h
20. *Grevillea sphacelata* R. Br. Brandige Grevillea.
 Blätter länglich = lanzettförmig, oben scharf, unten seidenhaarig. Blumenbüschel gipfelständig. Blumenblätter auswändig, rostfarbig = filzig, inwendig wollig. Narbe unbewehrt. Waterl. Neuhoiland. h
21. *Grevillea myrtacea* Sieb. Myrtenartige Grevillea.
 Blätter elliptisch = länglich, an beiden Enden verdünnt, wie die Aestchen scharfborstig. Trauben wenigblümig. Waterl. Neuhoiland. h

22. *Grevillea phyllioides* R. Br. Phylleaartige Grevillea.

Blätter linien-lanzettförmig, oben scharf, unten flüzig, die obersten fast zottenhaarig. Narben oval, mit Anhängen versehen, über die Blumenblätter doppelt herborragend. Vaterl. Neuholand. h

tttt Plaglopus. Fruchtknoten an der Spitze schief. Blumenblätter ungleich. Stamm- und Abblätter fast getheilt.

23. *Grevillea Gondii* R. Br. Gondische Grevillea.

Stengel strauchig, gestreckt. Blätter länglich, ganzrandig, geädert, wellenrandig, die Ader auf beiden Seiten glatt. Blumen in verlängerten Trauben. Vaterl. das nördliche Neuholand. h

24. *Grevillea venusta* R. Br. Liebliche Grevillea.

Blätter theils ungetheilt, theils dreilappig oder fiederspaltig, unten seidenhaarig. Trauben aufrecht. Blumenblätter glatt. Griffel rauchhaarig. Vaterl. Neuholand.

25. *Grevillea acanthifolia* Sieber. Acanthusblättrige Grevillea.

Blätter fiederspaltig, lederartig, glatt, die Einschnitte dreispaltig, dornig. Blumen zapfenförmige Aehren bildend. Blumenblätter zottenhaarig. Griffel glatt. Vaterl. Neuholand. h

tttt Calothyrsus. Blumentrauben traufsförmig. Blätter meist fiederspaltig.

26. *Grevillea pungens* R. Br. Stechende Grevillea.

Blätter fiederspaltig, oben glatt, unten silberweiß. Einschnitte linien-pfriemenförmig, stehend. Trauben zurückgeschlagen. Blumenblätter und Griffel glatt. Vaterl. Neuholand. h

27. *Grevillea Dryandria* R. Br. Dryandrische Grevillea.

Blätter gefiedert, unten seidenhaarig. Blättchen verlängert-linienförmig. Trauben gestielt, sehr lang. Blumenblätter fast schief, wie der Fruchtknoten und Griffel glatt. Vaterl. Neuholand. h

28. *Grevillea asplenifolia* R. Br. Streifenfarneblättrige Grevillea.

Blätter lang, linienförmig, fiederspaltig-eingeschnitten, auch ganzrandig, unten flüzig. Trauben kürzer als die Blätter. Blumenblätter flüzig. Griffel glatt. Vaterl. Neuholand. h

29. *Grevillea Banksii* R. Br. Banksische Grevillea.

Blätter fiederspaltig, unten seidenhaarig. Einschnitte lang-lanzettförmig. Trauben aufrecht, gleich. Kelche (Blumenblätter) filzig. Fruchtknoten und Griffel glatt. Waterl. Neuholland. h

30. *Grevillea chrysodendron* R. Br. Goldbaum = Grevillea.

Blätter fast doppelt fiederspaltig. Einschnitte lang-liniensförmig. Die Blumen stehen in halben Quirlen und bilden walzenrunde Trauben. Kelchblätter filzig, an der Basis stehen bleibend. Stempel glatt. Waterl. Neuholland. h

II. Seminibus undique alatis.

Saamen allenthalben d. h. ringsum häutig geflügelt, gerändert.

31. *Grevillea heliosperma* R. Br.

Blätter gefiedert, glatt. Blättchen länglich-liniensförmig, die untern gestielt. Trauben getheilt, aufrecht. Blumenblätter und Stempel glatt. Waterl. Neuholland. h

32. *Grevillea refracta* R. Br.

Blätter theils gefiedert, theils ungetheilt. Blättchen lang-liniensförmig, unten silberweiß. Trauben getheilt, zurückgeschlagen. Blumenblätter seidenhaarig. Stempel glatt. Waterl. das nördliche Neuholland. h

33. *Grevillea ceratophylla* R. Br. Hornblättrige Grevillea.

Blätter theils 3—4spaltig, theils ganz, unten gerippt, seidenhaarig. Einschnitte lang-liniensförmig. Früchte glatt. Waterl. Neuholland. h

34. *Grevillea mimosoides* R. Br. Mimosenartige Grevillea.

Blätter schwerdtförmig, ganzrandig, gerippt, wie die Aeste glatt. Balsgapseln umgekehrt-eiförmig, klebrig. Waterl. das nördliche Neuholland. h

35. *Grevillea polystachya* R. Br. Vielährige Grevillea.

Blätter linien-schwerdtförmig, ganzrandig, schlaff, unten gerippt, seidenhaarig. Blumentrauben ährenförmig, wechselnd, gipfelständig. Narbe schief, ausgehöhlt, in der Mitte mit einer Warge versehen. Waterl. Neuholland. h

36. *Grevillea striata* R. Br. Gestreifte Grevillea.

Blätter linien-schwerdtförmig, straff, ganzrandig, unten gerippt, seidenhaarig. Blumentrauben wechselnd, gipfelständig.

dig. Narbe senkrecht stehend, niedergedrückt, kegelförmig. Vaterl. das nördliche Neuholand. h

37. *Grevillea lorea* R. Br. Riemenförmige Grevillea.

Blätter sehr lang, walzenrund, herabhängend. Blumen traubeständig. Narbe abgestutzt, pyramidenförmig. Vaterl. Neuholand. h

38. *Grevillea gibbosa* R. Br. Höckerige Grevillea.

Blätter länglich-lanzettförmig, ganzrandig, fast stizig, gerippt, geadert. Blumentrauben verlängert. Narbe kegelförmig. Balgkapsel höckerig-verdickt. Vaterl. Neuholand. h

Kultur der Grevilleen im Allgemeinen s. 1. Nachtr. B. 3. S. 579. Sie kommen alle aus Neuholand und entwickeln ihre lieblichen Blumen im Sommer, auch zu verschiedenen Zeiten im Jahr. Hinsichtlich auf Standort, Erdreich, Fortpflanzung und Vermehrung behandelt man sie wie die Silberastern (s. Protea.)

Synonymen.

Grevillea daphnoides Sieb. f. *Grevillea Baueri* N. 16.

— *dubia* R. Br. f. *Grevillea punicea* N. 1.

— *oleoides* Sieb. f. *Grevillea occidentalis* N. 19.

Grewia Linn. (Jussieu in Ann. du mus. 4. t. 47—51.) *Grewia* f. Lexic. B. 4.

Reich fünftheilig, gefärbt. Corolle fünfblättrig, die Blätter an der Basis entweder mit behaarten Drüsen oder kleinen Schuppen versehen. Zahlreiche Staubfäden, bodenständig. Ein Griffel mit lappiger Narbe. Steinfrucht fleischig; sie enthält vier zweifächerige Nüsse, jede mit zwei Samen.

Polyandria Monogynia (Familie Liliaceen.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines alten Naturforschers, des Herrn Nehem Grew, der schon vom Jahr 1668 an den Bau der Gewächse zum Gegenstand seiner Beobachtung und Untersuchung wählte und in dieser Beziehung, noch vor Malpighi, mancherlei interessante Entdeckungen gemacht hat. Er war Mitglied und Sekretär einer Gesellschaft der damaligen Naturforscher in London, hernach Lehrer der Phytognomie (Phytologie) und starb 1711.

Die Arten der Gattung *Grewia* sind Bäume und Sträucher, deren Blätter meist wechselnd stehend, ungetheilt und gerippt sind. Blumen einzeln gestielt oder rispenständig. Corollenblätter roth oder weiß.

1. *Foliis tri- triplinervis*. Blätter drei- oder dreifach gerippt.

† *Foliis subtus glabris*. Blätter unten glatt.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon beschriebenen Arten: *Grewia glandulosa*, *laevigata* Vahl. *Gr. Mallacocca*, *occidentalis* Linn. und folgende.

1. *Grewia multiflora* Juss. J. c. Vielblättrige Grewie.

Blätter ey- lanzettförmig, langgespitzt, sägerandig. Blumenstiele gehäuft, dreiblümig. Staubfäden abgekürzt. Vaterl. die Philippischen Ins. h

2. *Grewia disperma* Rottl. Zweisaamige Grewie.

Blätter länglich- lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt, sägerandig, dreifach gerippt. Blumenstiele einzeln stehend, dreiblümig. Corollenblätter sehr kurz. Früchte zweisaamig. Vaterl. Ostindien. h

3. *Grewia apetala* Juss. Blumenblattlose Grewie.

Blätter umgekehrt- eyförmig, feingekerbt, scharf. Blumenstiele meist einzeln stehend, dreiblümig. Corollenblätter fehlen. Vaterl. Java. h

4. *Grewia oppositifolia* Buchan. Nepalische Grewie.

Blätter eyförmig, langgespitzt, gezähnt, unten wie die Aestchen filzig. Blumenstiele einzeln, den Blättern gegenüber stehend, drei oder mehrblümig. Vaterl. Nepal. h

5. *Grewia umbellata* Roxb. Corom. Doldenblüthige Grewie.

Blätter elliptisch, fast gezähnt, auf beiden Seiten glatt. Blumenstiele gipfelständig, dreiblümig. Vaterl. Ostindien. h

6. *Grewia bicolor* Juss. Zweifarbige Grewie.

Blätter oval- länglich, stumpf, scharf gezähnt, auf beiden Seiten glatt, unten grau. Blumenstiele gepaart, dreiblümig. Staubfäden so lang als die Corollenblätter. Vaterl. Senegambien. h

7. *Grewia Rothii* Cand. Rothische Grewie. (*Gr. bicolor* Roth.)

Blätter länglich- eyförmig, langgespitzt, scharf gezähnt, glatt, unten grau. Blumenstiele gepaart, dreiblümig. Staubfäden doppelt länger als die Corollenblätter, wodurch sich diese Art am meisten von der vorhergehenden N. 6. unterscheidet. Vaterl. Ostindien. h

8. *Grewia cuneifolia* Juss. Keilblättrige Grewie.

Blätter umgekehrt = eiförmig, keilförmig, fast lederartig, an der Spitze gezähnt = gekerbt. Blumenstiele zweiblümig. Staubfäden so lang als die Corollenblätter. Vaterl. Madagascar. h

9. *Grewia nitida* Juss. Glänzende Grewie.

Blätter länglich = eiförmig, feingekerbt, oben glänzend. Blumenstiele einzeln stehend, abgetürzt, fast zweiblümig. Staubfäden so lang als die Corollenblätter. Vaterl. China. h

10. *Grewia Microcos* Linn. Hierher gehört *Microcos paniculata* Linn. s. Lexic. erste Aufl. B. 6. S. 170.

Blätter länglich = lanzettförmig, verlängert, fast ganzrandig, in der Jugend unten fast flockig. Blumen in sehr ästige gipfelständige Rispen gesammelt. Blumenstiele mit Bracteen versehen. Kelche grau = filzig. Vaterl. Ostindien. h

11. *Grewia acuminata* Juss. Langgespitzte Grewie.

Blätter länglich = lanzettförmig, langgespitzt, fein gekerbt. Blumenstiele fast gepaart, zweiblümig, länger als die Blattstiele. Wahrscheinlich nur eine Varietät von einer der vorhergehenden Arten? Vaterl. Java. h

12. *Grewia megalocarpa* Pat. Br. Vierlappige Grewie.

Blätter länglich, mit einer stumpfen hervorgezogenen Spitze, sägerandig, glatt. Blumenstiele 1–3 blümig. Frucht glatt, vierlappig. Vaterl. Guinea. h

13. *Grewia carpinifolia* P. Br. Hainbuchenblättrige Grewie.

Grewia rhamnoides Roth. Nov. Pl.

Blätter fast herz = eiförmig, gespitzt, sägerandig, unten scharf. Blumenstiele kurz, meist dreiblümig. Guinea. Ostindien. h

†† Foliis subtus pubescentibus. Blätter unten filzig.

Grewia orientalis Linn. Gr. hirsuta, excelsa Vahl. s. Lexic. gehören hierher, und folgende Arten.

14. *Grewia guazumaefolia* Juss. Guazumablättrige Grewie.

Grewia oblongifolia Blum.

Blätter länglich = eiförmig, gespitzt, unten filzig, gekerbt = gezähnt, die untern Zähne drüsig. Blumenstiele einzeln stehend, meist dreiblümig. Vaterl. Java. h

15. *Grewia tomentosa* Juss. Filzige Grewie.

Grewia hirsuta Smith. Fl. ind.

Blätter an der Basis schief, ey = lanzettförmig, langgespitzt, auf beiden Seiten filzig, ungleich gezähnt. Blumenstiele abgestutzt, fast vierblümig. Corollenblätter sehr kurz. Waterl. Java. h

16. *Grewia bracteata* Roth. Eingehüllte Grewie.

Aestchen filzig. Blätter elliptisch = lanzettförmig, stumpf, sägerandig, auf beiden Seiten mit gebüschelten rostfarbigen Haaren bekleidet. Blumenstiele winkelförmig, dreiblümig. Blumen von Bracteen gleichsam eingehüllt. Waterl. Ostindien. h

17. *Grewia salvifolia* Roth. Salbeiblättrige Grewie.

Blätter länglich = eyförmig, stumpf, feingekerbt, oben filzig, punktiert, unten schneeweiß = filzig. Blumenstiele winkelförmig, fast dreiblümig, mit Bracteen besetzt. Waterl. Ostindien. h

18. *Grewia flava* Cand. Gelbe Grewie.

Blätter länglich = umgekehrt eyförmig, sehr stumpf, fein gekerbt, oben glattlich, unten grau = filzig. Blumenstiele einblümig. Corollenblätter gelb, zweispaltig, kürzer als die Kelchtheile. Waterl. das südliche Afrika. h

19. *Grewia Hamiltonii* Dietr. Hamiltonische Grewie.

Grewia oppositifolia Hamilton Spr. Syst. veg. cur. p. 205.

Blätter eyförmig, langgespitzt, sägerandig, dreirippig, unten, wie die Aeste filzig. Blumenstiele einzeln, den Blättern gegenüberstehend, dreiblümig. Waterl. Nepal. h

20. *Grewia paniculata* Roxb. Rispenblüthige Grewie.

Microcos tomentosa Smith. ind.

Blätter elliptisch = länglich, spitzlich, sägerandig, unten zottenhaarig. Aestblätter zweispaltig. Blumen in gipfelförmige Rispen gesammelt. Waterl. Ostindien. h

21. *Grewia columnaria* Smith. Säulenförmige Grewie.

Blätter länglich = eyförmig, gekerbt, auf beiden Seiten scharf. Blumenstiele dreiblümig. Staubfäden und Griffel säulenförmig verlängert. Waterl. Ostindien. h

22. *Grewia pilosa* Lamarck. Behaarte Grewie.

Grewia orientalis Vahl.

Blätter länglich = eyförmig, spitzlich, gezähnt, unten mit Harbüscheln bekleidet. Blumenstiele fast doldentraubig. Früchte behaart. Waterl. Ostindien. h

23. *Grewia flavescens* Juss. Gelbliche Grewie.

Blätter länglich-eyförmig, gespitzt, fast eckig, ungleich sägezählig, auf beiden Seiten sternhaarig = filzig. Blumenstiele einzeln stehend, dreiblümig. Corollenblätter gelblich. Vaterl. Ostindien. h

24. *Grewia mollis* Juss. Weichblättrige Grewie.

Blätter ey = lanzettförmig, sägeartig gezähnt, oben glatt, unten weichfilzig. Blumenstiele fast einzeln stehend, dreiblümig. Vaterl. Senegambien. h

25. *Grewia aspera* Roxb. Scharfblättrige Grewie.

Blätter rundlich = eyförmig, langgespitzt, fast dreilappig, ungleich sägerandig, auf beiden Seiten sternhaarig = filzig, scharf. Blumenstiele meist zu 3 stehend, einblümig, kürzer als die Blattstiele. Vaterl. Ostindien. h

26. *Grewia commutata* Cand. (*Gr. carpinifolia* Rothb. Roth.)

Blätter länglich = herzförmig, langgespitzt, ungleich sägerandig, oben fast runzlich, sternhaarig = filzig, unten fast rostfarbig = filzig. Blumenstiele winkelförmig, fast doldentraubig. Vaterl. Ostindien. h

27. *Grewia obliqua* Juss. Schiefblättrige Grewie.

Blätter schief, lanzettförmig, gezähnt, auf beiden Seiten sternhaarig. Blumenstiele dreiblümig, länger als die Blattstiele. Vaterl. Ostindien und Arabien. h

II. *Foliis sub-5nervis*. Blätter meist fünfrippig.

Zu dieser zweiten Abtheilung gehören die im Verisou beschriebenen Arten: *Grewia asiatica* Linn. *Gr. tiliaefolia*, *populifolia*, *velutina* Vahl. und folgende.

28. *Grewia obtusifolia* Juss. Stumpfblättrige Grewie.

Gr. arbutifolia Poir. Pers. Synops.

Blätter breit, herzförmig, an der Spitze buchtig = eckig, ungleich gezähnt, oben scharf, unten fast filzig. Blumenstiele fast gepaart, dreiblümig, doppelt kürzer als die Blattstiele. Vaterl. Java. h

29. *Grewia betulaeifolia* Juss. Birkenblättrige Grewie.

Blätter herzförmig, sägerandig, fünfrippig, fast zottenhaarig. Blumenstiele einzeln stehend, verlängert, einblümig. Vaterl. Senegambia.

30. *Grewia rotundifolia* Juss. Rundblättrige Grewie.

Grewia orbiculata Rothb. Roth. nov. Pl.

Blätter fast rund = oval, fein gekerbt, oben grau, unten

weiß: filzig. Blumenstiele meist gepaart, fast doldentraubig, länger als die Blätter. Waterl. Coromandel. h

31. *Grewia arborea* Roxb. Baumartige Grewie.

Grewia inaequalis Roxb. corom. Gr. subinaequalis Cand. ?

Blätter fast herz: euförmig, stumpf, sägerandig, auf beiden Seiten sternhaarig: filzig. Blumenstiele gehäuft, lang, dolden: rispenartig. Waterl. Ostindien. h Blühz. Sommer.

32. *Grewia villosa* Roxb. Zottenhaarige Grewie.

Blätter fast herz: euförmig, eckig, doppelt sägezählig, auf beiden Seiten sternhaarig: filzig, zottenhaarig. Blumenstiele gehäuft, einblümlig, kürzer als die Blattstiele. Waterl. Ostindien. h

33. *Grewia scabra* Cand. Scharfborstige Grewie.

Microcos scabra Smith. Fl. ind.

Blätter länglich, fast herzförmig, unten scharfborstig, mit querlaufenden Rippen. Blumen eingehüllt, in ästig: weitschweifigen Rispen. Waterl. Ostindien. h

34. *Grewia involucrata* Blum. Eingehüllte Grewie.

Blätter ungleich: herzförmig, länglich. langgespitzt, sägear: tig gezähnt, unten sternhaarig: filzig. Blumen eingehüllt, in ausgesperrten winkel: und gipfelständigen Rispen. Waterl. Java. h

35. *Grewia sapida* Roxb.

Blätter oval, grobgezähnt, glattlich. Blumenstiele zu dreien stehend, dreiblümlig, länger als die Blattstiele. Waterl. Ostindien. h

36. *Grewia eriocarpa* Juss. Wollfrüchtige Grewie.

Blätter oval, stumpf, sägezählig, unten filzig. Blumenstiele winkelförmig, dreiblümlig. Früchte wollig? Waterl. Java. h

37. *Grewia odorata* Blum. Wohlriechende Grewie.

Blätter länglich, unten etwas scharf, ungleich gekerbt, die untern Kerbzähnen drüsig. Blumenstiele winkelförmig, fast gepaart, 3—5 blümlig. Blumenstielen doldenartig. Corollenblätter dreirippig. Waterl. Java. h

38. *Grewia pumila* Hamilt. Niedrige Grewie.

Stengel strauchig, niedrig. Blätter rundlich: umgekehrteförmig, fünfrippig, sägerandig, wie die Aestchen zottenhaarig. Blumenstiele winkelförmig, gehäuft, dreiblümlig. Waterl. Nepal. h

Die meisten Grewien kommen aus Tropenländern und verlangen in unsern Gärten warme Standörter. Sie lieben gute lockere Dammerde, z. B. Laub- oder Walderde mit Flußsand und etwas Lehm von alten Wänden u. gemischt. Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten. Uebrigens siehe die Anweisung zur Kultur der Grewien im Allgemeinen im Lexikon B. 4. S. 464.

Synonymen.

- Grewia bicolor** Roth. f. *Grewia Rothii* N. 7.
 — *carpinifolia* Rottb. f. *Grewia commutata* N. 26.
 — *glabra* Blum. ist *Grewia laevigata* Vahl. f. Lex. B. 4.
 — *hirsuta* Sm. f. *Grewia tomentosa* N. 15.
 — *inaequalis* Blum. f. *Grewia arborea* N. 31.
 — *oblongifolia* Blum. f. *Grewia guazumaefolia* N. 14.
 — *oppositifolia* Hamilt. f. *Grewia Hamiltonii* N. 19.
 — *orbicularis* Rottb. f. *Grewia rotundifolia* N. 30.
 — *rhamnifolia* Roth. f. *Grewia carpinifolia* N. 13.
 — *salvifolia* Linn. Suppl. f. *Alangium decopetala* Lexic.
 — *subinaequalis* Cand. f. *Grewia arborea* N. 31.
Grielum humifusum Thunb. ist *Grielum tenuifolium* f. Lexic. (*Geranium grandiflorum* Linn. Spec.)
Griffinia hyacinthina Herber ist *Amaryllis hyacinthina* Ker.
Griffinia intermedia Lindl. in Bot. reg. 990. ist *Amaryllis intermedia* Spr.
Griffithia Agardh. Algarum.

Diese Algengattung ist aus einigen Conserven: Species der ältern Schriftsteller gebildet und enthält vier Arten.

1. *Griffithia corallina* Ag. (*Conserva corallinoides* Linn. *Callithamnion* Lyngb. *Conserva barbata* Engl. bot. 1817. var.)

Wächst im mittelländischen Meere.

2. *Griffithia setacea* Ag. (*Conserva setacea* Huds. *Ceramium penicellatum* Cand.)

Wächst im atlantischen und mittelländischen Meere.

3. *Grif-*

3. *Griffithia equisetifolia* Ag. (*Conferva equisetifolia* Lichtf. *C. imbricata* Huds. *C. cancellata* Roth.)

Standort wie vorige.

4. *Griffithia multifida* Ag. (*Conferva multifida* Huds. *Ceramium Casuarinae* Cand.)

Wächst im atlantischen Meere.

Grimaldia dichotoma Radd. ist *Marchantia triandra* Scop:

Grimaldia assurgens Schrad. f. 1. Nachtr. ist *Cassia nitidissima* Linn. f. Lexic. zweite Aufl. B. 2.

Grimmia Hedwig Stirp. 1. t. 39. Spec. muscorum frondos. ed. Schwaegr. p. 75. t. XV.

Häube von unten seitwärts gespalten. Kapselrand einfach gezähnt, dessen 16 Zähne etwas breit sind und frei stehen.

Cryptogamia Sect. 2. (Familie Laubmoose.)

Diese Laubmoosgattung führt ihren Namen zu Ehren des Hrn. Dr. Herm. Nicol. Grimm aus Gotland. Er ward 1641. geboren; studirte Arzneikunde und wurde Arzt in Stockholm. Auf seinen Reisen in Ostindien sammelte er mehrere indische Gewächse, die er an Ort und Stelle genau untersucht und die Beschreibungen derselben durch beigefügte Zeichnungen anschaulicher zu machen gesucht hat. (S. Eph. nat. cur. dec. 2. ann. 1. obs. 146.) Er starb 1711. Dr. Joh. Fried. Karl Grimm studirte in Göttingen, wurde Arzt in Eisenach, wo er die Flora Jsenacensis herausgab, dann Arzt und geh. Hofrath in Gotha, und starb daselbst im Jahr 1825. ?

I. Capsula subimmersa. Kapsel fast eingesenkt; untergetaucht.

1. *Grimmia apocarpa* Hedwig. J. c. (*Bryum apocarpum* Linn.)

Stengel aufrecht, ästig. Blätter absteheknd, lanzettförmig, gekielt, ganzrandig, gespitzt, an der Spitze fast durchscheinend. Kapsel eiförmig, der Deckel erhaben, fast schnabelförmig. Wächst in Europa und Nordamerika. Sprengel (Syst. Veg.) hat fünf Varietäten angezeigt.

2. *Grimmia pensylvanica* Schwaegr. (Gr. pilifera Bridel.)

Stengel ästig. Blätter lanzettförmig, feinspizig-haartragend, aufrecht. Kapseldeckel kegelförmig, feinspizig. Vaterl. Nordamerika.

Dist. Ser. 2r. Nachtr. IV. Bd.

⌘

3. *Grimmia maritima* Turner.

Stengel kurz, fast ästig. Blätter lanzettförmig, aufrecht, gespitzt, an der Spitze zweifarbig. Kapseldeckel schief, schnabelförmig. Wächst am Meerufer in England und Nordamerika.

4. *Grimmia fontinalioides* Hooker.

Stengel schwimmend, lang, ästig, an der Basis dünn, fast blattlos. Blätter länglich-eiförmig, gespitzt, sägerandig, ohne Rippen. Kapseldeckel flach, die Zähne um die Mündung (Maul) fast gespalten. Wächst im Amazonenflusse.

5. *Grimmia plagiopus* Schwägr. (Gr. *plagiopodia* Hedw.)

Stengel abgekürzt, fast ästig. Blätter dachziegelförmig über einander liegend, länglich-eiförmig, ausgehöhlt, einripig, ganzrandig, an der Spitze haartragend. Kapseln seitensständig, gestielt.

6. *Grimmia crinita* Bridel.

Stengel sehr kurz, ziemlich einfach. Blätter wie Dachziegel über einander liegend, spatelförmig, langgespitzt, ganzrandig. Kapseldeckel kegelförmig, die Zähne des Randes fast gespalten. Vaterl. das mittlere Deutschland und Frankreich.

7. *Grimmia cribrosa* Pers.

Stengel kurz, ästig. Blätter dicht stehend, linien-lanzettförmig, feingespitzt = haartragend. Kapseldeckel kegelförmig, stumpf. Wächst am Harz, in der Schweiz und Frankreich.

II. *Capsula exserta*. Kapsel hervorragend.

† *Seta incurva*. Borste (Kapselstiel) gekrümmt.

8. *Grimmia incurva* Schwägr. (Gr. *uncinata* Kaulf. Gr. *spiralis* Hook.)

Stengel zahlreich, ästig, und bilden Nasen. Blätter linien-lanzettförmig, aufrecht, an der Spitze haartragend. Kapsel länglich, der Deckel stumpflich. Vaterl. Schottland.

9. *Grimmia fusco-lutea* Hooker.

Stengel mehrere, fast ästig, und bilden Nasen. Blätter linien-lanzettförmig, sehr lang und feingespitzt = haartragend, an der Spitze fast sägerandig. Borste (Kapselstiel) kurz, bogenförmig = gekrümmt. Vaterl. Mexico.

10. *Grimmia pulvinata* Smith. (*Bryum pulvinatum* Linn. *Leersia* Hedwig.)

Stengel wie bei vorhergehender Art. Blätter länglich, an der Spitze haartragend. Borste zur Zeit der Kapselreife ge-

krümmt. Kapsel straff, der Deckel langgespißt. Waterl. Europa, Asien und Afrika.

11. *Grimmia Richardi* Spr. (Campylopus Bridel. Thysanomitrium Schwaegr.)

Stengel aufrecht, fast ästig. Blätter lanzett-liniensförmig, pfriemenspizig, straff. Kapsel walzenrund, an der Basis scharf. Haube an der Basis gefranzt. Waterl. Guadalup.

†† Seta recta. Borste (Kapselstiel) gerade.

12. *Grimmia Mühlenbergii* Bridel. (Gr. incurvata Mühlenb. Weisia Schwägr.)

Stengel aufrecht, fast ästig. Blätter lanzett-liniensförmig, dicklich, abstehend, gefielt. Kapsel eiförmig. Haube gefurcht, an der Basis ausgeschweift. Waterl. Pensylvanien.

13. *Grimmia longirostris* Hook.

Stengel aufrecht, ästig. Blätter lanzett-pfriemensförmig, aufrecht-abstehend, an der Spitze haartragend. Kapsel oval. Deckel langgeschnabelt. Waterl. Quito.

14. *Grimmia ovata* Mohr. (Gr. obtusa Schwägr. Campylopus et Dryptodon Brid.)

Stengel aufrecht, ästig. Blätter abstehend, lanzettförmig, an der Spitze haartragend. Kapsel länglich-eiförmig. Deckel kegelförmig, die Zähne des Randes fast gespalten. Wächst an Felsen in Europa.

15. *Grimmia Donniana* Smith. (Gr. sudetica Schwägr.)

Stengel kurz, fast einfach. Blätter lanzett-liniensförmig, pfriemenspizig, an der Spitze haartragend. Borste kurz. Kapsel oval. Deckel kegelförmig, stumpflich, die Zähne des Randes ungetheilt. Waterl. Deutschland und England.

16. *Grimmia campestris* Burch.

Stengel aufrecht, fast ästig. Blätter breit, eiförmig, ausgehöhlt, die untern stumpf, obere an der Spitze haartragend, fast gezähnt. Kapsel oval. Deckel gewölbt, mucronenspizig. Waterl. das südliche Afrika.

17. *Grimmia crispata* Spr. (Encalypta crispata Hedw. Claphomitrium Brid.)

Stengel fast ästig. Blätter lanzettförmig, gespißt, abstehend, im trockenen Zustande gedreht. Kapsel länglich, Deckel gerade, schnabelförmig. Waterl. Kap d. g. Hoffn.

18. *Grimmia albida* Spr.

Stengel sehr kurz, einfach. Blätter dachziegelförmig über

einander liegend; angedrückt, aufrecht; eiförmig; an der Spitze weißlich. Kapsel länglich. Kap d. g. Hoffn.

Will man die Arten der Gattung *Grimmia*, die in Europa wachsen, in unsern botanischen Gärten kultiviren, so können sie auf dieselbe Art und Weise behandelt werden, wie ich am Schlusse der Gattung *Bryum* gelehrt habe s. Lexic. 1. Aufl. B. 2. S. 343.

Grindelia Willd. in Mag. d. Ges. Naturf. Fr. zu Berl. Grindellie.

Character generl. s. 1. Nachtr. B. 3. S. 580.

Blüthendecke (Kelch) flach, geschuppt, sparrig. Fruchtboden nackt; grubig. Die Saamentrone besteht aus 2—5 borstenartigen Grannen.

Syngenesia superflua. (Familie Compositae, Gruppe Radiaten.)

1. *Grindelia glutinosa* Dun. Klebrige Grindellie.

Stengel stranchig, ästig, aufrecht; oben, wie die Kelche klebrig. Blätter länglich-umgekehrteiförmig, fast lederartig, an der Spitze gezähnt-mucronenspitig. Blumen einzeln gipfelständig, gelb, gestrahlt. Hierher gehören *Doronicum glutinosum* Willd. *Donia glutinosa* R. Brown. *Demetria* Lag. *Jnula glutinosa* Pers. und *Aster glutinosus* Cavan. siehe 1. Nachtr. B. 1. S. 359. Waterl. Mexiko. 4

2. *Grindelia inuloides* Willd. s. 1. Nachtr. B. 3. S. 580. Hierher gehören folgende Synonymen: *Aster spathulatus* et *Demetria spathulata* Lagasc. *Jnula spathulata* Pers. *Donia squarrosa* Pursh.

3. *Grindelia pulchella* Dur. Pierliche Grindellie.

Stengel staudenstranchig, aufrecht, glatt. Blätter linien-lanzettförmig, gespißt, fast gezähnt. Kelch klebrig. Waterl. Chili. 4

4. *Grindelia ciliata* Spr. Gewimperte Grindellie.

Donia ciliata Nuttall. Hook. exot. fl.

Stengel krautartig, glatt. Blätter länglich, gefranzt-gesägt. Blumenstiele eckig. Waterl. Nordamerika. 4

5. *Grindelia Duvalii* Spr. Duvalische Grindellie.

Grindelia angustifolia Duval.

Stengel krautartig; glatt. Blätter ganzrandig; untere spatelförmig, obere eiförmig-lanzettförmig, gespißt. Kelch glatt. Waterl. Mexiko. 4

6. *Grindelia angustifolia* Kunth. Schmalblättrige Grindelia.

Stengel, mehrere aus einer Wurzel, krautartig, einfach, einblüthig. Blätter schmal, stiellos, untere spatelförmig, buchtig-gezähnt, obere länglich-liniensförmig, sägerandig, einkirpzig. Waterl. Mexiko. 4

7. *Grindelia incisa* Spr. Eingeschnittene Grindelia.

Aster incisus Dr. Fischer Catal.

Stengel krautartig, aufrecht, oben scharf. Blätter fast stiellos, lanzettförmig, eingeschnitten-fiederspaltig, sägerandig, glatt, am Rande scharf. Blumenstiele doldentraubig. Waterl. Sibirien. 4

Kultur. N. 4. und 7. gedeihen unter freiem Himmel und kommen fast in jedem Boden fort, die übrigen überwintert man im Glashause. Sie blühen im Sommer. Fortpflanzung durch Saamen und Wurzeltheilung.

Grubbia Berg. f. Lexic. B. 4.

Diese Gattung widmete Bergius dem Andenken des Herrn Mich. Grubb, der Vorsteher der ostindischen Gesellschaft war und Hrn. Prof. Bergius viele schätzbare Beiträge zur lapidischen Flora geliefert hat. Es ist nur eine Art bekannt: *Grubbia rosmarinifolia* f. Lexic.

Guaiacum Linn. Franzosenholz f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 582.

Reich fünftheilig. Corolle fünfblättrig. Staubfäden 10, freistehend. Ein Griffel. Kapsel fünffächerig, fünfkantig, jedes Fach enthält einen harten Saamen.

Decandria Monogynia (Familie Rutaceen.)

1. *Guaiacum Breynii* Spr. Breynisches Guaiacum.

Blätter 2—3 paarig, gefiedert, etwas glänzend. Blättchen ungleich, das Endblättchen länglich-elliptisch, ungleich, die mittlern umgekehrteiförmig, die untersten rundlich. Blumenstiele doldenartig. Corollenblätter gelb. Wächst am Magdalenaenflusse. h

2. *Guaiacum arborea* Kunth ist *Zygophyllum arboreum* Jacquin. f. Lexic. B. 10. S. 626.

Blätter viel = (6—7) paarig gefiedert. Blättchen fast wechselnd stehend, länglich, stumpf, mucronenspitzig, ungleich gespalten. Blattstiele und Aestchen filzig. Blumenstiele fast doldenartig. Waterl. und Kultur f. Lexikon a. a. O.

Guaiacum afrum L. f. *Schotia speciosa*.

Guapurium Juss. gen. pl. ed. Usten. p. 359. *Guapurium*.

Kelch 4spaltig. Corolle vierblättrig. Staubfäden zahlreich, festschändig. Antheren rundlich. Beere kugelig, genabelt, 2—4saamig.

Jcosandria Monogynia (Familie Myrteen.)

1. *Guapurium fruticosum* Spr. Strauchiges *Guapurium*.

Stamm baum- oder strauchartig. Blätter gegenüber stehend, einfach, oder fiederspaltig, hell-punktirt. Blumen büschelförmig, seitenständig. Vaterl. Peru. ♀

2. *Guapurium herbaceum* Spr. Krautartiges *Guapurium*. *Klaprothia mentzelioides* Kunth. in Humb. et Bonpl. Nov. gen. pl. VI. p. 123. t. 537.

Der Stengel ist krautartig, und windet sich. Blätter einfach, gegenüberstehend, gezähnt, scharfborstig. Blumenstiele gipfelständig, fast gabelästig, wenigblümig, mit Bracteen besetzt. Corollenblätter weiß. Vaterl. Neugranada. ☉

Guardiola Cavan. *Guardiola*.

Blüthendecke (Kelch) glockenförmig, dreiblättrig. Fruchtboden mit Spreublättchen besetzt. Fünf Randblümchen. Saamen keulenförmig, nur mit dem bleibenden Griffel gekrönt.

Syngenesia. (Familie Compositae, Gruppe Radiaten.)

1. *Guardiola mexicana* Humb. et Bonpl. Pl. aequin. t. 141.

Stengel krautartig, ästig. Blätter gegenüberstehend, gestielt, länglich-eyförmig, langgespitzt, sägerandig, glatt. Blumen gestielt, zu 3—5 gipfelständig. Randblümchen weiß. Vaterl. Mexico. ☉ Blühz. August — Septemb.

Guarea Linn. f. Lexic. B. 4. *Guarea*.

Kelch klein, vierzählig. Corolle vierblättrig. Staubfädenröhre cylindrisch, und trägt acht Antheren. Ein Griffel mit kopfförmiger Narbe. Kapsel 4fächerig, vielsaamig.

Monadelphia Octandria (Familie Malvaceen.)

1. *Guarea ramiflora* Venten. (*G. humilis* Berter.)

Blätter zweipaarig gefiedert, lederartig, so wie die Aeste glatt. Blättchen länglich, langgespitzt, ganzrandig. Blumen in traubenförmigen seitenständigen Aehren, die kürzer als die Blätter sind. Vaterl. Portorico. ♀

2. *Guarea Swartzii* Cand. (*G. trichilioides* Swartz.)

Blätter 2—4 paarig gefiedert, glatt. Blättchen ey-lanzettförmig, langgespitzt, geädert. Blumen in langen Trauben. Vaterl. die caribäischen Inseln. h

3. *Guarea excelsa* Bonpl. Kunth. in Nov. gen. pl. 7. p. 227. Hohe Guarea.

Ein Baum, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter 2—3 paarig gefiedert. Blättchen oval, stumpf, lederartig, oben glatt, unten in den Winkeln der Rippen zottenhaarig. Blumenrispen winkelfständig, fast einfach, abgekürzt. Vaterl. Neu-spanien (Mexico). h

4. *Guarea brachystachia* Sesc. Kurzjährige Guarea.

Blätter 4—5 paarig gefiedert, glatt. Blättchen oval, gespißt. Blumen einzeln, winkelfständig, sehr kurz, die Aeste mit Warzen besetzt. Vaterl. Neuspanien. h

5. *Guarea densiflora* Spr. (Epicharis Blum.) Dichtblüthige Guarea.

Blätter 5—8 paarig gefiedert, unten fllzig. Blättchen wechselnd stehend, länglich, langgespitzt, an der Basis schief. Blumentrauben dicht, winkelfständig. Vaterl. Java. h

6. *Guarea cauliflora* Spr. (Epicharis Blum.) Stammblüthige Guarea.

Blätter vielpaarig gefiedert, unten zottenhaarig. Blättchen gegenüberstehend, länglich, langgespitzt. Blumentrauben dicht, seitenständig. Vaterl. Java. h

7. *Guarea sericea* Blum. (Epicharis sericea Blum.) Seidenhaarige Guarea.

Ein hoher Baum, dessen Blätter vielpaarig gefiedert sind. Blättchen länglich, langgespitzt, unten, vornehmlich an den Rippen fllzig-seidenhaarig. Blumentrauben gehäuft, seitenständig. Epicharis altissima Blum ist wahrscheinlich nur eine Varietät. Vaterl. Java. h

8. *Guarea trichilioides* Linn. f. Lexic. B. 4.

Kultur. Die Arten, welche aus Tropenländern kommen, stellt man ins warme Haus. N. 3. und 4. nehmen auch mit Durchwinterung im Glashause vorlieb. Sie lieben gute lockere Dammerde mit etwas Lehm oder Rasenerde gemischt. Fortpflanzung durch die Ausaat des Saamens in Blumentöpfe (Saamennäpfe) die ins warme Beet gestellt werden, desgl. durch Stecklinge in warmen Beeten oder durch Ableger.

Guatteria Ruiz et Pav. Fl. peruv. Guatterie.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 583.

Reich dreitheilig, Corolle sechsblättrig. Aesthen zahlreich, fast ansetzend, bodenständig, keulenförmig. Zahlreiche gestielte einsamige Beeren.

Polyandria Polygynia (Familie Anoneen.)

Diese Gattung ist mit *Uvaria* et *Unona* Linn. sehr nahe verwandt. Die ihr zugehörten Arten sind Bäume und Sträucher, deren Blätter wechselnd stehen und ganzrandig sind. Blumenstiele einzeln oder gehäuft, in Blattwinkeln oder den Blättern gegenüberstehend.

† Foliis glabris. Blätter glatt,

Zu dieser Abtheilung gehören die im ersten Nachtrage abgehandelten Arten: *Guatt. glauca*, *ovalis*, *pendula* R. et P. und folgende.

1. *Guatteria brevipes* Cand. Kurzstielige Guatterie.

Blätter länglich, gespitzt, glänzend, wie die Aeste glatt. Blumenstiele winkelförmig, einblüthig. Früchte kurzgestielt. Waterl. Guiana. h

2. *Guatteria Ouregou* Dunal. (*Uvaria monosperma* Lam. Willd.)

Blätter länglich, langgespitzt, glatt, unten rostfarbig, netzaderig. Blumenstiele winkelförmig, meist gehäuft. Früchte langgestielt. Waterl. Guiana, h

3. *Guatteria podocarpa* Cand. Cayennische Guatterie.

Blätter länglich-oval, langgespitzt, glatt, einfarbig. Blumenstiele einzeln, winkelförmig. Früchte langgestielt. Waterl. Cayenne. h

4. *Guatteria suberosa* Dun. Korbartige Guatterie.

Uvaria suberosa Roxb. Corom.

Die Rinde des Stammes korkartig-schwammig. Blätter länglich, gespitzt, glatt, Blumenstiele den Blättern gegenüberstehend, einblüthig, die äußern Corollenblätter kleiner als die innern. Früchte kugelförmig, langgestielt. Waterl. Coromandel. h

5. *Guatteria virgata* Dun. Ruthenförmige Guatterie.

Uvaria lanceolata et *virgata* Swartz.

Aeste ruthenförmig. Blätter länglich-lanzettförmig, stumpflich, glatt, auf beiden Seiten dunkelgrün, fast stiellos. Früchte klein, oval, sehr kurz gestielt. Waterl. Jamaica und Cuba. h

6. *Guatteria laurifolia* Dun. Lorbeerblättrige Guatterie.

Guatt. maypurensis Kunth. *Uvaria laurifolia* Swartz.

Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, glatt, oben glänzend. Früchte eiförmig, mucronenspizig. Vaterl. Jamaika und Domingo. h

7. *Guatteria sempervirens* Dun. Immergrünende Guatterie.

Blätter länglich = eiförmig, langgespitzt, glatt, glänzend. Blumenstiele wollig. Corollenblätter länglich, feinspizig. Früchte kugelförmig. Vaterl. Malabar. h

8. *Guatteria Corinti* Dun.

Blätter länglich = eiförmig, glatt, glänzend. Corollenblätter stumpflich. Früchte kugelförmig. Vaterl. Malabar. h

9. *Guatteria montana* Cand. Bergliebende Guatterie.

Guatt. malabarica Dun. fl.

Blätter länglich = lanzettförmig, langgespitzt. Blumenstiele fast gepaart, meist zweiblümig. Corollenblätter eingebogen. Vaterl. Malabar auf Bergen. h

10. *Guatteria acutifolia* Dun. Spizblättrige Guatterie.

Blätter länglich = eiförmig, gespitzt, dick, glänzend. Kelchtheile stumpf. Corollenblätter sehr spizig. Früchte kugelförmig. Vaterl. Malabar. h

11. *Guatteria cuneiformis* Blum. Keilförmige Guatterie.

Blätter umgekehrt = eiförmig, an der Basis fast herzförmig, glatt, unten grau-grün. Blumenstiele einblümig, wie die fast sichelförmigen Corollenblätter verlängert. Früchte länglich = keilförmig, an beiden Enden verdünnt. Vaterl. Java. h

12. *Guatteria umbilicata* Dun. Genabelte Guatterie.

Blätter länglich = eiförmig, langgespitzt, glatt. Blumenstiele mit Bracteen versehen. Früchte gestielt, kugelig, niedergedrückt, genabelt. Vaterl. Südamerika. h

13. *Guatteria Berteriana* Spr. Berterische Guatterie.

Blätter länglich, stumpf, glatt, sägezahnig oder ganzrandig. Früchte zahlreich, gestielt, fast sitzig, schief, mucronenspizig, so lang als die Stiele. Vaterl. Portorico. h

14. *Guatteria prinoides* Spr. Prinostartige Guatterie.

Neste ruthenförmig. Blätter länglich = lanzettförmig, schief, an beiden Enden verdünnt, undeutlich sägerandig, oben glänzend. Früchte sehr kurz gestielt, schief, mucronenspizig. Vaterl. St. Domingo. h

15. *Guatteria lateriflora* Blum. Seitenblüthige Guatterie.

Blätter länglich, langgespitzt, glatt. Blumenstiele einzeln,

seitenständig, einblümig. Früchte sehr kurz gestielt, länglich-umgekehrtepförmig. Waterl. Java. h

16. *Guatteria pallida* Blum.

Blätter länglich, an beiden Enden verbünnt, glatt, unten blaß. Blumenstiele einzeln stehend, einblümig. Früchte gestielt, länglich, an beiden Enden verbünnt, füzig. Waterl. Java. h

17. *Guatteria australis* Hilar. Südliche Guatterie.

Stengel strauchig. Blätter länglich, langgespizt, glatt. Corollenblätter fast gleich, stumpf. Waterl. Brasilien. h

†† Foliis subtus pubescentibus. Blätter unten füzig.

18. *Guatteria Aberemoa* Dun. (*Aberemoa guianensis* Aubl. Fl. guian.)

Blätter länglich-eyförmig, gespizt, auf beiden Seiten füzig. Früchte fast stiellos, zahlreich, länglich, an beiden Enden verbünnt, mucronenspizig. Waterl. Guiana. h

19. *Guatteria cerasoides* Dun. (*Uvaria* Roxb.)

Blätter länglich-lanzettförmig, gespizt, unten zottenhaarig, Blumenstiele einzeln winkelftändig. Corollenblätter fast gleich. Früchte kugelfund, den Kirschen gleichend. Waterl. Coromandel. h

20. *Guatteria rufa* Dun. Gelbrothe Guatterie.

Guatt. cordata Dunal.

Blätter fast herzförmig-länglich, gespizt, unten mit gelbrothem Filze bekleidet. Blumenstiele sehr kurz, seitenständig, wenigblümig. Waterl. Ostindien und die moluckischen Inseln. h

21. *Guatteria Gomeziana* Hilar. Fl. bras. Gomezische Guatterie.

Ein Baum, dessen Aeste abstehen. Blätter länglich, langgespizt, unten behaart, die innern Corollenblätter lanzettförmig, gespizt. Waterl. Brasilien. h

22. *Guatteria eriopoda* Cand. Rauchblumige Guatterie.

Blätter länglich-lanzettförmig, an beiden Enden verbünnt, unten, wie die Aeste, rostfarbig-zottenhaarig. Blumenstiele einblümig, wie die Kelche und Corollenblätter behaart. Piercher gehört (Guatt. hirsuta R. et P. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 583. Waterl. Peru. h Blühz. Sommer.

23. *Guatteria macrophylla* Blum. Großblättrige Guatterie.

Blätter groß, lederartig, länglich, an beiden Enden verdünnt, unten filzig. Blumenstiele sehr kurz, wenigblümig. Die äußern Corollenblätter kürzer als die innern. Vaterl. Java. h

24. *Guatteria Bagma* Blum.

Blätter länglich, langgespitzt, oben glänzend, unten, wie die Aestchen, filzig. Blumenstiele sehr kurz, einblümig. Die innern Corollenblätter kürzer als die äußern. Vaterl. Java. h

25. *Guatteria pisocarpa* Blum.

Blätter an der Basis ungleich, länglich-eiförmig, stumpflich, unten, wie die Aestchen, filzig. Blumenstiele einblümig. Früchte fast stiellos, kugelförmig. Vaterl. Java. h

26. *Guatteria ferruginea* Hilar. Rostfarbige Guatterie.

Blätter länglich, gespitzt, unten rostfarbig-filzig. Die innern Corollenblätter breiter und kürzer als die äußern, wodurch sich diese Art von *Guatt. eriopoda* N. 22. unterscheidet; bei jener sind die Corollenblätter alle fast von gleicher Länge. Vaterl. Brasilien. h

27. *Guatteria villosissima* Hilar. Sehr zottenhaarige Guatterie.

Blätter länglich, langgespitzt, unten an den Rippen und Aern sehr zottenhaarig. Blumenstiele zweiblümig. Die innern Corollenblätter kürzer als die äußern. Vaterl. Brasilien. h

28. *Guatteria lutea* Hilar. Gelbe Guatterie.

Stamm strauchig. Blätter länglich, langgespitzt, unten filzig. Corollenblätter gelb, die innern verlängert, gespitzt. Vaterl. Brasilien. h

Kultur. Die Guatterien verlangen in unsern Gärten eine Stelle im warmen Hause, denn sie wachsen in Tropenländern in Wäldern und Hainen. Man pflanzt sie in gute lockere Dammerde und vermehrt sie, außer der Aussaat des Saamens, auch durch Stecklinge in warmen Beeten.

Synonymen.

Guatteria cordata Dun. f. *Guatteria rufa* N. 20.

— *hirsuta* R. et P. f. *Guatteria eriopoda* N. 22.

— *malabarica* Dun. f. *Guatteria montana* N. 9.

— *maypurensis* Kunth. f. *Guatteria laurifolia* N. 6.

Guazum polybotrya Cavan. ist *Rubroma polybotryon* Willd.

Guazum tomentosa Kunth. ist *Rubroma tomentosum* Spr.

Guepinia Lepidium Desv. ist *Lepidium nudicaulis* Linn. *Teesdalia Lepidium* R. Br.

Guepinia nudicaulis Bät. ist *Iberis nudicaulis* Linn. *Teesdalia Iberis* R. Br.

Guettarda Linn. *Guettarda*. (Gaertn. Sem. t. 36.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 684.

Blumen meist monöisch. Kelch glockenförmig = cylindrisch. Corolle langröhrig, trichterförmig, der Rand 5--7 spaltig, mehr oder weniger abstehend. Staubfäden 5--8 eingeschlossen. Ein Griffel, mit kopfförmiger Narbe. Steinfrucht 4--6 fächerig, in jedem Fache ein Saame.

Pentandria Monogynia (Familie Rubiaceen.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Joh. Stephan Guettard ehemaliger Akademiker zu Paris (geb. 1715 † 1786.) Guettard hat sich durch einige schätzbare Belehrungen über die Natur der Zoophyten, Anatomie und Beschreibung der Pflanzen um die Wissenschaft verdient gemacht. Siehe *Memoires sur differ. parties des sciences, et arts*. Tom. 1--5. Mit 258 Kupfert. Paris 1768 — 1783. *Observations sur les plantes*, (de Orleans) Vol. 1, 2. Paris 1747.

Die Arten der Gattung *Guettarda* sind Bäume und Sträucher, deren Blätter einander gegenüber stehen und ganzrandig sind. Blumenstiele meist zweitheilig, 3 oder vielblütig. Blumen ährenständig, meist einseitig.

† *Floribus pentandris*. Blumen mit fünf Staubfäden.

Zu dieser Abtheilung gehören die im 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Guett. argentea* Lam. Willd. *G. crispiflora*, *parviflora* Vahl. und folgende. Die Gattung *Laugieria* Vahl. Sw. u. a. hat man mit *Guettarda* vereiniget.

1. *Guettarda hirsuta* Poiret. ist *Laugieria hirsuta* R. et P. f. Lexic.
2. *Guettarda tomentosa* Roem. et Schult. ist *Laugieria tomentosa* f. Lexic.
3. *Guettarda resinosa* Vahl. ist *Laugieria resinosa* f. Lexic.

4. *Guettarda lucida* R. et Schult. ist *Laugieria lucida* Sw. f. Lexic.

5. *Guettarda odorata* R. et Schult. ist *Laugieria*.

6. *Guettarda umellata* Spr. Doldenblüthige Guettarde.

Aeste oben ausgebreitet = zusammengedrückt. Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, ganzrandig, glatt, oben glänzend. Blumenstiele winkelförmig, gehäuft doldenartig. Corollen glatt. Vaterl. Brasilien. h

7. *Guettarda viburnoides* Schlechtend. in *Linnaea* B. 4. Heft 2. S. 182.

Aeste rundlich, braun = oder gelbroth = filzig. Blätter gestielt, länglich = eiförmig, gespitzt, an der Basis gerundet, oben glattlich, unten filzig, 4 Zoll lang, $2\frac{1}{2}$ Zoll breit. Blumen in langgestielte Asterdolden gesammelt, gehäuft, aufgehend, einseitig. Bracteen sehr klein, kürzer als die Kelche. Antheren meist fünf, in der Corollenröhre fast aufgehend, linienförmig. Steinfrucht einsamig, niedergedrückt = kugelig. Vaterl. Brasilien. h

8. *Guettarda uruguensis* Schlechtend. J. c. p. 182.

Ein Baum, 15—20 Fuß hoch, dessen Aeste fast rund sind und aufsteigen. Blätter gestielt, theils elliptisch = eiförmig oder keilförmig, theils lanzettförmig, gespitzt, glattlich, die größern 3 Zoll lang. Austerblätter lanzettförmig = dreieckig. Die Blumen bilden langgestielte, winkelförmige Asterdolden. Bracteen linien = lanzettförmig, länger als die Kelche. Blumen einseitig, fünfmannig. Corolle weiß. Narbe kopfförmig, grün. Steinfrucht walzen = eiförmig, 3—4 saamig. Vaterl. Brasilien, bei San Jose de Uruguay. h

†† Floribus hexandris. Blumen mit sechs Staubfäden.

Guettarda rugosa Sw. f. 1. Nachtr. gehört hierher und folgende.

9. *Guettarda scabra* Lam. Hierher gehört *Matthiola scabra* Linn. f. Lexic. B. 6. S. 6.

10. *Guettarda cordata* Kunth. in Humb. et Bonpl. Nov. gen. pl. 3. p. 328. Herzförmige Guettarde.

Aeste walzenrönd, braun, glatt, in der Jugend zusammengedrückt. Blätter gegenüber stehend, gestielt, elliptisch = eiförmig, an der Basis tief herzförmig, geadert, lederartig, oben mit zerstreut stehenden Härchen bedeckt, unten weiß = filzig, 2—3 Zoll lang, 9—10 Linien breit. Austerblätter eiförmig,

seidenhaarig, so lang als die Blattstiele. Blumenstiele einzeln, winkelförmig, dreiblümig, filzig. Blumen aufsteigend, 9—10 Linien lang. Kelch glockenförmig, schlaff, abgestutzt, undeutlich gezähnt, seidenhaarig. Corollenröhre fast viermal länger als der Kelch, seidenhaarig, der Rand tellerförmig, die Einschnitte kürzer als die Röhre. Staubfäden 6, eingeschlossen. Antheren linienförmig. Ein Griffel, mit keulenförmiger Narbe. Vaterl. Südamerika, in Wäldern. ? ♀ Blühz. Sommer.

11. *Guettarda xylosteoides* Kunth. J. c. 3. p. 328. t. 292.

Ein Baum, etwa 20 Fuß hoch, dessen Aeste sich ausbreiten, in der Jugend scharfborstig, im Alter braun und glatt sind. Blätter gestielt, länglich-umgekehrt eiförmig, an der Basis gerundet, ganzrandig, geadert, oben glatt, unten blaß, filzig, 2 Zoll lang. Afterblätter lanzettförmig, gespitzt, borstig, so lang als die Blattstiele. Blumenstiele winkelförmig, zweispaltig, 3—7 blümig, $1\frac{1}{2}$ Zoll lang. Blumen fast kopfförmig, einseitig, aufsteigend. Bracteen pfriemenspizig, filzig. Kelch und Corolle wie bei vorhergehender Art gebildet. Corolle weiß, auswendig und im Schlunde filzig. Antheren 6, selten 5 oder 7 in der Corollenröhre sitzend. Narbe purpurroth. Vaterl. Südamerika, am Orinoko-Flusse. ♀ Blühz. Julius.

+++ Floribus tetrandris. Blumen nur viermännig.

12. *Guettarda elliptica* Swartz. Elliptische Guettarde.

Blätter elliptisch, ganzrandig, steif, geadert, oben glatt, unten filzig. Die Blumen bilden zweitheilige Aehren. Corollen filzig. Vaterl. Ostindien. ♀

13. *Guettarda membranacea* Swartz. Häutige Guettarde.

Blätter häutig, länglich, langgespitzt, ganzrandig, geadert, an den Rippen und Adern stachelig-scharfborstig. Die Blumen nach einer Seite gerichtet und bilden zweitheilige Aehren. Corolle filzig. Vaterl. Domingo und Martinique. ♀

14. *Guettarda coriacea* Roem. et Schult. ist *Laugieria coriacea* Vahl. s. Lexic. B. 5.

Kultur. Gute lockere Dammerde und warme Standörter. Fortpflanzung durch Stecklinge und durch die Aussaat des Saamens in Blumentöpfe (Saamennäpfe), die ins warme Beet gestellt werden. Uebrigens siehe 1. Nachtr. B. 3. S. 586.

Guichenotia Gay. Guichenotie.

Kelch corollinisch, glockenförmig, von dreitheiligen Bracteen unterstützt. Corolle drüsenförmig. Antheren 5, seitlich aufspringend. Fruchtknoten fünffächerig.

Pentandria Monogynia (Familie Lasiospermeae.)

1. *Guichenotia ledifolia* Gay. Ledumblättrige Guichenotie.

Stamm strauchig, ästig. Blätter linienförmig, am Rande zurückgerollt, unten sitzig. Blumentrauben langgestielt, seitständig. Kelche behaart.

Dieser Strauch kommt aus Neuhoiland, blüht im Frühjahr und Sommer und wird im Glashause überwintert.

Güldenstädtia Dr. Fischer. Güldenstädtie.

Kelch zweilippig, von zwei Bracteen unterstützt; die obere Einschnitte breiter als die untere. Das Fähnchen der schmetterlingsförmigen Corolle sehr klein. Zehn Staubfäden, davon einer frei steht. Hülse walzenrund, viel-saamig.

Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflanzen.)

Diese Gattung widmete Hr. Dr. Ferd. Fischer dem Andenken des Herrn Joh. Anton Güldenstädt, aus Liefland, (geb. 1745, † 1781.) Güldenstädt war Professor in Petersburg, besuchte die kaukasischen Gebirge, dann mit Pallas den Ural und die südlichen Länder Sibiriens und sammelte viele Pflanzen die er in einem Werke: Bemerkungen einer Reise im russischen Reiche, welches eine Flora der Gegenden am Baikal-See enthält, beschrieben hat. Petersburg 1775. 4.

1. *Güldenstädtia monophylla* Fischer. Einblättrige Güldenstädtie.

Wurzelblätter fast dreizählig, kreisrund, seidenhaarig-sitzig. Stengel fehlt. Schaft bolzenartig getheilt, wenigblüthig. Vaterl. die Alpen in Sibirien. 4

2. *Güldenstädtia pauciflora* Fischer. Wenigblüthige Güldenstädtie.

Hierher gehört: Astragalus pauciflorus Pall. Astrag. t. 66. fig. B. Siehe 1. Nachtr. B. I. S. 400. N. 95.

Günthera Andr. ist Brassica elongata Ehrh.

Güntheria Spreng. Güntherie.

Blüthendecke (Kelch) einblättrig, vieltheilig, vielblüthig. Fruchtboden mit Spreublättchen besetzt, die gespalten-grannig sind. Saamentrone spreuig, die Corollenröhre einschließend.

Syngenesia I Ord. (Familie Compositae, Gruppe Cyparitiaceae)

Diese Gattung sollte eigentlich auf *Gunniera* folgen. Sie führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Dr. Günther Apotheker in Breslau. ?

1. *Güntheria megapota mica* Spr. Megapota mische Güntherie.

Stengel krautartig, aufrecht, etwa $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch, einblättrig, filzig. Blätter wechselnd stehend, länglich, an beiden Enden verdünnt, ganzrandig. Blumen gestielt, gelb. Vaterl. Rio grande.

Güntheria graveolens Trevir ist *Corsinia marchantioides* Radd.

Guilandina Linn. Guilandine.

Kelch tellerförmig, fünfspaltig. Corolle fünfblättrig, kelchständig. Staubfäden 10, freistehend. Ein Griffel. Hülse breit, stachlig oder unbewehrt. Saamen kugelig, knochenhart.

Decandria Monogynia (Familie Hülsenpflanzen.)

Guilandinus, dem diese Gattung gewidmet ist, war Professor der Botanik in Padua. Ob er derselbe Guilandinus war, den Kurt Sprengel im ersten Theile der Geschichte der Botanik S. 355. angeführt hat, weiß ich nicht.

1. *Guilandina gemina* Lour. Fl. china et cochinchin.

Blätter gefiedert. Blättchen eiförmig, stumpf, an der Basis stachlig. Blumen rispenständig. Früchte (Hülsen) weichstachlig. Vaterl. Cochinchina. h

2. *Guilandina ciliata* Berg. Gewimperte Guilandine.

Aeste mit Stacheln besetzt. Aestchen rostfarbig = filzig. Blätter gleich, 3—6 paarig gefiedert, glattlich. Blättchen schief, kreisrund, ausgekerbt, gewimpert. Blumen in Trauben-Aehren gesammelt. Hülsen elliptisch, stachlich. Vaterl. die Caribäischen Inseln, vornemlich die Ins. Bartholom. h

Die übrigen Arten: *Guil. Bonduc.* Linn. *G. axillaris et paniculata* Lam. und eine Anleitung zu ihrer Kultur s. Lexic. B. 4.

Synonymien.

Guilandina Bonducella Linn. s. Lexic. B. 4. ist *Guilandina Bonduc.* Var. *Guil-*

Guilandina dioica Linn. f. *Gymnocladus canadensis* Lam. Lexic.

— *echinata* Spr. ist *Caesalpinia echinata* Lex. 2 Aufl.

— *Moringa* Linn. f. *Hyperanthera Moringa*.

— *Nuga* Linn. f. Lexic. ist *Caesalpinia Nuga* R. Br.

Guilleminea Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. VI. p. 42.

Kelch glockenförmig, fünfspaltig, an der Basis von drei Bracteen unterstützt. Keine Corolle. Staubfäden 5, kurz, oben in die Kelchröhre eingefügt, an der Basis ausgebreitet und verbunden. Antheren einfächerig. Ein oberer einfächeriger Fruchtknoten. Ein Griffel, mit ausgerandeter Narbe. Kapsel elliptisch, häutig, nicht aufspringend, vom bleibenden Kelche bedeckt. Saamen fast linsenförmig.

Pentandria Monogynia (Familie Chenopodeen.)

Diese Gattung ist mit *Illecebrum* Linn. nahe verwandt, unterscheidet sich aber am meisten durch fünf Staubfäden, mit einfächerigen Antheren gekrönt, durch den ungetheilten Griffel und durch die Beschaffenheit der Kapsel; bei *Illecebrum* stehen zwischen den fünf fruchtbaren Staubfäden abwechselnd, fünf Astersfäden (oder Nectarshuppen) und der Griffel ist gespalten.

1. *Guilleminea illecebroides* Kunth J. c. VI. p. 42. t. 518.

Illecebrum densum Willd. herb. R. et Schult. Syst. Veg. 4. p. 517.

Guilleminea Illecebrum Spr. Syst. Veg. cur. p. 103.

Stengel niedrig, sehr ästig. Blätter gegenüber stehend, gestielt, spatelförmig, gesägt, glatt, abwechselnd kleiner, die Stiele an der Basis verbunden, ohne Astersblätter. Die Blumentöpfechen sitzen einzeln in den Blattwinkeln an den Ästchen. Vaterl. Peru; bei der Stadt Quito und im Thale S. Jago. 4 Blüht daselbst im Januar.

Gulielma Martius gen. et sp. Palm.

Männliche und weibliche Blumen an einem Kolben. Kelch und Corolle einblättrig, das Corollenblatt dreizählig oder dreispaltig. Staubfäden 6. Griffel 3. Steinfrucht einsamig, die Schale an der Spitze mit 3 Poren versehen.

Hexandria Trigynia (Familie Palmen.)

Dietr. Lex. 2t Nachtr. IV. Bd.

⊗

1. *Gulielma speciosa* Mart. Schöne Gulielmapalme.

Bactris Gachipaes Humb. et Bonpl. Nov. gen. 1. p. 302. ? f. Lexic. 2 Aufl. B. 2. S. 183.

Eine hohe prächtige Palme, deren Stamm (so wie die Laubstiele) sehr dornig ist. Laub (Wedel) gefiedert, gekräuselt, stachelig. Kolben ästig. Scheide einblättrig. Steinfrucht länglich. Vaterl. Neugranada und Brasilien. ♀ Blüth. August und September.

Gunnera Linn. *Gunnera*. (Lamarck illustr. t. 801.)

Blumen in zusammengefügten Köpfen. Kelch zweizählig. Staubfäden 2. Ein gespaltenen Griffel. Steinfrucht fleischig, von dem angeschwollenen Kelche bedeckt und gleichsam mit diesem verwachsen.

Diandria Digynia (Familie Urticeen.)

Diese Gattung widmete Linné dem Andenken des Hrn. Joh. Ernst Gunnerus, Bischof von Dornheim (geb. 1718. † 1773.) Gunnerus hat sich durch die Herausgabe einer Flora von Norwegen um die Wissenschaft verdient gemacht. (Flora norvegica P. 1. 2. Nedrof. 1766. Havn. 1772. fol. Nachträge in den Norske Vidensk Selskab Skrift)

Es sind von der Gattung drei Arten bekannt f. 1. Nachtrag B. 3. S. 588. Der Charact. generic. nebst Klasse kann daselbst ausgeschrieben werden.

Güntheria siehe oben neben *Güldenstädtia*.

Gussonia concolor Spr. f. *Excocaria concolor*.

Gussonia discolor Spr. f. *Excocaria discolor*.

Gutierrezia linearifolia Lag. ist *Galinsogea linearifolia* Spr.

Gyalecta aethalea Ach. ist *Parmelia multipunctata* var.

— *bryophylla* Ach. ist *Parmelia seruposa* Spr.

— *Chrysitis* Wallr. ist *Parmelia Chrysitis* Spr.

— *epulotica* Wahlenb. ist *Parmelia marmorea* Ach.

— *gloica* Ach. ist *Parmelia parella* Ach.

— *Personiana* Ach. ist *Parmelia carneo-lutea* Ach.

— *Wahlenbergiana* Ach. ist *Parmelia marmorea* Ach.

Gymnadenia R. Brown. Richard. *Gymnadenie*.

Kelch (Corollenblätter) gewölbt, rachenförmig. Nectarlippe gespornt, dreispaltig. Das Griffelsäutchen mit einem gespaltenen Schnäbelchen versehen.

Gynandria Monandria (Familie Orchideen.)

1. *Gymnadenia conopsea* Rich. ist *Orchis conopsea* Linn. f. Lexic. B. 6.
2. *Gymnadenia odoratissima* Rich. ist *Orchis odoratissima* Linn. f. Lexic. B. 6.
3. *Gymnadenia angustifolia* Spr. ist *Orchis iberica* M. a Bieberst. Willd. Sp. pl.
Uebrigens siehe die Beschreibung der *Orchis iberica* im 1. Nachtr. B. 3. S. 381.
4. *Gymnadenia viridis* Rich. *Satyrium viride* Linn. ist *Orchis viridis* Swartz. f. Lexic. B. 6.
5. *Gymnadenia ornithis* Spr. ist *Orchis ornithis* Jacq. f. Lexic. B. 6.
6. *Gymnadenia albida* Rich. *Satyrium albidum* Linn. ist *Orchis albida* Sw. f. Lexic. B. 6.
7. *Gymnadenia cucullata* Rich. f. *Orchis cucullata* Lex. B. 6.

Gymnandra Pallas. Gymnandra.

Kelch gespalten, dreizählig. Corolle zweilippig. Oberlippe ungetheilt, die untere 2—3 spaltig, an der Basis des Rands vier ungleiche Staubfäden tragend, davon 2 fehl schlagen, d. h. unfruchtbar sind. Kapsel 2fächerig, 2saamig.

Didynamia Angiospermia (Familie Personaten.)

† Die untere Corollensippe meist zweispaltig.

1. *Gymnandra integrifolia* Willd. *Gymn. borealis* Pall. ist *Bartia Gymn.* Linn. f. Lexic. 1 und 2 Aufl. B. 2.
2. *Gymnandra gracilis* Willd. Dünne *Gymnandra*.
Stengel krautartig, dünn. Blätter ungleich, sägerandig. Wurzelblätter langgestielt, länglich. Stengelblätter stiellös, länglich-eiförmig. Die Blumen bilden eine schlaffe walzenrunde Aehre. Staubfäden lanzettförmig, so lang als die Oberlippe der Corolle. Waterl. Ins. Meut.
3. *Gymnandra elongata* Willd. Langährige *Gymnandra*.
Blätter gefiedert. Wurzelblätter länglich, verlängert. Stengelblätter eiförmig. Blumen in eine verlängerte Aehre gesammelt. Staubfäden kürzer als die obere Corollensippe. Waterl. das östliche Sibirien.
4. *Gymnandra ovata* Willd. (*Bartia Gymnandra* Pursh. (non Linn.)

Wurzelblätter länglich, fast doppelt und tief gezähnt. Stengelblätter eiförmig, entfernt sägezählig. Blumen eine elliptisch-eiförmige Aehre bildend. Staubfäden kürzer als die Oberlippe der Edroffe. Vaterl. Nordamerika, das östliche Sibirien und Kamtschatka.

† Die Unterlippe der Corolle meist dreispaltig.

5. *Gymnandra altaica* Willd. (*Lagotis glauca* Gaertn.)

Stengel krautartig. Blätter stumpf, sägerandig. Wurzelblätter langgestielt, länglich. Stengelblätter stiellos, eiförmig. Aehre walzenrund. Bracteen kürzer als die Blumen. Antheren fast anstehend. Vaterl. Kamtschatka; Jmaus.

6. *Gymnandra minor* Willd. Kleine *Gymnandra*.

Blätter länglich-lanzettförmig, fast sägerandig. Wurzelblätter gestielt. Stengelblätter stiellos. Blumen eine walzenrunde Aehre bildend. Staubfäden so lang als die gekerbte Oberlippe. Vaterl. das östliche Sibirien.

7. *Gymnandra dentata* Willd. Gezähnte *Gymnandra*.

Blätter länglich, tief sägeartig-gezähnt. Blumen in eine schaffe walzenrunde Aehre gesammelt. Staubfäden so lang als die gekerbte Oberlippe. Vaterl. das östliche Sibirien.

8. *Gymnandra reniformis* Willd. Nierenförmige *Gymnandra*.

Wurzelblätter nierenförmig, gekerbt, gestielt. Stengelblätter rundlich-oval, sägerandig. Die Blumen bilden eine dichte walzenrunde Aehre. Oberlippe ausgekerbt, länger als die Staubfäden. Vaterl. Insel Aleut. 4?

9. *Gymnandra Stelleri* Ledeb.

Wurzelblätter länglich, gekerbt, gestielt. Stengelblätter stiellos, umfassend, rundlich, stumpf, ganzrandig. Aehre eiförmig. Vaterl. Kamtschatka.

Kultur. Alle Arten dieser Gattung gedeihen in unseren Gärten unter freiem Himmel und kommen fast in jedem Boden fort. Man zieht sie aus Saamen und vermehrt die perennirenden Arten noch überdies durch Wurzeltheilung.

Gymnanthera R. Brown. Prodr. Fl. Nov. holl.

Corolle präsertirtellerförmig. Kranz (innere Corolle) fünfblättrig, die Blätter gegrannt. Staubfäden 5, im Schlunde eingefügt, mit langgespizten, ungebarteten Antheren gekrönt. Pollenmassen zu 4, körnerig. Balgkapseln walzenrund, glatt, ausgesperret. Saamen mit Haarschöpfchen versehen.

Pentandria Digynia (Familie Contorten.)

1. *Gymnanthera nitida* R. Brown.

Ein glatter Schlingstrauch, dessen Blätter leinader, gegenüber stehend, länglich und glänzend sind. Blumenstiele seitenständig, fast doldentraubig. Blumen weiß-grünlich. Vaterl. Neuhollland. h

Kultur. Gute lockere Dammerde und Durchwinterung im Glashause oder in einem ähnlichen frostfreien Behälter. Fortpflanzung durch Saamen, Stecklinge und Ableger.

Gymnema Rob. Brown. Prod. Fl. Nov. Holl. Gymnema.

Corolle fast trugförmig, fünfspaltig, im Schlunde, zwischen den Einschnitten, mit Schüppchen oder kleinen Zähnen versehen. Griffelsäulchen ohne Kranz. Antheren 5, häutig. Pollenmassen aufrecht, an der Basis angeheftet. Balgklapseln dünn, glatt. Saamen mit Haarschöpfchen gekrönt.

Pentandria Digynia (Familie Contorten.)

1. *Gymnema geminatum* R. Br. Gepaartdoldige Gymnema.

Stengel gewunden, filzig. Blätter gegenüber stehend, eiförmig, glattlich. Blumen in gepaarten Dolden, deren Stiele kürzer als die Blätter sind. Die Corolle ist im Schlunde mit einem Kranze versehen. Vaterl. Neuhollland. 4 h

2. *Gymnema tingens* Spr. (*Asclepias tingens* Roxb.)

Stengel gewunden, glatt. Blätter herzförmig, langgespitzt, glatt. Blumen in winkelfständige Dolden gesammelt. Der Schlund der Corolle gekrönt, die Röhre mit fünfzähligen Falten. Vaterl. Pegu.

3. *Gymnema tenacissimum* Spr. (*Asclepias tenacissima* Roxb.)

Stengel windend. Blätter herzförmig, zottenhaarig, sehr weich. Blumen in Rispen, die sehr ästig und filzig sind. Die Corollenröhre an der Basis schuppig, - der Rand schief. Balgklapseln filzig. Vaterl. Ostindien.

4. *Gymnema sylvestre* R. B. Hierher gehört: *Periptoca sylvestris* Retz. Willd. f. Lexic. B. 7.

Stengel strauchig, kletternd. Vaterl. Seylon. h

5. *Gymnema trinerve* R. Br. Dreirippiges Gymnema.

Stengel aufrecht. Blätter länglich-lanzettförmig, dreirippig, filzig. Blumen in stiellosen Dolden. Corolle im Schlunde nackt. Vaterl. Neuhollland. 4 h

6. *Gymnema lactiferum* R. Br. ist *Asclepias lactifera* Linn. f. Lexic. 1 und 2 Aufl. B. 2.

Die Arten der Gattung *Gymnema* sind krautig, staudenstrauchig oder krautartig, die Stengel gewunden, kletternd oder aufrecht. Die Blätter stehen zu 2 einander gegenüber, sind häutig, flach, die Blumen in Doldern oder Asterdolden gesammelt und entwickeln sich im Sommer. N. 2, 3, 4 und 6 stellt man ins warme Haus; die übrigen nehmen mit Durchwinterung im Glashause vorlieb. Fortpflanzung und Vermehrung durch Samen und Stecklinge in warmen Beeten.

Gymnogramme Desv. *Gymnogramme*.

Die Fruchthäuschen sitzen zwischen den gabelästigen Aehren des Laubes (Wedel), ohne Schleierhäutchen.

Cryptogamia Sect. 1. (Familie Farrenkräuter, Filices.)

† Fronde subtus hirsuta s. squamosa.

Laub (Wedel) unten rauchhaarig oder schuppig.

1. *Gymnogramme pedata* Kaulf. (*Hemionitis pedata* Swartz Synops filic. t. 1, f. 3.)

Laub (Wedel) fußförmig getheilt, gelbroth = rauchhaarig. Blättchen fiederspaltig, langgespitzt. Waterl. Neuspanien. ? 4

2. *Gymnogramme Ceterach* Spr.

Laub tief fiederspaltig. Einschnitte linien = lanzettförmig, abwechselnd stumpf, unten alle, mit Spreublättchen dicht besetzt. Waterl. Europa und Teneriffa. 4

Bei dieser Art hat Sprengel folgende Synonymen angeführt; *Asplenium Ceterach* Linn. *Aspl. aureum* Cav. *Aspl. latifolium* Borry, *Scolopendrium Ceterach* Sm. *Grammitis Ceterach et aurea* Sw. *Ceterach officinarum et canariensis* Willd.

3. *Gymnogramme rufa* Desv. Gelbrothe *Gymnogramme*.

Laub gefiedert, unten mit gelbrothen Borsten besetzt. Blättchen stiellos, länglich, stumpf, ganzrandig. Hierher gehört: *Pteris rufa et Acrostichum rufum* Linn. *Hemionitis rufa* Sw. Waterl. Südamerika. 4

4. *Gymnogramme acuminata* Kaulf. Langgespitzte *Gymnogramme*.

Laub gefiedert, behaart. Blättchen gestielt, länglich = lanzettförmig, langgespitzt, ganzrandig, an der Basis keilsförmig abgestuft. Waterl. die caraischen Inseln. 4

5. *Gymnogramme cordata* Schlechtend. ist *Acrostichum*

cordatum Linn. *Grammitis* Swartz. *Notholaena* Desv.
Ceterach crenata Kaulf. Kap d. g. Hoffn. 4

6. *Gymnogramme totta* Schlechtend. (*Polypodium tottum* Willd.)

Laub doppelt fiederspaltig, auf beiden Seiten behaart. Blättchen stiellos, lanzettförmig, langgespitzt. Einschnitte eysförmig, stumpf. Kap d. g. Hoffn. 4

7. *Gymnogramme tomentosum* Desv. (*Asplenium tomentosum* Lam.)

Laub fast doppelt gefiedert, zottenhaarig = filzig; die untern Blättchen gefiedert, obere herzförmig, dreilappig. Vaterl. Brasilien. 4

8. *Gymnogramme filipendulaefolia* Desv. (*Grammitis cheilanthoides* Swartz. *Asplenium filipendulaefolium* Thuars.)

Laub meist doppelt gefiedert, linien = lanzettförmig, behaart. Blättchen rundlich = eysförmig. Einschnitte stumpf, zweispaltig. Mascar. Insel.

9. *Gymnogramme myriophylla* Swartz.

Laub fast dreifach gefiedert, schlaff, filzig. Blättchen herzablaufend, eysförmig, stumpf, eingeschnitten, die Einschnitte gespalten = ausgekerbt. Brasilien. 4

10. *Gymnogramme hirta* Desv. (*Grammitis hirta* Kunth.)

Laub dreifach gefiedert, borstig. Blättchen rundlich = umgekehrt = eysförmig, an der Spitze dreilappig, die Lappen gezähnt. Vaterl. Neugranada. 4

11. *Gymnogramme flexuosa* Desv. (*Grammitis flexuosa* Humb.)

Laub vierfach gefiedert, behaart. Blättchen dreitheilig. Einschnitte stumpf, 2—3 spaltig. Die Spindel ist knieartig gebogen und wie der Strunk glatt. Vaterl. Neugranada. 4

†† Fronde subtus farinosa. Laub unten mehlig (wie mit Mehl bestreut.)

12. *Gymnogramme trifoliata* Desv. (*Acrostichum trifoliatum* Linn. f. Lexic. 1. Aufl. B. 1. *Hemionitis trifoliata* Humb.)

Laub gefiedert. Blättchen gekerbt, zu 2—3 auch einzeln stehend, gestielt, linienförmig, glatt, die fruchttragenden unten weiß = mehlig. Südamerika. 4

13. *Gymnogramme tartarea* Desv. (*Acrostichum tartareum* Sw. *Hemionitis dealbata* W.)

Laub doppelt gefiedert, unten weißmehlig. Blättchen länglich, stumpf, gezähnt; die untersten fast fiederspaltig, oberste zusammenfließend. Vaterl. Jamaika und Sudamerika. 4

14. *Gymnogramme peruviana* Desv. (*Gym. dealbata* Willd.)

Laub doppelt gefiedert, unten weiß = mehlig, obere Blättchen keilförmig, feingekerbt, untere fiederspaltig. Einschnitte stumpf. Peru. 4

15. *Gymnogramme Calomelanos* Kaulf. (*Acrostichum Calomelanos* Linn. f. Lexic.)

Laub doppelt gefiedert, unten weiß = mehlig. Blättchen lanzettförmig, gespitzt, untere fiederspaltig, über der Basis geschräpft. Westindien. 4

16. *Gymnogramme bidentata* Presl.

Laub doppelt gefiedert, unten grau = mehlig. Blättchen länglich = lanzettförmig, fiederspaltig. Einschnitte stumpflich, zweizählig, die untersten größer als die oberen. Vaterl. Panamas Ins. 4

17. *Gymnogramme rosea* Desv. (*Hemionitis argentea* Willd.)

Laub dreifach gefiedert, unten rosenroth = mehlig. Blättchen keilförmig, meist dreispaltig, an der Spitze gezähnt. Insel Mascaren. 4

18. *Gymnogramme flavens* Kaulf. (*Acrostichum flavens* Sw. *Cincinalis* Desv.)

Laub dreieckig, zusammengesetzt, unten gelblich = mehlig. Fiedern gegenüber stehend, doppelt gefiedert. Blättchen länglich, stumpf, ganzrandig. Neugranada. 4

19. *Gymnogramme triangularis* Kaulf.

Laub dreieckig, zusammengesetzt, unten gelblich = mehlig. Fiedern gegenüber stehend, angewachsen, die untersten doppelt fiederspaltig, deren Blättchen linienförmig und nieder gebogen sind. Einschnitte eiförmig, stumpf. Californien. 4

20. *Gymnogramme chrysophylla* Kaulf. (*Acrostichum chrysophyllum* Sw.)

Laub doppelt gefiedert, unten goldfarbig = mehlig. Blättchen länglich, stumpf, oben glänzend; die untern ausgeschweift, obere fiederspaltig. Westindien. 4

21. *Gymnogramme sulfurea* Desv. (*Acrostichum sulfureum* Sw.)

Laub doppelt gefiedert, unten schwefelgelb = mehlig. Blättchen fiederspaltig. Einschnitte keilsförmig, an der Spitze abgestutzt, gezähnt. Jamaica. 4

22. *Gymnogramme ochracea* Presl,

Laub doppelt gefiedert, unten gelb = filzig. Blättchen lanzettförmig, gespitzt, untere fiederspaltig, obere sägerandig, das Endblättchen verlängert. Peru. 4

+++ Fronds nuda. Laub nackt.

23. *Gymnogramme plantaginea* Spr. (*Hemionitis plantaginea* Don.)

Laub einfach, elliptisch = länglich, langgespitzt, ganzrandig, häutig, an der Basis herablaufend. Nepal. 4

24. *Gymnogramme pumila* Ant. Spr. Syst. veg. Suppl. p. 31.

Laub einfach, stiellos, fächerförmig, fast handförmig = eingeschnitten, die Einschnitte sägerandig, langgespitzt. Dieser kleine Farren wird nur $\frac{1}{2}$ —1 Zoll hoch und wächst in Surinam an Baumstämmen. Die Wurzel ist ästig = faserig, oben mit gebrothen Spreublättchen besetzt, das Laub glatt, nackt. 4

25. *Gymnogramme pothifolia* Spr. (*Hemionitis pothifolia* Don.)

Laub fiederspaltig, lederartig, wie der verlängerte Stiel, glatt. Einschnitte lanzettförmig, langgespitzt = schelfförmig, ganzrandig. Nepal. 4

26. *Gymnogramme opaca* Spr. (*Hemionitis opaca* Don.)

Laub gefiedert, länglich = eiförmig. Blättchen tief fiederspaltig. Einschnitte länglich, stumpf, häutig, sägerandig. Nepal. 4

27. *Gymnogramme rhizophylla* Kaulf.

Laub gefiedert. Blättchen lanzettförmig, an der Basis abgestutzt, doppelt, spitzig gezähnt, die des fruchtbaren Laubes länglich stumpf, dann am Rande zurückgerollt; das unfruchtbare Laub an der Spitze Wurzeln treibend. Waterl. Manila. 4

28. *Gymnogramme auriculata* Kaulf. (*Acrostichum appendiculatum* Willd.)

Wurzel horizontal liegend, mit sehr kleinen Spreublättchen bekleidet. Laub nackt, glatt, gefiedert. Blättchen lanzettförmig.

mit, ausgeschweift-mucronenspitzig, an der Basis keilsförmig, geohrlappig. Die Blättchen des fruchtbaren Laubes rundlich, ganzrandig oder leicht ausgeschweift, unten mit Kapseln (Fruchthäufchen) dicht bedeckt. Ostindien. 4

29. *Gymnogramme acrostichoides* Desv. (*Hemionitis acrostichoides* Sw.)

Laub gefiedert. Blättchen breit-lanzettförmig, langgespitzt, wellenrandig-gekerbt. Vaterl. das westliche Afrika; Sierra Leone. 4

30. *Gymnogramme asplenoides* Kaulf. (*Grammitis asplenoides* Presl.)

Laub gefiedert, langgespitzt, unten fast flzig. Blättchen linien-lanzettförmig, eingeschnitten-gezähnt. Fruchthäufchen länglich. Brasilien. 4

31. *Gymnogramme aspidioides* Kaulf. (*Ceterach aspidioides* Willd.)

Laub gefiedert, unten flzig, 6 Zoll bis 1 Fuß lang. Stiel glatt. Blättchen 1—2 Zoll lang, länglich-lanzettförmig, fiederspaltig-sägezähmig. Einschnitte stumpf, die untersten größer als die obern. Neugranada und Brasilien. 4

32. *Gymnogramme polypodioides* Spr. (*Ceterach polypodioides* Radd.)

Laub gefiedert, unten glatt. Blättchen fiederspaltig, an beiden Enden verdünnt. Einschnitte fast sichelförmig, gewimpert. Stiele unten glatt, oben scharfborstig. Brasilien. 4

33. *Gymnogramme leptophylla* Desv. (*Polypodium leptophyllum* Linn. f. Lexic. B. 7. S. 428.)

Laub doppelt gefiedert, glatt, zart. Blättchen keilsförmig, meist dreilappig, die Lappen stumpf, dreizähmig. Südeuropa. 4

34. *Gymnogramme japonica* Desv. (*Hemionitis japonica* Thunb.)

Laub doppelt gefiedert, glatt. Blättchen breit-lanzettförmig, gespitzt, ganzrandig. Japan. 4

35. *Gymnogramme chaerophylla* Desv. (*Hemionitis* Poir.)

Laub doppelt zusammengesetzt. Die untern Fiedern doppelt, die mittlern einfach gefiedert. Blättchen keilsförmig, leingeschnitten, die Einschnitte gespitzt. Brasilien. 4

Die meisten Arten der Gattung *Gymnogramme* kommen aus Tropenländern und dienen zur Bierre unserer warmen

Gewächshäuser, vornehmlich diejenigen Arten, welche in der zweiten Abtheilung vorkommen, deren Laub auf der Unterseite weiß, gelb oder rosenroth-mehlig ist. Man pflanzt sie in gute leichte Dammerde, (Laub- Wald- oder Mistbeeterde) und vermehrt sie durch die Aussaat der zarten Saamen und durch Wurzeltheilung. N. 24. ist eine kleine zarte Pflanze, die in feuchter leichter Erde, in die man einige Stücke alte Baumrinde steckt, am besten gedeiht, denn sie wächst in ihrer Wildniß auf Baumstämmen.

Gymnolomia Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. IV.

Blüthendecke (Kelch) halbkugelig, vielblättrig, die Blätter (Schuppen) wie Dachziegeln über einander liegend. Fruchtboden mit Spreublättchen besetzt. Strahlblümchen zungenförmig, geschlechtslos. Saamen ohne Krone.

Syngenesia 3 Ordn. (Familie Compositae.)

Die Arten, welche dieser Gattung angehören, sind meist krautartige Pflanzen, deren Blätter einander gegenüber stehen, und scharfborstig-behaart sind. Blumen langgestielt, winkels- und gipfelständig, gelb.

1. *Gymnolomia tenella* Kunth J. c. IV. p. 218. t. 373.

Stengel dünn, fast gewunden. Blätter gestielt, fast herzförmig, borstig-behaart. Blumenstiele lang, einblümig. Vaterl. Neugranada. 4 ?

2. *Gymnolomia hondensis* Kunth J. c. (*Gymnoloma hondense* Spr.)

Blätter eiförmig, fast langgespitzt, an der Basis gerundet, dreirippig, auf beiden Seiten scharfborstig. Diese Art hat Sprengel (Syst. Veg.) zur vorübergehenden gezogen. Vaterl. Neugranada. 4 Blühz. Mai.

3. *Gymnolomia triplinervia* Kunth J. c. IV. p. 319. (*Gymnoloma triplinerve* Spr.)

Stengel glattlich. Blätter gestielt, schmal, an beiden Enden verdünnt, gezähnt, dreifach gerippt, wenig scharfborstig. Blumenstiele lang, winkelsständig. Vaterl. Neugranada. 4 ?

4. *Gymnolomia rubeckioides* Kunth J. c. IV. p. 219. t. 374.

Stengel gewunden. Aeste warzig. Blätter gestielt, eiförmig, lang gespitzt, dreirippig, sägerandig, auf beiden Seiten scharfborstig. Blumenstiele winkelsständig, einblümig. Strahlblümchen meist 6—7. Vaterl. Peru. 4 Blühz. August.

5. *Gymnolomia connata* Spr.

Aeste scharfborstig. Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, an der Basis verbunden, gezähnt, wenig scharfborstig. Blumenstiele abgekürzt. Kelchblättchen fast einfach, schlaff. Waterl. Brasilien. 24

6. *Gymnolomia maculata* Ker.

Stengel standenstrauchig, viereckig, gesteckt. Blätter kurzgestielt, länglich-eiförmig, fast sägerandig, scharf. Blumenstiele gipfelständig. Waterl. Brasilien. 24 h

Diese Gewächse verlangen warme Standörter, denn sie kommen aus Tropenländern. Man zieht sie aus Saamen und vermehrt sie noch überdies durch Wurzeltheilung. N. 6. durch Stecklinge, in warmen Beeten.

Gymnopogon Pal. Brown. *Gymnopogon.*

Aehre rispenartig. Kelch zweiklappig, länger als die zweiklappige Corolle, deren Klappen abwechselnd an der Spitze gespalten und auf dem Rücken an der Basis begrannt sind; die Granne ist gestielt, gedreht.

Triandria Digynia (Familie Gräser.)

1. *Gymnopogon racemosus* R. Br. Hierher gehört *Andropogon ambiguus* Michaux, f. 1. Nachtr. B. 1. S. 234. *Anthopogon lepturoides* Nuttall. *Alloeatheros* Elliot.

Gymnosporangium Hedw.

Cryptogamia Sect. V. Coniomycetes.

Diese Gattung gehört zur Familie der Gallertschwämme (*Tremella* Linn.) Die Masse ist fast gallertartig. Die Saamensäulchen sind gestielt.

1. *Gymnosporangium conicum* Hedw. (*Tremella juniperina* Linn. *Sabinae* Dickson.)

Eine feuergelbe kegelförmige gallertartige Substanz, mit länglichen Saamensäulchen, die an den Stämmen und Aesten des gemeinen Wachholders (*Juniperus communis* auch an *J. Sabina*) sich ansetzt und entwickelt.

2. *Gymnosporangium clavariaeforme* Cand. (*G. juniperinum* Nees. *Tremella clavariaeformis* Jacq. *digitata* Willd.)

Masse gelb, unregelmäßig, keulen- oder fast hornförmig. Wächst wie vorige Art an Wachholderstämmen.

3. *Gymnosporangium virginianum* Spr. (*G. juniperi virginianae* Schw.)

Masse fast gestielt, gelblich, hart, kopfförmig, grubig, an der Basis forlig-stückig, braun-roth. Wächst auf Juniperus virginiana L.

4. *Gymnosporangium Chaillatii* Spr. (*Phragmotrichum Chaillatii* Kunz.)

Wächst an den Zapfen der Fichten Pinus Abies.

Gymnostachys Rob. Brown. *Gymnostachys*.

Die Blumen bilden ein walzenrundes Kösschen, mit kleiner Scheide. Kelch vierstältig, an der Basis 4. Staubfäden tragend. Narbe aufstehend. Beere einsamig.

Tetrandria Monogynia (Familie Aroideen.)

1. *Gymnostachys anceps* R. Br.

Wurzel kholig. Blätter grasartig. Schaft zusammengesetzt-zweischneidig. Eine krautartige Pflanze, die in Neuholland im Sandboden wächst. Man überwintert sie im Glashause und vermehrt sie, außer dem Saamen, durch Wurzeltheilung.

Gymnostomum Hedwig. *Scrp. cryptog. 1. t. 6—30.*

Kahlmund f. 1. Nachtr. B. 3. S. 481.

Haube halb, hinfällig, von unten sich aufspaltend. Vorste (Kapselstiel) gipfelständig. Kapselmund nach, nach.

Cryptogamia Sect. 11. (Familie Laubmoose.)

† Foliis integerrimis. Blätter ganzrandig.

Caule simpliciusculo. Stengel fast einfach.

1. *Gymnostomum ovatum* Hedw. (*Bryum ovatum* Dickson.) f. Lexic. 1. Aufl. B. 4. S. 482.

Blätter an der Spitze haartragend, eysförmig, ausgehöhlt, gegen einander geneigt. Kapsel länglich, der Deckel schnabelförmig. Europa.

2. *Gymnostomum truncatum* Hedw. (*Bryum truncatum* Linn.) f. Lexic. 1. Aufl. B. 4.

Blätter lanzettförmig, feingespitzt, abstehend. Kapsel abgestutzt, umgekehrt-eysförmig, der Deckel schnabelförmig. Waterl. Europa.

3. *Gymnostomum rufescens* Schulz. (*G. minutulum* Mart.)

Blätter lanzettförmig, mucronenspitzig, abstehend. Kapsel oval, der Deckel kegelförmig. Waterl. das mittlere und nördliche Deutschland.

4. *Gymnostomum minutulum* Schwaegr.

Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden am meisten durch längliche Blätter, und durch den stumpfen Kapseldeckel. Deutschland.

5. *Gymnostomum Barbula* Pöppig.

Blätter lanzettförmig, ganzrandig, stumpflich. Kapsel dünn, walzenrund, der Deckel schief, schnabelförmig. Vaterl. Cuba.

6. *Gymnostomum japonica* Hedw.

Blätter lanzettförmig, langgespitzt, wellend, die Rippe fast auslaufend. Der Kapseldeckel gewölbt, genabelt. Japan.

7. *Gymnostomum niloticum* Dill.

Stengel sehr kurz, einfach. Blätter länglich-lanzettförmig, langgespitzt, abstehend. Kapsel kugelig, fast eingesenkt. Deckel gewölbt, mucronenspitzig. Vaterl. Aegypten.

8. *Gymnostomum conicum* Schwaegr. (*G. reflexum* Bridel.)

Blätter länglich, mucronenspitzig, abstehend, die Rippe auslaufend. Kapsel länglich. Deckel kegelförmig, sehr stumpf. Deutschland, die Schweiz, Italien und England.

9. *Gymnostomum tenue* Schrad.

Stengel fast ästig. Blätter länglich-lanzettförmig, stumpf, aufrecht, die Rippe fast auslaufend. Kapsel länglich-umgekehrt-eiförmig. Deckel kegelförmig, stumpflich. Deutschland und die Schweiz.

10. *Gymnostomum tetragonum* Bridel. (*Pyramidula* et *Pyramidum* Brid.)

Blätter spatelförmig, mucronenspitzig. Kapsel umgekehrt-eiförmig. Haube fast vierseitig, fast aufgeblasen, seitlich gespalten. Vaterl. das mittlere Deutschland.

11. *Gymnostomum javanicum* Nees & Esenb. (*Rottleria* Brid.)

Blätter länglich, mucronenspitzig, hohl mit auslaufender Rippe. Kapsel walzenrund. Deckel pfriemenspitzig. Vaterl. Java.

12. *Gymnostomum calcareum* Hornsch.

Stengel fast ästig. Blätter linien-lanzettförmig, stumpflich, abstehend. Kapsel länglich. Deckel schief, schnabelförmig. Wächst in Deutschland, besonders in Baiern.

13. *Gymnostomum subulatum* Nees.

Stengel fast ästig. Blätter pfriemenspitzig, steif, aufrecht. Kapsel umgekehrt-eiförmig-abgestutzt. Deckel pfriemensförmig.

ß *Caule ramoso. Stengel ästig.*

14. *Gymnostomum viridissimum* Smith. (*Bryum viridissimum* Dickson.)

Stengel ästig. Blätter länglich-lanzettförmig, mucronenspißig, abstehend mit auslaufender Rippe. Kapsel länglich-eyförmig. Deckel schief, schnabelförmig. Wächst an Baumstämmen in England.

15. *Gymnostomum rupestre* Schwaegr.

Blätter linien-lanzettförmig, gespißt, aufrecht. Kapsel oval. Deckel gerade, kegelförmig. Wächst auf Alpen im südlichen Deutschland. *G. articulatum* Schkuhr. gehört hierher.

16. *Gymnostomum curvirostrum* Hedw. (*G. aeruginosum* Sm. *G. stelligerum* E. B. *G. luteolum* Sm. *G. pomiforme*, *pallidisetum*, *brevisetum*, *microcarpon* Hornsch. ist *Bryum aetivum* Linn. f. Lexic. erste Aufl. B. 2. S. 328.)

Blätter linien-lanzettförmig, straff, abstehend, in der Jugend an der Spitze gezähnt. Kapsel länglich-umgekehrteyförmig. Deckel kreuzweis geschnäbelt. Waterl. Deutschland und England.

17. *Gymnostomum caespitium* Mohr.

Blätter lanzett-pfriemenförmig, fast ohne Rippen. Kapsel selbst kurz. Kapsel kugelig. Deckel geschnäbelt.

†† *Foliis dentatis serratis.* Blätter gezähnt oder sägerandig.

18. *Gymnostomum pyriforme* Hedw. (*G. turbinata* Michx. *G. tortipes* Brid. *Bryum pyriforme* Linn.) f. Lexic. 1. Aufl. B. 4. S. 482.

Blätter länglich, mucronenspißig, abstehend, an der Spitze gezähnt. Kapsel birnförmig. Deckel kegelförmig. Waterl. Europa und Nordamerika.

19. *Gymnostomum fasciculare* Bridel. (*G. Bonplandii* Brid.)

Blätter lanzettförmig, gespißt, sägerandig, abstehend. Kapsel birnförmig. Deckel stumpf. Deutschland, England und Nordamerika.

20. *Gymnostomum Heimii* Hedw. f. Lexic. 1. Aufl. B. 4. S. 481.

21. *Gymnostomum affine* Hornsch. (*G. obtusum* Hedw. *Bryum obtusum* Dicks.)

Blätter spatel = lanzettförmig, an der Spitze gezähnt; die obersten linien = lanzettförmig, länger als die untern, Kapsel länglich = umgekehrt, eiförmig. Deckel flachlich, geschnäbelt. Deutschland und England.

22. *Gymnostomum Rottleri* Schwaegr. (*Rottlera gymnostomoides* Bridel.)

Blätter aufrecht, spatelförmig, mucronenspizig, gezähnt. Kapsel eiförmig. Deckel flach. Vaterl. Ostindien.

23. *Gymnostomum curvisetum* Schwaegr.

Blätter länglich = lanzettförmig, langgespizt, an der Spitze sägerandig. Kapselstiel an der Spitze eingebogen. Kapsel birnförmig. Deckel flach.

24. *Gymnostomum julaceum* Hook.

Stengel fadenförmig, aufrecht, fast ästig. Blätter länglich = eiförmig, sägerandig, wie Dachziegel über einander liegend, angedrückt. Kapsel länglich. Deckel pfriemenspizig. Vaterl. Quito.

* Blätter ganzrandig, der Rand eingerollt.

25. *Gymnostomum involutum* Hook.

Stengel aufrecht, meist ästig. Blätter länglich = lanzettförmig, ganzrandig, abstehend, der Rand eingerollt. Kapselstiel lang, aufrecht. Kapsel schmal, walzenrund. Deckel pfriemenspizig. Vaterl. Nepal.

26. *Gymnostomum tortile* Schwaegr. (*G. condensatum* Voit Röhling.)

Stengel aufrecht, fast ästig. Blätter länglich = lanzettförmig, stumpf, am Rande eingerollt. Kapsel oval. Deckel schief, schnabelförmig. Wächst im mittlern und südlichen Deutschland.

27. *Gymnostomum Jamesonii* Willd. Arnott.

Blätter linien = lanzettförmig, ganzrandig, am Rande eingerollt. Kapsel kreiselförmig, die Mündung groß. Deckel mit einem verlängerten Schnabel versehen. Vaterl. Brasilien.

28. *Gymnostomum guadalupense* Spr.

Stengel fast einfach. Blätter lanzettförmig, spizlich, ganzrandig, gekielt. Kapsel länglich. Deckel pfriemenspizig. Vaterl. Guadalupe.

29. *Gymnostomum Sepiicola* Funck.

Stengel aufrecht, fast ästig. Blätter linienförmig, pfriemenspizig, ganzrandig. Kapsel länglich = cylindrisch, die Mündung

ung zusammengezogen. Kapsel kegelförmig, stumpf. Wächst im südlichen Deutschland, besonders in Franken.

30. *Gymnostomum lapponicum* Hedw. f. Lexic. 1. Aufl. B. 4. S. 481. (*Anictangium* Hedw. spec. musc.)

Stengel zweitheilig, fast ästig. Blätter linien = lanzettförmig, ganzrandig, abstehend, gebogen. Kapselstiel sehr kurz. Kapsel birnförmig, gestreift = gefurcht. Deckel kegelförmig. Wächst auf Alpen in Deutschland und England.

31. *Gymnostomum aestivum* Hedw. (*G. luteolum* Engl. bot. *G. tristichon* Wahlenb. *Anictangium compactum* Schwaegr.)

Stengel aufrecht, fast ästig. Blätter linien = lanzettförmig, gespitzt, ganzrandig, aufrecht. Kapsel länglich, die Mündung schmal. Deckel schief, schnabelförmig. Wächst in Deutschland und England.

Will man die Arten dieser Laubmoosgattung, welche in Europa wachsen, in unsere botanische Gärten aufnehmen und kultiviren, so können sie auf dieselbe Art und Weise behandelt werden, wie ich im Lexikon erste Aufl. B. 2. S. 343 — 345. gelehrt habe.

Synonymen.

Gymnostomum aeruginosum Sm. f. *Gymnostomum curvirostrum* N. 16.

— *articulatum* Schk. f. *Gymnostomum rupestre* N. 15.

— *Bonplandii* Brid. f. *Gymnostomum fasciculare* N. 19.

— *brevisetum* Horns. f. *Gymnostomum curvirostrum* N. 16.

— *condensatum* Röhl. f. *Gymnostomum tortile* N. 26.

— *luteolum* Hornsch. f. *Gymnostomum curvirostrum* N. 16.

— *luteolum* Engl. bot. f. *Gymnostomum aestivum* N. 31.

— *microcarpon* Horns. f. *Gymnostomum curvirostrum* N. 16.

— *obtusum* Hedw. f. *Gymnostomum affine* N. 21.

— *pallidum* Horns. f. *Gymnostomum curvirostrum* N. 16.

Gymnostomum tortipes Brid. f. *Gymnostomum pyriforme* N. 18.

— *tristichon* Wahlenb. f. *Gymnostomum aestivum* N. 31.

— *turbinatum* Michx. f. *Gymnostomum pyriforme* N. 18.

Gymnostyles Juss. in Ann. du Mus. (Soliva Ruiz et Pav.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 591.

Blüthendecke (Kelch) vielblättrig, einfach, vielblümig. Fruchthoden nackt. Die Randblümchen weiblich, unvollkommen, die Scheibenblümchen männlich, röhrig, zart. Saamen fast geflügelt, an der Spitze ausgerandet und mit dem stehen bleibenden Griffel gekrönt.

Syngenesia 1 Ordn. (Familie Compositae, Gruppe Eupatorien.)

† Floribus glomeratis axillaribus sessilibus.

Blumen geknaut, winkelfständig, stiellos.

Zu dieser Abtheilung gehören die im I. Nachtrage beschriebenen Arten: *Gymn. anthemifolia*, *nasturtiifolia* et *pterosperma* Juss. (Synon. *Ranunculus alatus* Poir.) und folgende.

1. *Gymnostyles alata* Spr.

Stengel aufrecht, wie die Blätter behaart = borstig. Blätter doppelt gefiedert. Blättchen linienförmig, gespitzt. Saamen häutig geflügelt, 4lappig, die Granne (bleibender Griffel) abfallend. Vaterl. Brasilien.

2. *Gymnostyles Mutisii* Spr. (*Hippia minuta* Mutis, nec Linn.)

Solivia Mutisii Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. IV. p. 302.

Stengel kriechend, wie die Blätter, fast wollig. Blätter doppelt gefiedert. Blättchen linien = lanzettförmig, gespitzt. Blumen stiellos. Saamen keilsförmig, abgestutzt, an der Spitze behaart. Vaterl. Neugranada. 4

3. *Gymnostyles lusitanica* Spr. (*Hippia stolonifera* Brot.)

Stengel kriechend. Blätter fiederspaltig, glattlich. Einschnitte länglich = linienförmig, spitzlich. Saamen an der Spitze abgestutzt, unbewehrt, wollig, mit querlaufenden Runzeln versehen. Vaterl. Portugal. 4

4. *Gymnostyles chilensis* Spr. (*Soliva sessilis* R. et Pav.)

Stengel krautartig. Blätter gefiedert. Blättchen vielspal-
tig. Vaterl. Chili.

†† Floribus pedunculatis. Blumen gestielt.

5. *Gymnostyles minuta* Spr. (*Solivia pygmaea* Kunth.)

Hierher gehört *Hippia minuta* Linn. f. Lexic. erste Aufl.
B. 4. S. 656.

Stengel kriechend. Blätter gefiedert. Blättchen länglich-lin-
ienförmig, gespitzt, gewimpert. Blumenstiele einblümig. Saa-
men länglich-keilsförmig, ausgekerbt-zweizählig. Vaterl. Neu-
granada. 4 Blühz. Septemb. Oktob.

6. *Gymnostyles peruviana* Spr. (*Soliva pedunculata* R. et P.)

Stengel krautartig. Blätter ungepaart gefiedert. Blumen
gestielt, winkelförmig. Vaterl. Peru. 4 ?

Gymnothrix crinita Humb. f. *Penisetum crinitum* Spr.

Gymnothrix tristachya Humb. f. *Penisetum tristachyon*
Spr.

Gynandropsis affinis Blum. f. *Cleome diffusa* 2. Nachtr.
N. 8.

— *brachycarpa* Cand. f. *Cleome brachycar-*
pa 2. Nachtr. N. 1.

— *hispidula* Cand. f. *Cleome pubescens* 2.
Nachtr. N. 11.

— *palmipes* Cand. ist *Cleome palmipes* Spr.

— *pentaphylla* Cand. ist *Cleome pentaphyl-*
la Linn.

Gynema balsamica Rafin. f. *Baccharis foetida* Lexic.

Gynarium Willd. Gynarium.

Blumen didisch, rispenständig. Kelch zweiblümig, die
Blümchen abwechselnd ansetzend, abwechselnd gestielt; die Co-
rollenklappen der männlichen Blüthen sind kürzer als die der
weiblichen; die letztern pfriemenspizig und an der Basis mit
langen Haaren besetzt.

Triandria Digynia (Familie der Gräser.)

1. *Gynarium saccharoides* Humb. et Bonpl. Plant. ae-
quin. 2. p. 112. t. 115.

Wurzel ästig, faserig. Halme zahlreich, 18—20 Fuß hoch.
Blätter rohrartig, sehr lang, sägerandig-dornig. Rispe sehr
ästig, weißschweiß, überhängend. Vaterl. Südamerika. 4

Gyneſtum acaule Poit. f. *Geonoma* acaulis N. 2.

— *baculiferum* Poit. f. *Geonoma* arundinacea N. 3.

— *deversum* Poit. f. *Geonoma* multiflora N. 10.

— *maximum* Poit. f. *Geonoma* acutiflora N. 9.

— *strictum* Poit. f. *Geonoma* pycnostachys N. 4.

Gyneteria Willd. *Gyneterie*.

Blüthendecke (Kelch) ziegelschuppig, die Schuppen trocken-
rauschend, innere länger als die äußeren Fruchtboden zotten-
haarig. Blümchen meist weiblich, (♀) dünn, 2—3 spaltig,
oft nur ein Zwitterblümchen (♀) welches größer ist als die
übrigen. Griffel einfach, an der Basis gegliedert. Saamen-
krone aufsteigend, haarig.

Syngenesia 2 Ord. (Familie Compositae.)

1. *Gyneteria incana* Spreng. Graue *Gyneterie*.

Stamm baumartig. Blätter länglich, an der Basis ver-
dünn, ganzrandig, fast lederartig, grau = filzig. Die Blumen
bilden gipfelständige, zweitheilige sehr ästige Doldentrauben.
Hierher gehört *Tessaria integrifolia* R. et P. f. Lexic.
B. 9. S. 611. und *Conyza riparia* Kunth. Waterl. Pe-
ru und Chili, am Amazonenflusse und an überschwemmten Or-
ten. ♀ Blüht daselbst im Januar.

2. *Gyneteria dentata* Spr. Hierher gehört *Tessaria den-
tata* R. et P. f. Lexic. B. 9. S. 641.

Kultur. Beide Arten kommen aus Peru und verlangen
warme Standörter, N. 1. reichlich Wasser, besonders im
Sommer. Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge.

Gynocardia Roxb. Corom. *Gynocardie*.

Blumen döldisch. Kelch fünflappig. Fünf Corollenblätter,
an der Basis mit Nectar-schuppen versehen. Staubfäden zahl-
reich, bodenständig. Fünf herzförmige Narben. Beere aus-
getrocknet, viel-saamig.

Polyandria Pentagynia (Familie Rapparideen.)

1. *Gynocardia odorata* Roxb. Wohlriechende *Gynocardie*.

Ein Baum dessen Aeste absteilen. Blätter wechselnd ste-
hend, länglich = lanzettförmig. Blumen wohlriechend, gehäuft,
gestielt. Waterl. Ostindien. ♀ Blüht. Sommer.

Gynopleura Cav. ist *Malesherbia* Ruiz et Pav. f. 1.
Nachtrag B. 4. S. 534. Nebst Character generic. und
2 Arten.

Kelch fünfstheilig. Corollenblätter 5, kelchständig, an der

Basß mit Nectarschuppen versehen. Griffel seitenständig. Kap-
sel dreiflappig, die Klappen den Rücken bildend.

Pentandria Trigynia.

Gynopogon Forst. f. Lexic. 1. Aufl. B. 4. S. 383.
ist Alyxia Bank. f. 2. Nachtr. B. 1. S. 183.

Gynostemma Blum. Spr. Syst. veg. cur. p. 246.

Blumen düssisch. Kelch zehnlättrig, die Blätter zwei
Reihen bildend. Keine Corolle. Staubfäden 6, in einem
Bündel verwachsen. Antheren zweifächerig. Narben 3—4.
Steinfrucht kugelig, 3—4 saamig.

Monadelphia Hexandria (Dioecia Hexandria.) Fa-
milie Menispermeeu.)

1. *Gynostemma pedatum* Blum.

Blätter fuß = handförmig. Einschnitte, länglich = eysförmig,
grob = sägerandig. Blumen in winkelftändige Rispen gesammelt.
Waterl. Java. H ?

2. *Gynostemma simplicifolium* Blum.

Blätter einfach, länglich = eysförmig, lauggespißt, sägeartig
gezähnel, glatt. Blumen in Trauben, die Rispen bilden.
Beide Arten kommen aus Java und verlangen in unsern Gär-
ten warme Standörter.

Gypsophylla Linn. Gypsfrant f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 593.

Kelch edig, fünfspaltig, stehen bleibend. Corolle fünflät-
tig. Staubfäden 10, meist bodenständig. Zwei Griffel. Kap-
sel kugelig, einfächerig, fünftlappig.

Decandria Digynia (Familie Caryophyllaceu; Neltenge-
wächse.)

† Blumen zerstreut stehend, gestielt.

Hierher gehören die im Lexikon und 1. Nachtrage beschrie-
benen Arten: Gyps. elegans M. a B. G. viscosa Murr.
G. dichotoma Bess. G. perfoliata, repens, panicula-
ta, prostrata, muralis Linn. G. adscendens Jacq. G.
compressa Desf. und folgende.

1. *Gypsophylla altissima* Linn. Hohes Gypsfrant f. Lexic.

Stengel aufrecht, rund, glatt, nach oben ästig = zweitheilig,
3—5 Fuß hoch. Aeste abstehend, weitschweifig, vielblümig.
Blätter stiellos, umfassend, länglich = lanzettförmig, gerippt,
glatt, graulich = grün, untere 3—4 Zoll lang. Blumenstiele
sparrig. Corollenblätter weiß oder blaßroth, fast ausgefärbt,
so lang als die Staubfäden. Waterl. Sibirien. 24

2. *Gypsophylla grandiflora* Poir. Großblumiges Gyps-
kraut.

Stengel aufrecht, rund, glatt, mehr oder weniger ästig-
rispenartig. Blätter linien = pfriemenförmig, fast rauchhaarig,
die untern büschelförmig stehend. Blumenrispen wenigblümig.
Corollenblätter ausgekerbt. Vaterl. Südeuropa. ?

3. *Gypsophylla sabulosa* Steven. (*G. perfoliata* M. a
Bieb. nec Linn.)

Stengel zweitheilig, an der Basis sitzig. Aeste rispenar-
tig, flebrig. Blätter stiellos, umfassend, lanzettförmig, drei-
rippig, weichlich. Corollenblätter länglich, viel länger als
die gespitzten Kelchtheile. Vaterl. Laurien und Kaukasus. 4
Juni — August.

4. *Gypsophylla acutifolia* Fisch. Spitzblättriges Gyps-
kraut.

Stengel rispenartig = ästig, 2—3 Fuß hoch. Die Aeste
dreitheilig, zottenhaarig = flebrig. Blätter linien = lanzettförmig,
langgespitzt, meist dreirippig. Corollenblätter ausge-
kerbt, über Kelch und Staubfäden hervorragend. Vaterl.
Kaukasus. 4 Blühz. Sommer.

5. *Gypsophylla glauca* Stev. Graugrünes Gypskraut.

Gyps. *Stevenii* Fisch. *armerioides* Ser. *G. repens*
M. a B. (nec Linn.)

Stengel aufrecht, ästig, weitschweifig, rispenartig. Aeste
ausgesperert, sitzig flebrig. Blätter linien = lanzettförmig, fast
fleischig, stumpf, graugrün. Corollenblätter spatelförmig, un-
getheilt. Vaterl. Kaukasus.

6. *Gypsophylla Rokeika* Delil. Aegyptisches Gypskraut.

Stengel zweitheilig, sehr ästig. Die Aeste ausgesperert, fas-
denförmig, glatt, einblümig. Wurzelblätter eysförmig. Sten-
gelblätter linienförmig, abgekürzt. Corollenblätter oben weiß
oder blaßroth, unten roth, gestreift. Vaterl. Aegypten.

7. *Gypsophylla cerasioides* Wallich.

Stengel aufrecht, viereckig, behaart. Blätter fast stiellos,
umgekehrt = eysförmig, behaart. Blumen doldentraubig. Der
Einschnitt des Kelches lanzettförmig, häutig = gefranzt. Co-
rollenblätter ausgekerbt. Vaterl. Nepal.

8. *Gypsophylla thymifolia* Smith. Thymianblättriges Gyps-
kraut.

Stengel ästig, weitschweifig, meist zweitheilig. Blätter

spatelförmig, auf beiden Seiten filzig. Corollenblätter umgekehrt = eysförmig. Wächst am Parnassus. 4 ?

9. *Gypsophylla ochroleuca* Smith. Ocherfarbiges Gyps-
kraut.

Stengel weisßschweißig, fast zweitheilig = ästig. Die Aeste ausgesperrt. Blätter linien = pfriemenförmig, wellend. Corollenblätter spatelförmig, an der Basis punktirt. Vaterl. Attika. (Griechenland.)

10. *Gypsophylla graminea* Smith. Grasartiges Gyps-
kraut.

Wurzelblätter gehäuft stehend, linienförmig, am Rande zartdornig = scharf. Stengel fast nackt, rispenartig getheilt. Corollenblätter ausgekerbt. Kelche filzig. Vaterl. Griechenland.

11. *Gypsophylla tenuifolia* M. a Bieb. Dünnbräutiges
Gypskraut.

Stengel dünn, rispenartig getheilt. Wurzelblätter gehäuft, linienförmig. Stengelblätter pfriemenförmig. Vaterl. Kaukasus. 4

12. *Gypsophylla saxifraga* Linn. f. Lexic. 1. Aufl. B.
4. S. 487.

Dianthus saxifraga Linn. spec. 1 filiformis Lam.
Gyps. multicaulis Poir.

Stengel sehr ästig, glatt. Aeste eckig, einblümig. Blätter linienförmig, straff, glatt. Kelche an der Basis schuppig. Corollenblätter weiß oder röthlich. Vaterl. Südeuropa.

13. *Gypsophylla dioica* Spr. (*Saponaria dioica* Schlechtend.)

Stengel aufrecht, ästig. Blätter stiellos, lanzettförmig. Blumen rispenständig, dübsch. Kelche glatt, an der Basis fast eckig, die Einschnitte eysförmig. Bracteen gespißt, den Stengelblättern gleichend. Vaterl. Südamerika. ? 4 ?

†† Blumen in Büschel oder Köpfchen gesammelt.

Gypsophylla fastigiata Linn. f. Lexic. G. glomerata M. a Bieb. f. 1. Nachtr. gehört hierher und folgende.

14. *Gypsophylla collina* Stev. Hügel = Gypskraut.

Stengel aufrecht, ästig. Blätter linienförmig, gespißt, etwas scharf. Blumenstiele doldentraubig, glatt. Blumen gehäuft stehend. Kelchtheile stumpflich. Staubfäden hervorstehend. Vaterl. Bessarabien und Podolien auf Hügeln.

15. *Gypsophylla Struthium* Linn. f. Lexic. 1. Aufl. 8.

4. Salztrautblättriges Gypstraum.

Stengel an der Basis staudenstrauchig, fast einfach, scharf. Blätter fast büschelförmig stehend, liniensförmig gespißt, halbrund. Blumen büschelförmig. Staubfäden kürzer als die Corollenblätter. Vaterl. Spanien und Laurien. 4.

16. *Gypsophylla capitata* Pall. Kopfförmiges Gypstraum.

Stengel an der Basis holzig-staudenstrauchig, sehr ästig. Aeste zweitheilig, scharf, zusammengebrückt=edig. Blätter lanzettförmig, glatt. Blumen in Köpfchen gesammelt, die mit Hüllblättern versehen sind. Staubfäden hervorragend. Vaterl. Kleinasien. 4

17. *Gypsophylla dianthoides* Smith. Nelkenartiges Gypstraum.

Stengel an der Basis staudenstrauchig, einfach, straff, zusammengebrückt. Blätter liniensförmig, sehr schmal, scharfzandig, wellend. Blumen geknüllt. Bracteen liniens-pfriemensförmig, verlängert. Vaterl. Creta. 4

18. *Gypsophylla occellata* Smith.

Stengel weitschweifig. Blätter spatelförmig, auf beiden Seiten filzig. Blumen in Köpfchen gesammelt. Die Platten der Corollenblätter sind eysförmig und gegürtelt. Vaterl. Griechenland.

19. *Gypsophylla hirsuta* Spr. Behaartes Gypstraum. (*Saponaria hirsuta* Lahill.)

Stengel aufsteigend, wenigblümig. Blumen stiellos, fast kopfförmig. Stengelblätter lanzettförmig, wie die Kelche, behaart=filzig. Corollenblätter ganzrandig. Vaterl. Syrien.

20. *Gypsophylla transylvanica* Spr. (*Bauffya petraea* Baumg. B. transylv. S. st. Veg. 1.)

Stengel krautartig, aufrecht, straff. Blätter liniensförmig, gekielt, stumpflich. Blumen büschelförmig stehend. Bracteen sehr klein. Kelche gefärbt. Die Staubfäden abwechselnd fehl=schlagend. Vaterl. die Alpen in Siebenbürgen.

Die Gypstraum, welche in Europa, in Kleinasien, am Kaukasus u. w. wachsen, gedeihen in unsern bot. Gärten unter freiem Himmel, kommen fast in jedem Boden fort und blühen vom Juni und Juli bis Oktober N. 6. und 7. verlangen beschützte Standörter, oder, wenn sie perenniren, Durchwinterung in frostfreien Behältern. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und Wurzeltheilung.

Synonymen.

- Gypsophylla aggregata* Linn. ist *Arenaria triquetra* Linn.
 — *arenaria* Kitaib. f. Lexic. 1. Aufl. ist *Gypsophylla fastigiata* Var. f. Lexic.
 — *armerioides* Ser. f. *Gypsophylla glauca* N. 5.
 — *cretia* Smith ist *Saponaria cretica* Linn. f. Lexic.
 — *illirica* Smith ist *Saponaria illirica* Linn. f. Lexic.
 — *multicaulis* Poir. f. *Gypsophylla saxifraga* N. 12.
 — *perfoliata* M. a B. f. *Gypsophylla sabulosa* N. 3.
 — *repens* M. a B. f. *Gypsophylla glauca* N. 5.
 — *Stevenii* Fisch. f. *Gypsophylla glauca* N. 5.
 — *Vaccaria* Smith ist *Saponaria Vaccaria* Linn. f. Lexic.

Gyrocarpus Jacq. Roxb. corom. Kreiselfrucht.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 594.

Blumen polygamisch. Kelch corollinisch, 4—8 spaltig. Nectarium 4spaltig. Staubfäden 4, in die Kelchröhre eingefügt. Antheren zweifächerig. Ein Griffel. Steinfrucht an der Spitze mit zwei Flügeln versehen.

Tetrandria Monogynia (Polygamia W.) (Familie Thymeleen.)

1. *Gyrocarpus sphenopterius* Rob. Brown.

Blätter herzförmig, dreilappig, filzig, unten grau, die obern, neben den Blumen, ungetheilt, selten dreilappig. Fruchtflügel länglich-umgekehrtenförmig, stumpf, ganzrandig oder getheilt. Vaterl. Neuholand. ♀

2. *Gyrocarpus rugosa* R. Br.

Blätter fast herzförmig, dreispaltig, gerunzelt, oben glattlich, unten filzig, die Einschnitte langgespitzt. ♀

Beide Arten kommen aus Neuholand und werden in unsern Gärten im Glashause überwintert. Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge in warmen oder temperirten Beeten.

Gyrocarpus americanus Jacq. et asiaticus W. f. 1. Nachtr.
a. a. D.

Gyrocarpus Jacquini Roxb. ist *Gyrocarpus asiaticus* f.
1. Nachtr.

Gyromia virginica Nuttall. f. *Medeola virginica*.

Gyonium vellatum Wahlenb. ist *Lecidea vellea* Spr.

Gyrophora Ach. ist *Lecidea* Ach. Meyer.

Gyropodium coccineum ist *Mitremyces lutescens* Schweinitz.

Gyrostemon Desfont. *Gyrostemon*.

Blumen diöcisch. Kelch röhrig, gelappt, oder nur ausgeschweift. Keine Corolle. Staubfäden zahlreich, bodenständig (auf einer Scheibe.) Kapseln zahlreich, zweiflappig, einsamig.

Polyandria Polygynia (Familie Malvaceen.)

Diese Gattung enthält jetzt nur zwei Arten: 1. *Gyrost. ramulosus* und 2. *Gyrost. coinifolius* Desf. Die erstere trägt linienförmige, die zweite umgekehrtepförmige Blätter. Beide wachsen im westlichen Neuholland, scheinen aber in Deutschlands Gärten noch unbekannt zu seyn.

Gyrotrichum Spr. Syst. veg. IV. Sec. V. p. 381.

Cryptogamia Sect. V. III. *Gastromycetis* Gruppe *Byssoides*.

1. *Gyrotrichum maculiforme* Spr.

Ein kleiner, schwarz-olivengarbener Schwamm (Staubpfl.) der auf Baumblätter, besonders auf verfaulten Eichenblättern sich aufsetzt und ausbildet. Hierher gehört auch *Circinotrichum* Nees a Esenb. Fung.

H.

Habenaria Willd. Rob. Brown. Bügelblume.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 596.

Kelch (Corolle Willd.) fünfblättrig, rachenförmig, die obern Blätter gewölbt. Nectarlippe unten sackförmig = gespornt. Griffelsäulchen unter der Anthere mit zwei Anhängen (unfruchtbaren Staubfäden) versehen, die gespitzt sind. Anthere gipfelständig. (Abbild. Swartz. obs. t. 6.)

Gynandria Monandria (Familie Orchideen.)

† Labello indiviso. Nectarlippe ungetheilt.

Habenaria herbiola R. Br. f. 1. Nachtr. gehört hierher und folgende Arten.

1. *Habenaria hyperborea* R. Brown. Hierher gehört *Orchis hyperborea* Linn. f. Lexic. B. 6. S. 491.

Blumen grün oder gelblich-grün.

2. *Habenaria alata* Hooker ist *Orchis foliosa* Swartz. f. Lexic. Auch *H. bidentata* Pöppig gehört hierher.

Blumen weiß und schön.

3. *Habenaria dilatata* Hook. Hierher gehört *Orchis dilatata* Pursh. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 399.

Blumen gelblich = grün.

4. *Habenaria virescens* Spr. ist *Orchis virescens* Mühlenb. in litt. Willd. spec. pl. f. 1. Nachtrag. B. 5. S. 398.

5. *Habenaria huronensis* Spr. (*Orchis huronensis* Nuttall.)

Blumenblätter grünlich, gegen einander geneigt, pfriemenspizig, länger als der gekrümmte Fruchtknoten. Nectarlippe lanzettförmig, langgespizt, gekrümmt. Bracteen abstehend, länger als die Blumen. Waterl. Nordamerika. 2

6. *Habenaria integra* Spr. (*Orchis integra* Nutt.)

Blumenblätter orangengelb, die zwei inneren kürzer als die längliche ungetheilte Nectarlippe, deren Sporn länger als der Fruchtknoten ist. Bracteen kürzer als die Blumen. Waterl. Nordamerika. (Nov. Caesar.)

7. *Habenaria nivea* Spr. (*Orchis nivea* Nutt.) Weiße Bügelblume.

Blätter linien = pfriemensförmig. Die Blumen bilden eine dichte eiförmige Endähre. Blumenblätter schneeweiß, abstehend. Lippe länglich = linienförmig, ganzrandig, länger als die innern Blumenblätter. Sporn fadenförmig, länger als der Fruchtknoten. Bracteen abgekürzt. Waterl. Florida. 2

8. *Habenaria clavellata* Spr. ist *Orchis clavellata* Michx. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 390.

Stengel nur mit einem Blatte besetzt. Blumenblätter gegen einander geneigt. Lippe eiförmig, ganzrandig. Sporn keulenförmig, so lang als der Fruchtknoten. Waterl. Nordamerika. 2

9. *Habenaria obsoleta* Spr. ist *Orchis obsoleta* Mühlenb. Willd. sp. pl. f. 1. Nachtr. B. 5. S. 394.

10. *Habenaria obtusata* Spr. ist *Orchis obtusata* Pursh. f. 1. Nachtr. B. 5. S. 401.

11. *Habenaria spectabilis* Spr. ist *Orchis spectabilis* Linn. f. Lexic. B. 6. 1. Nachtr. B. 3. S. 397. ausführlich beschrieben. Auch *Orchis humilis* Michx. f. 1. Nachtr. B. 5. S. 396. hat Sprengel hierher gezogen.

12. *Habenaria citrina* Thuars.

Blumenblätter linien-lanzettförmig, untere abstehend, obere gegen einander geneigt. Lippe keilförmig, stumpf, gleichsam wie abgebissen. Sporn sehr kurz, dünn. Bracteen länger als die Fruchtknoten, an der Spitze drüsig-behaart. Waterl. Insel Mascaren. 4

13. *Habenaria purpurea* Thuars. Purpurrothe Bügelblume.

Blumenblätter purpurroth, abstehend, die zwei untern größer als die obern. Lippe spatelförmig, mucronenspizig. Sporn abgefürzt, gekrümmt. Bracteen sehr kurz. Waterl. Madagascar. 4

14. *Habenaria Amphorches* Spr. (*Amphorches calcarata* Thuars.)

Aus der Wurzel entwickelt sich gewöhnlich nur ein lanzettförmiges, dreirippiges Blatt, und ein aufrechter Stengel, der eine längliche Endähre trägt. Blumenblätter niedergebogen abstehend. Lippe verkehrt liegend, umgekehrt-eyförmig, gefleckt. Fruchtknoten sitzig, länger als der stumpfliche Sporn und die eyförmigen Bracteen. Waterl. Insel Mascaren. 4

15. *Habenaria orbiculata* Hooker ist *Orchis orbiculata* Pursh. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 401.

16. *Habenaria bracteata* R. Brown. (*Orchis bracteata* Willd.)

Blumenblätter (Corolle) gegen einander geneigt. Lippe linsenförmig, an der Spitze fast zweizählig. Sporn sehr kurz, zweispitzig. Bracteen abstehend, viel länger als die Blumen. Waterl. Nordamerika. 4

17. *Habenaria tridentata* Hook. (*Orchis tridentata* Mühlenb. Willd.) f. 1. Nachtr. B. 3. S. 403.

18. *Habenaria ciliaris* R. Br. ist *Orchis ciliaris* Linn. f. Lexic. B. 6.

Blumen gelb oder scharlachroth.

19. *Habenaria cristata* R. Br. ist *Orchis cristata* Mich.
f. Lexic. B. 6.
20. *Habenaria platyphylla* Spr. (*Orchis plantaginea*
Roxb. nec. Swartz.) ist *Orchis Roxburghi* Swartz. f.
Lexic. B. 6. Sprengel hat auch *Orchis platyphyllos*
Sw. Will. als Synonym hierher gezogen — siehe meine
Bemerkung hierüber im 1. Nachtr. B. 5. S. 387.
21. *Habenaria blephariglottis* Hooker. ist *Orchis ble-*
phariglottis Willd. f. 1. Nachtr. B. 5. S. 373.
Wurzel gebüschelt. Blumen ährenständig, weiß.
22. *Habenaria aphylla* R. Br. Blattlose Sägelblume (*Or-*
chis aphylla Forsk.)
Blätter fehlen. Schaft aufrecht. Blumen traubenständig,
glockenförmig. Lippe fadenförmig. Vaterl. Arabien.
23. *Habenaria uniflora* Don.
Stengel einblümig, aufrecht. Blumenblätter eiförmig,
stumpf. Lippe groß, kreisrund. Vaterl. Nepal. 4
†† Lippe dreilappig.
24. *Habenaria geniculata* Don. Knieispornige Siegelblume.
Blumenblätter weiß, äußere oval, stumpf, ausgehöhlt, in-
nere linien = schelförmig, kürzer als die äußern. Lippe dreis-
lappig, die seitenständigen Lappen halbrund, sägerandig, der
Endlappen länglich = linienförmig, ganzrandig, der Sporn in
der Mitte mit einem Knie (Gelenk) versehen. Vaterl. Ne-
pal. 4
25. *Habenaria triloba* Don. Dreilappige Sägelblume.
Stengel meist dreiblümig. Blumen ziemlich groß, purpur-
roth. Corollenblätter breitenförmig, gespitzt. Lippe umgekehrt-
eiförmig, die Seitenlappen sehr breit, gerundet, der Endlap-
pen linienförmig. Sporn pfriemenförmig, gerade, länger als
der Fruchtknoten. Vaterl. Nepal. 4
26. *Habenaria goodyeroides* Don. Goodyeraartige Sägel-
blume.
Blumen weiß, eine lange vielblümige Endähre bildend. Co-
rollenblätter eiförmig, gespitzt, gegen einander geneigt. Lippe
dreilappig, die Lappen fast gleich, stumpf, ganzrandig. Sporn
sehr kurz, sackförmig. Bracteen lanzettförmig, länger als die
übergebogenen Blumen. Vaterl. Nepal. 4
27. *Habenaria hirtella* Spr. ist *Orchis hirtella* Swartz.
f. Lexic. B. 6.

28. *Habenaria graminea* Spr. Grasartige Bügelblume.

Blätter linien-lanzettförmig. Stengel aufrecht. Blumen rachenförmig. Corollenblätter ungleich. Lippe dreilappig, die Lappen ganzrandig, der mittlere hervorgezogen. Fruchtknoten länger als der stumpfliche Sporn und Bracteen. Vaterl. Madagascar. Sprengel hat *Satyrium gramineum et flexuosum* Thuars hierher gezogen, jedoch mit ? —

29. *Habenaria mascarenensis* Spr. (*Satyrium rosellatum* Thuars.)

Wurzelblätter länglich, gespitzt, gehäuft, rosettenartig ausgebreitet. Schaft mit Schuppen besetzt. Blumen rachenförmig. Corollenblätter ungleich. Lippe dreilappig, die Lappen ganzrandig, der mittlere hervorgezogen. Sporn fadenförmig, so lang als der Fruchtknoten. Bracteen abgekürzt. Vaterl. Insel Mascaren. 4

30. *Habenaria chlorantha* Spr. (*Satyrium latifolium* Thuars.)

Blätter länglich, den Stengel umfassend. Corollenblätter abstehend, ungleich. Lippe dreilappig, die Lappen abgekürzt, ungleich, ganzrandig. Sporn sackförmig, kurz. Bracteen so lang als die Blumen. Vaterl. Insel Mascaren. 4

+++ Lippe dreispaltig oder dreitheilig.

a. Die Einschnitte der Lippe ungetheilt.

Zu dieser Abtheilung gehören die im 1. Nachtrage B. 3. beschriebenen Arten: *Haben. brachyceras et macroceras* Willd. Ferner 1. Nachtr. B. 10. Anhang S. 100. *Haben. trifida, angustifolia et latifolia* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. und folgende Arten.

31. *Habenaria flava* R. Br. ist *Orchis flava* Linn. f. Lexic. B. 6.32. *Habenaria viridiflora* R. Br. ist *Orchis viridiflora* Swartz. f. Lexic. et 1. Nachtr. B. 5. S. 391.33. *Habenaria cubitalis* R. Br. ist *Orchis cubitalis* Linn. f. Lexic. B. 6.34. *Habenaria cordata* R. Br. ist *Orchis cordata* Willd. f. 1. Nachtr. B. 5. S. 374.35. *Habenaria gracilis* Hooker. Dünne Bügelblume.

Wurzel faserig. Blätter lanzettförmig. Blumenblätter länglich-lanzettförmig, abstehend. Lippe dreitheilig, die seitensrandigen Einschnitte sind linienförmig, so lang als der mittlere Lappen, der länglich ist.

36. *Habenaria marginata* Hooker. Geränderte Bügelblume.

Wurzel knollig. Blätter elliptisch, durchscheinend = gerändert. Corollenlippe dreitheilig, die seitenständigen Einschnitte linienlanzettförmig, langgespitzt, länger als der mittlere, stumpfe Einschnitt. Sporn keulenförmig, so lang als der Fruchtknoten. Die Anthere an beiden Seiten mit einem Anhange versehen. Vaterl. Ostindien. 4

37. *Habenaria ochroleuca* R. Br. Ocherfarbige Bügelblume.

Blumen ähren = traubenständig, ocherfarbig. Lippe dreitheilig, die Einschnitte ganzrandig, die seitenständigen lanzettförmig, feingespitzt, der mittlere fadenförmig, zusammengedrückt, länger als die seitenständigen. Sporn keulenförmig, so lang als der Fruchtknoten. Vaterl. Neuholand. 4

38. *Habenaria elongata* R. Br. Langspornige Bügelblume.

Blumen ährenständig. Lippe dreitheilig. Einschnitte ganzrandig, der mittlere Einschnitt kürzer als die seitenständigen. Sporn doppelt länger als der Fruchtknoten. Vaterl. Neuholand. 4

39. *Habenaria praealta* Spr. (*Satyrion praealtum* Thuars.)

Stengel ziemlich hoch. Blätter lang, lanzettförmig. Blumen trauben = ährenständig. Corollenblätter stumpf, abstehend. Lippe dreitheilig. Einschnitte lanzettförmig, stumpflich, ganzrandig, gleichlang. Sporn keulenförmig, gekrümmt, fast länger als der Fruchtknoten. Vaterl. Insel Mascaren. 4

40. *Habenaria Sigillum* Thuars.

Blumen weiß. Die obern Corollenblätter breit, die seitenständigen eingeschnitten. Lippe dreitheilig. Einschnitte länglich = linienförmig, stumpf, der mittlere an der Basis breiter. Sporn fast kegelförmig, gekrümmt. Griffelsäulchen an beiden Seiten mit Anhängen versehen. Bracteen sehr kurz. Vaterl. Insel Mascaren.

41. *Habenaria montevidensis* Spr.

Wurzel faserig. Stengel aufrecht. Blumen rachenförmig. Die untern Corollenblätter niedergebogen, die zwei obern eiförmig, gespitzt, genägelt. Lippe dreitheilig. Einschnitte ganzrandig, die seitenständigen linien = fadenförmig. Sporn keulenförmig, verlängert. Vaterl. Monte Video.

42. *Habenaria arachnoides* Thuars.

Blumenblätter ockergelb, obere eiförmig, untere keilsförmig, die seitenständigen linienförmig, zweitheilig. Lippe dreitheilig. Einschnitte ganzrandig, der mittlere länger als die seitenständigen. Sporn keulensförmig, fast so lang als der Fruchtknoten. Griffelsäulchen an beiden Seiten mit Anhängen versehen. Vaterl. Madagascar. 4

43. *Habenaria repens* Nuttall. Kriechende Bügelblume.

Stengel an der Basis wurzelnd, kriechend. Blumen ährenständig. Die seitenständigen Corollenblätter zweispaltig. Lippe dreilappig, die seitenständigen Einschnitte borstenförmig. Sporn fast so lang als der Fruchtknoten. Vaterl. Nordamerika, Carolina. 4

44. *Habenaria rotundifolia* Spr. ist *Orchis rotundifolia* Michx. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 402.

45. *Habenaria fissa* R. Br. ist *Orchis fissa* Mühlenb. Willd. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 399.

46. *Habenaria leptoceras* Hooker. bot. mag. t. 2726.

Blumen bleifarbig = grün, der Sporn weiß, fadenförmig, zusammengedrückt, doppelt länger als der Fruchtknoten. Lippe dreitheilig. Einschnitte linienförmig, der mittlere länger als die seitenständigen. Anthere an der Basis mit zwei spornartigen Hervorragungen versehen. Vaterl. Nepal. ?

47. *Habenaria hispida* Ant. Spr. tentam. Suppl. Syst. veg. p. 27.

Blätter rundlich, ganzrandig, umfassend, wie der Stengel scharfborstig. Blumen ährenständig. Lippe dreitheilig. Einschnitte linienförmig, ganzrandig, der mittlere länger als die seitenständigen. Bracteen eiförmig = langgespitzt, scharfborstig. Sporn gekrümmt, länger als der Fruchtknoten. Hierher gehört *Orchis hispida* Thunb. f. Lexic. B. 6. S. 490. bei *Orchis hispidula*. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. 4

β. Die Einschnitte der Lippe getheilt.

48. *Habenaria incisa* Spr. ist *Orchis incisa* Mühlenb. Willd. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 400.

49. *Habenaria Susannae* R. Br. (*H. intermedia* Don.) ist *Orchis Susannae* Linn. f. Lexic. B. 6.

50. *Habenaria radiata* Spr. ist *Orchis radiata* Thunb. Swartz. f. Lexic. B. 6.

51. *Habenaria pectinata* Don. ist *Orchis pectinata* Smith. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 387.

52. Ha-

52. *Habenaria gigantea* Don. (*Orchis gigantea* Smith.)
Riesenförmige Zügelblume.

Blumen ährenständig, weiß. Corollenblätter elliptisch, gespißt, abstehend. Lippe dreitheilig, die seitenständigen Einschnitte ausgesperrt, vielspaltig, der mittlere lanzettförmig, ungetheilt. Sporn sehr lang. Bracteen kürzer als die Blumen. Vaterl. Emodi montes. 4

53. *Habenaria fimbriata* R. Br. ist *Orchis fimbriata*
Alt. Hort. Kew. f. Lexic. B. 6.

54. *Habenaria psychodes* Spr. ist *Orchis psychodes*
Linn. f. Lexic. B. 6.

Blumen goldgelb, in eine lange Endähre gesammelt.

Kultur. Die Habenarien behandelt man in unsern Gärten wie die Arten der Gattung *Orchis*, mit denen sie zunächst verwandt sind, und in Beziehung auf den Gattungscharakter am meisten durch die Gestalt und Beschaffenheit des Griffelsäutgens sich unterscheiden. Sie lieben gute lockere Dammerde und entwickeln ihre lieblichen Blumen vom Mai bis Juli, einige im September. Die in Nordamerika wildwachsenden Arten gedeihen unter freiem Himmel, wenn sie in guten Boden gepflanzt und in kalten Wintern bedeckt werden; die übrigen, welche aus wärmern Ländern kommen, überwintert man in Gewächshäusern. Fortpflanzung durch Samen und Wurzeltheilung.

- Hablizia* M. a Bieberst. *Hablizie*.

Kelch fünfblättrig, radförmig. Keine Corolle. Staubfäden 5, mit zweifächerigen Antheren gekrönt. Narbe dreilappig. Schlauchfrucht einsamlig.

Pentandria Monogynia (Familie Chenopodeen.)

1. *Hablizia tamnoides* M. a B. Tamnusartige *Hablizie*.

Wurzel fleischig. Stengel kletternd, schuppig. Blätter gestielt, herzförmig, gespißt, scharf. Blumen rispenständig. Vaterl. Kaukasus.

- Haemranthus* Herber in bot. Mag. ist *Amaryllis* Linn.

- Haemanthus* Linn. Blutblume f. Lexic. B. 4.

Blumenscheide (Hülle 4 oder vielblättrig) vielblüthig. Corolle sechstheilig. Staubfäden 6. Ein Griffel. Beere rund, fleischig, dreifächerig, meist dreisaamig. Samen rundlich.

Hexandria Monogynia (Familie Coronarien.)

+ Blumenscheide (Hülle) länger als die Blümchen.

Wurzelblätter zweireihig - zungenförmig.

Dietr. Lex. 2r. Nachtr. IV. 35.

u

1. *Haemocarpus paniculatus* Spr. ist *Arungana paniculata* Pers. f. 1. Nachtr. B. 1. S. 341.

2. *Haemocarpus corymbosus* Spr. Syst. veg. 3. p. 333. (*Haronga lanceolata* Choisy. apud. Cand.)

Blätter ey = lanzettförmig, auf beiden Seiten glatt. Die Blumen bilden gipfelständige wenigblümige Doldentrauben. Vaterl. Madagascar. h

3. *Haemocarpus cymosus* Spr. (*Haronga revoluta* Choisy.)

Blätter länglich = umgekehrteyförmig, scharf = punktirt, am Rande zurückgerollt, unten an den Rippen rostfarbig. Blumenstiele asterdoldentraubig, rostfarbig = silzig. Vaterl. Madagascar. h

4. *Haemocarpus axillaris* Spr. (*Haronga* Willd. herb.)

Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, glatt, oben dunkelgrün, unten blaß, zweifarbig. Blumenstiele winkelförmig, gehäuft, kürzer als die Blätter. Vaterl. Madagascar. h

Diese Gewächse verlangen warme Standörter, denn sie kommen aus Madagascar.

Haemocharis Mart. hat Curt Spreng. zur *Gordonia* gezogen f. Syst. veg. Cur. p. 260.

Haemocharis semiserrata Mart. (*Gordonia* Spr.) f. *Wikstroemia fruticosa* L. Nachtr. B. 9. S. 672.

1. *Haemocharis tomentosa* Mart. (*Gordonia* Spr.)

Neste behaart. Blätter fast stiellos, länglich = umgekehrteyförmig, fast ganzrandig, unten silzig, Blumen einzeln gipfelständig. Vaterl. Brasilien.

Haemodorum Schmith in Linn. Transact. IV. p. 213. *Hæmodorum*.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 495.

Corolle sechstheilig, glatt. Staubfäden 3, an der Basis der Corollentheile eingefügt. Ein fadenförmiger Griffel, mit ungetheilter Narbe. Kapsel dreifächerig, jedes Fach enthält zwei Samen.

Hexandria Monogynia (Familie Coronarien.)

Die *Hæmodoren* sind krautartige Gewächse, mit gebüschelten oder spindelförmigen Wurzeln und einfachen Stengeln, die mit Blättern besetzt sind. Blumen in Doldentrauben, selten ährenständig.

1. *Haemodorum coccineum* R. Brown. Scharlachrothes *Hæmodorum*.

Haemodorum corymbosum Smith. Transact. IV.

Blätter flach. Blumen in zusammengesetzten Doldentrauben, die drei äußern Corollentheile stumpf, kürzer als die innern. Waterl. Neuholland. 4

2. **Haemodorum planifolium** R. Br. Prodr. Fl. Nov. holl. Flachblättriges Hämodorum.

Der krautartige aufrechte Stengel ist mit flachen Blättern besetzt, die linien-schwerdtförmig sind, und an der Wurzel gehäuft-zweireihig stehen. Die Blumen bilden eine gipfelständige Doldentraube, deren Aeste abstehen. Die Corollentheile fast gleich. Waterl. Neuholland. (Abbild. Bot. mag. 1601.)

3. **Haemodorum teretifolium** R. Br. Rundblättriges Hämodorum.

Blätter fast walzenrund. Blumen in zusammengesetzten Doldentrauben, deren Aeste aufrecht stehen und mit lanzettförmigen Bracteen besetzt sind. Die innern Corollentheile etwas länger als die äußeren, in der Mitte die Staubfäden tragend. Waterl. Neuholland. 4

4. **Haemodorum laxum** R. Br. Schlaffes Hämodorum.

Blätter fast walzenrund, schlaff. Doldentraube zusammengesetzt, die Aeste derselben abstehend. Bracteen länglich, stumpf, trocken-rauschend. Waterl. Neuholland.

5. **Haemodorum spicatum** R. Br. Aehrentragendes Hämodorum.

Blumenstielen zu zweien beisammen stehend, eine lange Endähre bildend. Waterl. Neuholland.

6. **Haemodorum brasiliense** Spr. Brasilisches Hämodorum.

Hagenbachia brasiliensis Nees a Eseh. Nov. Act. Acad. Nat. Cur. 11. p. 19. t. 2.

Wurzel gebüschelt, aus fadenförmigen fleischigen Fasern zusammengesetzt. Blätter fast zwei Fuß lang, schwerdtförmig, lang und scharf gespitzt, gestreift. Schaft kürzer als die Blätter, dreiseitig knieartig gebogen, oben mit einigen häutigen scheidenartigen Bracteen besetzt. Blumen weiß, in Trauben gesammelt, die eine gipfelständige Rispe bilden. Blumenstiele gehäuft stehend, überhängend. Waterl. Brasilien. 4

Kultur. Die fünf ersten Arten kommen aus Neuholland und nehmen in unsern Gärten mit Durchwinterung im Glashaufe vorlieb. N. 6. verlangt einen warmen Standort, denn

ſie wächst in Braſilien. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und Wurzeltheilung.

Haenkea flexuosa R. et Pav. f. 1. Nachtr. B. 3. iſt *Celastrum Hänkea* Spr. Syst. Veg. Cur. p. 88. *Schoepfia flexuosa* Syst. Veg. Roem. et Schult. V. p. 160.

Hagea alsinifolia Bivon. iſt *Mollia alsinifolia* Spr.

Hagea polycarpoides Biv. iſt *Mollia Polycarpon* Spr.

Hagea Teneriffae Pers. iſt *Mollia diffusa* Willd. Wird im 1. Nachtr. ausgeſtrichen.

Hagenbachia brasiliensis Nees. f. *Haemodorum brasiliense* N. 6.

Hakea Schrad. Cavan. (*Conchium* Smith. Gaertn. Sem. Suppl. t. 219.) *Hakea*.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 598.

Kelch (Corolle) vierblättrig, unregelmäßig; an jedem ausgehöhlten Ende eines Kelchblattes iſt eine Anthere eingesenkt. Eine Nectardrüse am Fruchtknoten. Ein Griffel. Balgkapsel holzig, einfächerig, excentriſch. Saamen geflügelt, die Flügelhaut länger als der Saame.

Tetrandria Monogynia (Familie Protaceen.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn v. Hak? Sie enthält einige 30 Arten, die aus Neuhollland kommen. Es ſind Bäume und Sträucher von verschiedener Größe, deren Blätter zerstreut ſtehen, fadenförmig oder ſach ſind. Blumen winkelftändig. Rob. Brown hat die Arten Prodrom. R. Nov. Holl. nach der Geſtalt und Beſchaffenheit der Blätter und der Früchte eingetheilt und geordnet.

† *Folia omnia filiformia*. Blätter alle fadenförmig.

* *Capula juxta apicem ecalcarata*.

Kapsel an der Spitze ohne Sporn.

Zu dieſer Abtheilung gehören die im 1. Nachtrage aufgeführten Arten: *Hakea pungioniformis*, *gibbosa* Cav. *H. acicularis*, *suaveolens* R. Br. *H. Epiglottis* Labill. und folgende.

1. *Hakea rugosa* R. Br. Nanzelfrüchtige *Hakea*.

Stengel ſtrauchig, weichſchweißig. Blätter fadenförmig, glatt. Frucht (Kapsel) umgekehrt: eiförmig, gekrümmt, an beiden Enden ſammförmig, gerunzelt, an der Spitze pfriemenförmig aufſteigend. Vaterl. Neuhollland. ‡

2. *Hakea nodosa* R. Br. Knotige *Hakea*.

Neste abstehend, knieartig gebogen. Blätter wenig zusammengedrückt. Kapsel spizlich, knotig, mit umgekehrt-eyförmigen Flügeln. Blumenstiele filzig. Kelche glatt. *H. flexilis* R. Br. ist eine Varietät. Waterl. das südliche Neuholland. h

3. *Hakea leucoptera* R. Br. Weißsaamige Hakea.

Neste aufrecht, ruthenförmig, fast gebogen. Blätter walzenrund, doppelt länger als die Blumen. Kapseln eyförmig, unten höckerig, oben zusammengedrückt. Saamen mit weißgrauen Flügeln versehen. Waterl. das südliche Neuholland. h

4. *Hakea obliqua* R. Br. Schiefe Hakea.

Neste filzig. Blätter walzenrund. Blumenstiele angewachsen. Kelche seidenhaarig. Die Nectarbrüse am Fruchtknoten an der Spitze schief. Kapseln höckerig, fast knotig. Waterl. das südliche Neuholland. h

5. *Hakea pachyphylla* Sieber.

Blätter walzenrund, dick, mucronenspizig, abstehend. Kelche gehäuft, winkelfständig, abgekürzt, glattlich. Waterl. Neuholland. h

6. *Hakea falcata* R. Br.

Blätter fuchelförmig, ausgesperrt. Waterl. das südliche Neuholland. h

** Capsula juxta apicem bicalcarata.

Kapsel an der Spitze mit zwei Sporn versehen.

Hierher gehören: *H. gibbosa* Cav. *H. acicularis*, suaveolens R. Br. s. 1. Nachtr. B. 3. und folgende Arten.

7. *Hakea lissosperma* R. Br.

Blätter walzenrund, glatt. Kapseln höckerig, inwendig eben, mit zwei sehr kurzen Spornen versehen. Saamenflügel umgekehrt-eyförmig. Waterl. Neuholland, die Insel van Diemen. h

8. *Hakea vittata* R. Br.

Nestchen filzig. Blätter walzenrund, glatt, doppelt länger als die Früchte. Kapseln eyförmig, wenig convex, inwendig grubig. Saamenflügel umgekehrt-eyförmig. Waterl. Neuholland. h

9. *Hakea cycloptera* R. Br.

Nestchen und Blätter glatt. Blätter walzenrund, doppelt länger als die Früchte. Kapseln höckerig, inwendig grubig. Saamen an beiden Enden geflügelt, der untere Flügel fast so lang als die Nuß. Waterl. das südliche Neuholland. h

†† *Polia plerumque filiformia, nonnulla plana.* Blätter meist fadenförmig, nur einige flach.

10. *Hakea microcarpa* R. Br. Kleinfrüchtige Hakea.

Blätter ganzrandig, glatt. Die Abblätter walzenrund, die untersten flach. Blumenstiele und Kelche glatt. Kapseln doldenartig, mit zwei Spornen versehen, kürzer als die Blätter. Waterl. die Insel van Diemen. h

11. *Hakea trifurcata* R. Br. Gefurchte Hakea.

Blätter fadenförmig, 2—3 spaltig, auch ungetheilt, unten gefurcht. Kelche behaart. Kapseln zusammengedrückt, ohne Sporn. Waterl. das südliche Neuhollland. h

12. *Hakea varia* R. Br. Bunte Hakea.

Die obern Blätter fadenförmig, getheilt oder einfach, untere flach, fiederspaltig, die Einschnitte linien-pfriemenförmig. Kapseln mit zwei Spornen versehen. Waterl. das südliche Neuhollland. h

††† *Folia omnia platia,* Blätter alle flach.

* Blätter ungetheilt.

Hierher gehören die im 1. Nachtrage beschriebenen Arten:

H. saligna, oleaeifolia, cinerea, elliptica R. Br. *H. ruscifolia, clavata* Labill. *H. dactylodes* Cav. und folgende.

13. *Hakea arborescens* R. Br. Baumartige Hakea.

Stamm baumartig. Aeste ausgebreitet. Blätter spatel-förmig, unendlich gerippt, unbewehrt. Keine Hülle. Dolden gestielt. Blumenstielchen und Kelche filzig. Kapseln ohne Sporn. Waterl. das nördliche Neuhollland. h

14. *Hakea marginata* R. Br. Geränderte Hakea.

Blätter lanzettförmig, gerändert, einrippig, an der Spitze mit einem dornigen Mucrone versehen, die obersten filzig. Kapseln fast stiellos, langgespitzt, glänzend, ohne Sporn. Waterl. das südliche Neuhollland. h

** Blätter fast gezähnt, eingeschnitten,

Hierher gehören die im 1. Nachtrage beschriebenen Arten:

Hakea florida, illicifolia, nitida, amplexicaulis, prostrata, ceratophylla, undulata R. Br. und folgende.

15. *Hakea attenuata* R. Br. Verdünnte Hakea.

Blätter seidenhaarig, an der Basis feldförmig, an der Spitze gezähnt, oder fiederspaltig. Die Einschnitte lanzettförmig, ganzrandig, an der Basis verdünnt. Kapseln mit zwei Spornen. Waterl. das südliche Neuhollland. h

16. *Hakea linearis* R. Br. Fintenförmige Hakea.

Blätter linien-lanzettförmig, theils fast dornig-gezähnt, theils ganzrandig, ohne Aderu. Blumen gebüschelt, winkelförmig und gipfelständig. Die gemeinschaftlichen Blumenstiele, wie die Aestchen glatt. Kapseln wenig zusammengedrückt, mit zwei Spornen versehen. Vaterl. Neuhoiland. ♀

Kultur. Die Arten der Gattung *Hakea* kommen alle aus Neuhoiland und werden in unsern Gärten in Glashäusern überwintert. Sie lieben gute lockere Dammerde. Laub- oder Erikenerde mit Flußsand und etwas Rasenerde gemischt. Fortpflanzung durch Samen und Stecklinge.

Synonymen.

Hakea flexilis R. Br. f. *Hakea nodosa* M. 2.

— *glabra* Schrad. f. *Hakea pugioniformis* f. 1.

Nachtr.

— *pubescens* Schrad. f. *Hakea gibbosa* Cav. 1.

Nachtr.

— *pyriformis* Gaertn. f. *Xylomelum pyriforme*

Sm.

— *sericea* Schrad. f. *Hakea acicularis* 1. Nachtr.

Halesia Linn, Halesie (Gaert. Sem. 1. t. 32.) f. Lexic. B. 4. C. 496.

Blume auf dem Fruchtknoten. Kelch vierzählig. Corolle glockenförmig, vierspaltig. Staubfäden 8—12—16, an der Basis in eine cylindrische Röhre verwachsen; Steinfrucht vierseitig-geflügelt, 4fächerig, 4saamig.

Dodecandria Monogynia Willd. Sp. pl. Monadelphia Dodecandria Spr. Syst. Veg. (Familie Styracaceen.)

1. *Halesia parviflora* Michx. Kleinblumige Halesie.

Stamm strachig. Blätter länglich-eiförmig, gesägt, auf beiden Seiten, sowie die Stiele, filzig. Blumen mit acht Staubfäden versehen, und bilden hängende, fast zusammengesetzte Trauben. Vaterl. Nordamerika. ♀ (Abbild. Bot. reg. t. 952.)

Diese Art hat man früher zu *H. tetraptera* gezogen, aber sie ist verschieden und selbstständig.

Kultur der Halesien f. Lexic. B. 4.

Halidrys nodosus Lyngh. ist *Fucus nodosus* Linn.

Halidrys siliquosa Lyngh. ist *Cystosira siliquosa* Ag.

Halimeda Opuntia Lamarx. ist *Codium Opuntia* Schoush.

Halimodendron Candolle.

Kelch glockenförmig, fünfzählig. Corolle schmetterlingsförmig. Fährchen stumpf. Griffel fadenförmig. Hülse aufblasen, fast lederartig.

Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflanzen.)

1. *Halimodendron argenteum* Cand. ist *Robinia Halodendron* Pallas f. Lexic. B. 8. S. 202.

Haliseris Agardh.

Laub flach, häutig, gerippt.

Cryptogamia Sect. IV. (Familie Algae. Gruppe Phycoidae.)

1. *Haliseris delicatula* Ag. (*Dictyopteris delicatula* Lamar. x.)

Laub fast einfach, zart-dünn, am Rande mit linienförmigen Fruchthäuschen versehen, die zu 2 parallel liegen. Watel. Ostindien.

2. *Haliseris marginata* Spr. (*Zonaria marginata* Ag.)

Laub zweitheilig, ganzrandig, in den Theilungswinkeln gerundet. Die Einschnitte linienförmig, stumpf. Fruchthäuschen randständig. Wächst im rothen Meere.

3. *Haliseris linearis* Ag.

Laub lang, linienförmig. Fruchthäuschen zerstreut stehend. Wächst am Meerufer in Amerika.

4. *Haliseris polypodioides* Ag. (*Fucus polypodioides* Lamar. x. *F. membranaceus* Stackh.)

5. *Haliseris dichotoma* Spr. (*Fucus zosteroides* Lamar. x. *Zonaria dichotoma* Ag.)

Diese Algen, nebst *Haliseris Lamourouxii*, *penicellata* Spr. *H. Justii* Ag. wachsen an Meerufern in Ostindien; am atlantischen Meere. Haiist. *Woodwardia* Ag. in Neuholland am Meerstrand.

Halleria Linn. Hallerie, siehe Lexic. B. 4.

Kelch dreilappig, stehen bleibend. Corolle trichterförmig, der Rand vierspaltig, der obere Einschnitt ausgekerbt, größer als die untern. Staubfäden 4, ungleich lang. Griffel lang, bleibend. Meere zweifächerig, viel-saamig.

Didynamia Angiospermia (Familie Caprifoliën.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren eines der größten Naturforschers seiner Zeit, des Herrn Dr. Albert v. Haller, (geb. 1708. † 1777.) Die schätzbaren Schriften

des H. v. Haller, der sich um die Wissenschaft im Allgemeinen und um die helvetische Flora ein großes Verdienst erworben hat, sind unfehlbar jedem Naturforscher bekannt und bedürfen daher hier keiner Anzeige.

Von dieser Gattung kennen wir jetzt nur zwei Arten: *H. lucida* et *elliptica*. Beide habe ich im Lexikon B. 4. beschrieben und eine Anleitung zu ihrer Kultur beigelegt. Es sind Sträucher, 3—6—10 Fuß hoch, deren Blätter einander gegenüberstehen.

Hallia Thunb. Hallie.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 606.

Kelch fünftheilig, regelmäßig, kürzer als die schmetterlingsförmige Corolle. Das Schiffehen stumpf. Griffel nicht zurückgebogen. Hülse einsamig, zweiflappig.

Diadelphia Décandria (Familie Hülsenpflanzen.)

1. *Hallia angustifolia* Candolle. Schmalblättrige Hallie.

Stengel fadenförmig. Blätter linienförmig, gespißt, glatt. Afterblätter lanzettförmig, länger als die Blattstiele. Blumenstiele einblümig, kürzer als die Blätter. Vaterl. das südliche Afrika.

2. *Hallia argentea* Spr. ist *Sophora argentea* Pallas f. *Podaliria argentea* Lexic. B. 7. S. 364.

Die übrigen Arten, welche der Gattung *Hallia* angehören f. 1. Nachtr. B. 3. S. 609. Anleitung zu ihrer Kultur.

Hallia trifoliata Roth ist *Lespedezia indica* Spr.

Halocnemon M. Br.

Der gemeinschaftliche Kelch bildet ein schuppiges Käßchen; der besondere ist dreiblättrig, geschlossen. Ein Staubfaden und 1 Griffel.

Monandria Monogynia (Familie Chenopodeen.)

† *Aphylla*. Stengel blattlos.

1. *Halocnemon strobilaceum* M. Br. [(*Salicornia glauca* Delill. S. *mucronata* Lag.)]

Stengel standenstrauchig, weitschweifig. Glieder sehr kurz. Wächst am caspischen und mittelländischen Meere. h

2. *Halocnemon caspicum* M. Br. Hierher gehört: *Salicornia caspica* Pallas f. Lexic. B. 8. S. 364.

†† *Foliata*. Stengel mit Blättern besetzt.

3. *Halocnemon arabicum* Spr. ist *Salicornia arabica* Pall. Linn. Suppl. f. Lexic. B. 8.

4. *Halocnemon nodulosum* Spr. (*Salicornia strobilacea* Sieb. s. *nodulosa* Delil. fl. aeg.)

Stengel staudenstrauchig, aufrecht. Blätter in der Jugend freisäbelförmig, im Alter wechselnd stehend, fast kugelig, halb umfassend, angedrückt. Die Schuppen der Köpchen länglich, graugrün. Vaterl. Aegypten. h

5. *Halocnemon foliatum* Spr. ist *Salicornia foliosa* Linn. Suppl. f. Lexic. B. 8.

Haloragis Forst. Meerträublein f. Lexic. und 1. Nachtr. (*Cercodia* Gaertn. Sem. t. 32.)

Kelch vierblättrig, auf dem Fruchtknoten stehend. Corolle vierblättrig. Antheren 8, Griffel 4, Steinfrucht ausgeartet, net, vierfächerig, viersamig.

Octandria Tetragynia (Familie Onagren.)

1. *Haloragis Gonocarpus* Spr. Neuholländisches Meerträublein.

Gonocarpus tetragyna Labillard. Fl. Nov. Holl.

Blätter länglich-umgekehrteiförmig, sägeartig gezähnt. Blumen fast stiellos, einzeln, winkelförmig. Früchte kugelig-eiförmig Vaterl. das nördliche Neuholland.

2. *Haloragis tetrandra* Schott, Viermänniges Meerträublein.

Stengel krautartig, einfach. Blätter spatel-liniensförmig, fast ganzrandig. Blumen gehäuft stehend, fast stiellos, sehr klein, nur mit 4 Antheren versehen.

Halymenia Agardh.

Laub flach oder röhrig, fast häutig. Fruchtwarzen punktförmig, fast in die Platten des Laubes eingesenkt.

Cryptogamia Sect. IV. (Familie Algen, Gruppe II. Floridæ.)

1. *Halymenia reniformis* Ag.

Laub knorplich, niereenförmig, fast kreisrand, ganzrandig, gestielt. (*Fucus reniformis* Turn.)

2. *Halymenia cordata* Ag. (*Fucus cordatus* Turn. hist. t. 116.)

Laub fleischig, elliptisch, ganzrandig, an dem sehr kurzen Stiele verdünnt. Wächst im atlantischen Meere.

3. *Halymenia edulis* Ag. (*Fucus edulis* Turn. F. caprinus Fl. dan. var. F. carnosus et *Lactuca* Esper. *Ulva caprina* Gann.)

Laub fleischig, spatelförmig, ganzrandig, kurzgestielt, einfach oder am Stiele getheilt. Wächst im atlantischen und mittelländischen Meere.

4. *Halymenia palmata* Ag.

Laub häutig, handförmig getheilt, ganzrandig, die Einschnitte länglich. Siehe *Fucus palmatus* Linn. Lexic. B. 4. S. 231.

5. *Halymenia ligulata* Ag.

Laub häutig, zart, getheilt. Die Einschnitte linienförmig, absteigend. *Ulva ligulata* Woodw. Hal. elongata Ag. Var. Wächst im atlantischen Meere.

6. *Halymenia Proteus* Spr. (*Fucus Proteus* Delil. F. floresius Turn.)

Laub häutig, flach, doppelt zusammengesetzt. Die Einschnitte linienförmig, sägerandig, horizontal ausgebreitet. Wächst im atlantischen, mittelländischen und rothen Meere.

7. *Halymenia furcellata* Ag. (*Ulva furcellata* Turn. Engl. bot. 1881.)

Laub zweitheilig, fast gallertartig, an der Basis fast dreikantig. Einschnitte linienförmig, flach, gespalten. Wächst im atlantischen Meer.

8. *Halymenia plaryna* Ag.

Laub fleischig, zweitheilig, sehr kurz gestielt. Einschnitte an der Spitze breiter als unten, gekräuseltgedreht. Japan im Meere.

9. *Halymenia saccata* Ag. (*Fucus saccatus* Turn.)

Laub ausgebreitet, abgekürzt. Nester kantenförmig. Wächst am Meerufer im südlichen Afrika.

Die Halymenien wachsen in Meeren an Ufern auf Steinen an Seemuscheln u. von denen zuweilen einige Arten sich trennen oder durch Wellen abgerissen werden und im Wasser schwimmen, wie *Fucus natans* Linn. und andere zu dieser Familie gehörende Seegewächse.

Hamadryas Commers. Hamadryade.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 601.

Blumen düssig. Kelch 5—6 blättrig. Corolle 10—12 blättrig. ♂ Staubfäden zahlreich, bodenständig. ♀ Narben mehrere auffühend. Saamen (Karpopsen) zahlreich, eiförmig.

Dioecia Polyandria (Polyandria Polygynia Syst. veg. ed. Spr.) (Familie Ranunculaceen.)

1. *Hamadryas magellanica* Lamarck. f. 1 Nachtr. B. 3.
2. *Hamadryas tomentosa* Candolle. Filzige Hamadryas.

Blätter oben zottenhaarig, fast wie mit Spinnengewebe überzogen, 5—7 spaltig, die Einschnitte länglich, fast dreispaltig. Schaft länger als die Blattstiele, wie die Kelchblätter filzig. Vaterl. Insel Statuum ad terram ignis Menzies.

Hamamelis Linn. Zaubernuß f. Lexic. B. 4.

Kelch vierspaltig, auswendig schuppig. Vier lange zungenförmige Corollenblätter. Staubfäden 4, kurz. Antheren zweifächerig) zweiflappig. Griffel 2. Kapsel zweifächerig, lederartig, mit zwei Hörnern versehen.

Tetrandria Digynia (Familie Berberideen?)

1. *Hamamelis virginica* Linn. f. Lexic. B. 4. Hierzu gehören folgende Varietäten: *Ham. macrophylla* Pursh. *H. parvifolia* Nutt. die sich nur durch die Größe der Blätter unterscheiden.
2. *Hamamelis chinensis* R. Brown. Chinesische Zaubernuß.

Arbuscula sinensis Plukn. t. 368. f. 2.

Stamm baum- oder strauchartig. Blätter fast umgekehrt-eiförmig, unten netzaderig, steinhaarig = filzig. Blumenköpfchen gestielt. Vaterl. China. ♀

Hamellia Linn. Willd. f. Lexic. B. 4. (*Hamelia* Spr. Kunth) Hamelie.

Kelch sehr klein, fünfzählig. Corolle langröhrig, fünfedig. Staubfäden 5. Narbe linienförmig, stumpf. Beere fünffächerig. Saamen rauh. (Abbild. Gaertn. Sem. t. 190—196.)

Pentandria Monogynia (Familie Rubiaceen.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Henr. Ludw. du Hamel du Monceau. (geb. 1700 † 1782.) Du Hamel war Aufseher über das französische Seewesen und hat sich durch seine Versuche und Beobachtungen über das Wachsthum der Pflanzen, besonders der Bäume um die Wissenschaft sehr verdient gemacht. Sein schätzbares Werk: *La physique des arbres* Vol. 1—2. erschien zu Paris im Jahr 1758.

Die Arten, welche der Gattung *Hamellia* L. (*Hamelia*.) angehören: *H. axillaris*, *chrysantha*, *ventricosa* Sw.

H. patens L. habe ich im Verikon B. 4. beschrieben und S. 506. ihren Nutzen und Kultur angegeben. Hier nur folgende Synonymen.

Hamelia glabra Lam. (f. 1. Nachtr. B. 3.) f. *Amaioua*

guianense 2. Nachtr.

— *grandiflora* Herit. Ait. f. *Hamelia ventricosa*
Lexic.

— *odorata* Willd. herb. ist *Hamelia chrysantha*
Lexic.

— *pauciflora* Willd. herb. ist *Hamelia ventricosa*
Lexic.

— *sessiliflora* Willd. (Lexic. B. 4.) ist *Amaioua*
guianensis 2. Nachtr.

— *sphaerocarpa* R. et Pav. ist *Hamelia patens* f.
Lexic.

— *suaveolens* Kunth ist *Hamelia chrysantha* f.
Lexic.

— *xorullensis* Kunth ist *Hamelia patens* f. Lex.

Hamiltonia Mühlenb. Willd. *Hamiltonia*. (*Pyralaria* Michx.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 611.

Blumen polygamisch. ♀ Kelch corollinisch, fast glockenförmig, fünfspaltig. Keine Corolle. Nectarium füsßzähmig, schalenförmig. Staubfäden 5, in die Einschnitte des Kelches eingefügt. Narbe einfach. Steinfrucht birnförmig. ♂ Kelch, Nectarium und Staubfäden wie bei ♀, aber der Stempel fehlt.

Spec. pl. ed. Willd. *Polygamia Dioecia* (*Pentandria Monogynia* Spr. Syst. veg.) (Familie Santaleen.)

1. *Hamiltonia umbellata* Spr. ist *Thesium umbellatum* Linn. f. Lexic. B. 9. S. 705. (*Comandra umbellata* Nutt.)

2. *Hamiltonia sarmentosa* Spr. (*Comandra sarmentosa* Nutt.)

Wurzel kriechend, Sprossen treibend. Stengel krautartig. Blätter länglich, stumpf. Blumenstiele doldenartig, fast dreiköpfig, einzeln, winkelförmig. Vaterl. Nordamerika. 2

Hamiltonia fruticosa Don. ist *Leptodermis lanceolata* Wallich.

— *pilosa* Roxb. ist *Spermadictyon pilosum* Spr.

Hamiltonia scabra Don. ist *Spermadictyon scabrum* Spr.

Hancornia Gomez. Pancornie.

Reich klein, fünftheilig. Corolle fünfspaltig, der Rand sehr abstehend. Staubfäden 5, in die Corollenröhre eingefügt. Narbe gespalten. Beere einsächerig, viel-saamig.

Pentandria Monogynia (Familie Conforten.)

1. *Hancornia speciosa* Gomez. Prachtige Pancornie.

Blätter länglich, wenig gespitzt, lederartig, glatt. Blumenstiele gipfelständig, meist dreiblümig. Corolle röhrig, der Rand fünfspaltig, abstehend. Vaterl. Brasilien. h

2. *Hancornia pubescens* Martius. Filzige Pancornie.

Aeste und Blätter filzig. Blätter länglich, langgespitzt. Blumen stiellos, in gipfelständige, zweitheilige Astersolden gesammelt. Vaterl. Brasilien. h

Beide Arten verlangen gute lockere Dammerde, Laub- oder Walderde, mit Sand und wenig Lehm oder Rasenerde gemischt, und warme Stadtdörter, denn sie kommen aus Brasilien. Die Fortpflanzung geschieht auf die bekannte Art und Weise durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.

Hapalanthus repens Jacq. ist *Callisia repens* Linn.

Haplaria grysea Link ist *Acladium gryseum* Spr.

Haplocarpha Schlechtend. in *Linnaea* B. VI. Heft 1. p. 90. t. 1.

Radius ♀ *Achaenium exalatum*. Pappus uniserialis, Filamenta scabra Schlechtend.

Syngenesia (Familie Compositae.)

1. *Haplocarpha lanata* Schlechtend. (nec *Arctotis lanata* Thunb.)

Diese Art ist allerdings mit *Arctotis lanata* Thunb. sehr nahe verwandt, aber unterschieden durch die weiblichen Strahlblümchen, durch die scharfen Staubfäden, durch die zottig-wolligen Saamen und durch die Saamenkrone. Diese besteht aus 8–9 Spreublättchen von gleicher Länge, die länglich-elliptisch, ausgehissen-gezähnt sind und nur eine Reihe bilden; bei *Arctotis* sind die Strahlblümchen geschlechtslos, und die Staubfäden warzig. Vaterl. das Kap d. g. Hoffung. 4?

Hardwickia Roxburgh. Hardwicke.

Reich corollig, fünfblättrig. Staubfäden 10, davon 5 abweich.

abwechselnd länger als die übrigen sind. Griffel aufsteigend. Hülse lanzettförmig, einsamig.

Decandria Monogynia (Familie Hülsenpflanzen.)

1. *Hardwickia binata* Roxb. Gezweigte Hardwickie.

Ein Baum, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter gezweigt, in der Mitte mit einem Nucrone versehen. Blumen gelb, in winkels- und gipfelfständige Rispen gesammelt. Waterl. Co. romandel. h

Haronga axillaris Willd. f. *Haemocarpus axillaris*.

— lanceolata Chois. f. *Haemocarpus corymbosus*.

— revoluta Chois. f. *Haemocarpus cymosus*.

Harpullia Roxburgh Corom. Harpullie.

Reich und Corolle fünfblättrig. Staubfäden 5, mit den Corollenblättern abwechselnd. Narbe zweilappig. Kapsel zweifächerig, zweisaamig.

Pentandria Monogynia (Familie Sapindeen.)

1. *Harpullia cupanioides* Roxb. Cupaniaartige Harpullie.

Ein kleiner Baum, dessen Blätter gepaart gefiedert und glatt sind. Blättchen (8—12), länglich, gespitzt, ganzrandig. Blumen schwefelgelb, in winkelfständige Rispen gesammelt. Waterl. Ostindien. h

Harrachia Jacquin. Harrachie.

Reich fünftheilig, ungleich, von drei Bracteen unterstützt. Corolle röhrig, einlippig, fünflappig. Staubfäden 4, ungleich lang, in die Corollenröhre eingeschlossen. Antheren einsächerig. Kapsel zweifächerig, die Saamen mit Häuten versehen.

Didynamia Angiospermia (Familie Acantheen.)

Diese Gattung hat Jacquin dem Herrn Grafen Harrach zu Ehren *Harrachia* genannt.

1. *Harrachia speciosa* Jacq. Ecl. t. 21. Prachtige Harrachie.

Ruellia infundibuliformis Andrew Repos.

Crossandra undulaefolia Salisb. parad. 12. (?) (f.

1. Nachtr. B. 2. S. 472.)

Stengel strauchig, aufrecht, ästig. Aeste grün, glatt. Blätter zu 2 einander gegenüber stehend, gestielt, länglich, an beiden Enden verdünnt, wellenrandig, 2 — 4 Zoll lang, glatt. Blumen in gestielten Aehren. Bracteen zu 3 stehend, feinspizig, filzig. Corollen schön, mennig = fast ziegelroth, bei einer Varietät feuer = fast scharlachroth. Waterl. Ost- und Westindien. h

Dietr. Exr. 2r Nachtr. IV. Bd.

h

Im Syst. Veg. hat Curt Sprengel auch *Justicia infundibuliformis* Linn. zur *Harrachia* Jacq. gezogen, aber die Diagnose in Vahl's Enum. pl. 1. p. 164. und in Spec. pl. ed. Willd. paßt nicht vollkommen auf *Harrachia*, siehe meine Bemerkung bei *Crossandra* 1. Nachtr. a. a. O. Im hiesigen bot. Garten steht die *Harrachie* im warmen Hause, ist jetzt 3 Fuß hoch und entwickelt ihre lieblichen Blumen zu verschiedenen Zeiten im Jahre: im Frühlinge und Sommer, zuweilen auch im Winter. Die Vermehrung geschieht durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.

Harrisonia Adans.

Haube halb. Borste (Kapselstiel) winkelförmig.

Cryptogamia Sect. II. (Familie Laubmoose.)

Diese Laubmoosgattung widmete Adanson seinem Freunde dem Herrn Harrison in London. ?

1. Harrisonia aquatica Spr.

Stengel ästig, schwimmend. Blätter lanzettförmig, ganzrandig, fast einseitig. Borsten (Kapselstiele) winkelförmig. Kapsel hervorragend, länglich. Der Deckel schnabelförmig. Hierzu gehört: *Hedwigia aquatica* Hedw. stirp. *Anictangium* Hedw. *Hypnum aquaticum* Jacq. *Gymnostomum* Bridel meth. Wächst im mittlern und südlichen Deutschland in Bächen und Quellen,

2. Harrisonia secunda Spr. (*Hedwigia secunda* Hooker.)

Stengel aufrecht, ästig. Blätter eiförmig, langgespitzt, ohne Rippen, an der Spitze gezähnt, einseitig. Kapsel langgestielt, länglich, an der Mündung zusammengezogen. Der Deckel pfriemenspizig. Vaterl. Mexiko.

3. Harrisonia Humboldtii Spr. (*Hedwigia* Hooker.)

Stengel aufrecht, ästig. Aeste gekrümmt, sehr abstehend. Blätter eiförmig-lanzettförmig, ganzrandig, ohne Rippen, an der Spitze haartragend; sie liegen wie Dachziegel über einander. Kapseln langgestielt, kegelförmig, gefurcht. Wächst in Neugranada.

4. Harrisonia Hornschuchiana Spr. (*Hedwigia* Hook. *Gymnostomum* Funk.)

Stengel aufrecht, ästig. Blätter lanzett-pfriemensförmig, lang, gebogen, ganzrandig. Kapseln fast kegelförmig. Deckel schief, schnabelförmig. *Hartogia capensis* Linn. Suppl. f. Lexic. B. 4. S. 507. hat Spr. zu *Elaeodendron* gezogen f. *Elaeod. schinoides* Spr.

Haronga Chois. f. Haemocarpus.

Hassagay-boom. Colon. ist *Curtisia faginea* Ait.

Hasseltia Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. VII. Hasseltie.

Kelch viertheilig. Corolle vierblättrig (nach Kunth Kelch achtblättrig, stehen bleibend. Keine Corolle.) Staubfäden haarförmig, zahlreich, bodenständig. Antheren zweifächerig. Acht Nectardrüsen um den Fruchtknoten stehend. Ein Griffel. Frucht fast kugelförmig, 1—2 fächerig; in jedem Fache 1—2 Samen.

Polyandria Monogynia (Familie Bixeeen.)

1. *Hasseltia floribunda* Kunth J. c. p. 233. t. 651. Vielblümige Hasseltie. India. Pie de Paloma.

Ein Baum, dessen Aeste walzenförmig sind und abstehen. Blätter wechselnd stehend, länglich, gezähnt, fünfrippig, an der Basis mit zwei Drüsen versehen. Blumen gestielt, in Aesterröhren gesammelt, welche reiche gipfelständige Dolden bilden. Wächst am Magdalenen-Flusse, bei Badillas. Blüht: Mai — Juni.

Hahingia coccinea Smith ist *Holmskooldia sanguinea* Reiz. f. 1. Nachtr.

Havetia laurifolia Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Spec. pl. V. p. 158. t. 462. ist *Clusia tetrandra* Willd.

Haworthia Haw. f. 1. Nachtr. ist *Aloe* Linn. Spr.

Haynea Willd. Sp. pl. Haynie.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. C. 613.

Kelch eysförmig, ziegelschuppig, unbewaffnet. Fruchtboden fleischig, mit Spreublättchen besetzt, die ungetheilt sind. Sammentrone haarig-borstig.

Syngenesia 1. Ordn. (Familie Compositae.)

Im ersten Nachtrage habe ich schon bemerkt, daß diese Gattung dem Herrn Prof. Dr. F. G. Hayne gewidmet ist. Hayne war zuletzt Professor der Botanik in Berlin, wo er sein großes Werk über Arzneipflanzen 4. mit Abbild. herausgab. Er starb im Jahr 1833.

1. *Haynea pedunculata* Spr. Gestielte Haynie.

Serratula pedunculata Cand. Pers. *Hololepis* Cand. Ann. mus.

Stengel standenstrauchig. Blätter gestielt, länglich, an beiden Enden verdünnt, ganzrandig, glatt, unten blaß. Blü-

men gestielt, winkelftändig, die Stiele mit Bracteen besetzt.
Kelchschuppen lederartig, die innern schmaler als die äußern.
Waterl. Brasilien. 4 h

Hebanthe paniculata Mart. ist *Jrsine paniculata* Spr.

Hebanthe spicata Mart. ist *Jrsine spicata* Spr.

Hebanthe virgata Mart. ist *Jrsine virgata* Spr.

Hebeandra Bonpl. f. *Monnina*.

Hebelia allemannica C. G. Gmel. f. *Tosfieldia palustris*.

Hebelia collina C. G. Gmel. f. *Tosfieldia palustris*.

Hecastophyllum Brownei Kunth ist *Petrocarpus Ecastophyllum* Berg.

Hecastophyllum dubium Kunth ist *Petrocarpus dubius* Spr.

Hecatonia palustris Lour. ist *Ranunculus sceleratus* Linn.

Hecatonia pilosa Lour. ist *Ranunculus cantoniensis* Cand.

Hedeoma hispida Pursh. f. *Cunila hispida*.

Hedeoma thymoides Pers. f. *Cunila thymoides*.

Hedera Linn. Epheu f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. I. Nachtr. B. 3. C. 618.

Kelch fünfzählig. Corolle fünfblättrig. Staubfäden 5, zwischen den Corollenblättern stehend. Antheren unten gespalten.
Narbe einfach. Beere fünffächerig, fünfsamig.

Pentandria Monogynia (Familie Caprifoliaceen.)

1. *Hedera Hainla* Don. Fl. nepal.

Stamm baumartig, mit Stacheln besetzt. Blätter lederartig, herzförmig, fünflappig, gezähnt, glatt. Blumen traubensrispenständig und bilden kugelige Dolden. Waterl. Nepal. (Landschaft im östlichen Theile Asiens.) h

2. *Hedera fragrans* Don. Gutriechender Epheu.

Stamm baum- oder strauchartig. Blätter dreizählig. Blättchen eiförmig, sägerandig, glatt, unten bläulich-grün, die Reraturen borstig. Blumen in zusammengesetzten vielstrahligen Dolden. Waterl. Nepal. h

3. *Hedera tomentosa* Don. Filziger Epheu.

Stamm baumartig, ohne Stacheln. Blätter siebenzählig. Blättchen lanzettförmig, langgespißt, ganzrandig, lederartig, unten mit Filze dicht bedeckt. Blumen in Trauben, welche Dolden bilden. Waterl. Nepal. h

4. *Hedera aculeata* Don. Stacheliger Epheu.

Stamm baumartig, mit Stacheln besetzt. Blätter siebenzählig. Blättchen länglich, langgespitzt, sägerandig, unten sitzig. Blumen traubenständig, sitzig. Vaterl. Nepal. h

5. *Hedera parasitica* Don. Schmarogender Epheu.

Stengel wurzelnd, meist schmarogend. Blätter zweipaarig gefiedert. Blättchen lederartig, länglich, gespitzt, ganzrandig, glatt, unten blaugrün. Blumen in Trauben, welche unbehaarte Dolden bilden. Vaterl. Nepal. h

Alle fünf Arten kommen aus Nepal und verlangen in unsern Gärten Standörter, in warmen Häusern oder Lepidarien (6—10° Reaum.) Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge.

Hedera elata Don, ist *Hedera terebinthacea* Vahl. f. Lexic. B. 4.

Hedona sinensis Lour, ist *Lychnis grandiflora* Jacq. f. Lexic.

Hedwigia Sw. f. Lexic. B. 4. S. 517.

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Dr. Johann Hedwig, ehemaliger Professor der Botanik in Leipzig (geb. 1730. † 1799.) Hedwig hat sich durch die Bestimmung der kryptogamischen Gewächse, besonders der Laubmoose um die Wissenschaft verdient gemacht. Sein großes Werk: *Joannis Hedwig Species Muscorum Frondosum*, edit. Frid. Schwägrichen. 1801—1811, 4- mit vielen illuminirten Abbildungen ist unfehlbar jedem Botanikus bekannt.

Wir kennen von der Gattung *Hedwigia* jetzt nur eine Art: *H. balsamifera* Sw. f. Lexic.

Synonymen.

Hedwigia aquatica Hedw. f. *Harrisonia aquatica*.

Hedwigia Humboldtii Hedw. f. *Harrisonia Humboldtii*.

Hedwigia simplicifolia N. E. f. *Trichilia simplicifolia* Spr.

Hedycarpus Jackson. *Hedycarpus*.

Kelch viertheilig. Staubfäden 4. Narben 3. Kapsel beerartig, dreifächerig. Saamen mit Mantelhaut (Umschlag) versehen. Tetrandria Monogynia.

1. *Hedycarpus malayanus* Jack.

Ein kleiner Baum, mit ausgebreiteten Aesten. Blätter

wechselnd stehend, eysförmig, langgespitzt. Blumen traubenständig. Vaterl. Sumatra. h

Hedycaria Forst. Linn. Suppl. Hedycarie f. Lexic. B. 4.

Blumen dübsch. Kelch 8—10 spaltig. Antheren anstehend, an der Spitze bartig. Nuss einsamig.

1. *Hedycaria hirsuta* Spr.

Blätter länglich = eysförmig, buchtig = gekerbt, auf beiden Seiten behaart, an der Basis mit zwei Drüsen versehen. Vaterl. Bengalen.

Hedychium Koenig, Kranzblume f. Lexic. B. 4.

Kelch 2—3 theilig, Corolle verkehrt stehend, sechstheilig, die Nectarlippe gespalten. Der Staubfaden gegliedert, und trägt an der Spitze eine doppelte Anthere. Der Griffel fadenförmig, doppelt länger als der Staubfaden. Narbe trichterförmig. Kapsel dreifächerig, dreilappig, vielamig. Samen mit Mantelhaut.

Monandria Monogynia (Familie Scitamineen; Gruppe Alpineen.)

1. *Hedychium coronarium* König. f. Lexic. B. 4. (Abbild. Curt. bot. Mag. t. 708. Rosc. mon. pl. 10. t. 77. Loddig. Bot. Cab. 51.)

Wurzel knollig, ästig = faserig. Stengel aufrecht, einfach, rund, 6—8 Fuß hoch und höher, an der Basis rosenrothspunktirt = gefleckt. Blätter stiellos, zwei Reihen bildend, lanzettförmig, lang und feingespitzt, obere 1—1½ Fuß lang, 2½ Zoll breit, die Blattscheiden den Stengel umfassend. Blumen weiß, wohlriechend, und bilden eine gipfelständige Aehre, deren Bracteen lederartig, 4—6 blüthig sind, und wie Dachziegel über einander liegen. Corollenröhre doppelt länger als der Kelch, gekrümmt. Die äußern Theile linien = lanzettförmig, innere schief, oval, wie die Lippe wellenrandig. Lippe groß, rundlich, fast umgekehrt = eysförmig, oben gespalten, in der Mitte mit zwei gelben Flecken versehen. Der Staubfaden etwa 1 Zoll lang, weiß, kürzer als die Lippe. Vaterl. Ostindien. 2 Blüthj. Sommer.

2. *Hedychium maximum* Roscoe mon. pl. 4. t. 29. Großes Hedychium.

Wurzel knollig = ästig. Stengel aufrecht, 10—14 Fuß hoch. Blätter stiellos, länglich, unten sitzig. Die Blumen bilden eine gipfelständige Aehre mit häutigen Bracteen, welche dach-

ziegelförmig über einander liegen, stumpf und gewimpert sind. Kelch scheidenartig, dreitheilig, zottenhaarig, die Theile der Corolle weiß, in der Mitte gelblich; die äußeren gleich lanzett-liniensförmig, zurückgeschlagen, innere eiförmig. Lippe groß, zweilappig, gekerbt, oder wellenrandig. Staubfäden roth. Vaterl. Ostindien. ? 4

3. *Hedychium flavum* Roxb. ind. 1. p. 81. Rosc. mon. pl. 3. t. 19.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, grün, an der Basis braun. Blätter lanzettförmig, langgespitzt, unten fast filzig. Blumen gelb, wohlriechend, in eine gipfelständige 5—6 Zoll lange Aehre gesammelt. Bracteen meist dreiblümig, innere einblümig. Lippe umgekehrt-herzförmig, zweilappig, so lang als der Staubfaden. Vaterl. Bengalen. 4

4. *Hedychium flavescens* Carey. Rosc. mon. pl. 3. t. 20. Gelbliches Hedychium.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 6—8 Fuß hoch, an der Basis röthlich. Blätter lanzettförmig, lang, unten filzig-zottenhaarig. Blatthäutchen lang, häutig. Blumen gelblich, (bl., gelb) wohlriechend, ährenständig, nachziegelförmig über einander liegend. Bracteen; äußere breit, sehr stumpf, gewimpert, innere 2—3 blümig, walzenrund. Kelch doppelt kürzer als die Corollenröhre. Die äußern Corollentheile gleich, liniensförmig, zurückgeschlagen, die zwei innern eiförmig, stumpf. Lippe breit, eiförmig, so lang als der Staubfaden. Vaterl. Indien. 4

5. *Hedychium angustifolium* Roxb. Corom. Schmalblättriges Hedychium.

Hedychium coccineum Wallich in Bot. Reg. t. 1209.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 5—6 Fuß hoch. Blätter linien-lanzettförmig, glatt, 15—18 Zoll lang, $1\frac{1}{2}$ Zoll breit, mit fadenförmiger Spitze. Blatthäutchen kurz, rosenroth. Blumenähre 6—12 Zoll lang. Bracteen häutig, zweiblümig, äußere cylindrisch, innere gespalten. Corolle ziegelfarbig, die äußern Theile liniensförmig, zurückgeschlagen, die zwei innern länglich. Lippe zweilappig, kürzer als der Staubfaden. Vaterl. Bengalen. 4

6. *Hedychium coccineum* Smith. Rosc. mon. pl. 4. t. 28. Scharlachrothes Hedychium.

Wurzel und Stengel wie bei vorhergehender Art. Blätter

lanzettförmig, an beiden Enden verbünnt, grau- oder blaugrün, 6—8 Zoll lang. Blatthäutchen eysförmig, blasfrosenroth. Blumenähre gipfelständig, 6—8 Zoll lang, die Spindel zottenhaarig. Bracteen meist dreiblümig, äußere cylindrisch, an der Spitze büschelhaarig, innere keilsförmig, häutig. Corolle scharlachroth, die äußern Theile linienförmig, zurückgeschlagen gedreht, die innern fast elliptisch, wellenrandig. Lippe zweilappig, mit einem langen keulenförmigen Nagel versehen. Vaterl. Nepal, 4

7. *Hedychium aurantiacum* Rosc. mon. pl. 6, t. 44. Pomeranzenfarbiges Hedychium.

Hed. angustifolium Bot. Mag. 2078. H. coccineum var. Buchan.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 3—5 Fuß hoch, in der Jugend purpurröthlich. Blätter zweireihig, linien-lanzettförmig, unten an der Mittelrippe zottenhaarig. Blatthäutchen eysförmig, stumpf. Ähre gipfelständig, sechsreihig, dachziegelförmig. Bracteen 2—3 blümig, die innern einblümig, häutig. Corolle sechstheilig, die drei äußern Theile linienförmig, zurückgeschlagen, roth, die zwei innern linien-lanzettförmig. Lippe pomeranzenfarbig, zweilappig, mit einem Nagel versehen, die Lappen eysförmig. Vaterl. Ostindien, 4

8. *Hedychium ellipticum* Smith. Rosc. mon. fl. 6, t. 45. Elliptisches Hedychium.

Stengel aufrecht, 4—5 Fuß hoch. Blätter breit, elliptisch-länglich-lanzettförmig, glatt. Blatthäutchen kurz, ausgekerbt, purpurroth. Ähre gipfelständig, dachziegelförmig, fast überhängend. Bracteen eysförmig, gespitzt, einblümig. Die äußern Corollentheile linienförmig, zurückgerollt, blaßgelb, die zwei innern keilsförmig, weiß. Lippe milchweiß, fast ungetheilt. Kürzer als der Staubfaden. Vaterl. Nepal, 4

9. *Hedychium gracile* Roxb. ind. p. 12. Dünnes Hedychium.

Stengel 3—4 Fuß hoch. Blätter lanzettförmig. Ähre gipfelständig, ausgebreitet. Blumen einzeln zerstreut stehend. Corolle weiß, die Theile linienförmig. Lippe gespalten, die Einschnitte halb-lanzettförmig. Staubfäden purpurroth. Vaterl. Ostindien. 4

10. *Hedychium speciosum* Wallich. Prächtiges Hedychium.

Stengel aufrecht, 4—6 Fuß hoch. Blätter länglich-lan-

zettförmig, fast wellenrandig. Mehrere gipfelförmig, groß, lang, büschelförmig, glatt, die Büschel gedrängt stehend, zweiblümig. Blumen blaßgelb, wohlriechend. Kelch die Corollenröhre scheidenartig halb umfassend. Die äußern Corollentheile linienförmig, die zwei innern keulenförmig. Lippe ungetheilt, gespißt. Staubfaden scharlachroth. Vaterl. Ostindien. 24

11. *Hedychium elatum* R. Brown. Hohes Hedychium.

Hed. elatum Bot. Reg. t. 526. Loddig. Bot. Cab. t. 856. Rosc. mon. pl. 5. t. 36.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 12—14 Fuß hoch und höher. Blätter breit-lanzettförmig, langgespißt, unten graugrün, zottenhaarig, 1—2 Fuß lang. Blattscheiden roth und zottenhaarig. Mehrere aufrecht, 18—20 Zoll lang und länger. Bracteen 3—4 blümig, äußere gewimpert, innere häutig, behaart. Kelch zottenhaarig. Corolle weiß. Die drei äußern Theile linienförmig, gelblich-weiß, die zwei innern feingekerbt. Lippe gespalten, weiß, an der Basis fleischroth, die Einschnitte gespalten. Staubfaden fleischroth. Vaterl. Nepal. 24

12. *Hedychium villosus* Wallich. Rosc. mon. pl. 11. t. 85. Zottenhaariges Hedychium.

Wurzel Sprossen treibend. Stengel aufrecht, 5—8 Fuß hoch. Blätter kurzgestielt, länglich-lanzettförmig, am Rande und an der Mittelrippe fast filzig. Blatthäutchen stumpf. Mehrere gipfelförmig, 6—10 Zoll lang, die Spindel eckig, zottenhaarig. Bracteen 2—3 blümig. Kelch zottenhaarig, wenig kürzer als die Corollenröhre. Corolle weiß, wohlriechend, die drei äußern Theile linienförmig, kaum grünlichgelb, die zwei innern linienförmig, an der Spitze ausgebreitet, ausgekerbt. Lippe länglich, tief gespalten, Staubfaden purpurroth. Vaterl. Bengalen. 24

13. *Hedychium spicatum* Smith. Mehren tragendes Hedychium.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 3 Fuß hoch und höher. Blätter kurz gestielt, lanzettförmig, unten fast silberfarbig-filzig, 12—15 Zoll lang. Blatthäutchen filzig. Mehrere dünn, gekrümmt, büschelförmig, 6—8 Zoll lang, die Büschel 2—3 blümig. Spindel glatt. Bracteen eiförmig, abgestutzt, filzig. Corolle schmutzig weiß, die drei äußern Theile linien-lanzettförmig, gleich. Lippe breit, zweilappig, umgekehrt-herzförmig. Der Staubfaden gelblich. Vaterl. Nepal. 24

(Abbild. Bot. Mag. 2300, Hooker exot. Pl. Loddig. Bot. Cab. 653. Rosc. mon. pl. 7. t. 53.)

14. *Hedychium thyrsiforme* Smith. Straußförmiges Hedychium.

Hed. heteromalum Ker. in Bot. Reg. t. 767. ?

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 4—6 Fuß hoch. Blätter elliptisch-länglich, mit fadenförmiger Spitze, wellenrandig, unten filzig. Scheiden purpurröthlich, zottenhaarig. Blatthäutchen stumpf. Die Blumen bilden eine dichte eiförmige Endähre, deren äußere Bracteen eingerollt und 2—3 blümig sind. Corollentheile weiß, an der Basis gelb, die äußeren zurückgeschlagen. Lippe tief, zweitheilig, kürzer als der Staubfaden, die Einschnitte lanzettförmig. Vaterl. Nepal. 4 (Abbild. Rosc. mon. pl. 8. t. 60.)

15. *Hedychium glaucum* Rosc. mon. pl. 1. t. 3. Graugrünes Hedychium.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 3—4 Fuß hoch und höher. Blätter kurzgestielt, lanzettförmig, langgespitzt, wellenrandig, unten grau- oder blaulichgrün. Blatthäutchen roth. Ähre dünn, an der Basis wenig niedergebogen. Bracteen einblümig, die innern durchscheinend. Corolle weiß, die drei äußern Theile linienförmig, zurückgeschlagen, die zwei inneren lanzettförmig, stumpf. Lippe tief gespalten, kürzer als der Staubfaden. Vaterl. Ostindien. 4

16. *Hedychium Gardnerianum* Rosc. mon. pl. 2. t. 13 Bot. Reg. t. 774.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 6—8 Fuß hoch, eines Fingers oder Daumens dick, an der Basis angeschwollen-zwiebelartig, roth, dann grün, glatt, mit Blattscheiden bedeckt. Blätter länglich- oder eiförmig-lanzettförmig, gespitzt, fast wellenrandig, glatt, 10—14 Zoll lang, 5—7 Zoll breit. Blatthäutchen kurz, stumpf, roth. Ähre gipfelständig, straff, fast sechsreihig, 6—10 Zoll lang. Spindel fast eckig. Blumen abstehend. Bracteen grün, glatt, zweiblümig, eingerollt, doppelt kürzer als die Corollenröhre. Corolle gelb, wohlriechend, die drei äußern Corollentheile linien-fadenförmig, herabhängend, mehr oder weniger gedreht, die zwei inneren lanzettförmig, an der Basis röthlich. Lippe fast kreisrund, oben gespalten, am Rande feingekerkelt, an der Basis verdünnt, rinnenförmig, scharlachroth. Der Staubfaden purpur- oder dunkel-scharlachroth, doppelt länger als die Lippe. Anthere läng-

lich, roth. Vaterl. Nepal. 2. Blüthz. im hiesigen bot. Garten im August.

17. *Hedychium carneum* Carey. Rosc. mon. pl. 12. t. 92. Fleischrothes Hedychium.

Wurzel fleischig. Stengel aufrecht, 5—7 Fuß hoch. Blätter zweireihig, lanzettförmig, feinspizig, unten, wie die Scheiden fast zottenhaarig. Aehre schlaff, niedergebogen. Bracteen eingerollt, 1—2 blümig. Corolle fleisch- oder incarnatroth, die drei äußeren Theile linienförmig, die zwei inneren elliptisch. Lippe zweilappig, kürzer als der Staubfaden. Vaterl. Ostindien, 2 (Abbild. Bot. Mag. 2637. Bot. Cab. 693.)

18. *Hedychium longifolium* Rosc. mon. pl. 1. t. 4. Langblättriges Hedychium.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 6—8 Fuß hoch, wie die Blätter grau- oder blaulichgrün. Blätter linien-lanzettförmig, 2—3 Fuß lang, mit langer fadenförmiger Spize, hell-punktirt. Blatthäutchen verlängert, weiß. Aehre ausgebreitet, 12—16 Zoll lang. Spindel stumpf, dreieckig, punktirt. Bracteen zweiblümig. Corolle roth, die drei äußeren Theile linienförmig, zurückgeschlagen, die zwei inneren oval. Lippe eiförmig, an der Spize gespalten, an der Basis rinnenförmig, kürzer als der Staubfaden. Vaterl. Ostindien. 2

19. *Hedychium acuminatum* Rosc. mon. pl. 2. t. 12. Langgespitztes Hedychium.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 3—4, mehr oder weniger zusammengedrückt. Blätter lanzettförmig, unten zottenhaarig. Aehre schlaff. Spindel fast dreikantig, punktirt. Bracteen einblümig, mucronenspizig. Corollentheile linienförmig, an der Basis pomeranzenfarbig, an der Spize gelb, die zwei inneren fast wellenrandig. Lippe länglich, tief gespalten, weiß, an der Basis pomeranzenfarbig, der Nagel rinnenförmig, die Lappen gespitzt. Staubfaden gekrümmt. Vaterl. Nepal. 2

20. *Hedychium Roscoi* Wallich. in Rosc. mon. pl. Roscoisches Hedychium.

Stengel aufrecht. Blätter lanzettförmig, abstehend, glatt. Aehre länglich, büschelförmig, die Büschel dreiblümig. Die inneren Corollentheile messerförmig. Lippe rautenförmig-rundlich, stumpf, gespalten, gefaltet, die Lappen stumpf. Vaterl. Nepal. 2

wechselnd stehend, eiförmig, langgespitzt. Blumen traubenständig. Vaterl. Sumatra. h

Hedycaria Forst. Linn. Suppl. Hedycarie f. Lexic. B. 4.

Blumen büschel. Kelch 8—10 spaltig. Antheren anstehend, an der Spitze bartig. Nuss einsamig.

1. *Hedycaria hirsuta* Spr.

Blätter länglich = eiförmig, buchtig = gekerbt, auf beiden Seiten behaart, an der Basis mit zwei Drüsen versehen. Vaterl. Bengalen.

Hedychium Koenig. Kranzblume f. Lexic. B. 4.

Kelch 2—3 theilig. Corolle verkehrt stehend, sechs theilig, die Nectarlippe gespalten. Der Staubfaden gegliedert, und trägt an der Spitze eine doppelte Anthere. Der Griffel fadenförmig, doppelt länger als der Staubfaden. Narbe trichterförmig. Kapsel dreifächerig, dreilappig, viel samig. Samen mit Mantelhaut.

Monandria Monogynia (Familie Scitamineen; Gruppe Alpineen.)

1. *Hedychium coronarium* König. f. Lexic. B. 4. (Abbild. Curt. bot. Mag. t. 708. Rosc. mon. pl. 10. t. 77. Loddig. Bot. Cab. 51.)

Wurzel knollig, ästig = faserig. Stengel aufrecht, einfach, rund, 6—8 Fuß hoch und höher, an der Basis rosenroth punkirt = gefleckt. Blätter stiellos, zwei Reihen bildend, lanzettförmig, lang und feingespitzt, obere 1—1½ Fuß lang, 2½ Zoll breit, die Blattscheiden den Stengel umfassend. Blumen weiß, wohlriechend, und bilden eine gipfelständige Aehre, deren Bracteen lederartig, 4—6 blüthig sind, und wie Dachziegeln über einander liegen. Corollenröhre doppelt länger als der Kelch, gekrümmt. Die äußern Theile linnen = lanzettförmig, innere schief, oval, wie die Lippe wellenrandig. Lippe groß, rundlich, fast umgekehrt = eiförmig, oben gespalten, in der Mitte mit zwei gelben Flecken versehen. Der Staubfaden etwa 1 Zoll lang, weiß, kürzer als die Lippe. Vaterl. Ostindien. 4 Blüth. Sommer.

2. *Hedychium maximum* Roscoe mon. pl. 4. t. 29. Großes Hedychium.

Wurzel knollig = ästig. Stengel aufrecht, 10—14 Fuß hoch. Blätter stiellos, länglich, unten sitzig. Die Blumen bilden eine gipfelständige Aehre mit häutigen Bracteen, welche dach-

ziegelförmig über einander liegen, stumpf und gewimpert sind. Kelch scheidenartig, dreitheilig, zottenhaarig, die Theile der Corolle weiß, in der Mitte gelblich; die äußeren gleich lanzett-liniensförmig, zurückgeschlagen, innere eiförmig. Lippe groß, zweilappig, gekerbt, oder wellenrandig. Staubfäden roth. Vaterl. Ostindien. ? 4

3. *Hedychium flavum* Roxb. ind. 1. p. 81. Rosc. mon. pl. 3. t. 19.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, grün, an der Basis braun. Blätter lanzettförmig, langgespitzt, unten fast stielig. Blumen gelb, wohlriechend, in eine gipfelständige 5—6 Zoll lange Aehre gesammelt. Bracteen meist dreiblümig, innere einblümig. Lippe umgekehrt-herzförmig, zweilappig, so lang als der Staubfaden. Vaterl. Bengalen. 4

4. *Hedychium flavescens* Carey. Rosc. mon. pl. 3. t. 20. Gelbliches Hedychium.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 6—8 Fuß hoch, an der Basis röthlich. Blätter lanzettförmig, lang, unten stielig-zottenhaarig. Blatthäutchen lang, häutig. Blumen gelblich, (blaugelb) wohlriechend, ährenständig, dachziegelförmig über einander liegend. Bracteen: äußere breit, sehr stumpf, gewimpert, innere 2—3 blümig, walzenrund. Kelch doppelt kürzer als die Corollenröhre. Die äußern Corollentheile gleich, liniensförmig, zurückgeschlagen, die zwei innern eiförmig, stumpf. Lippe breit, eiförmig, so lang als der Staubfaden. Vaterl. Indien. 4

5. *Hedychium angustifolium* Roxb. Corom. Schmalblättriges Hedychium.

Hedychium coccineum Wallich in Bot. Reg. t. 1209.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 5—6 Fuß hoch. Blätter linien-lanzettförmig, glatt, 15—18 Zoll lang, $1\frac{1}{2}$ Zoll breit, mit fadenförmiger Spitze. Blatthäutchen kurz, rosenroth. Blumenähre 6—12 Zoll lang. Bracteen häutig, zweiblümig, äußere cylindrisch, innere gespalten. Corolle ziegelförmig, die äußern Theile liniensförmig, zurückgeschlagen, die zwei innern länglich. Lippe zweilappig, kürzer als der Staubfaden. Vaterl. Bengalen. 4

6. *Hedychium coccineum* Smith. Rosc. mon. pl. 4. t. 28. Scharlachrothes Hedychium.

Wurzel und Stengel wie bei vorhergehender Art. Blätter

lanzettförmig, an beiden Enden verbünnt, grau- oder blaugrün, 6—8 Zoll lang. Blatthäutchen eiförmig, blasförmig-
roth. Blumenähre gipfelständig, 6—8 Zoll lang, die Spindel
zottenhaarig. Bracteen meist dreiblümig, äußere cylindrisch,
an der Spitze büschelhaarig, innere keilförmig, häutig. Corolle
scharlachroth, die äußern Theile linienförmig, zurückge-
schlagen gedreht, die innern fast elliptisch, wellenrandig. Lippe
zweilappig, mit einem langen keulenförmigen Nagel versehen.
Waterl. Nepal, 4

7. *Hedychium aurantiacum* Rosc. mon. pl. 6, t. 44.
Pomeranzenfarbiges Hedychium.

Hed. angustifolium Bot. Mag. 2078. H. coccineum
var. Buchan.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 3—5 Fuß hoch, in der
Jugend purpurrothlich. Blätter zweireihig, linien-lanzettförmig,
unten an der Mittelrippe zottenhaarig. Blatthäutchen
eiförmig, stumpf. Ähre gipfelständig, sechsreihig, dachziegel-
förmig. Bracteen 2—3 blümig, die innern einblümig, häu-
tig. Corolle sechsreihig, die drei äußern Theile linienförmig,
zurückgeschlagen, roth, die zwei innern linien-lanzettförmig.
Lippe pomeranzenfarbig, zweilappig, mit einem Nagel verse-
hen, die Lappen eiförmig. Waterl. Ostindien, 4

8. *Hedychium ellipticum* Smith. Rosc. mon. fl. 6. t.
45. Elliptisches Hedychium.

Stengel aufrecht, 4—5 Fuß hoch. Blätter breit, elliptisch-
länglich-lanzettförmig, glatt. Blatthäutchen kurz, ausgekerbt,
purpurroth. Ähre gipfelständig, dachziegelförmig, fast über-
hängend. Bracteen eiförmig, gespitzt, einblümig. Die äus-
sern Corollentheile linienförmig, zurückgerollt, blaßgelb, die
zwei innern keilförmig, weiß. Lippe milchweiß, fast ungetheilt.
kürzer als der Staubfaden. Waterl. Nepal, 4

9. *Hedychium gracile* Roxb. ind. p. 12. Dünnes He-
dychium.

Stengel 3—4 Fuß hoch. Blätter lanzettförmig. Ähre
gipfelständig, ausgebreitet. Blumen einzeln zerstreut stehend.
Corolle weiß, die Theile linienförmig. Lippe gespalten, die
Einschnitte halblanzettförmig. Staubfäden purpurroth. Wa-
terl. Ostindien. 4

10. *Hedychium speciosum* Wallich. Prächtiges Hedychium.

Stengel aufrecht, 4—6 Fuß hoch. Blätter länglich-lan-

zettförmig, fast wellenrandig. Aehre gipfelförmig, groß, lang, büschelförmig, glatt, die Büschel gedrängt stehend, zweiblümig. Blumen blaßgelb, wohlriechend. Kelch die Corollenröhre scheidenartig halb umfassend. Die äußern Corollentheile linienförmig, die zwei innern keulenförmig. Lippe ungetheilt, gespißt. Staubfaden scharlachroth. Vaterl. Ostindien. 4

11. *Hedychium elatum* R. Brown. Hohes Hedychium.

Hed. elatum Bot. Reg. t. 526. Loddig. Bot. Cab. t. 856. Rosc. mon. pl. 5. t. 36.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 12—14 Fuß hoch und höher. Blätter breit-lanzettförmig, langgespißt, unten graugrün, zottenhaarig, 1—2 Fuß lang. Blattscheiden roth und zottenhaarig. Aehre aufrecht, 18—20 Zoll lang und länger. Bracteen 3—4 blümig, äußere gewimpert, innere häutig, behaart. Kelch zottenhaarig. Corolle weiß. Die drei äußern Theile linienförmig, gelblich-weiß, die zwei innern feingekerbt. Lippe gespalten, weiß, an der Basis fleischroth, die Einschnitte gespalten. Staubfäden fleischroth. Vaterl. Nepal. 4

12. *Hedychium villosum* Wallich. Rosc. mon. pl. 11.

t. 85. Bottenhaariges Hedychium.

Wurzel sprossen treibend. Stengel aufrecht, 5—8 Fuß hoch. Blätter kurzgestielt, länglich-lanzettförmig, am Rande und an der Mittelrippe fast filzig. Blatthäutchen stumpf. Aehre gipfelförmig, 6—10 Zoll lang, die Spindel eckig, zottenhaarig. Bracteen 2—3 blümig. Kelch zottenhaarig, wenig kürzer als die Corollenröhre. Corolle weiß, wohlriechend, die drei äußern Theile linienförmig, kaum grünlichgelb, die zwei innern linienförmig, an der Spitze ausgebreitet, ausgekerbt. Lippe länglich, tief gespalten. Staubfaden purpurroth. Vaterl. Bengalen. 4

13. *Hedychium spicatum* Smith, Aehren tragendes Hedychium.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 3 Fuß hoch und höher. Blätter kurz gestielt, lanzettförmig, unten fast silberfarbig-silzig, 12—15 Zoll lang. Blatthäutchen filzig. Aehre dünn, gekrümmt, büschelförmig, 6—8 Zoll lang, die Büschel 2—3 blümig. Spindel glatt. Bracteen eiförmig, abgestutzt, silzig. Corolle schmutzig weiß, die drei äußern Theile linien-lanzettförmig, gleich. Lippe breit, zweilappig, umgekehrt-hersförmig. Der Staubfaden gelblich. Vaterl. Nepal. 4

(Abbild. Bot. Mag. 2300, Hooker exot. Fl. Loddig. Bot. Cab. 653. Rosc. mon. pl. 7. t. 53.)

14. *Hedychium thyrsiforme* Smith. Straußförmiges Hedychium.

Hed. heteromalum Ker. in Bot. Reg. t. 767. ?

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 4—6 Fuß hoch. Blätter elliptisch-länglich, mit fadenförmiger Spitze, wellenrandig, unten filzig. Scheiden purpurröthlich, zottenhaarig. Blatthäutchen stumpf. Die Blumen bilden eine dichte cyförmige Endähre, deren äußere Bracteen eingerollt und 2—3 blümig sind. Corollentheile weiß, an der Basis gelb, die äußeren zurückgeschlagen. Lippe tief, zweitheilig, kürzer als der Staubfaden, die Einschnitte lanzettförmig. Vaterl. Nepal. 4 (Abbild. Rosc. mon. pl. 8. t. 60.)

15. *Hedychium glaucum* Rosc. mon. pl. 1. t. 3. Graugrünes Hedychium.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 3—4 Fuß hoch und höher. Blätter kurzgestielt, lanzettförmig, langgespitzt, wellenrandig, unten grau- oder blaulichgrün. Blatthäutchen roth. Nehr dünn, an der Basis wenig niedergebogen. Bracteen einblümig, die innern durchscheinend. Cypolle weiß, die drei äußern Theile linienförmig, zurückgeschlagen, die zwei inneren lanzettförmig, stumpf. Lippe tief gespalten, kürzer als der Staubfaden, Vaterl. Ostindien. 4

16. *Hedychium Gardnerianum* Rosc. mon. pl. 2. t. 13 Bot. Reg. t. 774.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 6—8 Fuß hoch, eines Fingers oder Daumens dick, an der Basis angeschwollen-zwiebelartig, roth, dann grün, glatt, mit Blattcheiden bedeckt. Blätter länglich- oder ey-lanzettförmig, gespitzt, fast wellenrandig, glatt, 10—14 Zoll lang, 5—7 Zoll breit. Blatthäutchen kurz, stumpf, roth. Nehr gipfelständig, straff, fast sechsreihig, 6—10 Zoll lang. Spindel fast eckig. Blumen abstehend. Bracteen grün, glatt, zweiblümig, eingerollt, doppelt kürzer als die Corollenröhre. Corolle gelb, wohlriechend, die drei äußern Corollentheile linien-fadenförmig, herabhängend, mehr oder weniger gedreht, die zwei inneren lanzettförmig, an der Basis röthlich. Lippe fast kreisrund, oben gespalten, am Rande feingekerkelt, an der Basis verdünnt, rinnenförmig, scharlachroth. Der Staubfaden purpur- oder dunkel-scharlachroth, doppelt länger als die Lippe. Anthere läng-

lich, roth. Waterl. Nepal. 2 Blüßz. im hiesigen bot. Garten im August.

17. *Hedychium carneum* Carey. Rosc. mon. pl. 12. t.

92. Fleischrothes Hedychium.

Wurzel fleischig. Stengel aufrecht, 5—7 Fuß hoch. Blätter zweireihig, lanzettförmig, feinspizig, unten, wie die Scheiden fast zottenhaarig. Aehre schlaff, niedergebogen. Bracteen eingerollt, 1—2 blümig. Corolle fleisch- oder incarnatroth, die drei äußeren Theile linienförmig, die zwei inneren elliptisch. Lippe zweilappig, kürzer als der Staubfaden. Waterl. Ostindien. 2 (Abbild. Bot. Mag. 2637. Bot. Cab. 693.)

18. *Hedychium longifolium* Rosc. mon. pl. 1. t. 4, Langblättriges Hedychium.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 6—8 Fuß hoch, wie die Blätter grau- oder blaulichgrün. Blätter linien-lanzettförmig, 2—3 Fuß lang, mit langer fadenförmiger Spitze, hell-punktirt. Blatthäutchen verlängert, weiß. Aehre ausgebreitet, 12—16 Zoll lang. Spindel stumpf, dreieckig, punktirt. Bracteen zweiblümig. Corolle roth, die drei äußeren Theile linienförmig, zurückgeschlagen, die zwei inneren oval. Lippe eiförmig, an der Spitze gespalten, an der Basis rinnenförmig, kürzer als der Staubfaden. Waterl. Ostindien. 2

19. *Hedychium acuminatum* Rosc. mon. pl. 2. t. 12. Langgespitztes Hedychium.

Wurzel knollig. Stengel aufrecht, 3—4, mehr oder weniger zusammengedrückt. Blätter lanzettförmig, unten zottenhaarig. Aehre schlaff. Spindel fast dreikantig, punktirt. Bracteen einblümig, mucronenspizig. Corollentheile linienförmig, an der Basis pomeranzenfarbig, an der Spitze gelb, die zwei inneren fast wellenrandig. Lippe länglich, tief gespalten, weiß, an der Basis pomeranzenfarbig, der Nagel rinnenförmig, die Lappen gespißt. Staubfaden gekrümmt. Waterl. Nepal. 2

20. *Hedychium Roscoi* Wallich. in Rosc. mon. pl. Roscoisches Hedychium.

Stengel aufrecht. Blätter lanzettförmig, abstehend, glatt. Aehre länglich, büschelförmig, die Büschel dreiblümig. Die inneren Corollentheile messerförmig. Lippe rautenförmig-rundlich, stumpf, gespalten, gefaltet, die Lappen stumpf. Waterl. Nepal. 2

21. *Hedychium trilobum* Wallich in Rosc. mon. pl.
Dreilappiges Hedychium.

Blätter länglich = lanzettförmig. Aehre lang, wenigblüthig. Bracteen entfernt stehend, eingerollt, einblüthig. Lippe umgekehrt = herzförmig, dreilappig, der mittlere Lappen feingespitzt. Vaterl. Nepal. 4

Kultur. Die Scitamineen haben fleischige meist knollige perennirende Wurzeln und gedeihen am besten in warmen Häusern, denn sie kommen aus Tropenländern. In europäischen Gärten behandelt man sie auf zweierlei Art. 1) Alle Arten, die im Herbst einziehen (ein Kunstausdruck der Gärtner) d. h. deren Stengel welken und trocknen, z. B. die meisten der Gattungen *Costus*, *Globba*, *Alpinia*, *Ammum* u. a. werden aus dem Lohbeete gehoben, im warmen Hause auf eine Stellage gestellt und den Winter über trocken gehalten, dann im Februar und März wieder in frische Erde gesetzt und ins warme Lohbeet gebracht. 2) Die Pflanzen, welche einen höhern Wuchs haben, z. B. die meisten Hedychien werden im Herbst mit Ballen ausgehoben, in ein größeres Gefäß gesetzt und der Raum zwischen Gefäß und Erdballen mit frischer lockerer nährhafter Erde ausgefüllt, oder man theilt den Erdballen und nimmt zu gleicher Zeit die Wurzelknollen ab, die zur Vermehrung dienen sollen. In beiden Fällen müssen die neuversetzten Pflanzen in ein warmes Lohbeet gestellt und begossen werden, so oft die Erde des Wassers bedarf. Es versteht sich übrigens von selbst, daß das Lohbeet auch den Winter hindurch die erforderliche Temperatur erhalten, d. h. beständig warm sein muß. Das Versetzen in größere Gefäße kann auch zeitig im Frühjahr z. B. im Februar oder März geschehen, aber dann blühen sie später als diejenigen, welche im September und Oktober versetzt werden.

Nach dieser zweiten Methode werden die größeren und höheren Hedychien im hiesigen botanischen Garten behandelt, vornehmlich N. 1, 2, 12, 14, 16. u. a. Sie entwickeln ihre lieblichen Blumenähren im Sommer vom Juli bis September.

Synonymen.

Hedychium angustifolium Bot. Mag. f. *Hedychium aurantium* N. 7.

Hedychium coccineum Wall. f. *Hedychium angustifolium* N. 5.

Hedychium heteromallum Ker. f. *Hedychium thyrsiforme* N. 14.

Hedyosmum Swartz. *Hedyosmum*. (*Hedyosmon* Spr. Syst. Veg.) -

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 619.

Blüthen monöisch ♂ in nackten Köpfen; die Antheren sitzen nämlich ohne Kelch und Corolle an einer gemeinschaftlichen Spindel sehr dicht beisammen. ♀ Kelch einblättrig, dreizählig. Keine Corolle. Griffel einfach. Steinfrucht achseltig, einsamig, von dem anschwellenden saftigen Kelche bedekt.

Monoecia Polyandria (Familie *Amarantaceen*.)

Die Arten dieser Gattung sind harzige, wohlriechende Sträucher, oder kleine Bäume, deren Aeste und Blätter einander gegenüber stehen, die Aestchen gegliedert-knotig, die Blätter einfach, sägerandig. Blumenstiele winkels- und gipfelständig. Blumen aufsehend.

1. *Hedyosmum arborescens* et *nutans* Swartz. f. 1. Nachtr. B. 3.

2. *Hedyosmum hirsutum* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. VII. p. 164.

Aeste, Blattstiele und Scheiden behaart. Blätter länglich, an beiden Enden gespitzt, sägerandig, steif, glatt, nur unten an den Rippen behaart. Vaterl. Neugranada. ♀ Blüht. Oktober.

3. *Hedyosmum glabratum* Kunth. J. c. VI. p. 165.

Alle Theile glatt. Blätter länglich, fast langgespitzt, gezähnt, steif, mit zerstreuten Punkten. Fruchtstiele ästig. Früchte zu 2—4 beisammen. Vaterl. Neugranada. ♀

4. *Hedyosmum Bonplandianum* Kunth. J. c. VI. p. 165. t. 634—635.

Alle Theile glatt. Blätter länglich, langgespitzt, an der Basis keilförmig, sägerandig. Die männlichen Blumenstiele winkelsständig, gepaart, 1—3 ährig, die Aehren walzenrund. Die weiblichen Blumenstiele einzeln, winkels- und gipfelständig, 3—5 zählig. Früchte einzeln. Vaterl. Neugranada. ♀

Kultur. Gute lockere nährhafte Erde und warme Standörter. Fortpflanzung durch die Ausfaat der Samen und durch Stecklinge in warmen Beeten.

Hedyotis Linn. Ohrfling f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 620.

Kelch viertheilig. Corolle röhrig, vierspaltig. Staubfäden 4. Ein Griffel mit gespaltener Narbe. Kapsel zweiknöpfig, zweifächerig, vielseedig, an der Spitze, zwischen den Kelchzähnen aufspringend.

Tetrandria Monogynia (Familie Rubiaceen.)

Die Arten der Gattung Hedyotis sind Sträucher, Staudensträucher oder krautartige Pflanzen, oft gestreckt oder kriechend. Blätter zu zweien gegenüber stehend. Blumen winkelförmig und gipfelförmig, einzeln oder zu 2—3 oder doldentraubig.

† Fruticosae s. suffruticosae.

Sträucher oder Staudensträucher.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Vericon beschriebenen Arten: *H. conferta*, *filiformis*, *juniperifolia*, *thymifolia* R. et P. *H. rupestris* Sw. und folgende.

1. *Hedyotis ulmifolia* Roxb. Rüsterblättriger Ohrling.

H. lineata Roxb.? Don. fl. nepal. p. 154. ?

Aeste weitschweifig, behaart. Blätter ey-lanzettförmig, gefaltet, gerippt. Die Blumen bilden gestielte, winkelförmige Doldentrauben, die kürzer als die Blätter sind. Blumenstielechen meist dreiblümig. Kelchtheile sehr lang. Waterl. Nepal. h

2. *Hedyotis cordifolia* Spreng. Herzförmiger Ohrling.

Aeste faden-ruthenförmig, ausgebreitet. Blätter herzförmig, fast rundlich, geadert, glattlich. Blumenstiele dreispaltig. Blumen zu 3 stehend, gehäuft. Hierher gehört: *Rondeletia virgata* Swartz. f. Lexic. 1. Aufl. B. 8. S. 221. Waterl. Et. Domingo. h

3. *Hedyotis longiflora* Spr. Langblumiger Ohrling.

Oldenlandia longiflora Lamarck.

Rondeletia triflora Vahl. *R. pilosa* Sw. f. Lexic. B. 8.

Blätter länglich, geadert, auf beiden Seiten behaart. Blumenstiele meist dreiblümig. Corollenröhre sehr lang. Waterl. Et. Crucis und Monserrat. h

4. *Hedyotis discolor* Spr. ist *Rondeletia discolor* Kunth f. 1. Nachtr. B. 7. S. 226. daselbst sehr genau und ausführlich beschrieben.

5. *Hedyotis leucaphylla* Spr. ist *Rondeletia leucaphylla* Kunth. in Humb. et Bonpl. Noy. gen. f. 1. Nachtr. B. 7. S. 228.

6. *Hedyotis foetida* Spr. Hierher gehört *Oldenlandia foetida* Forstr. f. Lexic. B. 6.

7. *Hedyotis nitida* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. III. p. 392. Glänzender Ohrsling.

Stengel strauchig, sehr ästig, die Aeste gehäuft stehend, mit Blättern dicht besetzt. Blätter linienförmig, gespitzt, fleischig, am Rande zurückgerollt, glatt, glänzend. Blumen stiellos, einzeln, gipfelfständig. Vaterl. Neugranada, bei Santa Fe de Bogota. ♀ Blühz. Junius.

8. *Hedyotis serpens* Kunth J. c. 3. p. 390. t. 289.

Aeste viereckig, glatt, weitschweifig, gestreckt = kriechend. Blätter gestielt, rundlich-eiförmig oder elliptisch spitzlich, glatt, hart = dornig gefranzt. Blumen gestielt, einzeln winkelfständig. Vaterl. die Alpen in Peru. ♀

9. *Hedyotis laricifolia* Cavan. Parirblättriger Ohrsling.

Aeste ausgebreitet, zweitheilig. Blätter linienförmig, gespitzt, glatt. Blumenstiele winkelfständig, asterdoldentraubig. Vaterl. Chili. ♀

†† Herbaceae. Stengel krautartig.

Hierzu gehören die im Lexikon abgehandelten Arten: *H. auricularia*, *graminifolia*, *herbacea*, *pumila* Linn. *H. hispida* Reiz. *H. racemosa* Lam. *H. diffusa* Willd. und folgende.

A. Blumenstiele einblümig.

10. *Hedyotis serpyllifolia* Poir. Feldthymianblättriger Ohrsling.

Stengel krautartig, kriechend, scharfborstig. Blätter rundlich, glattlich. Blumenstiele winkelfständig, sehr kurz, fast einzeln. Früchte fast scharfborstig. Vaterl. Ins. Bourbon, 2?

11. *Hedyotis virginica* Spr. Hierher gehört: *Oldenlandia uniflora* Linn. f. Lexic. B. 6.

B. Pedunculi uniflori aggregati verticillati.

Blumenstiele einblümig, gehäuft, quirlförmig stehend.

12. *Hedyotis stricta* Wallich. Straffer Ohrsling.

H. gracilis Wall. *H. fusca* Don.

Stengel krautartig. Aeste zweitheilig, scharf. Blätter linienförmig, glatt. Asterblätter gefranzt. Blumenstiele zu 3 stehend, sehr lang, straff. Vaterl. Nepal.

13. *Hedyotis capensis* Lam. Hierher gehört: *Oldenlandia capensis* Lexic. 1. Aufl. B. 6.

Stengel krautartig, niederlegend, zottenhaarig. Blätter linienförmig, gespitzt. Blumenstiele winkelfständig, fast gehäuft, kürzer als die Blätter. Waterl. Kap d. g. Hoffn. 4?

14. *Hedyotis trinervia* R. et Schult. ist *Oldenlandia trinervia* Retz. s. Lexic. B. 6.

15. *Hedyotis ramosissima* Spr. Sehr ästiger Ohrling.
Oldenlandia ramosissima Dr. Fisch.

Stengel sehr ästig, weitschweifig. Blätter lanzettförmig, spitzlich, an der Basis verdünnt, glatt. Blumen fast stiellos, einzeln, winkelfständig.

16. *Hedyotis Crataegonum* Spr. (*H. geniculata* Roxb.)
siehe *Oldenlandia verticillata* Lexic. B. 6.

17. *Hedyotis glomerata* Elliott. (*Oldenlandia glomerata* Michx.)

Stengel krautartig. Blätter lanzettförmig, filzig. Blumenstiele gipfelfständig, geknault. Kapseln scharfborstig. Waterl. Nordamerika.

18. *Hedyotis capitata* Lam. Kopfförmiger Ohrling.

Stengel fast einfach, fast aufrecht. Blätter länglich, gespitzt, geädert, unten zottenhaarig. Blumenköpfchen gestielt, winkelfständig. Waterl. Ostindien.

19. *Hedyotis angustifolia* Schlechtend. *Linnaea* 4. Heft 2. p. 153.

Stengel krautartig, an der Basis ästig-dreitheilig. Blätter schmal, linienförmig, gespitzt, am Rande zurückgerollt, scharf. Blumen quirlkopfförmig-geknault. Kapsel scharfborstig. Waterl. Insula Luconia. ☉

C. Pedunculis tri-multifloris.

Blumenstiele drei — vielblümig.

20. *Hedyotis dichotoma* Cavan. J. c. VI. p. 53. t. 573.
Gabelästiger Ohrling.

Stengel krautartig, gabelästig. Blätter länglich-eyförmig, glatt, unten graugrün. Blumenstiele meist dreiblümig. Waterl. Manilla.

21. *Hedyotis umbellata* Lam. ist *Oldenlandia umbellata* Roxb.

Wurzel perennirend. Stengel krautartig, ästig, weitschweifig. Blätter linienförmig, am Rande zurückgerollt. Blumenstiele winkelfständig, doldenartig geknault. Uebrigens s. Lex. B. 6.

- B. 6. C. 427. R. 11. *Oldenlandia umbellata* Linn. Roxb. 24
22. *Hedyotis hirsuta* R. et Schult. ist *Oldenlandia hirsuta* Linn. f. Lexic. B. 6. *H. hispida* Roth. (nec Retz.) *H. indica* R. et Schult.
23. *Hedyotis aspera* Roth. Scharfer Ohrling.
Stengel dünn = fadenförmig, wie die Blätter warzig = blässig = scharf. Blätter linien = pfriemensförmig. Blumentrauben gipfelfständig, wenigblüthig. Vaterl. Ostindien. ☉
24. *Hedyotis scandens* Roxb. Kletternder Ohrling.
Stengel krautartig, kletternd, wie die Blätter glatt. Blätter breit = lanzettförmig, kurzgestielt. Die Blumen bilden dreitheilige rispenartige Doldentrauben. Vaterl. Ostindien.
25. *Hedyotis paniculata* Lam. Rispenartiger Ohrling.
Hedyotis multiflora Cavan. Jc.
Blätter gestielt, lanzettförmig, glatt. Blumen geknaut, inwendig gebartet, in gipfelfständige pyramidenförmige Rispen gesammelt. Vaterl. Java, China und Westindien.
26. *Hedyotis ovatifolia* Cav. Euförmiger Ohrling.
Stengel krautartig, abgekürzt. Blätter fast stiellos, euförmig, zottenhaarig, gewimpert. Blumenstiele rispenförmig, zweitheilig. Vaterl. Manila.
27. *Hedyotis media* Cav. Mittlerer Ohrling.
Blätter euförmig, wenig zottenhaarig, unten graugrün. Blumenstiele meist dreiblüthig, winkelfständig. Vaterl. Manila.
28. *Hedyotis ciliolatis* Torr. Wimperhaariger Ohrling.
Stengel krautartig, ästig. Blätter stiellos, spatelförmig, gewimpert. Blumenstiele dreitheilig. Vaterl. Ad Cataractas Niagara.
29. *Hedyotis laxa* Don. Schlaffer Ohrling.
Stengel krautartig, ästig, schwach, schlaff, glatt. Blätter euförmig, gesägt, auf beiden Seiten behaart. Blumenstiele winkelfständig, zweitheilig. Blumen meist zu 3 stehend. Vaterl. Nepal.
- Kultur. Die Sträucher, Staudensträucher und perennirende Arten pflanzt man in gute lockere Dammerde und stellt sie an einen ihrem Vaterlande angemessenen Ort. Fortpflanzung und Vermehrung durch die Ausfaat der Saamen, die Sträucher auch durch Stecklinge, in warmen Beeten. Man
- Dietz. Ver. 27. Nochr. IV. Bd. 9

Die einjährige gedeiht auch im freien Lande, wenn sie im Frühjahr z. B. im Mai aus dem Saamenbeete oder Saamen-näpfen an schattliche Stellen in guten Boden gepflanzt werden.

Synonymen.

- Hedyotis caracasana Kunth ist Hedyotis rupestris Sw.
f. Lexic.
- Cervantesii Bonpl. ist Hedyotis juniperoides
f. Lexic.
- corymbosa Spr. ist Hedyotis fruticosa L. f.
Lexic.
- cymosa Spr. ist Hedyotis lactea f. 1. Nachtr.
- fusca Don. f. Hedyotis stricta N. 12.
- geniculata Roxb. f. Hedyotis Crataegonum
N. 16.
- gracilis Walt. f. Hedyotis stricta N. 12.
- hispida Roth. f. Hedyotis hirsuta N. 22.
- hypnoides Humb. ist Hedyotis conferta Lex.
- indica R. et Sch. f. Hedyotis hirsuta N. 22.
- lanceolata Poir. ist Houstonia longifolia.
- lineata Roxb. f. Hedyotis ulmifolia N. 1.
- maritima Linn. f. Lexic. ist Oldenlandia
maritima Roth.
- microphylla Humb. ist Hedyotis filiformis
f. Lexic.
- multiflora Cav. f. Hedyotis paniculata N.
25.
- nervosa Lam. ist Hedyotis auricularia
Lexic.
- tuberosa Sw. ist Dunalia Spr.
- umbellata Walt. ist Houstonia purpurea.

Hedypnois Linn. Röhrleinfrant.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 621.

Blumendecke (Kelch) einfach, vielblättrig, an der Basis mit kleinen schuppenartigen Blättchen besetzt. Fruchtboden nackt. Die äußeren am Rande stehenden Saamen sind an der Spitze häutig gezähnt, fast spreuig, die mittleren auf der Scheibe tragen gekraunte (meist 5) Spreublättchen von Borsten umgeben.

Syngenesia I. Ordu. (Familie Compositae, Gruppe Cichoreen.)

Von dieser Gattung hat Sprengel in Syst. Veg. 3. p. 670. nur zwei Arten aufgenommen. Es sind folgende

1. *Hedypnois coronopifolia* Tenor. Schließblättriges Nährleintraut.

Wurzel ästig, faserig. Blätter länglich-spateelförmig, stumpf, tief gezähnt = geschlitzt, borstig. Schaft niedergebogen, oben stärker als unten, glatt. Blumen gelb. Kelchblätter wenig scharfborstig. Vaterl. Neapel und Sicilien.

2. *Hedypnois rhagadioloides* Linn. Willd. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 622.

Stengel ästig, blättrig, ästig = weitschweifig. Blätter alle länglich, umfassend, mehr oder weniger gezähnt, wenig behaart. Blumenstiele verdickt. Kelche wenig scharfborstig. Vaterl. SüdEuropa. ☉

Zu dieser Art gehört *Hyoseris rhagadioloides* Linn. f. Lexic. 1. Auflage. Auch folgende, die Willd. in Sp. pl. als besondere Arten aufgestellt hat, sind nur als Varietäten zu betrachten; *H. cretica*, *monspeliensis*, *mauritanica*, *pendula* f. 1. Nachtr. *H. persica* M. a B. *tubaeformis* Tenor. *laciniiflora* Viv. hat Sprengel auch als Varietäten angezeigt. *Hedypnois aculeata* Diet. ist *Hyoseris aculeata* Pers. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 40. *Thrinchia hirta* Roth.

Hedypnois Taraxaci Vill. ist *Apargia Taraxaci* Willd.

Hedysarum Linn. Hahnenkopf f. Lexic. B. 4.

Character genericus f. 1. Nachtr. B. 3. S. 623.

Kelch fünfspaltig. Corolle schmetterlingsförmig, das Schiffchen quer abgestumpft. Hülse zusammengedrückt, gegliedert, die Glieder rundlich.

Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflanzen; Gliederhüllen.)

Die zahlreichen Arten der Gattung *Hedysarum* sind strauchige, staudenstrauchige oder krautartige Pflanzen, die man im System nach der Gestalt der Hülsen und der Blätter eingetheilt und geordnet hat.

I. Genuina Sprengel Syst. veg. 3. p. 311.

† Foliis simplicibus. Blätter einfach.

1. *Hedysarum maculatum* Linn. Gefeckter Hahnenkopf.

Desmodium Perrottetii de Cand. var.

Stengel krautartig, dünn, fast fadenförmig, ästig. Blätter wechselnd stehend, gestielt, einfach, rundlich = eiförmig, stumpf, ganzrandig, glatt, oben mit hellgrünen oder weißlichen gelblichen Flecken versehen, unten blaßgrün, gerippt. Blü-

menstiel einzeln, winkels- und gipfelständig, fast traubig. Blumen klein, bläßblaulich. Hülse 5—10 gliederig, glatt. Uebrigens s. Lexic. 1. Aufl. B. 4.

2. *Hedysarum Oliverii* Spr. (*H. nummularifolium* Cand. nec. Linn.)

Traverniera nummularia Cand. legum. t. 52.

Stengel strauchig, grau = filzig. Blätter kreisrund, mucronenspitzig, graugrün. Die Blumen bilden schlaffe, wenigblühige Trauben. Waterl. Aßen, am Euphrat. h

3. *Hedysarum spartium* Linn. Pfriemenartiger Hahnenkopf.

Stengel laubenstrauchig. Blätter theils einfach, theils dreizählig. Blättchen linien = lanzettförmig, fast filzig. Blumenstiele winkelsständig, einblüthig. Hülse scharfborstig und besteht meist nur aus drei Gliedern. Die Beschreibung im Lexikon 1. Auflage kann gestrichen werden. Waterl. Ostindien und Persien. h

4. *Hedysarum angustifolium* Kunth. Schmalblättriger Hahnenkopf.

Stengel strauchig. Aeste ruthenförmig. Blätter schmal, linien = lanzettförmig, mucronenspitzig, unten filzig. Blumen in einzelnen Trauben, mit gewimperten Bracteen besetzt. Die Glieder der Hülse (1—6) rundlich, scharfborstig. Waterl. Mexiko. h

†† Foliis ternatis. Blätter dreizählig.

a. Hülse meist zweigliederig.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Hed. barbatum*, *biarticulatum* Linn. *H. squarrosum* Thunb. *H. lappaceum* Forsk. *H. lutescens* Poir. *H. stoloniferum* Rich. (s. 1. Nachtr.) und folgende Arten.

5. *Hedysarum strictum* Pursh. Straffer Hahnenkopf.

Stengel krautartig, aufrecht, glatt. Blätter dreizählig. Blättchen länglich = linienförmig, fast lederartig, glatt, netzaderig. Blumen in Trauben gesammelt, die winkels- und gipfelständige Rispen bilden. Gliederhülse scharfborstig. Waterl. Nordamerika.

6. *Hedysarum reptans* Poir. Schleicher Hahnenkopf.

Stengel kriechend. Blättchen eiförmig, stumpf, gerunzelt, unten fast zottenhaarig. Blumenstiele lang, traubenförmig. Gliederhülse scharfborstig. Waterl. St. Domingo.

7. *Hedysarum infractum* Spr. (*Desmodium infractum* Cand.)

Stengel edlig, knieartig gebogen. Blättchen und Afterblätter eyförmig, gelappt. Blumentrauben einfach, winkelfständig, filzig. Gliederhülle glatt. Vaterl. Mexiko.

8. *Hedysarum molliculum* Kunth. (*Heteroloma lanatum* Desv. Kunth. Synops.)

Stengel weitschweifig. Blatt und Blumenstiele weichhaarig. Blätter dreizählig. Blättchen unten behaart. Das Endblättchen fast kreisrund, wie die seitenständigen mucronenspitzig. Blumen violett, in schlaffen Trauben. Hülse zweigliederig, scharfborstig. Vaterl. Mexico, ?

9. *Hedysarum venustum* Kunth.

Nicolsonia venustula Cand.

Stengel standenstrauchig, aufrecht, wie die Blattstiele filzig. Blättchen länglich-elliptisch, unten graulich-seidenhaarig. Blumentrauben abgekürzt, stiellos, gipfelfständig. Kelche weichfilzig. Hülsen 1—3 gliedrig, scharfborstig. Vaterl. Cumana. ♀ Blühz. September.

10. *Hedysarum rhombifolium* Elliott.

Stengel krautartig, filzig. Blättchen rautenförmig, fast lederartig, nehpaderig = runzlich. Blumen rispenständig. Gliederhülle geadert, filzig. Vaterl. Carolina.

11. *Hedysarum lineatum* Michx.

Stengel krautartig, kriechend. Aeste mit grünen Linien versehen. Blätter fast stiellos. Blättchen rundlich, glattlich. Blumentrauben lang, schlaff, wenigblümig. Die Glieder der Hülse linsenförmig. Vaterl. Carolina. 4

12. *Hedysarum Wade* Vand.

Stengel standenstrauchig. Blättchen ey-lanzettförmig, gewimpert. Die Blumentrauben stehen den Blättern gegenüber, sind sehr lang, die Blumenstielen zu 3. Hülsen dreigliederig, scharf. Vaterl. Brasilien. ♀

b. *Articulis pluribus*. Hülse vielgliederig.

Hierher gehören die im Verikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *H. heterocarpon*, *gyrans*, *canadense*, *marilandicum*, *canescens*, *paniculatum*, *viridiflorum* Linn, *H. diffusum*, *cuspidatum*, *ciliare*, *obtusum*, *serotinum*, *dichotomum* Willd. *H. uncinatum* Jacq, *H. ascendens* Sw, *H. asperum* Poir. *H. polycarpon* Lam, *H. microphyllum* Thunb. und folgende.

13. *Hedysarum alopecuroides* Rouler. Langähriger Hahnenkopf.

Blätter dreizählig. Blättchen fast herz-eiförmig, wie die Nesselzottenhaarig. Blumen in winkelfständigen Aehren, deren Bracteen lanzettförmig und gerippt sind. Kelche behaart. Vaterl. Ostindien.

14. *Hedysarum coeruleo-violaceum* Meyer Fl. Essequib. p. 246. Blaubioletter Hahnenkopf.

Ein kleiner, sehr ästiger Strauch, 1 Fuß hoch und höher, dessen Aeste sich ausbreiten, unten glatt, oben filzig sind. Blättchen elliptisch, auf beiden Seiten zottenhaarig = filzig, unten grau. Afterblätter lanzett = pfriemensförmig, gewimpert, rostfarbig. Blumen in kopfförmigen gipfelständigen Trauben, deren Stiele behaart sind. Bracteen ey-lanzettförmig, gestreift, fast wimperhaarig. Kelchtheile lanzett = pfriemensförmig. Corolle klein, blau-violett. Hülse scharf, behaart. Vaterl. Guiana, im Sandboden (contin. et insulae Wacanama.) h Blüht daselbst vom October bis Februar.

15. *Hedysarum tuberculosum* Labill.

Wurzel knüpfig = knotig. Stengel strauchig. Blätter einfach und dreizählig. Blättchen umgekehrt-eiförmig. Afterblätter gespalten, feinspizig. Blumen in gipfelständigen aufrechten Trauben, die gehäuft stehen. Gliederhülse filzig. Vaterl. Neu-Caledonien. h

16. *Hedysarum sambyense* Don.

Stengel strauchig. Blättchen rundlich-oval, mucronenspizig, zottenhaarig, unten grau. Afterblätter lanzettförmig, mucronenspizig. Blumen in einseitigen Trauben. Der obere Einschnitt des Kelches ist größer als die übrigen, ausgekerbt. Vaterl. Nepal. h

17. *Hedysarum timorense* Spr. (*Desmodium timorense* Cand.)

Stengel strauchig. Blättchen rautenförmig, oben filzig, unten grau = zottenhaarig, das Endblättchen viel größer als die seitenständigen. Blumen in Trauben, die Rispen bilden. Hülse klein, filzig. Vaterl. Ins. Timor. h

18. *Hedysarum gyroides* Roxb.

Stengel strauchig. Blättchen elliptisch, wenig behaart, das Endblättchen größer als die seitenständigen. Blumen in zahlreichen Trauben, die Rispen bilden. Hülse behaart. Vaterl. Ostindien. h

19. *Hedysarum stipulaceum* Sess. (Desmodium stipulaceum Cand.)

Stengel aufrecht, ästig, behaart. Blättchen eiförmig. Austerblätter horizontal stehend, schief, eiförmig-lanzettförmig, langgespitzt, gewimpert. Trauben gipfelfständig, fast rispenartig. Vaterl. Mexico.

20. *Hedysarum Alamani* Spr. (Desmodium Alamoni Cand.)

Stengel aufrecht, eifig, ästig, glattlich. Blättchen eiförmig, gespitzt, glattlich. Austerblätter lanzettförmig, langgespitzt, ausgebreitet-zurückgeschlagen. Trauben gipfelfständig, die Blumenstiele gepaart, die untern Einschnitte des Kelches verlängert. Vaterl. Mexico.

21. *Hedysarum acuminatum* Michx. Langgespitzter Hahnenkopf.

Stengel krautartig, mit zerstreut stehenden Haaren bekleidet. Blättchen rundlich-rautenförmig, langgespitzt, unten wenig behaart. Die Blumen bilden eine langgestielte, sehr ästige Rispe, fast ohne Bracteen. Vaterl. Nordamerika.

22. *Hedysarum lagocephalum* Link. Enum. plant. hort. berol. 2. p. 240.

Stengel krautartig. Blättchen rundlich, unten behaart. Austerblätter lanzettförmig, gerippt. Blumen gelb, in eine gipfelfständige, zusammengezogene Rispe gesammelt, mit Bracteen besetzt. Blumenstiele und Kelche zottenhaartig. Die Einschnitte des Kelches lang, linienförmig. Hülse dreigliederig, behaart. Vaterl. Brasilien. 4

23. *Hedysarum portoricense* Spr. Portoricoischer Hahnenkopf.

Stengel krautartig, aufrecht, behaart. Blättchen länglich, stumpf. Austerblätter pfriemenspizig, abgekürzt. Blumenrispe gipfelfständig, ohne Bracteen. Die Glieder der Hülse netzaderig, filzig. Vaterl. Portorico. 4 ?

24. *Hedysarum tenellum* Spr. Barter Hahnenkopf.

Stengel krautartig, dünn, gestreckt. Aeste fadenförmig, wie die Blätter glatt. Blättchen eiförmig. Austerblätter borstenförmig. Blumentrauben gipfelfständig. Vaterl. St. Domingo.

+++ Foliis pinnatis. Blätter gefiedert.

Hierher gehören die im Verikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Hed. alpinum*, *obscurum*, *coronarium*,

flexuosum, *humile*, *spinosissimum*, *argenteum* Linn.
H. sennoides, *nitidum*, *varium* Willd. *H. micran-*
thon Poir. *H. fruticosum*, *tauricum* Pall. *H. palli-*
dum Desf. und folgende.

25. *Hedysarum boreale* Nuttall. Nördlicher Hahnenkopf.

Stengel krautartig, fast aufrecht. Blätter gefiedert. Blättchen länglich = umgekehrteiförmig, fast zottenhaarig. Afterblätter scheidenartig. Blumentrauben langgestielt, winkelfständig. Gliederhülse runzlich. Vaterl. Nordamerika, besonders das obere Louisiana. 4

26. *Hedysarum caucasicum* M. & Bieberst. Taurischer Hahnenkopf.

Stengel krautartig, aufrecht. Blättchen oval, geadert, unten wenig behaart. Blumen in langen winkelfständigen Trauben. Gliederhülse aufrecht, glatt. Vaterl. Kaukasus. 4

27. *Hedysarum Razumovianum* Dr. Fischer Cand.

Stengel krautartig, aufrecht. Blätter gefiedert. Blättchen länglich = linienförmig, auf beiden Seiten etwas filzig. Blumen ährenständig, die Aehre gestielt, länger als die Blätter. Die Glieder der Hülse grau, keglerig, fast gerunzelt. Vaterl. das asiatische Rußland, Gouvernement Orenburg.

28. *Hedysarum altaicum* Fisch. Altaischer Hahnenkopf.

Stengel krautartig, aufrecht. Blättchen elliptisch = länglich, unten mit angedrückten Härchen besetzt. Blumen ährenständig, die Aehren länger als die Blätter. Fruchtknoten zweigliederig, filzig. Vaterl. das Altai-Gebirge: Imaus (Gebirg in der großen Tartarei.) 4

29. *Hedysarum venustum* Fisch. Schöner Hahnenkopf.

Stengel krautartig, aufrecht. Blättchen elliptisch, auf beiden Seiten filzig, grau. Die lieblichen Blumen bilden längliche Aehren, die fast länger als die Blätter sind. Hülse zottenhaarig. Vaterl. Imaus. 4

30. *Hedysarum lasiocarpon* Ledeb.

Stengel krautartig, aufrecht. Blättchen ey = lanzettförmig, fast filzig. Blumen in langen winkelfständigen Trauben. Bracteen länger als die Blumenstielehen. Fähnchen und Flügel gleich. Gliederhülse behaart. Vaterl. Imaus. 4

31. *Hedysarum rtyidocarpon* Candolle.

Stengel aufsteigend. Blättchen elliptisch, stumpf, unten filzig. Blumentrauben eyförmig, gestielt. Die Flügel der

Corolle doppelt länger als der Kelch. Fährchen länger als das Schiffchen. Gliederhülse gerunzelt = nepartig. Waterl. Sibirien.

32. *Hedysarum splendens* Fisch. Ansehnlich scheineuder Fahnentopf.

Stengel abgekürzt. Blätter meist dreipaarig gefiedert. Blättchen eiförmig, silberfarbig = seidenhaarig. Blumenstiele schaftförmig, lang, traubig. Bracteen länger als die Blumenstielen. Flügel kürzer als der Kelch. Gliederhülse netzaderig, seidenhaarig. Waterl. Sibirien. 4

33. *Hedysarum ibericum* M. a Bieb. Iberischer Fahnentopf.

Stengel krautartig, ästig. Blättchen elliptisch, unten wenig behaart. Blumen in langen winkelfständigen Trauben. Corollenblätter fast gleich. Gliederhülse glatt, grau, nepaderig. Waterl. der westliche Theil des Kaukasus. 4

34. *Hedysarum candidum* M. a Bieb. Weißlicher Fahnentopf.

Hed. argenteum Willd. (nec. Linn. Suppl. f. Lexic. B. 4.)

Der Stengel ist sehr kurz oder fehlt. Blätter wurzelständig, gefiedert. Blättchen rundlich = eiförmig, silberweiß glänzend = seidenhaarig. Schaft und Blattstiele rauchhaarig. Kelch so lang als die Corolle. Gliederhülse gerunzelt, ästig, aber nicht scharf, wie bei *H. argenteum* Linn. Waterl. Kasan. 4

II. *Lomentis tortuosis*. (*Uraria* Desv. Lourea Neck.) Hülsen gedreht.

† *Folii ternatis*. Blätter dreizählig.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Verkon beschriebenen Arten: *H. tortuosum*, *trigonum*, *spirale* Sw. *H. molle* Vahl. *H. obcordatum* Poir. und folgende.

35. *Hedysarum arboreum* Hamilton. Baumartiger Fahnentopf.

Erythrina arborescens Roxb. Corom.

Stamm baumartig, ästig. Blätter dreizählig. Blättchen oval, eingedrückt, (fein ausgeleert) wie die Aestchen sehr rauchhaarig. Afterblätter herzförmig, umfassend, feinspizig. Blumen in langen Trauben mit Bracteen versehen, die schwarzborstig sind. Die Einschnitte des Kelches lanzettförmig, fiederig. Waterl. Nepal. 4

36. *Hedysarum Loureirii* Spr. (*Hed. reniforme* Lour. nec. Linn.)

Lourea reniformis Cand.

Stengel krautartig, gestreckt, glatt. Die untern Blätter einfach, nierenförmig, die obern dreizählig, langgestielt. Blumentrauben gipfelständig, wenigblümig. Vaterl. das südliche China.

III. *Lomentis moniliformis.*

Hülsen rosenkranzförmig.

Hierher gehören die im Lexikon und I. Nachtrage beschriebenen Arten: *Hed. Alhagi*, *umbellatum*, *moniliferum* Linn. und folgende.

37. *Hedysarum Hamiltonii* Spr. (*Manna nepalensis* Don.)

Stengel strauchig. Blätter einfach, umgekehrt-eiförmig, mucronenspizig, auf beiden Seiten silberfarbig-seidenhaarig. Blumenstiele abgekürzt. Vaterl. Nepal. h

38. *Hedysarum Pseudoalhagi* M. a Bieb. Unächter *Alhagi*; türkischer Fahnenkopf.

Stengel krautartig. Äste abstehend, fast dornig und mit kleinen Stacheln besetzt. Blätter einfach, spatel-lanzettförmig, glatt. Ackerblätter zurückgekrümmt. Blumenstiele winkelförmig, kurz, einblümig. Vaterl. Kaukasus und Kleinasien. 4

39. *Hedysarum adhaerens* Poir.

Stengel staudenstrauchig. Blätter einfach, fast herz-lanzettförmig, langgespitzt, glatt, nehabrig. Ackerblätter borstenförmig. Die Blumen bilden gipfelständige, überhängende Trauben. Gliederhülsen sehr behaart. Vaterl. Java. h

40. *Hedysarum leiocarpon* Spr.

Stengel strauchig. Blätter dreizählig. Blättchen länglich-eiförmig, stumpf, unten filzig. Blumen in gipfelständigen Rispen. Gliederhülsen glatt, zusammengedrückt, häutig. Vaterl. Brasilien. h

41. *Hedysarum podocarpon* Spr. (*Desmodium podocarpon* Cand.)

Stengel staudenstrauchig, filzig. Blätter dreizählig. Blättchen rauten-eiförmig. Ackerblätter pfriemenspizig. Blumen in langen Trauben. Blumenstielen gepaart. Vaterl. Nepal. h

IV. *Lomentis alterutra sutura rectilineis.* (Ae-

schynommenoides. Heteroloma Desv. Pleurolobus Jaum. (H. ar.) Spr. Syst. veg. 3. p. 317.

* Staminibus diadelpia. Staubfäden zweibrüderig.

† Foliis simplicibus. Blätter einfach.

Hed. gangeticum Linn. f. 1. Nachtr. B. 3. gehört hierher und folgende Arten.

42. *Hedysarum latifolium* Roxb. Breitblättriger Hahnenkopf.

Stengel strauchig, mit rothgelben Haaren bekleidet. Blätter einfach, breit, fast herz-eiförmig, ausgeschweift. Asterblätter halbherzförmig, feingespitzt. Die Blumen bilden gipfelständige Rispen, deren Aeste mit hakenförmigen Haaren besetzt sind. Vaterl. China. h

43. *Hedysarum lasiocarpon* Pal. Brown.

Stengel strauchig. Blätter länglich, stumpf, unten zottenhaarig. Asterblätter an der Spitze der Blattstiele blattförmig. Blumen in ährenförmigen gipfelständigen Trauben. Hülsen zottenhaarig. Vaterl. Guinea. h

44. *Hedysarum rubrum* Spr. Rother Hahnenkopf, ist *Ornithopus ruber* Lour. f. 1. Nachtr. B. 5. S. 427.

†† Foliis ternatis. Blätter dreizählig.

Hierher gehören die im Verikon beschriebenen Arten: Hed. nudiflorum, retroflexum, triflorum, repens Linn. H. incanum, axillare, supinum Sw. H. mauritianum Willd. H. caespitosum Poir. (f. 1. Nachtr.) und folgende.

45. *Hedysarum parvifolium* Spr. (*Desmodium parviflorum* Cand.)

Stengel krautartig, gestreckt, glatt. Blätter dreizählig. Blättchen klein, umgekehrtenförmig, ausgeleert, unten seidenhaarig. Blumen in winkelfständigen Trauben, die länger als die Blätter sind. Vaterl. Ins. Mascaren. 4

46. *Hedysarum Pryoni* Spr. (*H. viridiflorum* N. L. Burm. (nec. Linn.))

Stengel standensauchig, aufrecht, glattlich. Blättchen länglich, gespitzt, oben glatt, unten seidenhaarig, das Endblättchen größer als die seitenständigen. Blumentrauben winkelfständig, länger als die Blätter. Vaterl. Ostindien. h

47. *Hedysarum Roxburghii* Spr. (*Desmodium diffusum et laxiflorum* Cand.)

Stengel staudenstrauchig, aufrecht, walzenrund, glatt. Blättchen länglich, langgespitzt, oben glatt, unten filzig. Afterblätter lanzettförmig. Blumen langgestielt, fast gehäuft und bilden lange gipfelständige Trauben. Vaterl. Ostindien. h

48. *Hedysarum floribundum* Don. (*Desmodium floribundum* Cand.)

Stengel strauchig, aufrecht. Nester dreikantig, scharfborstig. Blättchen eiförmig, mucronenspizig, unten zottig-filzig. Afterblätter lanzettförmig, pfriemenspizig. Blumen gestielt, gehäuft, in vielblümige Trauben gesammelt. Vaterl. Nepal. h

49. *Hedysarum rufescens* Spr. Gelbrother Hahnenkopf.
Desmodium rufescens Cand.

Stengel strauchig. Nester walzenrund, mit gelbrothen Zottenhaaren bekleidet. Blättchen elliptisch-eiförmig, stumpf, mucronenspizig, oben glatt, unten filzig. Afterblätter lanzettförmig, lang-pfriemenspizig. Blumen in Trauben, die gipfelständige Rispen bilden. Vaterl. Ostindien. h

50. *Hedysarum concinnum* Spr. (*Desmodium concinnum* Cand.)

Stengel strauchig. Nester rund, filzig. Blättchen umgekehrteiförmig, mucronenspizig, parallel geadert-gerippt, unten filzig. Afterblätter linien-lanzettförmig. Trauben gipfelständig. Blumenstielen gepaart. Vaterl. Ostindien; Nepal. h

51. *Hedysarum laxum* Spr. (*Desmodium laxum* Cand.)

Stengel dreikantig, glattlich und windet sich. Blättchen länglich, langgespitzt, unten fast filzig, die seitenständigen halbherzförmig, das mittlere an der Basis verdünnt. Die Blumen bilden eine gipfelständige sehr schlaffe Rispe. Blumenstielen gepaart. Vaterl. Nepal. h?

52. *Hedysarum oxyphyllum* Spr. (*Desmodium oxyphyllum* Cand.)

Stengel strauchig, rund, aufrecht. Nester fast eckig, glatt. Blättchen länglich, langgespitzt, unten blaß, glatt. Afterblätter pfriemenspizig. Blumenstielen gehäuft, eine schlaffe gipfelständige Rispe bildend. Vaterl. Nepal. h

53. *Hedysarum varians* Labill.

Stengel krautartig, ästig, glatt. Blättchen mucronenspizig, untere elliptisch, obere länglich-linienförmig. Blumen

in gipfelständigen Trauben, die falcartig gebogen sind. Waterl. Neu = Caledonien.

** *Staminibus distinctis*. Staubfäden unterschieden; zertheilt. (*Adesmia* Cand. *Patagonium* Desv.) Stengel krautartig. Blätter alle gefiedert.

Hierher gehören die im Lexikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Hed. muricatum* Jacq. *H. punctatum*, *bicolor*, *brasiliense*, *falcatum*, *pendulum* Poir. und folgende.

54. *Hedysarum dentatum* Spr. Gezählter Pappenkopf.

Aeschynomene dentata Lagasc.

Stengel drüsig = zottenhaarig. Blätter gefiedert. Blättchen umgekehrteiförmig, ringschnitt = gezähnt, unten punktiert. Blumen in gipfelständige Trauben gesammelt. Hülsen weichstachlich. Waterl. das südliche Amerika.

55. *Hedysarum hispidulum* Spr. Feinborstiger Pappenkopf.

Aeschynomene hispidula Lagasc.

Stengel ästig = weisichweißig, feinborstig. Blättchen länglich, stumpf, mucronenspizig, fast ganzrandig. Blattstiel fast mit Gabelranken versehen. Hülsen schneckenförmig; aufgerollt. Waterl. wie vorige Art.

56. *Hedysarum papposum* Spr. Federborstiger Pappenkopf.

Aeschynomene papposa Lagasc.

Stengel krautartig. Blättchen ey = lanzettförmig, ganzrandig, glattlich. Blumen in gipfelständige Trauben gesammelt. Hülsen meist zweigliederig, federig = borstig. Waterl. Chili.

V. *Lomentis teretiusculis articulis oblongis subaequalibus*. (*Coronillae* *Desmodium* et *Alysicarpus* Desv.)

Gliederhülsen rundlich, die Glieder länglich, fast gleich.

† *Foliis simplicibus*. Blätter einfach.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon und ersten Nachtrage beschriebenen Arten: *Hed. styracifolium*, *reniforme*, *nummularifolium*, *triquetrum*, *vaginales*, *hupleurifolium* Linn. *H. velutinum*, *biflorum* Willd. *H. diversifolium* Poir. *H. gramineum* Retz. und folgende.

57. *Hedysarum Ammoxylon* Spr. Zeylanischer Hahnenkopf.

Ornithopodium zeylanicum Burm. Fl. zeyl. t. 82.
Bremontiera Ammoxylon Cand.

Stengel strauchig, aufrecht. Aestchen zusammengebrückt, wie die Blätter grau-silzig. Blätter einfach, länglich, an beiden Seiten und an den Enden verdünnt. Aestblätter sehr klein, gekippt. Die Blumen bilden einfache seitenständige Trauben. Vaterl. Seylon. h

†† Foliis ternatis. Blätter dreizählig.

Hierher gehören die im Exikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Hed. repandum* Vahl, *H. capitatum* Burm. *H. racemosum*, *caudatum* Thunb. *H. laburnifolium*, *salicifolium* Poir. *H. scorpiurus* Sw. *H. biflorum* Willd. und folgende.

58. *Hedysarum Rottleri* Spr.

Stengel krautartig, aufrecht. Blätter dreizählig. Blättchen groß, länglich, spizlich, unten fast strichborstig. Die Blumen bilden eine lange, weitschweifige, gipfelständige Rispe. Hülsen linienförmig, gekrümmt, glatt. (*H. lineare* Rottl.) Vaterl. Ostindien.

††† Foliis pinnatis. Blätter gefiedert.

59. *Hedysarum lineare* Lour. Linienförmiger Hahnenkopf.

Stengel staudenstrauchig, ästig, weitschweifig. Blätter gefiedert. Blättchen linien-lanzettförmig, glatt. Blumen in gipfelständige Aehren gesammelt. Hülsen gerade, glatt. Vaterl. Cochinchina. h

VI. Dubia. Zweifelhafte Arten, die noch einer genauern Beobachtung und Bestimmung bedürfen, welche vielleicht nur als Varietäten von andern längst bekannten Arten zu betrachten sind, oder andern zunächst verwandten Gattungen angehören.

Hed. tomentosum, *striatum*, *sericeum*, *virgatum* Thunb. *H. sagittatum* Poir. *H. incarnatum* Willd. *H. carnosum* Desf. *H. virginicum* Linn. (siehe Exikon und 1. Nachtr. B. 3.) gehören hierher und folgende neue Arten.

60. *Hedysarum terminale* Rich.

Stengel staudenstrauchig, ziemlich hoch. Blätter einfach, groß, unten silzig. Blumen in einer schuppen Rispe. Hülse gegliedert, das äußere Glied mit dem ausgebreiteten bleibenden Griffel versehen. Vaterl. Capenne. h

† Foliis ternatis. Blätter dreizählig.

61. *Hedysarum latisiliquum* Poir. Breithülfiger Hahnenkopf.

Stengel staudenstrauchig, kletternd. Blätter dreizählig. Blättchen ey-lanzettförmig, gespitzt, unten negaderig. Blumentrauben winkelförmig, abgekürzt, scharfborstig. Gliederhülse ausgebreitet-flach, glatt. Vaterl. Peru. ♀

62. *Hedysarum malacophyllum* Link Enum. plant. horti betol. 2. p. 247.

Stengel krautartig, aufrecht, behaart. Blätter dreizählig. Blättchen länglich, fast herzförmig, unten blaß, zottenhaarig. Ackerblätter lanzettförmig. Blumen in gipfelförmigen Rispen. Vaterl. Manila. 4

63. *Hedysarum laevigatum* Nuttall.

Stengel krautartig, wie die Blätter glatt. Blätter langgestielt. Blättchen eyförmig, gespitzt. Ackerblätter pfriemenspizig, hinfällig. Blumen rispenständig. Vaterl. Nordamerica. (Nov. Caesar.) 4

64. *Hedysarum dioecum* Don.

Stengel strauchig. Blättchen oval, stumpf, lederartig, unten grau-blaulich, filzig. Ackerblätter eyförmig, gespitzt. Blumentrauben winkelförmig, vielblüthig. Geschlechter getrennt. Vaterl. Nepal. ♀

65. *Hedysarum rigidum* Elliott. Steifer Hahnenkopf.

Stengel aufrecht, sehr ästig, filzig. Blättchen länglich, stumpf, negaderig, filzig. Die Blumen bilden ästige Rispen mit langgespizten Bracteen. Vaterl. Carolina. 4 ?

66. *Hedysarum Wallichianum* Spr. (*H. retusum* Don.)
Desmodium angulatum Cand.

Stengel staudenstrauchig. Aeste eckig, filzig. Blättchen eyförmig, spizlich, auf beiden Seiten seidenhaarig-zottig. Blumentrauben fast ährenförmig. Bracteen zottenhaarig, länger als die Blumen. Vaterl. Nepal. ♀

†† Foliis pinnatis. Blätter gefiedert.

67. *Hedysarum subspinosum* Dr. Fischer. Fast dorniger Hahnenkopf.

Stengel staudenstrauchig, aufrecht. Blättchen elliptisch. Aestchen, Blatt- und Blumenstiele stehen bleibend, fast dornig. Blumenähren gestielt, länger als die Blätter. Vaterl. Sibirien. ♀

Die übrigen Arten, welche ich im Verikon 1. Auflage B. 4. nach Linn. u. N. unter Hedysarum aufgeführt habe, z. B. *H. onobrychis*, *Caputgalli* *Cristagalli* u. a. gehören zur Gattung *Onobrychis* Tournef. siehe 2. Nachtr.

Kultur im Allgemeinen. Die Hahnenkopfsarten blühen größtentheils vom Juni bis August und September. Manche empfehlen sich durch die Schönheit ihrer Blumen und dienen zur Zierde der Gärten. Die in Europa, am Kaukasus, in Sibirien und Nordamerika wildwachsenden Arten gedeihen in unsern Gärten unter freiem Himmel und kommen fast in jedem Boden fort. Die übrigen, welche aus wärmeren Ländern kommen, überwintert man in Gewächshäusern (in warmen oder Glashäusern). Fortpflanzung durch Saamen, der von den in warmen Ländern einheimischen Arten ins Mistbeet oder in Saamentöpfe (Saamennäpfe) gesät wird; die letztern werden dann ins warme Beet gestellt. Die perennirenden durch Wurzeltheilung und die krauchartigen durch Stecklinge.

Synonymen.

Zu den im Verikon B. 4. und im 1. Nachtrage B. 3. S. 632. angezeigten Synonymen gehören noch folgende:

- Hedysarum alpinum* Jacq. ist *Hedysarum obscurum* Linn. f. Lexic.
 — argenteum Willd. f. *Hedysarum candidum* N. 34.
 — bracteosum Michx. ist *Hedysarum cuspidatum* f. Lexic.
 — caianifolium Kunth ist *Hedysarum supinum* Sw. f. Lexic.
 — cinereum Kunth ist *Hedysarum incanum* Sw. var. f. Lexic.
 — coriaceum Poir. ist *Hedysarum marilandicum* f. Lexic.
 — cylindricum Poir. ist *Hedysarum nummularium* f. Lexic.
 — erythrinaefolium Juss. ist *Hedysarum multiflorum* f. Lexic.
 — globellum Michx. ist *Hedysarum obtusum*.
 — glumaceum Vahl. ist *Hedysarum gramineum* f. Lexic.
 Hedy-

- Hedysarum incanum** Thunb. ist **Hedysarum incarnatum** f. Lexic.
- **lineare** Rottler. f. **Hedysarum Rottleri** N. 58.
- **lineatum** N. L. Burm. ist **Flemingia lineata** Roxb.
- **nummularifolium** f. **Hedysarum Oliverii** N. 2.
- **reniforme** Lour. f. **Hedysarum Loureirii** N. 36.
- **retusum** Don. f. **Hedysarum Wallichianum** N. 66.
- **rugosum** Willd. (Lexic.) ist **Hedysarum gramineum** Lexic.
- **sibericum** Lam. ist **Hedysarum fruticosum** Pall. Lexic.
- **strobiliferum** Lexic. ist **Flemingia strobilifera** R. Br.
- **violaceum** Forsk. ist **Hedysarum gramineum**.
- **viridiflorum** Burm. f. **Hedysarum Pryoni** N. 46.

Die übrigen Synonymen siehe die Gattung **Onobrychis** 2. Nachtr. **Hedysarum grandiflorum** Pallas ist eine selbstständige Art, die sich von **Hed. argenteum** Linn. Suppl. durch die Blättchen, durch die Gliederhülsen, die in der Mitte weichstachelig sind, und durch andere Merkmale unterscheidet, daher muß das Synonym **H. grandiflorum** bei **H. argenteum** im Lexic. 1. Aufl. ausgestrichen werden. In **Hed. grandiflorum** Pall. gehören als Synonymen. **H. sericeum** M. a Bieb. **Astragalus grandiflorus** Linn.

Heimia salicifolia Link ist **Nesaea salicifolia** Kunth.

Heisteria Linn. **Heisterie** f. Lexic, B. 4.

Reich fünfspaltig. Corolle fünfblättrig. Narbe dreispaltig. Steinfrucht einsamig.

Decandria Monogynia (Familie Santaleen?).

Diese Gattung hat Linné bestimmt und sie einem seiner eifrigen Gegner Herrn Dr. Lor. Heister zu Ehren **Heisteria** genannt. Heister (geb. 1683. † 1758.) war Wundarzt und Professor zu Helmstädt, hatte aber, wie Sprengel in der Geschichte der Botanik B. 2. S. 246. bemerkt, keine gründlichen botanischen Kenntnisse, gleichwohl tadelte er Lin-

Dieter. 2r. Nachtr. IV. Bd.

3

né's System und lieferte eine Schrift: „Meditationes et animadversiones in novum systema botanicum sexuale Linnaei.“ Helmstädt 1741. Uebrigens siehe Sprengel Geschichte d. Botanik a. a. O.

1. *Heisteria parvifolia* Smith. Kleinblättrige Heisterie.
Blätter eiförmig, gespitzt, hell = glänzend. Blumen winkelförmig. Fruchtkelch abstehend, tief gelappt. Vaterl. Sierra Leone. \bar{h}
2. *Heisteria cauliflora* Smith. Stammblumige Heisterie.
Blätter länglich = umgekehrteiförmig. Blumen am Stamm und Aesten stehend. Fruchtkelch geschlossen, tief gelappt. Vaterl. Guiana. \bar{h}
3. *Heisteria coccinea* f. Lexic. B. 4.

Kultur. Alle drei Arten verlangen warme Standörter, denn sie kommen aus Tropenländern. Man pflanzt sie in gute lockere Erde und vermehrt sie durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.

Helenium Linn. Helenie f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1 Nachtr. B. 3. S. 633.

Blüthendecke (Kelch) einblättrig, vieltheilig. Strahlblümchen keilförmig, meist dreispaltig. Fruchtboden nackt, nur am Rande mit wenig Spreublättchen besetzt. Saamentrone sprenig = grannenhartig.

Syngenesia 2. Ordn. (Familie Compositae.)

1. *Helenium autumnale* Linn.

Stengel aufrecht, oben ästig = rispenartig, 3—5 Fuß hoch. Blätter wechselnd stehend, am Stengel herablaufend, länglich = lanzettförmig, eingeschnitten = sägerandig, glatt. Kelchtheile zurückgeschlagen. Strahlblümchen flach, keilförmig, dreizählig, gerippt = gefaltet, an der Basis verdünnt. Scheibe halbkugelig. Uebrigens f. Lexic. Helen. pubescens Aiton ist eine Varietät.

2. *Helenium canaliculatum* Lamarck. Rinnenförmige Helenie.

Stengel krautartig, einfach, aufrecht. Blätter fast herablaufend, lanzettförmig, sägerandig. Strahlblümchen rinnenförmig. Vaterl. Nordamerika.

3. *Helenium mexicanum* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. IV. p. 299.

Stengel aufrecht, ästig. Blätter wechselnd stehend, herab-

tausend, linienförmig, ganzrandig, glattlich. Strahlblümchen gelb, zungenförmig, dreispaltig. Vaterl. Mexico und wird daselbst in bot. Gärten kultivirt. 4

4. *Helenium quadridentatum* Labill. Vierzähniige Helenie s. 1. Nachtr. B. 3.

Rudbeckia alata Jacq. Icon. rar. 3. t. 593.

Stengel ästig, weitschweifig, so wie die Blätter glatt, oben flebrig. Blätter wechselnd stehend, herablaufend, untere fiederspaltig, obere lanzettförmig, ganzrandig. Blumen gelb, kleiner als N. 1. Strahlblümchen flach. Scheibenblümchen vierzähniig. Vaterl. Nordamerika, Louisiana, am Mississippi = Flusse. ☉

5. *Helenium troliifolium* Spr. Neuspanische Helenie.

Eriophyllum troliifolium Lagasc.

Blätter wechselnd stehend, stiellos, grau, untere breitheilig, vielspaltig, obere linienförmig, ungetheilt. Blumenstiele einblümiig. Vaterl. Neuspanien. 4 ?

6. *Helenium oppositifolium* Spr. Paarblättrige Helenie.

Trichophyllum oppositifolium Nuttall.

Blätter zu 2 einander gegenüberstehend, gestielt, dreispaltig, grauslig, die Einschnitte linienförmig, stumpf, fast fleischig, 2—3 spaltig. Blumenstiele zweispaltig. Vaterl. Nordamerika, am Missouri = Flusse. 4 ?

7. *Helenium lanatum* Spr. Wollige Helenie.

Actinella lanata Pursh. Trichophyllum lanatum Nuttall.

Stengel, Blätter und Blumenstiele wollig = filzig. Blätter wechselnd stehend. Wurzelblätter handförmig = fiederspaltig, die Einschnitte lanzettförmig, fast gezähnt. Stengelblätter linienförmig, ganzrandig. Blumenstiele lang, einblümiig. Vaterl. Nordamerika.

8. *Helenium stoechadifolium* Spr. Stöckasblättrige Helenie.

Eriophyllum stoechadifolium Lagasc.

Blätter zerstreut stehend, linienförmig, stumpf, am Rande zurückgerollt, unten filzig. Blumen gipfelförmig, doldentraubig. Vaterl. Neuspanien. ☉ ?

9. *Helenium pumilum* Willd. Enum. Suppl. Niedrige Helenie. Eine Varietät von N. 1. ?

Stengel niedrig, einfach. Blätter fast herablaufend, läng-

lich, fast ganzrandig. Kelchblätter abstehend. Waterl. Nordamerika.

Kultur. N. 3. wird im Glashause oder in einem andern frostoffreien Behälter überwintert, eben so N. 5., wenn es eine perennirende Pflanze ist; die übrigen Arten gedeihen im freien Lande und dienen zur Bierde der Gärten. Man vermehrt sie durch die Aussaat des Saamens, die perennirenden Arten auch durch Wurzeltheilung. Siehe Lexic. B. 4.

Heleochloa alopecuroides Host. f. *Crypsis alopecuroides*.

Heleochloa schoenoides Host. f. *Crypsis schoenoides* I. Nachtr.

Helia oblongifolia Mart. ist *Lisianthus spathus* Bonpl.

Helianthemum Tournef. Sonnenrose; Sonnenröschen. (*Cistus* Linn. u. a.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. C. 633.

Kelch fünftheilig, ungleich, die 2 äußeren Theile kleiner als die übrigen. Corolle, Staubfäden und Griffel wie bei *Cistus* Linn. Kapsel einfächerig, dreiklappig. Die Samen an der innern Wand der Klappen angeheftet.

Polyandria Monogynia (Familie Tiliaceen.)

Diese Gattung enthält jetzt 105 Arten, die Sprengel im Syst. veg. nach ihrer Dauer, nach dem Stande des Griffels der Ackerblätter und der Blumenfarbe geordnet hat. Es sind theils Sträucher oder Staudensträucher, theils krautartige Pflanzen. Die Blätter stehen zu 2 einander gegenüber, mit oder ohne Ackerblätter; bei einigen Arten stehen die Blätter auch wechselnd, fast zerstreut oder büschelförmig. Die meisten blühen im Sommer. Die Arten, welche in ältern botanischen Schriften und in diesem Lexikon B. 3. unter *Cistus* Linn. vorkommen, aber hierher gehören, habe ich im ersten Nachtrage B. 3. angezeigt. Hier folgen nur die neuen Arten, welche nach der Erscheinung des 1. Nachtrags entdeckt und bestimmt worden sind.

I. *Stylo recto abbreviato; floribus luteis* Spr.

Griffel gerade, abgekürzt. Blumen gelb.

* *Exstipulata, foliis trinervis.*

Die Ackerblätter fehlen. Stengelblätter dreirippig.

† *Suffruticosa.* Staudensträucher.

Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Lexikon unter *Cistus* beschriebenen Arten: *Helianthemum Libanotis*, *atriplicifolium*, *halimifolium* Willd. *H. ocimifoli-*

um, scabrosum, lasiantum, involuocratum, cheiranthoides Pers. H. umbellatum Mill. und folgende.

1. *Helianthemum rugosum* Dun. Runzliches Sonnenröschen.

Cistus alyssoides β. Lam.

Stengel staudenstrauchig. Aeste filzig. Blätter umgekehrt-eiförmig, fast schief, am Rande gekräuselt, fast gezähnt, auf beiden Seiten gerunzelt = filzig. Blumenstiele gipfelständig, kürzer als die Blätter. Kelche borstig = behaart. Vaterl. das westliche Frankreich und Portugal. ♀ Diese Art ist mit *H. alyssoides* Vent. Lam. (f. 1. Nachtr. B. 3. S. 654.) zunächst verwandt, aber durch die vorstehenden Kennzeichen zu unterscheiden.

2. *Helianthemum algarviense* Dunal. (*Cistus algarviensis* Sims. *Cistus elongatum* Vahl? Lexic. 2 Aufl. B. 3.)

Blätter eif. lanzettförmig, behaart = schlaff, unten, wie die Aeste, grau. Blumenstiele ästig, fast rispenartig, wie die Kelche zottenhaarig. Vaterl. Portugal. ♀

†† Herbacea. Krautartige, ohne Asterblätter.

Helianthemum globularifolium, *plantagineum*, *inconspicuum*, *brasiliense* Pers. *H. Tuberaria*, *guttatum* Mill. *H. punctatum* Willd. *H. corymbosum*, *carolinianum*, *canadense* (f. 1. Nachtr.) gehören hierher und folgende.

3. *Helianthemum bupleurifolium* Dun. Hasenohrblättriges Sonnenröschen.

Cistus bupleurifolius Lamarck.

Wurzelblätter länglich, wenig behaart. Stengelblätter lanzettförmig, langgespitzt, glatt, glänzend, gestielt. Blumen fast doldentraubig, kürzer als die Blattstiele. Kelche filzig. Vaterl. Spanien. 4

4. *Helianthemum heterodoxon* Dun.

Stengel krautartig. Aeste scharfborstig. Blätter stiellos, länglich = lanzettförmig, filzig = borstig; die obersten stehen wechselseitig. Blumen sehr kurz gestielt, fast wie Dachziegeln übereinander liegend; die äußeren Corollenblätter scharfborstig, den Bracteen gleichend. Vaterl. Afrika und Spanien.

5. *Helianthemum glomeratum* Lagasc. Quasblühiges Sonnenröschen.

Stengel fast staudenstrauchig. Blätter länglich = lanzettförmig.

mig, an der Basis verdünnt, unten grau. Blumenstrahlen winkelförmig, vielblüthig, kürzer als die Blätter. Vaterl. Neuspanien. 4 h

6. *Helianthemum rosmarinifolium* Pursh. Rosmarinblättriges Sonnenröschen.

Stengel krautartig, einfach. Blätter lineenförmig, am Rande zurückgerollt, unten filzig. Blumen gehäuft stehend, und bilden winkelförmige unterbrochene Trauben. Vaterl. Nordamerika. 4

II. Stylo recto stamina aequante: floribus luteis. Griffel gerade, so lang als die Staubfäden. Blumen gelb.

* Exstipulatae. Die Ackerblätter fehlen.

Helianthemum petiolatum f. I. Nachtrag und folgende Art.

7. *Helianthemum lunulatum* Cand. Mondförmiges Sonnenröschen.

Cistus lunulatus Allion.

Stengel staudenstrauchig, ästig. Blätter länglich-umgekehrteiförmig, unten grau. Blumen fast traubenständig. Corollenblätter gelb, an der Basis mondformig gezeichnet. Vaterl. die Alpen in Südeuropa. h

** Stipulata. Mit Ackerblättern.

Hierher gehören die im ersten Nachtrage angezeigten Arten: *Hel. aegyptiacum* Mill. *H. ledifolium*, *niloticum*, *salicifolium*, *villosum* Pers. *H. Laguneum* Lag. und folgende.

8. *Helianthemum micranthum* Spr. (*Cistus micranthus* Viviani.)

Stengel staudenstrauchig, wie die Blätter sternhaarig-filzig. Blätter lineenförmig, am Rande zurückgeschlagen. Kelchtheile gerippt, länger als die Corollenblätter. Wächst bei den großen Sandbänken im nördlichen Afrika. h

III. Stylo basi inflexo. Floribus luteis.

Griffel an der Basis eingebogen. Blumen gelb.

† Capsula pilosa, foliis stipulatis.

Kapseln behaart. Blätter mit Ackerblättern versehen.

* Suffruticosae. Stengel staudenstrauchig.

Helianthemum canariense Willd. *H. ellipticum*, *Lippi*, *sessiliflorum* Pers. (f. I. Nachtr.) gehören hierher, und folgende Arten.

9. *Helianthemum lanuginosum* Spr. (*Cistus lanuginosus* Viv.)

Stengel staudenstrauchig, ästig, wie die Blätter, mit Wolse dicht bekleidet. Blätter elliptisch. Die Blumen bilden einseitige Trauben. Kelchtheile so lang als die Corollenblätter. Vaterl. das nördliche Afrika. †

10. *Helianthemum ruficomum* Spr. (*Cistus ruficomus* Viv.)

Stengel staudenstrauchig, ästig, wie die Blätter sternhaarig = filzig. Blätter elliptisch, graulich. Blumen gehäuft, traubenständig. Kelche mit gelbrothen scharfen Vorsten dicht besetzt. Vaterl. das nördliche Afrika. (Bei den großen Sandbänken.) †

11. *Helianthemum cahiricum* Delil. (*Cistus stipulatus* β. Forsk.)

Stengel sehr ästig. Blätter umgekehrteypförmig, am Rande zurückgerollt, grau. Die Blumen bilden einseitige Trauben. Corollenblätter an der Spitze zusammenhängend. Vaterl. Aegypten. †

12. *Helianthemum confertum* Dun.

Stengel ästig. Aeste und Blätter filzig. Blätter länglich-lanzettförmig, stumpf, unten grau. Blumen stiellos, in dichte einseitige Trauben gesammelt. Vaterl. Teneriffa. †

13. *Helianthemum mucronatum* Dun. Mucronenspißiges Sonnenröschen.

Stengel fast aufrecht. Blätter elliptisch = eypförmig, mucronenspißig, oben sternhaarig = filzig, unten grau = filzig. Blumen traubenständig, kurzstielig. Vaterl. Teneriffa. †

†† Capsula glabriuscula meiosperma patula.
Kapsel glattlich.

* Suffruticosa. Exstipulata.

Staudenstrauchige, ohne Austerblätter.

Zu dieser Abtheilung gehören die im 1. Nachtrage beschriebenen und angezeigten Arten: *Hel. Fumana* Mill. *H. molle*, *organifolium*, *cinereum*, *italicum*, *marifolium*, *vinale* Pers. *H. dichotomum*, *canum* Dun. und folgende.

14. *Helianthemum ericoides* Dun. Heidenartiges Sonnenröschen.

Cistus ericoides Cavan. Jc.

Stengel staudenstrauchig. Blätter wechselnd stehend, halbo

eylindrisch, abgekrümmt, glattlich, wie Dachziegeln über einander liegend. Blumenstiele einzeln, gipfelständig, überhängend. Vaterl. Spanien und Nepal. ♀

15. *Helianthemum procumbens* Dun. Gestrecktes Sonnenröschen.

Stengel staudenstrauchig. Aeste lang, gestreckt, bestäubt. Blätter wechselnd stehend, linienförmig, strichborstig. Blumenstiele winkelförmig, kürzer als die Blätter. Vaterl. das südliche Europa. ♀

16. *Helianthemum alpestre* Cand. Alpen-Sonnenröschen.

Blätter länglich-elliptisch, stumpflich, abstehend, behaart, oben grün, unten weißlich. Corollenblätter ganzrandig, doppelt länger als der Kelch. Vaterl. die Alpen im mittlern Europa. ♀

Hierher gehört *Cistus alpestris* Cranz und *H. oelandicum* Jacq. austr. t. 399. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 638. Dasselbst müssen die Synonymen: *Cistus oelandicus* Lex. und *Cistus lunulatus* All. ausgestrichen werden.

17. *Helianthemum oelandicum* Cand. (*Cistus oelandicus* Linn. f. Lexic. B. 3.)

Blätter länglich-lanzettförmig, glatt, an der Basis gewimpert. Blattstiele behaart. Blumentrauben wenigblüthig. Kelchtheile fast so lang als die Corollenblätter, die ausgekerbt sind. Vaterl. die Ins. Oeland. ♀

18. *Helianthemum panicillatum* Don. Pinselförmiges Sonnenröschen.

Blätter grün, am Rande und an den Rippen scharfborstig: untere gestielt, eiförmig; obere fast stiellos, länglich-liniensförmig, größer als die untern. Blumen sehr klein. Vaterl. das südliche Frankreich und Spanien. ♀

** *Suffruticosa stipulata*.

Staudenstrauchige mit Austerblättern.

α. *Floribus luteis*.

Blumen gelb.

Hierher gehören die im 1. Nachtrage aufgeführten Arten: *Helian. arabicum*, *laeve*, *lavandulaefolium*, *polyanthum*, *squamatum*, *stochatifolium*, *croceum*, *glaucum*, *acuminatum*, *angustifolium*, *hirtum*, *glutinosum*, *crassifolium*, *thymifolium* Persoon. *H. vulgare* Gaertn. *H. surreianum*, *serpyllifolium*, *nummularium* Mill. *H. sulfureum* Willd. und folgende.

19. *Helianthemum viride* Tenor. Grünes Sonnenröschen.

Stengel standenstrauchig. Blätter büschelförmig stehend, linienförmig, glattlich. Austerblätter pfriemenförmig, kürzer als die Blätter. Blumenstiele traubig, einseitig, wie Kelche zottenhaarig-klebrig. Vaterl. Sicilien. h

20. *Helianthemum juniperinum* Lagasc. Wachholderartiges Sonnenröschen.

Blätter linien-pfriemenförmig, gewimpert, und stehen zu 2 gegenüber, auch zu 3. Austerblätter pfriemenspizig. Blumenstiele traubig, wie die Kelche zottenhaarig-klebrig. Vaterl. Spanien. h

21. *Helianthemum Barrelieri* Tenor. Barrelierisches Sonnenröschen.

Aeste und Blätter zottenhaarig. Blätter linien-lanzettförmig, stumpf, an der Basis verdünnt. Austerblätter pfriemenförmig, aufrecht. Blumenstiele wenigblümig, wie die Kelche behaart. Vaterl. Neapel und Sicilien. h

22. *Helianthemum rubellum* Presl. Rothblättriges Sonnenröschen.

Blätter rundlich-eiförmig, gespitzt, oben glatt, dunkelroth, unten weiß-silzig. Blumen in Trauben, die herabhängen. Kelche behaart. Vaterl. Sicilien. h

23. *Helianthemum paniculatum* Don. Rispenartiges Sonnenröschen.

Blätter rundlich-eiförmig, stumpflich, oben grün, unten grau. Blumen in gegenüberstehenden Trauben, die Rispen bilden. Vaterl. Spanien und Sicilien. h

24. *Helianthemum Broussoneti* Dun. Broussonetisches Sonnenröschen.

Blätter kurzgestielt, länglich-lanzettförmig, stumpflich, auf beiden Seiten silzig. Austerblätter linienförmig, fast schiffelförmig. Blumentrauben abgekürzt. Kelchtheile gefärbt. Vaterl. Teneriffa. h

25. *Helianthemum tomentosum* Dun. Filziges Sonnenröschen.

Cistus tomentosus Scopol.

Aeste aufsteigend. Blätter länglich, am Rande zurückgerollt, oben grün, glattlich, unten sternhaarig-grau-silzig. Blumen in schlaffen Trauben. Kelchtheile gefärbt, gefurcht. Vaterl. Kärnten. h

Dieses Sonnenröschen scheint nur eine Varietät von unserem *H. vulgare* zu seyn. — Sprengel (Syst. Veg.) hat *Cistus* Smith citirt und England als Vaterland angegeben, aber in Smith's Flora britan. ed. J. J. Roemer 1804 ist kein *Cistus tomentosus* angeführt.

26. *Helianthemum leptophyllum* Dun.

Blätter kurzgestielt, länglich-liniensförmig, am Rande zurückgerollt, an der Basis verdünnt, oben glattlich, unten aschgrau-filzig. Ackerblätter pfriemensförmig. Blumen in langen schlaffen Trauben. Kelche wenig behaart. Vaterl. Spanien. h

27. *Helianthemum Lagascae* Dun. Lagascaisches Sonnenröschen.

Blätter liniensförmig, stumpf, grün, behaart, am Rande zurückgerollt. Ackerblätter flach. Blumenstielchen scharfborstig. Kelche glänzend, an den Rippen gewimpert. Vaterl. Spanien. h

β. *Floribus albis rubrisve.*

Blumen weiß oder roth.

Hierher gehören die im 1. Nachtrage beschriebenen und angezeigten Arten: *Hel. apenninum*, *lineare*, *ciliatum*, *foetidum*, *mutabile*, *polifolium*, *pulverulentum*, *racemosum*, *striatum*, *pilosum*, *violaceum*, *virgatum* Pers. und folgende Arten.

28. *Helianthemum syrticum* Spr. (*Cistus syrticus* Viv.) Straffes Sonnenröschen.

Stengel staudenstrauchig. Aeste ausgesperret. Blätter liniensförmig, wie die Ackerblätter scharfborstig, unten graulich. Blumen traubenständig, weiß oder röthlich. Wächst bei den großen Sandbänken im nördlichen Afrika. h

29. *Helianthemum hispidum* Dun. (*Cistus hispidus* Lam. Brot.)

Blätter länglich, stumpflich, fast mucronenspizig, am Rande zurückgerollt, oben scharfborstig, unten grau. Blumen rosenroth. Kelche scharfborstig. Vaterl. Portugal. h

30. *Helianthemum maioranæfolium* Cand. Majorana-blättriges Sonnenröschen.

Blätter länglich-eyförmig, spizlich, am Rande zurückgerollt, oben grün, behaart, unten grau-filzig. Kelche sehr rauchhaarig. Vaterl. das südliche Frankreich. h

Kultur. Die Saamen von den ausländischen Sonnenröschen, welche in wärmern Ländern als unser deutsches Klee-

ma ist; wird wachsen und in Gewächshäusern überwintert werden, sät man in Blumentöpfe oder Saamennäpfe, die mit leichter guter Damm-, Laub- oder Erdenerde gefüllt sind, und stellt diese nach vollendeter Aussaat in ein Mistbeet oder an einen andern ihrem Vaterlande angemessenen Ort. Außerdem lassen sich die Staudensträucher auch durch Stecklinge und die perennirenden Arten durch Wurzeltheilung vermehren und fortpflanzen.

Synonymen.

- Helianthemum arcuatum* Presl. ist *Helianthemum roseum* var. f. 1. Nachtr.
 — *aureum* Presl. ist *Helianthemum hirtum* Pers. f. 1. Nachtr.
 — *coriaceum* α. β. Pers. ist *Hemistemma Commersonii* et *Aubertii*.
 — *eriocaulon* Dun. ist *Helianthemum guttatum* var. f. 1. Nachtr.
 — *nudicaule* Dun. ist *Helianthemum croceum* var. f. 1. Nachtr.
 — *obovatum* Dun. ist *Helianthemum italicum* f. 1. Nachtr.
 — *savi* Bertol. ist *Helianthemum arabicum* f. 1. Nachtr.

Helianthus Linn. Sonnenblume f. Lexic. B. 4.

Character generic, f. 1. Nachtr. B. 3. S. 646.

Blüthendecke (Kelch) geschuppt, die Schuppen dachziegelförmig gelagert, meist sparrig. Fruchtboden flach, sprengig. Strahlblümchen zungenförmig, geschlechtslos. Saamen mit zwei Spreublättchen gekrönt.

Syngenesia 3 Ordn. (Familie Compositae.)

I. Fruticosa. Strauchige.

† Foliis plerisque alternis. Blätter meist wechselnd stehend.

Helianthus quinqueradiatus Cav. f. 1. Nachtr. gehört hierher und folgende Arten.

1. *Helianthus microphyllus* Kunth in Humb. et Bonpl., Nov. gen. et spec. pl. IV. p. 173. t. 375. Kleinblättrige Sonnenblume.

Ein sehr ästiger Strauch, etwa 2 Fuß hoch. Äste und Blätter stehen wechselsweise. Äste walzenrund, gefurcht, unbehaart, in der Jugend seidenhaarig = wollig, weißlich.

Blätter gehäuft, in der Jugend fast bachlegelförmig gelagert, fast stiellos, länglich, stumpf, ganzrandig, ledevartig, dicklich, am Rande zurückgerollt, oben mit Strichborsten besetzt, unten graufilzig, 4—5 Linien lang. Blumen einzeln, gipfelfständig, so groß wie die Blumen der gemeinen Masliebe. (*Helianthus perennis* L.) Blumenstiele übergebogen. Blümchen alle gelb. Strahlblümchen zungenförmig, geschlechtslos. Saamen keilsförmig, zusammengedrückt, behaart, schwärzlich. Vaterl. Peru. ♀ Blühz. Septemb.

2. *Helianthus argenteus* Kunth J. c. t. 376. Silberfarbige Sonnenblume.

Dieser sehr ästige Strauch wird fast 2 Klafter hoch und hat runde gefurchte Aeste, die in der Jugend mit zarter weißer Wolle bekleidet sind. Blätter kurzgestielt, lanzettförmig, gespitzt, ganzrandig, dreirippig, oben seidenhaarig, grün, unten weißfilzig, 2 Zoll lang, 4 Linien breit. Blumenstiele einzeln, gipfelfständig, etwa so groß wie die Blumen der *Inula britannica* L. Blumenstiele fast 2 Zoll lang, wollig-behaart. Kelch halbkugelig, vielschuppig, auswendig wollig-seidenhaarig. Blümchen alle gelb. Strahlblümchen (etwa 15) zungenförmig, flach, dreizählig. Saamen länglich-linienförmig, zusammengedrückt, braun, mit zwei grannenartigen Spreublättern gekrönt. Vaterl. die hohen Gebirge der Andeskette in Quito, bei Los Paredones. ♀ Blühz. Julius.

3. *Helianthus verbesinoides* Kunth J. c. Werbesnaartige Sonnenblume.

Ein sehr ästiger, 3—4 Fuß hoher Strauch, dessen Aeste und Blätter wechselnd stehen. Aeste gestreift, wollig. Blätter gestielt, ey-lanzettförmig, langgespitzt, ganzrandig, dreirippig, unten seidenhaarig-filzig, grau, 1—2 Zoll lang, an der Basis $\frac{1}{2}$ Zoll breit. Blumenstiele winkelf- und gipfelfständig, letztere fast doldenartig gestellt, aufrecht, 6—8 Linien lang, behaart-filzig. Blümchen alle gelb. Strahlblümchen (etwa 10) zungenförmig, flach, elliptisch, vietrrippig, undeutlich dreizählig, drüsig-punktirt, 2 Linien lang. Vaterl. Peru. ♀ Blühz. August.

II. Herbacei. Krautartige.

Zu dieser Abtheilung, mit krautartigem Stengel und meist wechselnd stehenden Blättern gehören die im Lexikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Helianthus annuus*, *multiflorus*, *altissimus*, *giganteus*, *angustifolius* Linn.

H. tubaeformis Jacq. *H. mollis*, *macrophyllus* Willd. und folgende.

4. *Helianthus aureus* Kunth l. c. IV. p. 176. Goldfarbige Sonnenblume.

Stengel krautartig, aufrecht, ästig, 2—3 Fuß hoch. Aeste edig, borstig = zottenhaarig. Blätter gestielt, länglich; an beiden Enden verdünnt, fast ganzrandig, oben behaart, unten mit grauer Wolle bekleidet; die obern stehen wechselseitig. Blumen einzeln, gipfelständig, langgestielt. Scheibenblümchen gelb. Strahlblümchen pomeranzenfarbig. Vaterl. Südamerika, besonders Quito auf trockenen Hügeln. 4 Blühz. Julius.

5. *Helianthus truxillensis* Kunth l. c. p. 175. Truxilloische Sonnenblume.

Stengel krautartig, aufrecht. Aeste und Blätter wechselnd stehend. Blätter fast stiellos, länglich = lanzettförmig, gespißt, an der Basis gerundet, ganzrandig, geadert = dreifach gerippt, scharf, besonders auf der Oberfläche, kaum 2 Zoll lang, 7—8 Linien breit. Blumen einzeln, gipfelständig, gestielt, die Stiele gefurcht, aufrecht, oben scharfborstig. Blümchen alle gelb. Strahlblümchen (12—15) zungenförmig. Vaterl. Peru, am Meerstrande, bei Truxillo. 4 Blühz. Oktober.

6. *Helianthus undulatus* Dietr. Wellenblättrige Sonnenblume.

H. caule herbaceo erecto, foliis longe petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis subundulatis asperis, floribus solitariis terminalibus, squamis anthodii sub squarrosis D.

Helianthus petiolaris Barcl. et Hortulan.?

Stengel krautartig, aufrecht, etwa so dick wie der Stiel einer Taubenseide, unten einfach, oben wenig ästig, 3—4 Fuß hoch, wie die Blattstiele scharf punktiert. Blätter wechselnd stehend, lang gestielt, ey = lanzettförmig, langgespißt, meist wellenrandig, an der Basis verdünnt, unten gerippt, auf beiden Seiten scharf, die untern 3 Zoll lang, 12—15 Linien breit, der Stiel so lang als das Blatt. Die obern Stengel und Astblätter kleiner als die untern. Blumen einzeln, gipfelständig. Kelchschuppen linien = lanzettförmig, gespißt, die äußeren abstechend = sparrig. Strahlblümchen gelb, zungenförmig. Scheibenblümchen braun, fast schwarzpurpurroth. Vaterl. Indien? ☉ Blühz. Septemb.

Im hiesigen bot. Garten wird der Saame ins Mistbeet

gesät; die jungen Pflanzen werden dann im Mai oder so bald kein Frost mehr zu fürchten ist, an einer sonnenreichen Stelle ins freie Land gepflanzt. 1—2 Grad Reaumur. Frost ist dieser Pflanze eben so nachtheilig als den Georginen u. a. daher ist zu vermuthen, daß sie aus warmen Ländern kommt.

7. *Helianthus trilobatus* Link Enum. 2. p. 352. Dreilappige Sonnenblume.

Stengel krautartig, aufrecht, oben sehr ästig, 2—3 Fuß hoch und höher, mit abstehenden Borstenhaaren besetzt. Blätter langgestielt, dreilappig, der mittlere Lappen größer als die seitenständigen, alle spizig sägerandig, scharfborstig. Kelchblätter fast gleich, lang behaart, 11 äußern gespizt, zurückschlagen. Strahlblümchen zungenförmig, kurz. Waterl. Mexico. 24

†† Foliis plerisque oppositis.

Blätter meist zu 2 einander gegenüberstehend.

Hierher gehören die im Perikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Hel. decapetalus*, *frondosus*, *strumosus*, *divaricatus*, *atrorubens* Linn. *H. pubescens* Vahl. *H. prostratus* Willd. und folgende.

8. *Helianthus membranifolius* Poir. Hautblättrige Sonnenblume.

Stengel krautartig, aufrecht, behaart. Blätter gestielt, eiförmig, langgespizt, fast sägerandig, häutig, scharf. Blumenstiele winkelförmig, dreiblümig. Kelchschuppen angebrückt, glattlich. Waterl. Capenne. 24 ?

9. *Helianthus cornifolius* Kunth l. c. IV. p. 175. Hartriegelblättrige Sonnenblume.

Stengel aufrecht, ästig, 3 Fuß hoch. Aeste fastedig, borstig. Blätter gegenüber auch wechselnd stehend, gestielt, länglich-elliptisch, langgespizt, an der Basis gerundet, entfernt und undeutlich gezähnt, geädert, dreifach gerippt, unten scharfborstig, 3 Zoll lang, 16—17 Linien breit. Blumen einzeln, gipfelsändig, langgestielt. Blümchen alle gelb. Strahlblümchen (etwa 30) lanzett-zungenförmig, an der Spitze ausgekerbt-zweizählig. Waterl. Mexico, bei Santa Rosa de la Sierra. 24 ? Blühz. Septemb. Oktob.

10. *Helianthus parviflorus* Kunth l. c. IV. p. 174. t. 378. Kleinblumige Sonnenblume.

Helianth. micranthus Spr. Syst. veg. 3. p. 618.

Stengel aufrecht, ästig, gestreift, wie die Aeste mit rückwärts stehenden scharfen Borsten besetzt, 2 Fuß hoch. Blätter stiellos, länglich-liniensförmig, fast ganzrandig, geadert, scharf, unten blaß, 6—8 Linien lang, die untern stehen zu 2 einander gegenüber, die Astblätter wechselnd. Blumen einzeln, gipfelsändig, so groß wie die Blumen der *Matricaria Chamomilla* L. Kelch halbkugelig-glockig, scharfborstig. Blümchen alle gelb. Strahlblümchen (etwa 8 an der Zahl) zungenförmig, länglich, dreizählig. Vaterl. Mexiko, bei Santa Rosa. 4 Blühz. Septemb.

Helianthus parviflorus Bernh. ist wahrscheinlich eine Kulturpflanze und nur als Varietät von *H. decapetalus* oder einer andern Art zu betrachten.

11. *Helianthus pauciflorus* Nuttall. Wenigblümige Sonnenblume.

Stengel dreitheilig, glatt. Blätter fast quirlförmig stehend, linien-lanzettförmig, langgespitzt, sägerandig, unten sitzig. Kelchschuppen eiförmig, angebrückt. Vaterl. Nordamerika, Louisiana. 4

12. *Helianthus longifolius* Poir. Langblättrige Sonnenblume.

Stengel krautartig, rispenartig getheilt, wie die Blätter glatt. Aeste wenigblümig. Blätter lang, fast stiellos, lanzettförmig, dreifach gerippt, ganzrandig, die untern sägezählig. Die äußern Kelchschuppen liniensförmig, sparrig. Vaterl. Georgien. 4 ?

13. *Helianthus salicifolius* Otto et Albert Dietrich allg. Garten = Zeitung 1834. N. 43. Weidenblättrige Sonnenblume.

Stengel, mehrere aus einer Wurzel, krautartig, aufrecht, einfach, glatt, gefurcht, walzeurund, braun, blau, bereift, über 10—12 Fuß hoch. Blätter stiellos, gegenüber, auch wechselnd stehend, liniensförmig, an beiden Enden verdünnt, fast wellenrandig, undeutlich gezähelt, bogenförmig überhängend, 7—9 Zoll lang, 4 Linien breit. Blumen langgestielt, am obern Theile des Stengels winkelsändig, fast doldentraubig. Kelch länglich, ziegelschuppig, glatt. Strahlblümchen gelb, zungenförmig, abstehend, etwa 1 Zoll lang. Scheibblümchen röhrig, fünfspaltig. Die Einschnitte brann. Fruchtboden flach, spreuig. Vaterl. Nordamerika, am Missouri-Flusse. 4 Blühz. im bot. Garten bei Berlin im Oktober 1834. zum ersten Male im freien Lande. Uebrigens siehe

Die Anleitung zu ihrer Kultur in der oben erwähnten Gartenzeitung.

Eine Anleitung zur Kultur der Sonnenblumen, welche in unsern Gärten unter freiem Himmel gedeihen, s. Lexic. B.

4. Die Arten aus Peru und Mexico überwintert man in Gewächshäusern, und vermehrt sie durch Saamen, die Sträucher auch durch Stecklinge.

Synonymen.

In den Synonymen im 1. Nachtrage B. 3. S. 651. gehören noch folgende.

- Helianthus canescens** Michx. (nec. Juss.) f. **Helianthus pubescens** Vahl. f. 1. Nachtr.
- **crinitus** Nutt. ist **Helianthus giganteus** L. var. f. Lexic.
- **dentatus** Cav. f. 1. Nachtr. f. **Viguiera dentata** Spr.
- **doronicoides** Lam. ist **Helianthus decapetalus** f. Lexic.
- **lenticularis** Lindl.? ist **Helianthus annuus** L. var.
- **micranthus** Spr. f. **Helianthus parviflorus** N. 10.
- **missuricus** Spr. ist **Helianthus atrorubens** f. Lexic.
- **petiolaris** Barcl. f. **Helianthus undulatus** N. 6.
- **prostratus** Poir. (nec. Willd.) f. **Sanvitalia helianthoides**.
- **pubescens** Bot. reg. ist **Helianthus mollis** Willd. f. 1. Nachtr.
- **squarrosus** Kunth ist **Helianthus linearis** Cav. f. 1. Nachtr.
- **trachelifolium** Willd. Hort. f. 1. Nachtr. ist **Helianthus decapetalus**.
- **virgatus** Lam. ist **Helianthus altissimus** L. f. Lexic.

Helicanthera Lour. Fl. Chin. et Cochinchin.

Kelch abgestuft, gefärbt, von Schuppen unterstüzt. Corolle doppelt, beide fünfspaltig. Staubfäden 5, im Schlunde der Corolle eingefügt. Antheren spiralförmig. Narbe einfach. Beers einfaamig.

Pen-

Pentandria Monogynia.

1. *Helicanthera parasitica* Lour.

Ein schmarogender Strauch, mit lanzettförmigen glatten Blättern, und ährenständigen Blumen. Er wächst in Cochinchina auf Baumstämmen? ist aber in unsern bot. Gärten noch nicht kultivirt worden. Im 1. Nachtrage habe ich diesen Strauch unter *Helicia* aufgeführt, muß aber daselbst gestrichen werden, denn *Helicia* Lour. gehört zu *Rhopala* Aub.

Helichrysum stoloniferum Don. ist *Elichrysum nepalense* Spr.

Helicia cochinchinensis Lour. ist *Rhopala robusta* Roxb.

Helicomycetes Link.

Cryptogamia Sect. V. (Familie Byssoides.)

1. *Helicomycetes roseus* Link.

Dieser Bauchfadenpilz besteht aus sehr vielen kleinen spiralförmig gewundenen gegliederten Faden, die röthlichen Massen bilden und auf Baumstämmen vegetiren. (Abbild. im Berliner Magazin B. 3. t. 1. f. 35.)

Heliconia Linn. *Heliconie* f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 652.

Blumenscheiden zweireihig. Corolle zweilippig. Oberlippe zweitheilig, die untere rinnenförmig. Nectarium zweiblättrig, an der Spitze dreispaltig, die Geschlechtstheile einhüllend. Sechs Staubfäden, davon aber einer fehlschlägt und kürzer als die übrigen ist. Kapsel dreikantig, dreifächerig; jedes Fach enthält einen Saamen.

Pentandria Monogynia (Familie Museen.)

1. *Heliconia Psittacorum* Linn. Suppl. 158.

Stengel einfach, rund, glatt. Wurzelblätter gestielt, lanzettförmig, an der Basis gerundet, 1 Fuß lang. Stengel wechselnd stehend, klein, stiellos. Kolben gerade, ohne Bracteen. Blumenstiele 4—5, winkelförmig, kurz, einblüthig. Blumen bunt, gelb und roth. Die Theile der obern Corollenlippe lanzettförmig, dreiseitig, die Unterlippe schmal, rinnenförmig, an der Spitze braun gefleckt. Die fünf fruchtbaren Antheren linienförmig, so lang als die Corolle. Antheren aufrecht. Griffel dreiseitig. Narbe gespitzt. Kapsel dreieckig, stumpf, glatt. Waterl. Südamerika, am Magdalena = Flusse u. a. D. 24

Dietr. Ver. 2r Nachtr. IV. Bd.

U a

In Hinsicht auf Wuchs und Anstand gleicht diese Art einer *Canna* (Blumenrohr). Abgebildet finden wir sie in Trattinnich's Thesaur. bot. t. 20. Dr. Fischer Comment. Mosqu. I. P. t. 1. 4. f. H. Redoute Lili. 3. t. 150. Andrew's Repos. t. 124.

2. *Heliconia Swartziana* Roem. et Schult. Syst. veg. V. p. 591. Schwarze Heliconie.

Helic. Psittacorum β . glabra foliis lanceolatis ellipticis acuminatis, spathis erectis lanceolatis Curtis Bot. Mag. t. 502.

Stengel rund, gerade, glatt, oben nackt, unten mit Blättern besetzt. Diese sind gestielt, lanzettförmig, elliptisch, an der Basis gerandet, glatt, glänzend. Blattscheiden häutig. Kolben gipfelständig, knieartig gebogen. Blumenscheiden lanzettförmig. Die Blätter des Nectariums lanzettförmig, vertieft (hohl) ungetheilt. Vaterl. Jamaica in Wäldern und an Bergen. 4

Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden durch einen höhern Stengel, der oben nackt ist, durch den gebogenen Kolben und durch andere Merkmale.

3. *Heliconia brasiliensis* Hooker. Brasilische Heliconie.

Stengel (Schaft) aufrecht. Blätter länglich-herzförmig. Das obere Blatt des Nectariums zusammengerollt. Vaterl. Brasilien. 4

4. *Heliconia buccinata* Roxb. Stengellose Heliconie.

Der Stengel ist sehr kurz oder fehlt. Wurzelblätter lanzettförmig, glänzend. Zwischen (in der Mitte) der Blätter erhebt sich der wurzelständige Kolben, der knieartig gebogen und sitzig ist. Blumenscheiden zweireihig, ausgesperret. Die Nectarblätter gespißt. Vaterl. die moluckischen Inseln.

Heliconia lingulata, *rostrata* und *subulata* Ruiz et Pav. f. I. Nachtr. B. 3. S. 652. Syst. veg. ed. Roem. et Schult. V. p. 592. hat Sprengel im Syst. veg. nicht aufgenommen, auch im Register nicht angezeigt, eben so *Helic. Swartziana*. Aus diesen und mehreren Thatfachen geht deutlich hervor, wie flüchtig Sprengel gearbeitet, manche Arten weggelassen, dagegen andere aufgestellt hat, die nur als Varietäten zu betrachten sind. Zum Beweise des Gesagten können einige an Arten reiche Gattungen dienen, z. B. *Erica*, *Galium*, *Gnaphalium*, *Hedysarum* u. a.

Kultur. Die Heliconien behandelt man in unsern Gär-

ten wie die Museen und andere zu dieser Familie gehörende Gewächse, die aus Tropenländern kommen. S. Perizon erste Auflage B. A, S. 570.

Synonymen.

Heliconia alba Linn. f. *Strelitzia augusta*.

Heliconia humilis Jacq. f. Lexic. B. 4. ist *Heliconia*
Bihai L. var. ?

Helicosporium Nees a Esenb.

Cryptogamia Sect. V. 3. *Bissoidei*.

1. *Helicosporium vegetum* Nees fung. t. 5. f. 66.

Fadenpilz einfach, aufrecht, schwarzlich. Fruchthäufchen grün-gelblich. Wächst auf Holz.

2. *Helicosporium pulvinatum* (*Helicotrichum pulvinatum* Nees in nov. act. cur. 9. t. 5. f. 15.)

Helicteres Linn. Schraubenbaum f. Lexic. B. 4.

Kelch röhrig, lederartig, meist fünfspaltig. Corolle fünfsblättrig, die Blätter lang, zungenförmig, mit Nägeln versehen. Staubfadenröhre vielspaltig, 5—10—12 oder mehrere Antheren tragend. Fruchtknoten sehr lang gestielt, fünffächerig. Griffel 5, unten verbunden. Narben einfach. Kapseln 5, einfächerig, holzig, sehr oft spiral- oder schraubenförmig, gewunden-gedreht, nach innen aufspringend, vielSaamig. Saamen eiförmig.

Monadelphica *Dodecandria* (Familie *Bombaceae*. *Buttnerien*?)

Die Arten, welche dieser Gattung angehören, sind Bäume oder Sträucher, deren Blätter wechselnd stehen; die Blumenstiele in Blattwinkeln oder den Blättern gegenüber, oder gipfelständig, meist wenigblümig. Die Früchte sehr lang gestielt, schraubenförmig gedreht. Die Blumen entwickeln sich im Sommer und die Saamen reifen im Herbst, vom October bis December.

† Kapseln gedreht.

1. *Helicteres Jsora* Linn. f. Lexic. B. 4.

Blätter elliptisch, fast herzförmig, langgestielt, sägerandig, oben scharf, unten sitzig. Blumenstiele winkelförmig, kurz. Corollenblätter rosenroth, ungleich. Antheren 12. Kapseln pfriemenspizig. Vaterl. Ostindien und die moluckischen Inseln. H. Abbild. Reichenb. Magaz. d. äst. Botanik 8. Heft. t. 48. f. 2.

2. *Helicteres althaeaeifolia* Lamareck. Ibisblättriger Schraubenbaum.

H. guazumaefolia Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. V. p. 236.

H. biflora Schlechtend. Linnaea 6. p. 424. var. ?

H. corylifolia Martius Fl. brasil.

Ein Baum, ungefähr 15 Fuß hoch, dessen Aeste in der Jugend mit zarten Sternhaaren bekleidet sind. Blätter wechselnd stehend, gestielt, fast eiförmig, an einer Seite langgespißt, an der Basis gerundet, undeutlich herzförmig, sägerandig, geadert, fünfrippig, oben sternhaarig, unten weiß-silzig, fast 3 Zoll lang, 18—20 Linien breit. Blattstiele silzig, am Grunde mit zwei pfriemenspizigen silzigen Asterblättern besetzt. Blumenstiele zweiblümig, einzeln den Blättern gegenüberstehend. Blumen sehr kurzgestielt, mit einer fünfblättrigen Hülle versehen. Kelch röhrig, grau-silzig, sternhaarig, braun-röthlich, fünflappig, die Lappen langgespißt. Corolle fünfblättrig, länger als der Kelch, die Blätter spatelförmig, die Nägel sehr lang, an der Basis mit zwei flügel-förmigen gefranzten Anhängen. Staubfäden 10, an der Basis trugförmig verwachsen, oben frei und mit linien-bogenförmigen Antheren gekrönt. Fruchtknoten sehr lang gestielt, tief fünffurchtig, silzig, und trägt fünf haarförmige Griffel. Vaterl. Südamerika, am Ufer des Orinoco. ♀ Blühz. Mai — September.

3. *Helicteres grewiaefolia* Cand. Grewienblättrige Schraubenfrucht.

Blätter eiförmig, gespißt, ungleich, doppelt sägezähnig, auf beiden Seiten silzig. Früchte an der Spitze pfriemensförmig. Vaterl. die moluckischen Inseln. ♀

4. *Helicteres mexicana* Kunth J. c. V. p. 237. Mexikanischer Schraubenbaum.

Aeste cylindrisch, runzlig, braunlich, in der Jugend sternhaarig-silzig. Blätter gestielt, undeutlich herzförmig, eiförmig, stumpf, gekerbt-gesägt, oben grün, sternhaarig-silzig, unten grau, zottig-silzig, 9 Linien lang, 6 Linien breit. Blumenstiele kurz, 1—2 blümig. Blumen aufrecht, so groß wie die Blumen des *Cucubalus Behen* L. mit Hüllblättern, die bald abfallen. Kelch röhrig, leutensförmig, fünfzähnig, zehnrippig, granzottig, 7 Linien lang. Corollenblätter 5, länger als der Kelch, spatelförmig, mit sehr langen Nägeln versehen. Fruchtknoten sehr langgestielt, tief fünffur-

chig, sternhaarig = zottig. Kapseln fast 1 Zoll lang, fünfstündig, gedreht, holzig, braun, an der Spitze fünfschnäbelig. Vaterl. Mexico. ♀ Blühz. April, Mai.

5. *Helicteres viscida* Blum. Klebriger Schraubenbaum.

Blätter rundlich = herzförmig, langgespitzt, fast dreilappig, ungleich sägezähig, unten sternhaarig = zottig = klebrig. Blumenstiele winkelförmig, vielblüthig, zurückgeschlagen. Kapseln länglich, sehr rauchhaarig. Vaterl. Java. ♀

6. *Helicteres ferruginea* Link Enum. 2. p. 199. Rostfarbiger Schraubenbaum.

Blätter herz = lanzettförmig, feingekerbt, filzig, unten rostfarbig = weißlich, gespitzt, ungleich lang und breit. Blumenstiele gipfelförmig, traubig. Kelch dicht filzig. Corolle gelblich, länger als der Kelch. Vaterl. Brasilien. ♀

7. *Helicteres verbascifolia* Link J. c. 2. p. 200. Rösiger Kerzenblättriger Schraubenbaum.

Blätter herzförmig, langgespitzt, sägerandig, grün, oben scharf, unten sternhaarig, dicht filzig. Blumenstiele winkelförmig, wenigblüthig. Kelch 8 Linien lang, dicht flockig = filzig. Corolle roth, viel länger als der Kelch. Kapseln flockig = filzig. Vaterl. Brasilien, Portorico. ♀

†† Kapseln gerade.

8. *Helicteres carthaginensis* Linn. Jacq. f. Lexic. 1. Aufl. B. 4.

Blätter herzförmig, sägerandig, auf beiden Seiten filzig. Blumen fast stiellos, doldentraubenartig, vielmännig. Kapseln länglich, gerade. ♀

9. *Helicteres proniflora* Richard.

Blätter länglich = herzförmig, langgespitzt, ungleich sägezähig, zweireihig, unten, wie die Nesselblätter behaart = borstig. Die Blumen bilden winkelförmige, wenigblüthige Aehren = Trauben. Kapseln gerade. Vaterl. Capenne. ♀

10. *Helicteres javensis* Blum. Javanischer Schraubenbaum.

Blätter lanzettförmig, an der Basis undeutlich herzförmig, feingekerbt, oben glatt, unten graugrün, wie die Nesselblätter filzig. Blumenstiele winkelförmig, gepaart, vielblüthig. Kapseln gerade. Vaterl. Java. ♀

11. *Helicteres semitriloba* Bert. Halbdreilappiger Schraubenbaum.

Blätter fast herzförmig, breit, eiförmig, dreilappig, gezähnt, oben scharf = punkirt, unten sternhaarig = filzig. Blu =

menstiele gipfelsständig, rispen: doldentraubig, in der Mitte drüsig, wie die Kelche sitzig. Kapseln gerade. ?

Kultur. Gute lockere Dammerde und eine Stelle im warmen Hause. N. 4. im Glashause oder Tepidarium. Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge. Uebrigens s. Lex. B. 4.

Synonymen.

Helicteres apetala Jacq. s. Lexic. B. 4. ist *Sterculia Helicteres* Pers.

— **biflora** Schlechtend. ist *Helicteres althaeae-folia* N. 2.

— **brasiliensis** Mikan ist *Helicteres bruensis* L. s. Lexic.

— **corylifolia** Mart. s. *Helicteres althaeae-folia* N. 2.

— **guazumaefolia** Kunth s. *Helicteres althaeae-folia* N. 2.

— **paniculata** Lour. ist *Sterculia grandiflora* Vent.

— **undulata** Lour. ist *Sterculia lanceolata* Cav.

Heliocarpus Linn. hort. Clifffort. t. 16. Sonnenfrucht s. Lexic. B. 4.

Kelch und Corolle vierblättrig. Frucht (Kapsel) zweifächerig, zweisaamig, zweiflappig, die Klappen mit zierlichen fiederstrahligen Wimpern versehen.

Dodecandria Digynia (Familie der Etiliaceen.)

1. **Heliocarpus popayanensis** Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. V. p. 341.

Aeste und Blumenstiele flockig-sitzig. Blätter rundlich, dreiflappig, unregelmäßig sägezählig, oben mit angedrückten Haaren bekleidet, unten zart, braun-sitzig. Blattstiele mit gepaarten Aesterblättern versehen. Blumen in gipfelsständige Asterdolden gesammelt. Diese Art unterscheidet sich von *Heliocarpus americanus* Linn. s. Lexic. B. 4. hauptsächlich durch viermal größere Blumen und durch flockig-sitzige Aeste und Asterdolden; bei jener sind sie, wie die Blätter glatt. Vaterl. Neugranada, an Bergen, bei Popayan. h. Blühz. August.

Heliophila Linn. Sonnenfreund. s. Lexic. B. 4. *Heliophila*.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 653.

Reich an der Basis fast gleichförmig. Corolle vierblättrig. Staubfäden 6, ungleich, die kürzern meist mit Anhängen (einem äußern Zahn) versehen. Schote linienförmig, zusammengedrückt, oder perschnurenförmig, pfriemenspizig. Saamen einreihig, etwas häutig-gerändert.

Tetradynamia Siliquosa (Familie Kreuzblumen.)

I. Siliquae lineares. Schoten linienförmig, flach.
† Frutescens. Strauchige.

Heliophila incana Ait. f. Lexic. gehört hierher und folgende Arten.

1. *Heliophila cleomoides* Cand. ist *Cleome capensis* Linn. f. Lexic. 1. und 2. Aufl. B. 3. S. 128.

2. *Heliophila virgata* Burch. Ruthenförmige *Heliophila*.

Stengel strauchig. Aeste ruthenförmig, wie die Blätter glatt. Blätter länglich-eyförmig, fast fleischig, ganzrandig oder fast gezähnt. Schoten linienförmig, meist hängend, mit dem langen stehen bleibenden Griffel gekrönt. Vaterl. das südliche Afrika. h

3. *Heliophila glauca* Burch. Graublauliche *Heliophila*.

Aeste ruthenförmig, wie die Blätter glatt und grau- oder blaulich. Blätter länglich, fast lederartig, ganzrandig, obere fast linienförmig, gespißt. Staubfäden ohne Zähne. Schoten linienförmig, aufrecht, mit dem Griffel gekrönt. Vaterl. das südliche Afrika. h

4. *Heliophila stylosa* Burch.

Blätter linienförmig, gespißt, ganzrandig. Staubfäden zahnlos. Schoten linienförmig, hängend, mit dem langen fadenförmigen Griffel gekrönt. Vaterl. wie N. 1. h

5. *Heliophila linearifolia* Burch.

Blätter linienförmig, gespißt, ganzrandig. Staubfäden 6, davon die zwei seitenständigen kürzer gezähnt sind. Schoten linienförmig, mit dem Griffel gekrönt, der gerade ist. Vaterl. wie N. 1. h

6. *Heliophila suavissima* Burch.

Blätter linien- pfriemensförmig. Blumen wohlriechend. Staubfäden ohne Zähne. Schoten linienförmig, abstehend. Griffel spizig. Vaterl. wie N. 1. h

7. *Heliophila subulata* Burch.

Stengel und Blätter filzig. Blätter linien- pfriemensförmig.

mig, sehr spitzig. Schoten linienförmig, mit dem abstehenden Griffel gekrönt. Waterl. wie N. 1. h

8. *Heliophila scoparia* Burch. (*Cheiranthus strictus* Poir. nec. Linn. fil. Thunb.)

Neste ruthenförmig. Blätter linien-pfriemensförmig, fleis, fast sichelförmig. Blumen in wenigblümigen Trauben. Staubfäden ohne Zähne. Schoten linienförmig, aufrecht, mit dem kurzen Griffel gekrönt. Waterl. wie N. 1. h

9. *Heliophila fascicularis* Cand.

Blätter wechselnd stehend, fadenförmig. Schoten linienförmig, mit dem aufrechten Griffel gekrönt. Waterl. Kap d. g. Hoffn. h

10. *Heliophila abrotanifolia* Candolle.

Blätter dreitheilig = fiederspaltig, die Einschnitte pfriemenspitzig. Schoten linienförmig, gespitzt. Waterl. Kap d. g. Hoffn. h

†† Herbaceae. Krautartige.

Hierher gehören die im Lexikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Hel. pilosa* Lam. *H. digitata*, *coronopifolia* Linn. *H. foeniculacea* R. Br. *H. crithmifolia* Willd. und folgende.

11. *Heliophila incisa* Cand.

Stengel strauchig. Blätter länglich, an der Basis verdünnt, an der Spitze lappig = eingeschnitten, glatt. Schoten sehr schmal, hängend. Waterl. Kap d. g. Hoffn.

12. *Heliophila stricta* Sims. Bot. Magaz. 2526. Straßschotige *Heliophila*.

Stengel krautartig. Blätter behaart, untere lanzettförmig, fiederspaltig, obere linienförmig, ganzrandig. Schoten strass, mucronenspitzig. Waterl. wie N. 1.

13. *Heliophila pectinata* Burch.

Blätter kammförmig = fiederspaltig, glatt. Einschnitte nahe beisammen stehend, linienförmig. Schoten fast gespitzt, hängend. *Lunaria elongata* Thunb. (s. 1. Nachtr. B. 4.) hat Sprengel als Synonym angezeigt, jedoch mit ? Waterl. wie N. 1.

14. *Heliophila chamaemelifolia* Burch.

Stengel, Blätter und Blumenstiele wenig behaart. Blätter gefiedert. Blättchen linienförmig, gespitzt, ganzrandig. Schoten mucronenspitzig, aufrecht. Waterl. wie N. 1.

II. Siliquae lanceolatae.

Schoten lanzettförmig.

15. *Heliophila macrosperma* Burch.

Stengel staudenstrauchig, ästig, wie die Blätter glatt. Blätter linienförmig, gespitzt, ganzrandig. Schoten lanzettförmig, glatt, mit dem kurzen bleibenden Griffel gekrönt. Waterl. das südliche Afrika. ♀

III. Siliquis moniliformis: herbaceae glabrae.

Schoten rosenkranzförmig oder perlschnurenförmig gegliedert. Stengel krautartig, wie die Blätter glatt.

16. *Heliophila longifolia* Cand. Langblättrige *Heliophila*.

Stengel krautartig. Blätter lang, linienförmig. Schoten rosenkranzförmig, sehr dünn. Waterl. Kap d. g. Hoffn.

17. *Heliophila tenuisiliqua* Cand.

Blätter linienförmig, ganzrandig. Schoten sehr dünn. Vielleicht nur eine Varietät von der vorigen Art, mit der sie Waterl. und Standort gemein hat. ☉ ?

18. *Heliophila sonchifolia* Cand.

Stengel krautartig. Wurzelblätter fiederspaltig, die Einschnitte, wie die Stengelblätter, linienförmig, fast ganzrandig. Waterl. Kap d. g. Hoffn.

19. *Heliophila rivalis* Burch.

Blätter fiederspaltig. Einschnitte linienförmig, gespitzt. Corollenblätter umgekehrteiförmig. Hülsen fast gerade, mit dem kurzen Griffel gekrönt. Waterl. das südliche Afrika.

20. *Heliophila variabilis* Burch.

Blätter fiederspaltig. Einschnitte lang, linienförmig, gespitzt. Corollenblätter länglich = linienförmig. Schoten fast aufrecht. Waterl. wie N. 18.

21. *Heliophila sessilifolia* Burch.

Blätter fiederspaltig. Einschnitte linien = pfriemenförmig. Staubfäden 6, die zwei kürzern seitenständigen mit Anhängen versehen. Schoten fast aufrecht. Waterl. wie N. 18.

22. *Heliophila lepidioides* Link. Kressenartige *Heliophila*.

Trentepohlia lepidioides Roth. Nov. spec. pl.

Stengel niederliegend, ästig, edig glatt, etwa 1 Fuß hoch. Blätter fiederspaltig, untere gestielt, obere stiellos. Einschnitte linienförmig. Blumenkopf = traubenständig. Corollenblätter klein, weiß. Schoten länglich, sehr abstehend, 1—3 saamig. Waterl. Kap d. g. Hoffn. ☉

Diese Art hat Sprengel in Syst. Veg. 2. p. 917. beschrieben, aber auch als Synonym bei Aubrietia lepidioides Spr. citirt.

Kultur. Diese Gewächse zieht man aus Saamen in warmen Beeten, setzt hernach die jungen Pflanzen, besonders die strauchigen oder staudenstrauchigen Arten einzeln in Töpfe und überwintert sie im Glashause. Die einjährigen Arten bleiben entweder einzeln im Saamenbeete, davon im Sommer die Fenster abgenommen werden, bis zur Saamenreife stehen, oder man pflanzt sie an einer schützlichen Stelle ins freie Land, in guten lockeren Boden. Sie blühen vom Juni bis August.

Synonymen.

Heliophila arabioides Sims. ist **Heliophila pilosa** f. 1. Nachtr.

— **diffusa** Cand. ist **Aubrietia diffusa** Spr.
— **flava** Linn. fil. (f. Lexic.) ist **Coronopus anomalus** Spr.

— **integrifolia** Linn. (f. Lexic.) ist **Heliophila pilosa**.

— **parviflora** Burch. ist **Heliophila crithmifolia** Willd. f. 1. Nachtr.

— **pinnata** Venten. ist **Heliophila pendula** Willd. f. Lexic.

— **succulenta** Banks. ist **Heliophila platysiliqua** R. Br. Ait. f. 1. Nachtr.

— **trifida** Thunb. ist **Heliophila pinnata** f. Lexic.

— **trifurcata** Burch. ist **Heliophila tripartita** f. 1. Nachtr.

Heliophthalmum cicutaefolium Rafin. ist **Rudbeckia cicutaefolia** Spr.

Heliopsis Persoon. Synops. pl. 2. p. 473. **Heliopsis** (Schuhr's Handb. 1. 257.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 655.

Blüthenbede (Kelch) schuppig, fast blättrig. Fruchtboden kegelförmig, mit Spreublättern besetzt. Saamen eckig, nackt, ohne Krone.

Syngenesia 2 Ordu. (Familie Compositae.)

1. **Heliopsis scabra** Duv. Scharfblättrige **Heliopsis**.

Stengel krautartig, aufrecht. Blätter länglich-zersägmäßig,

gespitzt, grob sägezählig, unten wie die Kelche scharf. Blumen gelb. Vaterl. Nordamerika.

2. *Heliopsis buphthalmoides* Duv. ist *Anthemis buphthalmoides* Jacq. hort. Schoenb. 2. t. 151. f. 1 Nachtr. B. 1. S. 246.

Stengel krautartig, ästig, 2—3 Fuß hoch. Uebrigens wie im Nachtrage. Vaterl. Mexico, Peru. ☉ Blühz. Aug., Septemb.

3. *Heliopsis laevis* Pers. f. 1. Nachtrag B. 3. S. 655., nebst Synonymen und Verbesserungen.

Diese Pflanze habe ich im Vericon B. 2. nach Linn. und L' Herit. unter *Buphthalmum hilianthoides* aufgeführt.

Stengel, mehrere aus einer Wurzel, krautartig, aufrecht, glatt, fast rund, 4—6 Fuß hoch und höher. Aeste und Blätter gegenüberstehend. Blätter gestielt, länglich = eiförmig, langgespitzt, tief sägerandig. Blumen gelb, vielstrahlig. 4 Blühz. Aug. Septemb.

4. *Heliopsis dubia* Duv. *Anthemis americana* Linn. Suppl. A. *oppositifolia* Lam. A. *occidentalis* Willd. *Acmella occidentalis* Pers. *Spilanthes Mutisii* Kunth. *Acmella intermedia* Rich. Var. hat Spr. hierher gezogen.

5. *Heliopsis canescens* Kunth in H. et B. Nov. gen. et sp. pl. IV. p. 166. Graue Heliopsis.

Die Stengel sind aufrecht oder gestreckt, fast 1 Fuß lang, ästig, mit Haaren bekleidet, die zwei Reihen bilden; seine Aeste und Blätter stehen gegenüber. Die Blätter gestielt, eiförmig, gespitzt, an der Basis gerundet, sägerandig, geadert = dreirippig, auf beiden Seiten borstig = filzig, unten graulich, $1\frac{1}{2}$ Zoll lang, 1 Zoll breit, die Stiele $\frac{1}{2}$ Zoll lang, rinnenförmig, borstig = filzig. Die Blumen einzeln, gipfelständig, langgestielt, aufrecht, gelb, so groß wie die Blumen der *Jaulae britannicae*.

Im gedachten Werke und am Schlusse der Diagnose bemerkt H. Kunth: „Specimen suppendens valde incompletum; planta in vivo denuo examinanda.“ Vaterl. das Reich Quito, bei Lora in temperirten Gegenden. ☉ Blühz. Sommer.

6. *Heliopsis dubia* Duv. Hierher gehören: *Anthemis americana* Linn. Suppl. A. *oppositifolia* Lam. A. *occidentalis* Willd. *Acmella occidentalis* Pers. *Spilan-*

thes Mutisii Kunth. *Acemella intermedia* Rich. var. siehe Syst. veg. ed. Spr. III. p. 604.

Heliotropium Linn. Sonnenwende; Scorpionschwanz f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 656. B. 10. S. 252. (Schubert's. Handb. t. 29.)

Kelch röhrig, fünfzählig. Corolle kurzröhrig, präsentirtellerförmig, der Rand gefaltet, mit fünf Lappen, zwischen denen oft noch kleine Zähne stehen. Schlund nackt. Staubfäden 5. Narbe kegelförmig. Nüsschen 4, einsächerig, zusammenhängend.

Pentandria Monogynia (Familie der scharfbliättrigen Gewächse.)

Diese Gattung enthält jetzt einige 70 Arten, die größtentheils aus Tropenländern kommen. Es sind theils Sträucher oder Staudensträucher, theils krautartige Pflanzen, mit ungetheilten Blättern. Blumen in winkels oder gipfelfständigen Aehren, die nackt oder mit Bracteen besetzt sind. Corollen weiß oder blaulich-violett.

Im Lexikon B. 4. habe ich 29 und im ersten Nachtrage B. 10. Anhang (S. 252. bis 265.) 33 Arten genau und vollständig beschrieben. Hier nur noch folgende neue Arten.

I. Spicis ebracteatis, novellis spiralibus.

Blumenähren ohne Bracteen.

1. *Heliotropium syenites* Spr. (*H. villosum* Sieb. *H. cinereum* R. Br. *H. Kunzii* Lehm.)

Stengel staudenstrauchig, ästig, sehr zottenhaarig. Blätter langgestielt, länglich-eiförmig, an beiden Enden verdünnt, ganzrandig. Blumen in zusammengesetzte seitenständige Aehren gesammelt. Corollenröhre so lang als der Kelch. Vaterl. Aegypten. h

2. *Heliotropium suaveolens* M. a Rieb. Wohlriechende Sonnenwende.

Stengel krautartig, ästig. Blätter eiförmig, ganzrandig, gerunzelt, filzig. Blumenähren zusammengesetzt. Kelche wolliig, die Zähne pfriemenspizig. Corollenröhre so lang als der Kelch. Vaterl. Kaukasus und das nördliche Persien. ☉?

3. *Heliotropium obovatum* Roxburgh Corom. Don. Fl. Nepal.

Stengel krautartig, liegend, fast ästig. Blätter gestielt, umgekehrt-eiförmig, nicht geadert, seidenhaarig. Blumenäh-

ren zusammengesetzt. Kelchröhre kürzer als die Corolle. Vaterl. Nepal.

4. *Heliotropium ovalifolium* Forsk. Ovalblättriger Scorpionschwanz.

Stengel krautartig, gestreckt. Blätter oval, ganzrandig, seidenhaarig = zottig. Blumenähren fast einzeln stehend. Früchte filzig. Vaterl. Arabien und Neuholland.

5. *Heliotropium tiaridioides* Schlechtend. Linnaea. B.

4. S. 453.

Stengel strauchig, ästig. Blätter gestielt, lanzettförmig, an beiden Enden gespitzt, oben scharf = punktirt, unten zart, filzig, netzaderig, $2\frac{1}{2}$ —4 Zoll lang, 1—2 Zoll breit. Blumenähren gepaart und bilden zweitheilige gipfelständige Astersolden. Corollenröhre länger als der Kelch. Vaterl. Brasilien. h

6. *Heliotropium monostachyum* Schlechtend. J. c. p. 455. Einähriger Scorpionschwanz.

Stengel strauchig, oben getheilt. Blätter gestielt, länglicheiförmig. ? Aehre einfach, einzeln, niemals gepaart. Vielleicht nur eine Varietät von *H. parviflorum* Linn. Lehm.

7. *Heliotropium sidaefolium* Schlechtend. J. c. p. 460. Sidablättriger Scorpionschwanz.

Stengel strauchig oder staudenstrauchig, ästig. Aeste holzig, 8—12 Zoll lang. Blätter wechselnd stehend, lanzett- oder ey-lanzettförmig, gespitzt, am Stiele herablaufend, behaart. Blumen stiellos, in gipfelständige Astersolden gesammelt. Corolle auswendig feinborstig, inwendig im Schlunde zottenhaarig. Vaterl. Brasilien. h

8. *Heliotropium phyllicoides* Schlechtend. J. c. p. 460. Phyllicaartiger Scorpionschwanz.

Stengel strauchig, 8—14 Zoll hoch, wie die Blätter mit weißen Zottenhaaren bekleidet. Blätter stiellos, am Rande zurückgerollt. Astersolden gipfelständig, 2—3 spaltig. Blumen stiellos. Kelchtheile fast gleich. Corolle auswendig und im Schlunde zottenhaarig. Vaterl. Brasilien. h

II. *Spicis bracteatis*.

Blumenähren mit Bracteen versehen.

9. *Heliotropium callosum* Spr. Schwierige Sonnenwende; Scorpionschwanz.

Stengel strauchig, aufrecht, ästig, schwielig = scharfborstig.

Blätter wechselnd, stiellos, linien-lanzettförmig, schwielig-punktirt-scharfborstig, am Rande zurückgerollt. Blumenähren fast einzeln, seiten- und gipfelständig. Vaterl. Aegypten. h

10. *Heliotropium brasilianum* Roth. Brasilische Sonnenwende.

Stengel strauchig, sehr ästig, blaug-srieglich. Blätter spatel-lanzettförmig, mucronenspizig, ganzrandig, schwielig-scharfborstig. Ähren fadenförmig, fast zu 3 stehend. Corolle auswendig mit Strichborsten besetzt. Vaterl. Brasilien. h

11. *Heliotropium prostratum* R. Br.

Stengel gestreckt, krautartig, strieglich. Blätter fast stiellos, lanzettförmig, langgespizt, flach. Bracteen fast so lang als die Kelche. Vaterl. Neuhoiland. 4?

12. *Heliotropium Roxburghii* Spr. (*H. paniculata* Roxb. nec. R. Br.)

Stengel krautartig, aufrecht, ästig, scharfborstig. Blätter länglich-eiförmig. Ähren gipfelständig, rispenartig getheilt, einseitig. Vaterl. Ostindien.

13. *Heliotropium ocellatum* Schlechtend. J. c. p. 463.

Eine kleine krautartige Pflanze, deren Theile grau-striichborstig sind. Blätter lanzettförmig, stumpflich, an der Basis verdünnt, fast keilsförmig, kurzgestielt. Blumen klein, in einseitige gipfelständige Ähren gesammelt. Vaterl. Brasilien. ☉

Kultur der Heliotropien siehe Lexic. und I. Nachtrag. B. 10. S. 266. Zu denen daselbst S. 266. angezeigten Synonymen gehören noch folgende

Synonymen.

- Heliotropium brevifolium* Wallich. ist *Myosotis fruticosa* Linn. f. Lexic.
 ——— *cinereum* R. Br. f. *Heliotropium syenites* R. 1.
 ——— *compactum* Don. ist *Heliotropium linifolium* Lehm. *Myosotis fruticosa* L.
 ——— *hirsutum* Clark. ist *Heliotropium supernum* Lexic.
 ——— *hispidum* Kunth ist *Heliotropium ternatum* Vahl. f. Lexic.
 ——— *humifusum* Kunth ist *Lithospermum humifusum* Spr.

Heliotropium paniculatum Roxb. f. *Heliotropium Roxburghii* N. 12.

— *villosum* Sieb. f. *Heliotropium syenites* N. 1.

— *viridiflorum* Lehm. ist *Tournefortia viridiflora*.

Helleborus Linn. Nießwurz; Christwurz. f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 657.

Kelch meist gefärbt, (corollinisch) fünf oder mehrblättrig. Nectarien röhrig, 2lippig, kürzer als der Kelch. Staubfäden zahlreich, bodenständig. Kapseln 3—6, einfächerig, unten zusammenhängend; sie öffnen sich oben seitlich.

Polyandria Polygynia (Familie Ranunculaceen.)

1. *Helleborus sibiricus* Spr. Sibirische Christwurz; Nießwurz.

Eranthis sibiricus Candolle.

Wurzelblätter fast kreisrund, dreitheilig, die Einschnitte keilsförmig, an der Spitze eingeschnitten. Schaft aufrecht, einblüthig. Vaterl. das östliche Sibirien. 4

2. *Helleborus atrorubens* Waldst. et Kitaib. pl. rar. hung. Schwarzröthliche Christwurz.

Wurzel ästig. Stengel zweispaltig. Aeste eckig, blättrig, wenigblüthig. Blätter handförmig getheilt = gefingert = fußförmig, die Theile sägerandig, auf beiden Seiten glatt. Blumen blaufarbig = roth, fast schwarzröthlich. Vaterl. Croaticien. 4

Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören, finden sich im Lexikon und 1. Nachtrage, nebst Anleitung zu ihrer Kultur. Auch die vorstehenden neuen Arten dauern in unsern Gärten unter freiem Himmel.

Synonymen.

Helleborus dumetorum Kitaib. f. 1. Nachtr. hat Sprengel zu *Helleborus viridis* L. gezogen.

— *officinalis* Salisb. ist *Helleborus orientalis* Lam.

— *thalictroides* Lam. ist *Isopyrum thalictroides* Linn. f. Lexic.

— *trifolius* Linn. f. Lexic. ist *Coptis trifolia* Salisb. f. 2. Nachtr. B. 3.

Helleborus trilobus Linn. ist *Coptis trifoliâ* 2. Nachtr. B. 3.

Hellenia Willd. Spec. pl. *Hellenie*.

Corollae limbus duplex, exterior subtrifidus. Nectar. dyphyllum vel bifidum. Capsula trilocularis coriacea, inflata subglobosa. Calyx spathiformis campanulatus bifidus. Spec. plant. ed. Willd. erste Auflage 1. p. 4.

Kelch scheidenartig, 2—3 spaltig. Corolle einblättrig, der äußere Rand dreitheilig, Nectarlippe gespalten oder zweiblättrig. Anthere doppelt, am Rande des länglichen Staubfadens, der über die Anthere hervorragt. Griffel so lang als der Staubfaden. Narbe compact. Kapsel dreifächerig, ründig = schorfig, vielSaamig. Saamen mit Mantelhaut.

Monandria Monogynia (Familie Scitamineen.)

1. *Hellenia coerulea* R. Brown. Blaue *Hellenie*.

Wurzel ästig, fleischig. Stengel aufrecht, 6—8 Fuß hoch und höher. Blätter kurzgestielt, ungetheilt, an der Spitze purpurroth. Blatthäutchen eysförmig, gefleckt, roth. Blumenstielen dreiblümig, eine gipfelfständige Traube bildend, mit Bracteen besetzt, äußere Bracteen abfallend, innere einblümig. Kelch behaart. Die Einschnitte des äußeren Corollensrandes linienförmig, weiß. Lippe weiß = gelblich, an der Basis mit zwei kleinen Hörnern versehen. Der Staubfaden roth. Kapsel zur Zeit der Reife himmelblau. Saamen eckig, mit rother Mantelhaut versehen. Waterl. Neuholland. 4 Bläh. Commer.

2. *Hellenia rufa* Pressl. Reliq. Henkean. fasc. 2. p. 114. t. 21. Gelbrothe *Hellenie*.

Blätter stiellos, zweireihig, lanzettförmig, langgespißt, 10—12 Zoll lang, 14—16 Linien breit, unten an den Rippen mit gelbrothen Haaren bekleidet, eben so die Blattscheiden. Blumen in gipfelfständige einfache Trauben gesammelt. Bracteen 4—5 Linien lang, zweiblümig, röhrig, dreizählig, gelbroth = haarig. Kelch 3 Linien lang, röhrig, gelbroth = behaart. Corollenröhre doppelt länger als der Kelch, die Einschnitte lanzettförmig, stumpflich, abstehend, roth = punktiert. Fruchtknoten mit gelbrothen Haaren dicht besetzt. Waterl. die Insel Luzon. 4

3. *Hellenia abnormis* Lindley in Transact. of the Horticult. Soc. V. 7. p. 60.

Stengel 10—16 Zoll hoch, aufrecht. Blätter ey = lanzettförmig,

förmig, langgespißt, glatt, nach der Spitze zu gewimpert. Blatthäutchen kurz, zweilappig, roth. Die Blumen bilden eine kurze gipfelförmige zusammengesetzte Traube. Kelch weiß, so lang als die Corollenröhre, die Einschnitte zurückgeschlagen. Die Einschnitte der Corolle weiß, gleich lang. Lippe am Rande gekräuselt, an der Basis purpurroth, gespornt. Waterl. China. 4

Die übrigen Arten: *Hell. alba*, *aquatica* und *chinensis* Willd. und Anleitung zu ihrer Kultur s. Lexic. B. 4. Auf gleiche Weise können auch die oben beschriebenen neuen Arten, und andere Scitamineen behandelt werden s. 2. Nachtr. bei *Hedychium*.

Synonymen.

Hellenia Allughas Willd. s. Lexic. I. Aufl. s. *Alpinia Allughas* Rosc. Lexic. 2. Aufl.
— *grandiflora* Retz. ist *Costus speciosus* Smith.

Helleria Martius fl. bras. *Hellerie*.

Kelch fünfblättrig, auswendig porös-drüsig. Corolle fünfblättrig, die Blätter fast zusammenhängend. Staubfäden zahlreich, an der Basis verwachsen, den Griffel umschließend, mit zweiknöpfigen Antheren gekrönt. Kapsel trocken, zweifächerig.

Monadelphica Polyandria (Familie Malvaceen.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Professor Heller zu Würzburg.

1. *Helleria obovata* Mart.

Ein sehr ästiger Strauch, mit umgekehrt-eiförmigen glatten Blättern, und sitzig weißen Blumen in Doldentrauben. Waterl. Brasilien. 4

Helminthia Pers. Synops. s. *Helminthia* I. Nachtr. B. 3. S. 658.

Character generic. s. I. Nachtr. B. 3. S. 658.

Blüthendecke (Kelch) doppelt, äußere fünfblättrig, hüllensförmig, innere achttheilig. Fruchtboden nackt. Saamen runzlig. Saamenkrone gestielt.

Syngenesia 1 Ordn. (Familie Compositae.)

1. *Helminthia humifusa* Trevir. Niedrige Helminthie.

Stengel gestreckt, glatt. Stengelblätter eiförmig-lanzettförmig, scharfborstig. Hüllblätter eiförmig. Waterl. Südeuropa?

Dietr. Ex. 2r. Nachtr. IV. Bd.

B b

Helminthia spinosa Cand. f. 1. Nachtr. hat Spr. als Varietät zur *Helm. echiodoides* gezogen.

Helminthostachys Kaulfus Filic.

Mehre einfach. Kapseln fast zweiflappig, fast verbunden, büschelförmig, die Büschel quirlförmig stehend.

Cryptogamia Sect. I. (Familie Ophioglosseae.)

1. *Helminthostachys dulcis* Kaulf. (*Ophioglossum laciniatum* Rumph. *O. munda zeilanica* Linn. *Botrychium zeilanicum* Swartz.)

Laub (Wedel) fast dreifach zusammengesetzt. Blättchen dreitheilig. Einschnitte lanzettförmig, langgespitzt, feingekerbt. Vaterl. Ostindien; die moluckischen Inseln. 4

2. *Helminthostachys mexicanum* Spr. (*Botryopteris mexicana* Pressl.)

Laub dreifach, zusammengesetzt. Blättchen dreitheilig. Einschnitte länglich, stumpf, feingekerbt. Vaterl. Mexico. 4

Kultur. In Hinsicht auf Standort, Boden und Fortpflanzung behandelt man diese Gewächse wie andere Farnekräuter, die aus warmen Ländern kommen. N. 2. nimmt auch wohl mit Durchwinterung im Glashause vorlieb.

Helmisporium Link.

Fäden einfach oder ästig. Fruchtlager schneckenförmig aufgerollt.

Cryptogamia Sect. V. (Familie Byssoidaei.)

Diese Gattung enthält 6 Arten: 1. *H. velutina* Link (*Dematium ciliare* Pers. 2. *H. macrocarpon* Grew. crypt. scot. t. 148. f. 5. (*H. subulatum* Nees) 3. *H. nanum* Nees. 4. *H. tenuissimum* Kunz. 5. *H. simplex* Nees. 6. *H. candidum* Spr. Es sind Bauchspindenpilze, die auf Baumrinden vegetiren.

Helonias Linn. Schwindblume; Helonias.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. C. 656.

Kelch sechsblättrig, corollinisch, an der Basis mit drei Bracteen versehen. Staubfäden 6. Griffel 3. Kapsel dreifächerig, 3—6 saamig.

Hexandria Trigynia (Familie Juceen.)

1. *Helonias latifolia* Michx. Breitblättrige Helonias; Schwindblume.

Blätter lanzett-schwerdförmig, gerippt. Schaft nackt. Blumen in eine dicke eiförmige Endtraube gesammelt. Bracteen

Linien = lanzettförmig. Hierher gehört *H. bullata* Linn. f. Lexic. 1. Aufl. B. 4. Vaterl. Nordamerika in Sümpfen und an feuchten Stellen. 2. Blühz. April bis Juni.

2. *Helonias virescens* Kunth Synops. pl. 1. p. 275. Grünliche Helonias.

Wurzelblätter grasartig, linienförmig, gestreift, so lang als der beblätterte Stengel. Blumen grünlich, gestielt, und bilden eine fast zusammengesetzte Traube. Bracteen ey-lanzettförmig, abgefürzt. Vaterl. Neuspanien, zwischen Santa Rosa de la Serra et Fl. Cubilete. 2. Blühz. Septemb.

3. *Helonias erythrosperma* Michx. (*H. laeta* Sims. *Anthericum subtrigynum* Jacq. ist *Melanthium laetum* Ait. f. Lexic. 1. Aufl. B. 6. S. 41. Auch *Mel. phalangoides* Lam. f. Lexic. a. angezeigten Orte, hat Sprengel hierher gezogen.

Die übrigen Arten, welche im Verikon und I. Nachtrage unter *Helonias* beschrieben sind, hat man neuerlich zu andern Gattungen gebracht. Es sind folgende

Synonymen.

Helonias asphodeloides Linn. f. *Xerophyllum asphodeloides* Nuttall.

— *borealis* Willd. f. *Tofieldia alpina*.

— *bullata* Linn. f. *Helonias latifolia* R. 1.

— *dioica* Pursh. f. *Veratrum luteum*.

— *glaberrimum* f. *Zigatenus glaberrimus*.

— *graminea* Ker. f. *Xerophyllum gramineum*.

— *lactea* Sims. f. *Helonias erythrosperma* R. 3.

— *lutea* Sims. f. *Veratrum luteum*.

— *pumila* Jacq. f. *Veratrum luteum*.

— *tenax* Pursh. f. *Xerophyllum tenax* Nutt.

— *virginica* Sims. f. *Melanthium virginicum*.

Helopodium Michx. ist *Cladonia capitata*.

Helosciadium Koch. ist *Sium* Linn.

— Koch. Reichenb. Jc. t. 218. ist *Sium crassipes* Spr.

— *inundatum* Koch. ist *Meum inundatum* Spr.

— *repens* Koch. ist *Sium nodiflorum* Spr.

Helosis Richard. Schoss.

Blumen monöisch. Kolben kopfförmig. 3 Blüthenbede

B b 2

dreitheilig, gestielt. Ein Staubfaden. Anthere vierfächerig.
♀ Fruchtknoten mit 2 Griffeln.

Monoecia Androgynia (Familie Balanophoreae.)

1. *Helosis cayennensis* Rich. (Cynomorium cayennensis Swartz. Caldasia Mutis.)

Stunk nackt. Blüthenkopf fast kugelförmig. Schuppen runderförmig, schildförmig. Vaterl. Cayenne.

2. *Helosis jamaicensis* Rich. (Cynomorium jamaicensis Swartz.)

Stunk schuppig. Blüthenkopf verlängert, die Schuppen halb rautenförmig, wie Dachziegel über einander liegend. Vaterl. Jamaica.

Helospora Jackson. Helospora.

Reich vierzählig. Corolle röhrig, viertheilig. Staubfäden 4, eingeschlossen. Narben 4. Beere vielkammig. Samen in doppelten Reihen kreuzweis stehend.

Tetrandria Monogynia (Familie Rubiaceae.)

1. *Helospora flavescens* Jacks. Gelbliche Helospora.

Ein kleiner Baum, dessen Aeste abstehen. Blätter elliptischförmig. Blumen gestielt, einzeln, winkelförmig. Corollen gelb. Wächst in Sumatra und verlangt in unsern Gärten eine Stelle im warmen Hause.

Helotium Persoon Mycolog. Reulenschwamm.

Der reulenförmige Körper geht in eine halbkugelige Haube über, welche oben die Schlauchschicht trägt und am Rande zurückgerollt ist.

Cryptogamia Sect. V. Schwämme, Gruppe Mitrati.

1. *Helotium aciculare* Pers. (Helvella Bull. H. agariciformis Bolt.)

Der Stunk ist dünn, lang, milchweiß, glatt, der Hut halbkugelig. Wächst an Baumstämmen.

2. *Helotium album* Schum. (Peziza alba Fries.)

Schwammkörper weiß, Haube (Hut) kurzgestielt, gewölbt. Wächst auf faulen Grasblättern.

3. *Helotium aureum* Pers.

Haube gewölbt, goldgelb, glatt. Stunk dünn, an der Basis filzig. Wächst auf faulem Fichtenholz.

4. *Helotium conforme* Spr. (Helvella Pers. Myc. verpa patula Fries.)

Hut halbkugelig, regelmäßig, leucogelb. Strunk glatt; weiß. Wächst in Italien.

5. *Helotium nigripes* Schum. (*Peziza lenticularis* Bull. P. flava Willd. Octospora citrina Vahl.)

Hut sehr kurz, schwärzlich. Hut gewölbt, goldgelb, glatt. Wächst auf Baumstämmen.

6. *Helotium fibulaeforme* Pers. myc. (*Helvella* Bolt. *Peziza* Pers.)

Hut flachlich, oben schielweis, unten wie der Strunk schwärzlich. Wächst an den Wurzeln des Ulmbaumes.

7. *Helotium umbelliforme* Pers. myc. (*Helvella aurea* Bolt.)

Strunk dünn, wie der fast-gewölbte. Hut, goldgelb und glatt. Wächst an Baumästen.

8. *Helotium fimitarium* Pers.

Hut kegelförmig, fast eckig, wie der Strunk rath, glatt. Wächst auf Kuhmist.

9. *Helotium radicatum* Alb. et Schw. (*Elvella lenticularis* Scop. *Tubercularia flavescens* Rebert. *Leotia tuberculata* Hornem. Fl. dan. 1378. f. 2. *Ditiole radicata* Fries. sind Varietäten.

10. *Helotium compressa* Wormsk. (*Peziza Helot. complanata* Fr.)

Hut gewölbt, zusammengedrückt, wie der unten ausgebreitete Strunk rabenschwarz. Wächst auf Aesten der Erlen (*Alnus*) in Kamtschatka.

Helvella Linn. *Helvella*; Glattschwamm; Faltenschwamm. S. Lexic. B. 4.

Diese Gattung unterscheidet sich von der vorhergehenden hauptsächlich dadurch, daß die Haube (Hut) faltig, knottig-lappig ist und an dem meist hohlen Strunke herabhängt. Sie enthält jetzt 16 Arten von denen ich nur die vorzüglichsten, welche in Europa vorkommen, hier anzeige.

† *Stipitibus lacunosus*.

Strunke vertieft-eingedrückt.

1. *Helvella crispa* Fries. (*H. leucophaea* Pers. *albida* Schaeff. *nivea* Schrad. *Peziza contorta* Pers. myc.)

Strunk röhrig, (hohl) gerippt = vertieft, glatt. Haube (Hut) gefranst, blaß. Wächst in Wäldern auf der Erde.

2. *Helvella lacunosa* Fries. (*H. mitra* Schaeff. Grev. crypt. Scot. f. 36.)

Haube aufgeblasen, lappig, aschgrau = blauschwarz, die Lappen angewachsen. Strunk hohlröhrig, gerippt, vertieft. Wächst auf der Erde in Deutschland und Schottland.

3. *Helvella sulcata* Afzel.

Haube lappig, angewachsen, aschgrau = schwärzlich. Strunk gerippt, die Rippen gleich. Auf der Erde in Wäldern.

4. *Helvella lubrica* Scop. (*H. gelatinosa* Bull. *Leotia lubrica* Pers. *Hygromitra tremula* Nees.)

Haube niedergedrückt, fast lappig, wellenrandig. Strunk bläulichgelb, ungleich, fast vertieft. Wächst in Wäldern.

5. *Helvella stipitibus aequalibus pubescentibus vel laevibus.*

Strünke gleich, stielig oder glatt.

6. *Helvella esculenta* Pers. (*Elvella mitra* Schaeff.)

Haube aufgeblasen, wellenrandig, gerunzelt, braun. Strunk wenig zottenhaarig, weißgerändert, mit der Haube verwachsen. Wächst in Fichtenwäldern auf Sandböden.

7. *Helvella insula* Schaeff. (*Elvella mitra* Pollsch. Afz. *Phallus triceps* Müller.)

Haube angewachsen, die Lappen unregelmäßig, wie der stielige Strunk zimmetfarbig. Wächst in Fichtenwäldern.

8. *Helvella monachella* Fries. (*Phallus monachella* Scop. *Elvella spadicea* Schaeff. *H. leucopus et quinqueloba* Pers. myc.)

Haube angewachsen, lappig, fast stielig. Strunk hohlröhrig, glatt, weiß. Wächst in Wäldern an Bergen.

9. *Helvella atra* Oed. (*H. nigricans* Pers.)

Haube in der Mitte niedergedrückt, an beiden Seiten anliegend, unten glatt, feuergelb = schwärzlich oder rabenschwarz. Strunk fleischig, zottig. Wächst in nördlichen Wäldern.

10. *Helvella pezizoides* Afz.

Haube geebnet, zurückgeschlagen, zweiflappig, braun-schwarz, unten, wie der Strunk, schuppig = scharf. Wächst in Wäldern und auf Viehtritten.

11. *Helvella pulla* Holmsk. (*H. cinerea* Vill.)

Haube herabhängend, frei, die Lappen wellenrandig, unten wie der Strunk nackt. Wächst in Wäldern.

12. *Helvella venosa* Fries.

Haube flachlich, dann aufgeblasen, die Lappen blaß-bleichfarbig, unten gefaltet, fleischroth. Strunk zusammengebrückt, nackt, braun. Wächst in Wäldern in Schweden.

12. *Helvella acaulis* Pers. (*Elvella inflata* Schaeff. *Phallus acaulis* Batsch. *Rhizina undulata* Fries.)

Körper weitschweifig, folbig, wellenrandig, unten Wurzelsfasern treibend, blaß. Wächst in Sandböden.

Helexine Soleirolii Requien. ist *Parietaria Soleirolii* Spr.

Hemarthria compressa R. Brown ist *Rottböllia compressa* Linn.

Hemarthria uncinata R. Brown f. *Rottböllia uncinata*.

Hemerocallis Linn. Taglilie f. Lexic. B. 4.

Corolle sechstheilig, glockenförmig. Staubfäden 6, in der Basis der Corolle eingefügt, niedergebogen. Der Griffel einfach. Kapsel dreifächerig. Saamen fast kuglich.

Hexandria Monogynia (Familie Coronarien.)

1. *Hemerocallis disticha* Don. Nepl. Zweireihige Tagblume.

Blätter zweireihig, linienförmig, gekielt, am Rande knorpelscharf. Blumen ährenständig. Corollentheile gerippt, die Rippen netzartig verbunden. Vaterl. Nepal, 24

Synonymen.

Hemerocallis alba Andr. f. *Funkia subcordata* 2 Nachtr.

— *coerulea* Andr. f. *Funkia ovata* 2. Nachtr.

— *cordata* Thunb. f. *Lilium cordifolium* Thunb.

— *japonica* Thunb. (f. Lexic.) f. *Funkia lancifolia* 2. Nachtr.

— *lanceifolia* Thunb. (f. Lexic.) f. *Funkia lancifolia* 2. Nachtr.

— *Lilium* Linn. f. *Czackia Lilium* Andr. *Anthericum* Lexic.

Hemiandra R. Brown. Prod. Pl. Nov. Holl. *Hemiandra*.

Kelch und Corolle zweilappig; die Unterlippe der Corolle dreilappig, der mittlere Lappen gespalten. Staubfäden 4, aufsteigend. Antheren zweifächerig.

Didynamia Gymnospermia (Familie Labiaten.)

1. *Hemiandra pungens* R. Br. Stechende Hemiandra.

Stengel staudenstrauchig, niedrig. Blätter ganzrandig, mucronenspizig = stehend. Blumen einzeln, winkelfständig. Kelchlappen gerippt, stachelspizig. Corolle weiß = purpur:oth. Waterl. das südliche Neuholand. 4

Kultur. Gute lockere Dammerde und Durchwinterung im Glashause. Fortpflanzung durch Saamen und Stedlinge.

Hemianthus Nuttall. Hemianthus.

Kelch röhrig, vierzählig, unten gespalten. Corolle zweilippig. Oberlippe undeutlich, untere dreitheilig, der mittlere Einschnitt zungenförmig. Staubfäden 2, jeder gespalten, der eine Ast die Anthere tragend. Kapsel einfächerig, zweiflappig, vielSaamig.

Diandria Monogynia (Familie Primulaceen.)

1. *Hemianthus micranthemoides* Nutt. (Herpestes micrantha Pursh.)

Stengel krautartig, kriechend. Blätter zu 2 einander gegenüberstehend, rundlich = elliptisch, ganzrandig, gestreift, wie der Stengel und Blumenstiele glatt. Blumen klein, weiß, gestielt, einzeln, winkelfständig. Waterl. Jamaica. 4

Hemichorus R. Brown ist *Polycnemum erinaceum* Pall.

Hemidesmus indicus R. Br. ist *Periploca indica* Linn.

Hemigenia Rob. Brown. Hemigenie.

Kelch fünfspaltig. Corolle zweilippig. Oberlippe abgestutzt, untere dreiflappig, der mittlere Einschnitt gespalten. Staubfäden 4, aufsteigend, obere behaart; die Lappen der Antheren abwechselnd Pollen tragend, abwechselnd leer (unfruchtbar.) Diese Gattung, so wie *Hemiandra* R. Br. ist der *Westringia* Smith sehr nahe verwandt.

Didynamia Gymnospermia (Familie Labiaten.)

1. *Hemigenia purpurea* R. Br. Purpurrothe Hemigenie.

Ein kleiner glatter Strauch, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter zu 3, bisweilen auch zu 4 quirlförmig stehen. Blumen einzeln, winkelfständig, purpurroth, mit 2 violetten Bracteen versehen. Waterl. Neuholand. h Kultur wie *Hemiandra*.

Hemimeris Linn. Halbblume. f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 661.

Kelch fünftheilig, gleich. Corolle radförmig, zweilippig.

Untersippe breitspaltig, der mittlere Lappen größer als die seitenständigen. Staubfäden 4, niedergebogen. Antheren zweifachspitzig. Kapsel 2fächerig, viel-saamig. Samen an der, in der Mitte verdickten Scheidewand angeheftet.

Didynamia Angiospermia (Familie, Versenaten.)

1. *Hemimeris parviflora* Kunth in H. et B. Nov. gen. et sp. 2. p. 376. Kleinblumige *Hemimeris*. (*Alonsoa caulialata* R. et P.) Siehe 1. Nachtrag B. 10. Anhang S. 182.

Diese Art ist *Hemimeris urticifolia* Willd. (f. Lex.) zunächst verwandt, aber unterschieden durch einen krautartigen Stengel und durch kleinere Blumen; bei jener ist der Stengel ausdauernd, strauchartig. Waterl. Cayacas; Peru am Berge Buenavista. 2. Blüht daselbst im März.

2. *Hemimeris Mutisii* Bonpl. Kunth. J. c. 2. p. 376. *Alonsoa acutifolia* Ruiz, et Pav. ist *Scrophularia meridionalis* Mutis. Linn. Suppl. f. Lexic. B. 9. S. 26.

3. *Hemimeris hirsuta* Spr. Rauchaarige Halbbblume.

Stengel krautartig, vierflügelig. Blätter eiförmig, gezähnt, am Stiele herablaufend, mit Stielhaaren besetzt. Blumenstiele einzeln, winkelförmig, einblumig, wie die fast ungleichen Kelche behaart. Waterl. Brasilien.

4. *Hemimeris linariaefolia* Kunth J. c. 2. p. 376. Frauenfächerblättrige Halbbblume. S. 1. Nachtr. B. 10. Anhang S. 182.

Eine Anleitung zur Kultur dieser Gewächse im Allgemeinen, wozu auch die vorstehenden neuen Arten behandelt werden können f. Lexic. B. 4.

Synonymen.

Hemimeris alsinoides Lam. f. *Diascia montana* 2.

Nachtr.

— *diffusa* Linn. (f. Lexic.) f. *Diascia Bergiana* 2. Nachtr.

— *macrophylla* Thunb. f. *Diascia macrophylla* 2. Nachtr.

— *montana* Thunb. (f. Lexic.) f. *Diascia montana* 2. Nachtr.

— *peduncularis* Lam. ist *Diascia Bergiana* 2. Nachtr.

— *sabulosa* Thunb. (f. Lexic.) ist *Diascia Bergiana* var. 2. Nachtr.

Hemionitis Linn. Sylt. Veg. ed. Murr. Nepharen
(Schäfers Crypt. t. 6.)

Die Fruchtkapseln (Kapseln) sitzen auf den Nepharen des
Laubes, ohne Schließhaut (Deckhaut).

Cryptogramia Sect. I. (Familie Farrenkräuter.)

1. *Hemionitis palmata* Linn. Handförmiger Nepharen.

Laub (Weder) langgestielt, handförmig-lappig, 5—8 Zoll
lang, oben sägerandig, zottenhaarig, der Stiel behaart (schup-
pig; zwischen den Schuppen entwickeln sich kleine Knospen,
die zur Fortpflanzung dienen. Vaterl. Westindien. 24

Die übrigen Arten, welche Swartz, Willd. Thunb.
Cavan. u. a. unter *Hemionitis* aufgeführt haben, gehören
anderen Gattungen an, wie aus folgender Liste anschaulich
hervorgeht.

Synonymen.

Hemionitis acrostichoides Swartz. f. *Gymnogramme*
acrostichoides.

— *argentea* Willd. f. *Gymnogramme rosea*
Desv.

— *Boryana* Willd. ist *Antrophyum Boryanum*
Spr.

— *cayennensis* Desv. ist *Antrophyum cayen-*
nense Spr.

— *chaerophylla* Poir. f. *Gymnogramme chae-*
rophylla Desv.

— *coriacea* Don. ist *Antrophyum pumilum*
Kaulf.

— *dealbata* Willd. Enum. f. *Gymnogramme*
tartarea Desv.

— *discolor* Schk. f. *Lomaria discolor* Willd.

— *escutenta* Reiz f. *Diplazium esculentum*
Swartz.

— *grandifolia* Swartz f. *Diplazium grandifo-*
lium Swartz.

— *japonica* Thunb. f. *Gymnogramme japo-*
nica.

— *immersa* Bory. ist *Antrophyum pumilum*
Kaulf.

— *lanceolata* Linn. ist *Antrophyum lanceola-*
tum Kaulf.

— *leptophylla* Lag. f. *Gymnogramme lepto-*
phylla.

- Hemionitis obtusa** Willd. ist *Antrophyum obtusum*.
 — *opaca* Don. f. *Gymnogramme opaca*.
 — *pedata* Swartz. f. *Gymnogramme pedata*.
 — *peregrina* Clus. f. *Scolopendrium Hemio-*
 altis Cav.
 — *plantagineum* Cav. ist *Antrophyum planta-*
 gineum Kaulf.
 — *pothifolia* Don. f. *Gymnogramme pothi-*
 folia.
 — *prolifera* Beauv. f. *Menisium proliferum*
 Swartz.
 — *reticulata* Bory. ist *Antrophyum Boryanum*
 Spr.
 — *reticulata* Forst. ist *Antrophyum reticula-*
 tum Kaulf.
 — *rufa* Swartz. f. *Gymnogramme rufa*.
 — *trifoliata* Humb. f. *Gymnogramme trifo-*
 liata.
 — *vera* Clus. f. *Scolopendrium officinarum*
 Swartz.

Hemiphragma Wallich. Hemiphragma.

Kelch fünftheilig. Corolle trichterförmig, der Rand fünf-
 theilig. Staubfäden 4, fast gleich. Beere ausgetrocknet,
 hart zweifächerig, die Scheidewand oben gespalten.

Didynamia Angiospermia (Familie Verbenen.)

1. Hemiphragma heterophyllum, Wallich, Verschiedens- *blättriges Hemiphragma.*

Stengel krautartig, gestreckt, die untern Blätter herzför-
 mig, die obern lineenförmig. Blumen rosensch., büschelför-
 mig stehend. Waterl. Nepal. 24?

Hemistemma Jussieu. Hemistemma.

Kelch und Corolle fünfblättrig. Staubfäden zahlreich, nach
 einer Seite stehend. Zwei Griffel. Kapseln 2, jede meist
 einsamig.

Polyandria Digynia (Familie Dillenien.)

1. Hemistemma Commersonii Cand. (Helianthemum *coriaceum a Pers.)*

Stengel strauchig oder krautstrauchig. Blätter zu 2 ge-
 genüber stehend, oval-länglich, mucronenspitig. Blumenstiele
 und Kelche fleischig-vollig. Waterl. Madagascar. h. Blüh-
 schümel.

2. *Hemistemma Aubertii* Cand. (*Helianthemum coriaceum* β. Para.)

Stengel wie bei voriger Art. Blätter spatel = lanzettförmig, gespitzt, unten gesägt. Blumenstiele glattlich. Rinde seidenhaarig. Vaterl. Madagascar. H

3. *Hemistemma dealbatum* Rob. Brown. Geweißtes Hemistemma.

Blätter wechselnd stehend, spatelförmig, mucronenspitzig, unten seidenhaarig = weißlich. Die Blumen bilden einseitige Aehren. Vaterl. das nördliche Neuholand. H

4. *Hemistemma Banksii* R. Br. Baussisches Hemistemma.

Blätter länglich = umgekehrteiförmig, stumpf, unten dicht flzig. Blumen stiellos einseitig. Vaterl. wie vorige Art.

5. *Hemistemma angustifolium* R. Br. Schmalblättriges Hemistemma.

Blätter wechselnd stehend, liniensförmig, sehr schmal, unten weißlich. Blumenähren einseitig, seiden = zottenhaarig. Vaterl. wie N. 3.

6. *Hemistemma Leschenaultii* Cand. Leschenaultsches Hemistemma.

Blätter spatelförmig, an der Spitze fast ausgekerbt, unten weiß, flzig. Blumen sehr kurz gestielt, einzeln winkelsändig. Vaterl. das südliche Neuholand, in der Nähe des Meeres.

Kultut. N. 1. und 2. verlangen warme Standörter, denn sie kommen aus Madagascar. Die übrigen in Neuholand wildwachsenden Arten nehmen unsehrbar mit Durchwinterung im Glashause vorlieb. Den Saamen säet man in Blumentöpfe und stellt diese in ein warmes Beet.

- Hemisynapsium bryoides* Bridel f. *Pohlia bryoides* R. Brown.

- Hemitelia* Rob. Brown.

Saamenhäuschen (Kapseln) rundlich und sitzen zerstreut an den Adern des Laubes, anfänglich fast kugelig, dann zurückgeschlagen, halbmondförmig.

Cryptogamia Sect. 1. (Familie Farnkräuter.)

1. *Hemitelia grandifolia* Spreng. (*Cyathea grandifolia* Willd.)

Stumpf krautartig, unbewehrt, glatt. Laub (Wedel) ge-

federt. Blättchen lang, länglich-lanzettförmig, langgespitzt, an der Spitze sägerandig, fiederspaltig. Einschnitte länglich-eyförmig, stumpflich, die Spitze sägerandig, an den ästigen Rippen sprouig. Kapselhäuschen fast randständig, überall zweireihig. Waterl. Martinique. 4

2. *Hemitelia obtusa* Kaulf. Filic.

Laub gefiedert, unten an den Rippen blasig-spreuig. Blättchen lanzettförmig, fiederspaltig. Einschnitte länglich, stumpf, gefleht. Rippen sehr ästig. Kapselhäuschen fast randständig, fortlaufend. Waterl. die antillischen Inseln. 4

3. *Hemitelia horrida* R. Brown. (*Cyathea horrida* Sw. *Polypodium horridum* Linn.)

Stoß baumartig, an der Basis weichstachsig. Laub doppelt gefiedert, glatt. Blättchen groß, länglich, langgespitzt, fiederspaltig. Einschnitte lanzettförmig, fast sichelförmig, langgespitzt, ganzrandig, nur an der Spitze sägerandig. Kapselhäuschen meist randständig, fast fortlaufend. Waterl. wie die vorhergehende Art. h

4. *Hemitelia multiflora* R. Br. (*Cyathea multiflora* Smith.)

Stoß baumartig, unbewaffnet. Laub doppelt gefiedert, glatt. Blättchen länglich-lanzettförmig, langgespitzt, fiederspaltig. Einschnitte länglich, stumpf, sägerandig. Spindel gestülgelt. Waterl. Jamaica. h

5. *Hemitelia capensis* R. Br. (*Cyathea riparia* Willd. *C. capensis* Smith. *Polypodium capense* Linn. Suppl. *Aspidium capense* Swartz.)

Stoß baumartig, wie die Unterflache des Laubes blasig-spreuig. Laub dreifach gefiedert. Blättchen linien-lanzettförmig, gespitzt, zusammenfließend, sägerandig, die Serraturen scharf, an der Basis Kapselhäuschen tragend. Waterl. Kap d. g. Hoffn. h

6. *Hemitelia laciniata* Spr. (*Polypodium laciniatum* Forst.)

Stoß krautartig. Laub vielfach zusammengesetzt, glatt, weißend. Blättchen länglich-lanzettförmig, langgespitzt, fiederspaltig. Kapselhäuschen etwas entfernt, zweireihig.

Hemitelia speciosa Kaulf. f. *Cyathea speciosa* R. I.

Hemprichia Ehrenberg in Schlechtend. Linn. B.

4. Heft 3. S. 396. *Hemprichia*.

Perianthii partes quaternatae hypogynae. Stamina

monadelphia. *Drupa valvis deliscentis dipyrrena* Schlechtend. a. a. D.

Kelch vierspaltig, stehen bleibend, Corolle vierblättrig. Staubfäden 8, oder mehrere an der Basis verwachsen. Griffel sehr kurz, fleischig. Steinfrucht fleischig, kugelig, meist zweisaamig.

Monadelphia Octandria (Familie Barlerdeen.)

1. *Hemprichia erythraea* Ehrenb. in *Linnaea* B. 4. S. 3. S. 397.

Ein Strauch oder Baum, dessen Rinde glatt, die Epidermis welkend, dünn, wie bei *Betula alba*, aber getbrünnig ist. Blätter wechselnd stehend, zusammengefest, groß. Blättchen 3—5 zählig. Keine Afterblätter. Die Blumen bilden kurze winkelförmige wenigblümige Rispen. Wächst in der Nähe des rothen Meers. ? H

Henckelia Spr. f. *Didymocarpus* 2. Nachtr.

Heptaca Loureiro Fl. China et Cochinchin.

Blumen polygamisch. Kelch dreiblättrig. Corolle 10blättrig, fast radförmig. Narbe 7theilig. Beere 7fächerig, viel-saamig.

Polyandria Monogynia.

1. *Heptaca africana* Loureiro J. c.

Ein kleiner Baum, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter wechselnd stehend, eiförmig, ganzrandig, glatt. Blumenstiele felsenständig, vielblümig. Blumen weiß. Vaterl. das östliche Afrika. H

Heracleum Linn. Heilstrauch f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 662.

Die allgemeine Hülle fehlt oder varirt mit einigen Blättchen. Blumen meist gestrahlt. Früchte zusammengedrückt, hantelförmig, auf dem Rücken mit drei stumpfen Rippen versehen, zwischen denen vier keulenförmige Streifen liegen.

Pentandria Digynia (Familie Doldengewächse.)

1. *Heracleum alpinum* Linn. Alpen-Heilstrauch.

Stengel krautartig, fast einfach, behaart, aufrecht. Blätter einfach, herzförmig, lappig, stumpf, glatt. Blumen weiß, gestrahlt. Vaterl. Südeuropa auf Alpen. 2

2. *Heracleum asperum* M. a Bieberst. Scharfrüchtiger Heilstrauch.

Heracleum cordatum Presl. Fl. Sic.

Blätter zweipaarig gefiedert. Blättchen herzförmig, eingeschnitten-lappig, gespitzt, sägerandig, unten filzig. Dolden gestrahlt. Früchte rund, scharf. Vaterl. der Kaukasus und Sicilien. 2

4. *Heracleum pubescens* M. a Bieb. Füziges Heilkraut.
Her. caucasicum Steven Fl. Cauc.

Blätter fast dreizählig, handförmig-fiederspaltig, gezähnt, filzig, die Einschnitte und Buchten gespitzt. Dolden gestrahlt. Früchte elliptisch, in der Mitte (auf der Scheibe) zottenhaarig. Vaterl. Laurien und Kaukasus. 2

5. *Heracleum villosum* Dr. Fischer. Zottenhaariges Heilkraut.

Her. decipiens et marginatum Fisch. var. ?

Blätter buchtig-fiederspaltig, lang gespitzt, scharf gezähnt, unten filzig. Dolden gestrahlt, Blumen weiß. Früchte länglich, gewimpert, in der Mitte zottenhaarig. Vaterl. Sibirien.

6. *Heracleum ligusticifolium* M. a Bieb. Liebestodblättriges Heilkraut.

Blätter doppelt zusammengesetzt, fast dreizählig, glattlich. Blättchen keilförmig, eingeschnitten-gezähnt. Dolden gestrahlt. Corollen weiß. Früchte wenig zottenhaarig. Vaterl. Laurien.

7. *Heracleum tomentosum* Smith. (Prodr. Fl. gr. 1. p. 191. Sibth. Fl. graec. t. 281.)

Blätter vielfach zusammengesetzt, filzig, eingeschnitten. Die Einschnitte lanzettförmig, gespitzt. Dolden gestrahlt. Corollen weiß. Früchte glatt, am Stande verdickt, die Fugen sehr breit. Vaterl. Griechenland. 2

8. *Heracleum aureum* Smith. Sibth. Fl. gr. t. 282.

Stengel sehr ästig. Blätter gefiedert, lappig, eingeschnitten, filzig. Wurzelblätter rundlich. Dolden meist dreistrahlig. Blumen gestrahlt. Die Buchten der Früchte halb zirkelförmig. Vaterl. Griechenland, am Berge Parnassus.

9. *Heracleum humile* Smith. J. c. I. p. 193. Niedriges Heilkraut.

Wurzel sehr lang. Stengel fast einfach, 6—10 Zoll hoch. Blätter meist doppelt gefiedert. Blättchen eingeschnitten, filzig. Dolden 4—7 strahlig. Blumen weiß. Früchte glattlich, oben mit vier länglichen rothen Linien versehen. Vaterl. Kleinasien. 2 Blühz. Sommer.

10. *Heracleum Carmeli* La Billard. Plant. rar. Syr. Dec. V. t. 1.

Stengel 1—2 Fuß hoch, wie die Aeste gestreift. Blätter gefiedert = fünfzählig. Blättchen eingeschnitten = gezähnt, das Endblättchen dreilappig. Dolde 4—6 strahlig, die inneren Strahlen kurz. Hüls 4—5 blättrig, stehen bleibend. Endrollenblätter feinborstig. Vaterl. der Berg Carmel in Syrien.

11. *Heracleum nepalense* Don. Nepalesisches Heilkraut.

Stengel ziemlich hoch, gefurcht, behaart. Blätter zweipaarig gefiedert, zottenhaarig. Blättchen lappig, stumpf, sägerandig. Corollen gelblich, gleich. Vaterl. Nepal.

Kultur. Die Heilkräuter zieht man aus Samen, der im Herbst sobald er reif ist, oder zeitig im Frühjahr ausgesät wird. Die perennirenden Arten lassen sich auch durch Wurzeltheilung vermehren und fortpflanzen.

Synonymen.

Heracleum amplifolium Lapeyr. ist *Heracleum pyrenaicum* Cuss.

— *angustifolium* Jacq. ist *Heracleum Sphondylium* var. f. Lexic.

— *caucasicum* Stev. f. *Heracleum pubescens* N. 3.

— *cordatum* Presl. f. *Heracleum asperum* N. 2.

— *decipiens* Fisch. f. *Heracleum villosum* N. 5.

— *elegans* Jacq. ist *Heracleum Sphondylium* var. f. Lexic.

— *gummiiferum* Willd. ist *Heracleum pyrenaicum* var. ?

— *lanatum* Mich. f. 1. Nachtr. ist *Heracleum Panaces* f. Lexic.

— *marginatum* Fisch. f. *Heracleum villosum* N. 5.

— *minimum* Lam. ist *Peucedanum Vocontiorum* Spr.

— *pumilum* Villars ist *Peucedanum Vocontiorum* Spr.

— *setosum* Lapeyr. ist *Heracleum Panaces* Lexic.

Hera-

Heracleum speciosum Hoffm. f. *Heracleum pyrenaicum* 1. Nachtr.

Heriteria Gmelini Michx. f. *Lachnanthes tinctoria*.

Hermannia Linn. *Hermanuie* f. Lexic. B. 4.

Character generic. et Dedication f. 1. Nachtr. B. 3. S. 666.

Kelch einfach, meist glockenförmig, fünfspaltig oder fünfteilig. Fünf schief stehende Corollenblätter, die kappenförmig über einander liegen. Staubfäden 5, an der Basis verwachsen, unter der Epige verdickt. Antheren länglich, gespalten. Griffel 5, zusammenhängend. Kapsel fünffächerig, säufklappig, vielkammig.

Monadelphia Pentandria (Familie Hermannieen.)

Diese Gattung enthält jetzt 38 Arten. Es sind Sträucher von verschiedener Größe, 1—3—5 Fuß hoch, deren Blätter wechselnd stehen. Die lieblichen, meist überhängenden Blumen entwickeln sich im Sommer. Die meisten Arten habe ich im Lexikon B. 4. beschrieben, zu denen noch folgende gehören.

1. *Hermannia bipinnata* Burch. Doppeltgefiederte Hermannie.

Herm. abrotanoides Schrad. *H. multifida* et *halicacaba* Cand. gehören hierher.

Stengel strauchig, wie die Blätter und Blumenstiele weißlich sternhaarig = filzig. Blätter theils handsförmig = doppelt gefiedert, theils fiederspaltig. Einschnitte linienförmig. Blumenstiele einblüthig. Kelche aufgeblasen, fast kugelig. Waterl. das südliche Afrika. h

2. *Hermannia commosa* Burch. Schopfige Hermannie.

Blätter eysförmig, buchtig = gezähnt, filzig. Blumenstiele zweiblüthig. Kelch aufgeblasen, fast kugelig, mit gefranzter Schopfigen Anhängen versehen. Waterl. das südliche Afrika.

3. *Hermannia decumbens* Willd. Liegende Hermannie.

Herm. humilis Thunb. Fl. cap.

Aeste liegend. Blätter lanzettförmig, stumpf, ungleich sägerandig, wenig zottenhaarig. Austerblätter lanzettförmig. Kelche aufgeblasen, fast kugelig, wie die Bracteen sehr zottenhaarig. Waterl. das südliche Afrika. h

4. *Hermannia holosericea* Jacquin f. Lexic. 1. Aufl. B. 4. S. 605. Zeile 7 von unten lies *holosericea* statt *holoserica*.

Dietr. Ter. 2r. Nachtr. IV. Bd.

C c

5. *Hermannia disticha* Schrad.

Ein Strauch, 2—3 Fuß hoch, dessen Blätter wechselnd stehen und an den Ästchen zwei Reihen (Seiten) bilden. Blumen fast rispenständig, übergebogen. Kelche halbkugelig, glockenförmig = eckig, behaart. Corollenblätter gelb, dann gelbroth. Uebrigens s. Lexic. B. 4.

6. *Hermannia incana* Cavan. Granliche Hermannie.

H. althaeoides Link Enum. hort. Berol. 2. p. 179.

Blätter länglich = eiförmig, stumpf, ausgebeissen = gekerbt, zart = filzig, grau. Aesterblätter linien = lanzettförmig. Blumenstiele kurz, zweiblümig, fast rispenständig. Kelch halbkugelig, glockenförmig. Corollenblätter gelb. Vaterl. das südliche Afrika. h

7. *Hermannia melochioides* Burch. Melochiaartige Hermannie.

Blätter eiförmig, ungleich gezähnt, glatt. Aesterblätter eiförmig, langgespitzt. Blumenstiele einblümig, kürzer als die Blätter. Kelche halbkugelig, glockenförmig. Vaterl. das südliche Afrika. h

8. *Hermannia hispidula* Reichenb. Magaz. d. Ästhetisch. Botan. Heft 15. Tab. LXIX. f. 2.

Wuchs und Anstand fast wie bei *Herm. denudata* Linn. Ästchen, Blätter, Blumenstiele und Kelche mit kleinen zarten Borsten bekleidet. Blätter länglich, an beiden Enden verbünnt, gezähnt, einfarbig. Aesterblätter ey = lanzettförmig. Blumen gelb, in schlaffen wenigblümigen gipfelständigen Rispen. Kelch glockenförmig, halbfünfspaltig. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. h

9. *Hermannia candidissima* Ant. Spr. Syst. Veg. Suppl. p. 18.

Alle Theile der Pflanze sind weißlich, sternhaarig = filzig. Stengel sehr ästig, weissschweißig. Blätter rundlich, gefaltet, gekerbt. Aesterblätter linien = lanzettförmig, stumpflich. Blumenstiele sehr kurz, doldentraubig, winkel- und gipfelständig. Kelchtheile gerundet.

Diese Art fand Seyher (nicht der Gartendirektor in Schöppingen) auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung. Sie ist der *H. plicata et candicans* Aiton zunächst verwandt, aber von ersterer durch den mehr ästigen Stengel, durch die Gestalt der Blätter und Aesterblätter und durch den Blumenstamm zu unterscheiden; die letztere unterscheidet sich haupt-

fächlich durch größere glockenförmige Kelche, durch dreimal größere Blätter und durch pfriemenspizige Afterblätter.

Kultur der Hermannien im Allgemeinen siehe Lexic. B. 4. Sie lieben Laub-, Wald- oder Eriken-Erde, mit Sand und etwas Leimen oder Rasenerde gemischt, und nehmen mit Durchwinterung im Glashause vorlieb. Man vermehrt sie durch die Aussaat des Saamens und durch Stecklinge in temperirten Beeten.

Synonymen.

- Hermannia abrotanoides* Schrad. f. *Hermannia bipinnata* N. 1.
 — *althaeifolia* Jacq. f. *Hermannia plicata* Ait. Lexic.
 — *althaeoides* Link f. *Hermannia incana* N. 6.
 — *argentea* Smith ist *Hermannia pulverata* Andr. f. 1. Nachtr.
 — *aspera* Wendl. ist *Hermannia scabra* L. f. Lexic.
 — *coronopifolia* Link ist *Hermannia incisa* L. f. Lexic.
 — *filifolia* L. Suppl. ist *Hermannia linifolia* f. Lexic.
 — *grandiflora* Ait. (f. 1. Nachtr.) ist *Mahernia grandifl.* Burch.
 — *halicacaba* Cand. f. *Hermannia bipinnata* N. 1.
 — *hirta* Sparrm. ist *Hermannia scabra* Lax.
 — *humilis* Thunb. f. *Hermannia decumbens* N. 3.
 — *latifolia* Jacq. f. *Hermannia micans* Lex.
 — *multifida* Cand. f. *Hermannia bipinnata* N. 1.
 — *pinnata* Linn. f. *Mahernia pinnata*.
 — *velutina* Burch. ist *Hermannia salvifolia* Linn. ?

Hermas Linn. Stiedholde f. Lexic. B. 4. (Thunb. Nov. Act. Petrop. 14. t. 12.)

Blumen polygamisch, in Dolden, die länger als die Hüllblätter sind; die seitenständigen Doldenstrahlen tragen männliche, die mittlern Zwisterblumen, deren Staubfäden zuweilen

unfruchtbar sind. Früchte oval, fast zusammengedrückt, ohne Rippen.

Pentandria Digynia (Familie Doldengewächse.)

1. *Hermas rudissima* Reichenb. (*Lichtensteinia lacera* Schlechtend. in *Linnaea* 1. p. 394.)

Wurzelblätter länglich = umgekehrteyförmig, lappig, zartborstig = gewimpert, glabert, unten scharf. Blattstiele dick, scheidenartig. Dolden zusammengesetzt, langgestielt. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. 4

Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören, nebst Anleitung zu ihrer Kultur s. *Lexic.* B. 4.

Hermesia Humb. et Bonpl. *Hermesse*.

Character generic. s. 1. Nachtr. B. 3. S. 668. Daselbst habe ich nur eine Art: *Hermesia castaneaefolia* Humb. aufgeführt, die Andr. Jussieu zu *Alchornea* gezogen hat.

Hermesia banksiaefolia Spr. *Syst. veg.* 2. p. 236. ist *Collicomia serratifolia* R. Brown.

Blätter gegenüberstehend, lanzettförmig, sägerzählig, die Serraturen mucronenspizig, unten filzig. Blumen kopfförmig.

Hernandia guianensis Aubl. s. *Lexic.* 1. Aufl. B. 4. S. 612. ist *Hernandia ovigera* Linn. s. *Lexic.* 1. Aufl. S.

Herniaria Linn. Bruchkraut s. *Lexic.* B. 4. (Abbild. Schkuhrs Handb. t. 50.)

Character generic. s. 1. Nachtr. B. 3. S. 669.

Kelch fünfblättrig, stehen bleibend. Keine Corolle. Staubfäden 10, davon aber 5 unfruchtbar sind; sie stehen auf dem Basal des Kelches. Griffel 2. Kapsel einsamig.

Pentandria Digynia (Familie Chenopodeen.)

1. *Herniaria vulgaris* Spr. ist *Hern. glabra* Linn. wozu *H. hirsuta* L. als Varietät gezogen ist, eben so *H. cinerea* Cand. und *H. annua* Lag.

2. *Herniaria incana* Lamarck. Weißgraues Bruchkraut.

Stengel Staudenstrauchig, gestreckt, wie die Blätter weißgrau = behaart. Blätter spatel = lanzettförmig, büschelförmig stehend. Blumen winkelförmig. Kelche scharfborstig. Vaterl. das südliche Frankreich und Taurien. 4 h

Zu dieser Art hat Sprengel folgende gezogen, jedoch mit? *H. Mellegrena* Pall. *H. hirsuta* M. a Bieb. (nec Linn.) *H. alpina* Lois. *H. lenticulata* Linn. *H. ma-*

crocarpa Smith. *H. maritima* Link. f. 1. Nachtr. B. 3.

Kultur. Diese Gewächse zieht man aus Saamen, der an der bestimmten Stelle ins Land gesät wird. N. 1. pflanzt sich durch Saamenausfall selbst fort.

Synonymen.

Herniaria alpestris Lam. ist *Herniaria alpina* Vill. f. Lexic.

- *alpina* Lois. f. *Herniaria incana* N. 2.
- *annua* Lag. f. *Herniaria vulgaris* N. 1.
- *cinerea* Cand. f. *Herniaria vulgaris* N. 1.
- *erecta* Desf. ist *Herniaria polygonoides* Cav. f. Lexic.
- *glabra* Linn. f. *Herniaria vulgaris* N. 1.
- *hirsuta* Linn. f. *Herniaria vulgaris* N. 1.
- *hirsuta* M. a Bieb. f. *Herniaria incana* N. 2.
- *lenticulata* L. f. *Herniaria incana* N. 2.
- *macrocarpa* Sm. f. *Herniaria incana* N. 2.
- *maritima* Link. f. *Herniaria incana* N. 2.
- *Mellegrana* Pall. f. *Herniaria incana* N. 2.

Herpestes Gaertn. Sem. 1. 214. *Herpestes*.

Character generic. und 10. Arten f. 1. Nachtr. B. 10. Anhang C. 172. Man lese dafelbst *Herpestes* statt *Herpestis*.

Reich fünftheilig, die Einschnitte ungleich. Corolle röhrig, zweilippig. Staubfäden 4, ungleich, eingeschlossen. Kapsel von dem stehenbleibenden Kelche bedeckt, zweifächerig, zweiflappig, die Klappen zweifaltig.

Didynamia Angiospermia (Familie Personaten.)

Die Arten dieser Gattung sind krautartige Pflanzen, deren Stengel theils aufrecht, theils gestreckt oder kriechend sind. Blätter gegenüberstehend. Blumen winkelfständig, meist weiß, auch blau oder fleischroth, oder gelblich.

† *Calycibus bracteatis*.

Kelche mit Bracteen versehen.

Zu dieser Abtheilung gehören die im 1. Nachtr. B. 10. Anhang C. 172. beschriebenen Arten: *Herpestes* (nicht *Herbestis*) *cuneifolia*, *rotundifolia*, *amplexicaulis* Pursh und folgende.

1. *Herpestes domingensis* Spr. Domingensische Herpestes.
Stengel aufrecht, ästig, glatt. Blätter gestielt, länglich, gekerbt, an der Basis verdünnt. Blumenstiele quirlständig. Fruchtsiele neßaderig. Waterl. St. Domingo. 4
2. *Herpestes floribunda* R. Brown. Vielblümige Herpestes.
Stengel aufrecht, glatt. Blätter linear-lanzettförmig. Blumenstiele winkelförmig, meist fünfblümig. Fruchtsiele neßaderig. Waterl. Neuhollland und Ostindien.
3. *Herpestes stricta* Schrad. Link Enum. hort. berol. 2. p. 142.
Stengel aufrecht, fast einfach, eßig, glatt. Blätter gestielt, lanzettförmig, gespißt, am Stiele herablaufend, ungleich sägerandig, 4—6 Zoll lang, über 1 Zoll breit. Blumenstiele zu 4—6 winkelförmig oder fast einzeln. Kelchtheile eßförmig, gekerbt. Corolle blau. Waterl. Brasilien. 4
4. *Herpestes erecta* Spr.
Stengel aufrecht, fast ästig, wie die Blätter zottenhaarig. Blätter länglich-eßförmig, fast gekerbt. Blumenstiele abgekürzt. Waterl. Brasilien. 4 ?
5. *Herpestes micrantha* Pursh. (*Gratiola repens* Sw. f. Lexic. B. 4. gehört hierher.
Stengel kriechend, glatt. Blätter stiellos, rundlich, stumpf, gestreift-gerippt. Blumenstiele kürzer als die Blätter. Waterl. Jamaika.
6. *Herpestes rugosa* Roth. Runzelblättrige Herpestes.
Stengel kriechend. Blätter eßförmig, stumpf, sägerandig, gerunzelt, unten grubig-punktirt. Blumen in gestielte winkelförmige Köpfchen gesammelt, die zu 2 beisammen stehen. Waterl. Ostindien. 4
7. *Herpestes connata* Spr. (*Cybbanthera connata* Hamil. Don.)
Stengel aufrecht, ästig, wie die Blätter glatt. Blätter stiellos, an der Basis verbunden, eßförmig, fein gekerbt, gerippt. Blumen stiellos, wechselnd stehend mit drei Bracteen versehen.
8. *Herpestes fiellarioides* Schlechtend. Linnaea B. 8. S. 32. (*Baramia* Mart.)
Stengel fast einfach, aufrecht, wie die Blätter glatt, 1—2 Fuß hoch. Blätter stiellos, meist zu 3 stehend, linear-lanz-

zettelförmig, an der Spitze gezähnt. Blumenstiele winkelfständig, so lang als die Blätter. Bracteen und Kelch wie bei *H. Monnieria* Kunth (*H. amplexicaulis* Pursh.?) Waterl. Brasilien. 4

†† *Calycibus ebracteatis.*
Kelch ohne Bracteen.

Hierher gehören die im 1. Nachtrage B. 10. abgehandelten Arten; *Herp. caprarioides*, *columbrina*, *vandelioides* Kunth und folgende,

9. *Herpestes glechomoides* Spr.

Stengel krautartig, aufsteigend. Blätter umgekehrteiförmig, gekerbt, glattlich. Blumenstiele in den Blattwinkeln einander gegenüberstehend. Kelch behaart. Waterl. Brasilien, Rio grande, 4

10. *Herpestes procumbens* Spr. Gestreckte Herpestes.

Stengel gestreckt, wurzelnd, glattlich. Blätter stiellos, umgekehrteiförmig, ganzrandig. Blumenstiele einzeln winkelfständig, kürzer als die Blätter. Waterl. Brasilien. 4

11. *Herpestes cubensis* Poppig. Cubaische Herpestes.

Stengel aufsteigend, glatt. Aeste ruthenförmig. Blätter gestielt, rundlich, eiförmig, fein gekerbt. Blumenstiele fadenförmig, in den Blattwinkeln einander gegenüberstehend, länger als die Blätter. Waterl. die Ins. Cuba. 4

12. *Herpestes linearis* Spr. (*Lindernia sesamoides* Spr. Neue Entd.)

Stengel niedrig, ästig. Blätter linienförmig, ganzrandig, glatt. Blumenstiele einblüthig, gepaart, winkelfständig. Waterl. Coimandel.

13. *Herpestes montevidensis* Spr.

Stengel ausgebreitet. Aeste aufrecht, knieartig gebogen. Blätter länglich-linienförmig, ganzrandig, stumpflich, wie die Aeste glatt. Blumenstiele winkelfständig, überhängend, länger als die Blätter. Waterl. Monte Video.

14. *Herpestes caespitosa* Schlechtend. *Linnaea* B. 8, p. 1. S. 33.

Stengel, mehrere aus einer Wurzel, wie die Blätter glatt, und bilden Rasen. Blätter lanzettförmig, ganzrandig, dicklich, ohne Rippen. Blumenstiele an den Spitzen der Aeste länger als die Blätter. Die Einschnitte des Kelches eiförmig, gespißt. Waterl. Brasilien.

15. *Herpestes herniarioides* Schlechtend. J. c. C. 34.
 Stengel krautartig, viereckig, sehr ästig, niedrig, wurzelnd.
 Blätter eiförmig, gestielt. Stiele verbunden. Blumen win-
 kelständig, kurz gestielt. Brasilien.

Kultur. Die Arten, welche in Nordamerika wild wach-
 sen, gedeihen unfehlbar auch in unsern Gärten unter freiem
 Himmel. Die übrigen, und zwar die meisten Arten kommen
 aus Tropenländern und verlangen warme Standörter (Durch-
 winterung in Gewächshäusern.) Man zieht sie aus Saamen
 und vermehrt noch überdies die perennirenden durch Wurzel-
 theilung.

Herpestes callitrichoides f. 1. Nachtr. B. 10. Anhang ist
Morgania callitr. Spr.

Herpestes moranensis Kunth f. 1. Nachtr. B. 10. Anhang
 ist *Herpestes cuneifolia* Pursh.

Hesperantha Ker. (*Jxia* Jacq. Thunb.) *Hesperantha*.
 Corolle röhrig, der Rand fast regelmäßig, 6theilig. Narbe
 lang und tief getheilt, wodurch sich diese Gattung am meisten
 von *Jxia* Linn. unterscheidet.

Triandria Monogynia (Familie Coronarien; Scheiden-
 pflanzen.)

1. *Hesperantha radiata* Ker.

Blätter röhrig. Blumen einseitig, die Einschnitte der Co-
 rolle zurückgeschlagen. Hierher gehört *Jxia fistulosa* Andr.
 Repos. und *Jxia radiata* Jacq. f. Lexic. B. 5. C. 225.

2. *Hesperantha falcata* Ker.

Blätter schwerdt-sichelförmig. Blumenscheiden so lang als
 die Corollenröhre. Die Einschnitte der Corolle ausgebreitet.
 Hierzu gehört *Jxia falcata* Thunb. f. Lexic. B. 5. und
Jxia cinnamomea Andr.

3. *Hesperantha cinnamomea* Ker.

Blätter fast lanzett-sichelförmig, am Rande zurückgeschla-
 gen und wellenförmig gekräuselt. Scheiden kürzer als die
 Corollenröhre. Corollen aufrecht. Uebrigens siehe Lexic.
 B. 5. *Jxia cinnamomea* L. Thunb. die hierher gehört.

4. *Hesperantha angustata* Ker.

Blätter linienförmig, glatt. Schaft einfach, knieartig ge-
 bogen. Blumen einseitig. Hierher gehört *Jxia angusta*
 Vahl. Willd. f. Lexic. B. 5. C. 210.

5. *Hesperantha pilosa* Ker.

Blätter linienförmig, behaart. Schaft glatt, wenigblümig. Blumen aufrecht. Scheiden so lang als die Corollenröhre. Hierher gehört: *Jxia pilosa* L. Thunb. f. Lexic. B. 5.

Hesperis Linn. *Hesperis*; Nachtviole. G. Lexic. B. 4. Character generic. B. 3. G. 671.

Kelch geschlossen, an der Basis sackförmig. Corollenblätter 4, schief, gestellt. Staubfäden 6, die längern an der Basis breiter als oben. Schote rundlich oder fast vierkantig, an der Spitze stumpf, mit zusammengebrückter Narbe gekrönt. Saamen eiereichig.

Tetradynamia Siliquosa (Familie Kreuzblumen.)

1. *Hesperis alyssifolia* Cand. Steinkrautblättrige Nachtviole.

Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, ganzrandig, sternhaarig = filzig. Blumenstielchen und Kelche sehr zottenhaarig. Corollenblätter länglich = linienförmig, fast weitenrandig. Vaterl. Persien. 2

2. *Hesperis nivea* Baumg. Schneeweiße Nachtviole.

Stengel krautartig, scharfborstig. Blätter ey = lanzettförmig, gezähnt, behaart = borstig, untere gestielt, obere stiellos, umfassend. Schoten behaart, abstehend. Vaterl. Europa auf Alpen. D 2

3. *Hesperis heterophylla* Tenor. Verschiedenblättrige Nachtviole.

Stengel ästig, weitschweifig, wie die Blätter filzig. Blätter, untere elliptisch, fast ganzrandig, obere ey = lanzettförmig, sägerandig. Schoten aufrecht, dünn, fast filzig. Vaterl. Nepal. 2

4. *Hesperis Steveniana* Cand. Stevenianische Nachtviole.

Stengel aufrecht, einfach, wie die Schoten scharfborstig. Wurzelblätter glattlich, schrotsägeförmig. Stengelblätter ey = lanzettförmig, eingeschnitten = gezähnt, wenig scharfborstig. Vaterl. Laurien.

5. *Hesperis hyrcanica* Spr. (*Cheiranthus versicolor* Pall. Willd. herb.)

Stengel strauchig, niedrig, mit Blättern dicht besetzt, oben sehr rauchhaarig. Wurzelblätter spatel = linienförmig, weißfilzig, die obern, neben den Blumen, linienförmig, wie die Kelchblätter scharfborstig. Vaterl. das nördliche Persien. H

6. *Hesperis nitens* Viv. Glänzende Nachtviole.

Stengel sehr ästig, wie die Blätter glattlich. Blätter stiellos, länglich-linienförmig, stumpf, ganzrandig, glänzend. Schoten sehr kurz gestielt, zusammengebrückt = fast viereckig, mit doppelten Narben gekrönt. Vaterl. Regia Cyrenai-ca. 2.

7. *Hesperis pygmaea* Delil. Zwerg-Nachtsviole.

Stengel niedrig = zwergig, aber ästig, wie die Blätter sternhaarig = filzig, scharf. Blätter länglich, stumpf, buchtig. Schoten sehr dünn, glatt. Vaterl. Syrien und Aegypten. 2 ?

8. *Hesperis pulchella* Cand. Liebliche Nachtsviole.

Stengel fast ästig, glatt, am Grunde blättrig. Blätter buchtig = fiederspaltig, gewimpert, die Wimperhaaren ästig. Schoten gestielt, glatt. Vaterl. Syrien. ?

9. *Hesperis crenulata* Cand. Gekerbte Nachtsviole.

Stengel aufrecht, ästig, scharf. Blätter länglich, stumpf, stiellos, umfassend, gekerbt, wie die Schoten glatt. Vaterl. Mesopotamien.

10. *Hesperis diffusa* Banks ist *Sinapis frutescens* Ait. f. Lexic. B. 9. *Sinapis angustifolia* Cand.

Kultur der längst bekannten Nachtsvioletten siehe Lexic. B. 4. Die vorstehenden neuen Arten vermehrt man, wie jene, durch die Aussaat der Saamen, durch Wurzeltheilung, die Sträucher auch durch Stedlinge. N. 1, 5, 6 und 7. überwintert man in frostfreien Behältern.

Zu den Synonymen im 1. Nachtrage B. 3. S. 673. gehören noch folgende:

Hesperis acris Forsk. f. *Moricandia hesperidiflora* Cand.

— *alyssoides* Pers. f. 1. Nachtr. ist *Malcolmia alyssoides* Cand.

— *angustifolia* Lam. ist *Malcolmia tristis* R. Br.

— *arenaria* Lag. Desf. (f. Lexic.) ist *Malcolmia patula* Cand.

— *Cheiranthus* Pers. (f. Lexic.) ist *Hesperis aprica* 1. Nachtr.

— *cinerea* Poir. ist *Cheiranthus scoparius*.

— *contortuplicata* M. a B. ist *Sisymbrium contort.* Cand.

- Hesperis diffusa* Lam. (nec. Banks.) ist *Hesperis africana* Lexic. *Malcolmia* R. Br.
- *frutescens* Poir. ist *Cheiranthus semperflorens* Schousb.
- *glandulosa* Pers. (s. 1. Nachtr.) ist *Sisymbrium integrifolium* Linn.
- *hieracifolia* Vill. ist *Hesperis laciniata* All. f. Lexic.
- *inodora* Gouan. ist *Agrabis cebenensis* Cand.
- *inodora* Linn. (s. Lexic.) ist *Hesperis matronalis* var.
- *litorea* Lam. ist *Malcolmia litorea* R. Br.
- *maritima* Lam. ist *Malcolmia maritima* R. Br. *Cheiranthus* Lexic.
- *parviflora* Cand. f. *Malcolmia parviflora*.
- *parviflora* Poir. f. *Matthiola parviflora* *Cheiranthus* Lexic.
- *pilosa* Poir. f. *Sisymbrium pectinatum* Fisch.
- *pinnata* Pers. (s. 1. Nachtr.) ist *Sisymbrium pectinatum* Fisch.
- *pinnatifida* Desf. (nec Michx.) ist *Malcolmia triloba* Spr.
- *punctata* Poir. ist *Sisymbrium pectinatum* Fisch.
- *rigida* Stev. ist *Sisymbrium rigidum* M. & Bieb.
- *scapigera* Cand. ist *Nevroloma arabisiflora* Cand.
- *suaveolens* Bess. ist *Hesperis laciniata* All. f. Lexic.

Hesseea spiralis Berg. ist *Strumaria spiralis* Ker.

Heteranthera Pal. Brown. *Heteranthere*. C. Lexic. B. 4.

Character generic. s. 1. Nachtr. B. 3. C. 673.

Corollenröhre dünn, sehr lang, der Rand sechsseitig, fast regelmässig. Staubfäden 3, in die Mündung der Corollenröhre eingefügt. Antheren gleich oder verschieden gestaltet. Ein röhriger Griffel, mit offener gefranzter Narbe. Kapsel dreiflappig.

Triandria Monogynia (Familie Hydrochariden. ?)

1. *Heteranthera zosterifolia* Martius Nov. gen. et sp.

1. p. 7. t. 3.

Stengel (mehrere aus einer Wurzel) dünn, fast zusammengebrückt; sie stehen dicht beisammen und bilden einen dichten Rasen. Blätter wechselnd stehend, am Stengel entfernt, an den Aesten gedrängt, stiellos, zweireihig, liniensförmig, stumpflich, an der Basis scheidenartig ausgebreitet, weiß oder purpurroth gerändert, 1—2 Zoll lang, 1—2 Linien breit. Blumen scheiden häutig, zweiblümig, glatt, punkirt. Blumen abwechselnd gestielt, abwechselnd anstehend. Corolle stehen bleibend, die Röhre $1\frac{1}{2}$ Zoll lang, weiß, der Rand horizontal abstehend, die Einschnitte linien-lanzettförmig, violett, die drei inneren etwas kürzer als die äußeren, an der Basis gelb gefleckt. Staubfäden in der Mitte etwas verdickt. Antheren eiförmig, gleich, gelb. Narbe fast dreikantig-kopfförmig. Kapsel cylindrisch-lanzettförmig, glatt. Vaterl. Brasilien, in und an Wässern. 4

2. *Heteranthera alismoides* Link. Jahrb. I. 3. p. 73.
Alismaartige Heteranthera.

Blätter länglich = fast herzförmig, gespißt, ausgeschweift, 10 Linien lang, 4 Linien breit. Corollenröhre 8 Linien lang, gekrümmt, einige Linien aus der Scheide hervorstehend. Vaterl. Caracas. 4 ?

Die übrigen hierher gehörenden Arten und Anleitung zu ihrer Kultur im Allgemeinen s. 1. Nachtr. B. 3. S. 676.

Heteranthera decipiens Nees ist *Vrolikia polygaloides* Spr.

Heterocoma Cand. in ann. 16. t. 7. 8.

Blüthendecke (Kelch) schuppig, die Schuppen unbewaffnet, schlaff, hinfällig. Fruchtboden mit ganzen Spreublättern besetzt. Saamentrone doppelt, äußere spreizig; innere haarigborstenförmig.

Syngenesia 1. Ordn. (Familia Compositae.)

1. *Heterocoma albida* Cand. (*Serratula albida* Cand. Pers. Synops.)

Stengel strauchig oder staudenstrauchig, aufrecht. Blätter stiellos, umfassend, länglich, ganzrandig, auf beiden Seiten sitzig = weißlich. Blumen einzeln, winkelförmig, stiellos. Vaterl. Brasilien. ♀ Blüht. Sommer.

2. *Heterocoma bifrons* Cand. (*Serratula bifrons* Cand. Pers. Synops.)

Stengel strauchig. Blätter gestielt, länglich = elliptisch, gekerbt, oben weichstachelig = scharf, unten, wie die Aeste, wol-

fig. Blumen einzeln, winkelförmig, stiellos. Vaterl. Brasilien. h

Beide Arten kommen aus Brasilien und verlangen warme Standörter. Fortpflanzung durch Samen und Stecklinge.

Heterodendron Desfont. Ann. d. Mus.

Kelch trugförmig, am Rande ausgeschnitten. Staubfäden 10 sehr kurz. Antheren vierkantig, zweifächerig. Kein Griffel. Fruchtknoten 4, kugelförmig.

Decandria Monogynia (Familie Erebaceen.)

1. **Heterodendron oleaeifolium Desf.**

Ein Strauch, dessen Aeste glatt sind. Blätter wechselnd stehend, länglich-lanzettförmig, bläulich-grün, glatt. Blumen in winkelförmige Trauben gesammelt. Vaterl. Neuhol-land. h

Kultur. Gute lockere Dammerde und Durchwinterung im Glashause.

Heterbloma Desv. f. Hedysarum molliculum (2 Nachtr.)

N. 8.

Heteromorpha arborescens Schlechtend. ist Bupleurum arborescens Linn.

Heteropteris Humb. et Bonpl. (Banisteriae Spec. Auct.)

Diese Gattung hat Spr. in Silt. veg. 1. p. 388. zur Banisteria Linn. gezogen. Da ich die ihr zugehörten Arten im Verikon unter Banisteria nicht aufgeführt habe, so mögen sie hier folgen.

1. **Heteropteris argentea Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. V. p. 127. t. 450. (Banisteria argentea Spr.)**

Aestchen rundlich, mit weißen Seidenhaaren bedeckt. Blätter gegenüberstehend, gestielt, elliptisch-länglich, langgespitzt, ganzrandig, geädert, unten seidenhaarig-silberfarbig, 3 Zoll lang, 1½ Zoll breit. Blumen gestielt; sie bilden reiche winkelförmig- und gipfelförmige Trauben, die mit Blättern und sehr kleinen Bracteen besetzt sind. Kelch silberfarbig-seidenhaarig. Die Einschnitte eiförmig; vier Einschnitte sind auswendig mit zwei länglichen Drüsen versehen, der fünfte ohne Drüsen. Corollenblätter rosenroth, mit langen Nägeln. Platte kreisförmig, am Rande gefranzt. Staubfäden 10, an der Basis verbunden, mit elliptischen Antheren gekrönt. Fruchtknoten eiförmig. Vaterl. Mangranda. h

2. *Heteropteris floribunda* Kunth J. c. V. p. 166. (*Banisteria floribunda* Cand.? f. Syst. veg. ed. Spr. *Heteropt. appendiculata* Cand.?)

Neste rund, glatt. Nestchen wenig zusammengedrückt, in der Jugend graufilzig. Blätter gegenüberstehend, gestielt, länglich, an beiden Enden gespitzt, ganzrandig, geadert, glatt, einfarbig, fast lederartig. Blumen gestielt; sie bilden reiche winkels- und gipfelfständige Rispen, deren Nester einander gegenüber stehen, und wie die Bracteen rostfarbig-silzig sind. Kelchtheile rostfarbig-silzig, ohne Drüsen. Vaterl. Mexiko. ♀ Blühz. Mai.

3. *Heteropteris cornifolia* Kunth J. c. V. t. 450. (*Banisteria cornifolia* Spr.)

Nestchen glatt. Blätter elliptisch-länglich, an beiden Enden gespitzt, fast lederartig, oben glänzend, unten seidenhaarig, blaulich-grün. Blumen in Doldentrauben, die winkels- und gipfelfständige Rispen bilden. Vaterl. Neugranada. ♀ Blühz. Oktober.

Kultur wie die Banisterien f. Lexic. und 1. Nachtr.

Synonymen.

Heteropteris longifolia Kunth ist *Banisteria longifolia* Sw. f. Lexic.

— *platyptera* Cand. ist *Banisteria brachiata* Linn. f. Lexic.

— *purpurea* Kunth ist *Banisteria purpurea* Linn. f. Lexic.

Heterosperma ovatifolia Cav. f. *Heterospermum maritimum*.

Heterospermum Cavan. Icon. 3. t. 276. Doppelsaame.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 676.

Blüthendecke (Kelch) doppelt, äußerer viertheilig, innerer vielblättrig. Fruchtboden flach, mit Spreublättchen besetzt. Scheibenblümchen röhrig. Randblümchen zungenförmig. Saamen verschieden gestaltet, theils zusammengedrückt, hautrandig, theils keulenförmig, mit zwei Granen gekrönt.

Syngenesia 2. Ordn. (Familie Compositae.)

1. *Heterospermum maritimum* Kunth. Meerstrands Doppelsaame.

Heterosperma ovalifolia Cav. f. *H. ovatum* L.

Nachr. B. 3. S. 676. Waterl. Peru bei Truxillo am Meerufer. ☉ Blühz. Septemb. Abbild. Humb. et Bonpl. Nov. gen. et spec. pl. IV. t. 383.

2. *Heterospermum diversifolium* Kunth J. c. IV. p. 246. t. 384. Verschiedenblättriger Doppelsaame.

Stengel krautartig, ästig, die Aeste gegenüberstehend. Blätter verschieden, gestaltet, untere dreispaltig, obere umgekehrt-eiförmig, an der Spitze gekerbt-gezähnt, oder ganzrandig. (Kunth Synops.) Blumenstiele einblüthig. Waterl. Ault. ☉

Blüht daselbst im Januar und Februar.

Kultur. Diese krautartigen Pflanzen zieht man aus Saamen in temperirten Beeten und setzt dann die jungen Pflanzen, wenn kein Frost mehr zu fürchten ist, an einer schicklichen Stelle ins freie Land.

Heterostega juncifolia Desv. ist *Atheropogon juncifolius* Spr.

Heterostemon Desfont. Annal. du mus. ?

Kelch fünfspaltig, von zwei Bracteen unterstützt. Corolle dreiblättrig. Staubfäden 8, verbunden; drei davon sind mit vollkommenen Antheren gekrönt, die übrigen fünf unfruchtbar. Hülse vielSaamig.

Diadelphia Triandria (Familie Hülsenpflanzen.)

1. *Heterostemon mimosoides* Desf.

Stamm baumartig. Blätter vielpaarig gefiedert. Blättchen länglich, an der Basis schief, abgestutzt, an der Spitze ausgerandet. Blattstiele geflügelt. Blumen in Doldentrauben gesammelt. Waterl. Brasilien. ♀ Standort: warmes Haus.

Heterotrichum salsum M. a Bieb. f. *Saussurea salsa*.

Heuchera Linn. Heuchere f. Lexic. B. 4. (Schkuhr's Handb. t. 58.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 677.

Kelch bauchig, fünfzählig. Corollenblätter schmal, zwischen den Kelchzähnen stehend. Staubfäden 5, kelchständig. Antheren pfelförmig, zweilappig. Zwei gestielte Griffel. Kapsel halb zweifächerig. Die Saamen sitzen an den eingebogenen Rändern der Klappen.

Pentandria Digynia (Familie Saxifrageen.)

Diese Gattung hat Linn. bestimmt und sie dem Herrn Joh. Henr. Heucher zu Ehren *Heuchera* genannt. Heucher (geb. 1677. † 1747.) war Professor in Wittens

berg, wo er Verzeichnisse der damals im Universitäts-Garten befindlichen Pflanzen herausgab, und zwar unter dem Titel: „Novi proventus 1713.“

1. *Heuchera pubescens* Pursh. Filzige Heuchere.

Alle Theile der Pflanze sind mit pulverartigem Filz bekleidet. Stengel krautartig, schaftartig. Wurzelblätter rundlich-lappig, gezähnt. Blumen rispenständig, die Nester der Rispe abgekürzt, gedrängt stehend. Corollenblätter spatelförmig, bläulich oder gelb-grünlich, größer als der Kelch. Staubfäden fast so lang als die Corollenblätter. Vaterl. Nordamerika an Bergen. 4

2. *Heuchera hispida* Pursh. Scharfborstige Heuchere.

Stengel schaftartig, wie die Blätter scharfborstig. Blätter spitzlappig, gezähnt. Die Blumen bilden gestielte wenigblümige Rispen. Corollenblätter spatelförmig, so lang als die Kelche. Staubfäden hervorragend. Vaterl. Virginien. 4

3. *Heuchera Richardsonii* R. Brown. (*H. glabra* Palas.)

Blätter und Kelche glattlich. Blätter siebenlappig, sägerandig. Rispe einfach. Kelche an der Mündung schief. Vaterl. Nordamerika. 4

4. *Heuchera caulescens* Pursh. Staudenstrauchige Heuchere.

Stengel staudenstrauchig, wie die Blätter wenig behaart. Blätter spitzlappig. Blumen rispenständig, die Nester der Rispe zurückgeschlagen. Kelche scharfborstig. Corollenblätter gelb. Staubfäden hervorragend. Vaterl. Carolina. 4 h

Kultur. Die Heucherien kommen aus Nordamerika und gedeihen in unsern Gärten unter freiem Himmel. Man zieht sie aus Samen und vermehrt sie noch überdies durch Wurzeltheilung.

Heurnia Rob. Brown. Heurnie. (*Stapelia* Sp. Jacq. Mass.)

Corolle glockenförmig, der Rand mit 10 Zähnen versehen, davon 5 abwechselnd größer sind. Der Kranz (innere Corolle) doppelt, der innere besteht aus fünf gespitzten Hörnchen, die an der Basis höckerig sind; der äußere aus gespaltenen Lappen. Die Pollenmassen paarweise an der Basis verbunden.

Pentandria Digynia (Familie Contorten.)

Diese Gattung widmete Rob. Brown. dem Hrn. Julius Heurnius, der mit seinem Bruder (Professor in Leyden?)

Abbild:

Abbildungen von mehreren im südlichen Afrika gesammelten Pflanzen herausgegeben hat.

1. *Heurnia venusta* R. Br.

Corolle punktiert-gesleckt, glattlich, die Schnäbelchen (Hörnchen der innern Corolle) abstehend. Hierher gehört: *Stapelia venusta* Masson. f. Lexic. B. 9. S. 484.

2. *Heurnia verticillata* R. Br.

Corolle gesleckt, wenig scharfborstig, die Schnäbelchen verlängert, gebogen-abstehend. S. *Stapelia reticulata* Mass. Lexic. B. 9. S. 481.

3. *Heurnia ovellata* Spr. (*Stapelia ovellata* Jacq. St. lentiginosa Curt. Bot. Mag. f. *Stap. guttata* Mass. Lexic. B. 9. S. 475.)

4. *Heurnia campanulata* R. Br.

Corolle gesleckt, behaart. Hörnchen der innern Corolle abgefürzt, gebümmelt, die Lappen der äußern breit, abgestutzt-ansgerandet. Hierher gehört: *Stapelia campanulata* Mass. f. Lexic. B. 9. S. 471.

5. *Heurnia barbata* R. Br.

Corolle fast röhrig, gesleckt, wenig scharfborstig. Schnäbelchen verlängert, knieartig gebogen. S. *Stapelia barbata* Lexic. B. 9. S. 470.

6. *Heurnia tubata* R. Br.

Corolle fast röhrig, punktiert. Schnäbelchen knieartig gebogen, abstehend, die Lappen abgefürzt, ausgekerbt. Hierher *Stapelia duodecimfida* Jacq. *Stap. humilis et tubata* Mass. f. Lexic. B. 9.

7. *Heurnia clavigera* R. et Schult. Syst. Veg. VI. p. 9. (*Stapelia clavigera* Jacq.)

Keste rund, 5—6 eckig, aufrecht oder aufsteigend, $\frac{1}{2}$ Fuß lang, 1 Zoll im Durchmesser dick, gezähnt, die Zähne steif, abstehend. Blumenstiele einzeln stehend. Corolle glockenförmig, stinkend, auswendig blaßgrün, inwendig dunkelgelb, mit blutrothen Flecken und keulensförmigen Haaren. Der Rand groß, die Einschnitte abgefürzt, abwechselnd kleiner, die Lappen der innern Corolle stumpf, ausgekerbt. Vaterl. Kap d. g. Hoffnung. h

Kultur. Die Heurnien geheißen wie die Stapelien, am besten in warmen Häusern. Man pflanzt sie in gute leichte Erde und vermehrt sie durch Stecklinge (Zweige.)
Dietr. Verz. 2^{te} Nachtr. IV. Bd. D b

Hevea guianensis Aubl. f. *Siphonia elastica*.

Hexadica Lour Fl. Chin. et Cochinch.

Blüthen monöisch. ♂ Kelch fünfstheilig. Corolle fünfblättrig. ♀ Kelch sechsstheilig, stehenbleibend. Narben 6, aufsteigend. Kapsel sechsfächerig, sechsfaamig.

Monoecia Pentandria (Familie Ericofteen.)

1. *Hexadica cochinchinensis* Lour. Fl. Cochinch.

Ein Baum, dessen Aeste aufrecht = absteigen. Blätter wechselnd stehend, länglich = eiförmig, stumpf, ganzrandig, glatt. Blumen klein, weiß, in gipfelständigen Büscheln. Vaterl. Cochinchina. h

Kultur. Gute lockere Dammerde und eine Stelle im warmen Hause oder in einem Lepidarium (6—8° Reaum.) Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.

Heyderia Abietis Fries. f. *Leotia Mitrula* Pers.

Heylandia Candolle Legum. Heylandie.

Kelch fünfspaltig. Corolle schmetterlingsförmig. Schiffehen schief abgestutzt, gespitzt. Griffel zurückgebogen. Hülse zusammengedrückt, einsaamig.

Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflanzen.)

1. *Heylandia hebecarpa* Cand. Legum. t. 34.

Aeste ruthenförmig, wie die Blätter behaart. Blätter stiellos, halb umfassend, elliptisch = herzförmig, stumpf. Blumen fast stiellos, einzeln, winkelförmig. Hülssen scharfborstig. Vaterl. Seylon. h ?

2. *Heylandia leiocarpa* Cand. Hierher gehört *Hallia hirta* Willd. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 608.

3. *Heylandia latebrosa* Cand.

Blätter gestielt, eiförmig, gezähnt, glatt. Blumen gestielt, winkelförmig, gepaart. Hülssen filzig, unter die lappenförmigen Bracteen versteckt. Hierher gehört *Hedysarum latebrosus* Linn. f. Lexic. B. 4. S. 542. und *Hed. Lespedezia* Pers. Vaterl. Ostindien. h

4. *Heylandia Perrottetii* Spr. (*Crotalaria Perrottetii* Cand.)

Aeste ruthenförmig, wenigblättrig, wie die Kelche scharfborstig. Blätter linien = pfriemenförmig. Blumen gehäuft, traubenständig. Hülssen zottenhaarig. Vaterl. Senegambia.

Kultur. Fortpflanzung und Vermehrung durch die Aus-

saat der in warme Beete gestreuten Saamen; die jungen Pflanzen setzt man einzeln in Töpfe, die mit Laub- oder Walderde, der etwas Lehm zugesetzt wird, gefüllt sind, und stellt sie in einen Sommerkasten oder in ein warmes Haus.

Heymassoli spinosa Aubl. Ximenia americana.

Heynea Roxburgh Corom. Heynea.

Kelch fünfzählig. Fünf Corollenblätter. Die Röhre cylindrisch, an der Spitze die Antheren tragend. Ein Griffel. Kapsel zweiflappig, einsamig.

Diadelphia Decandria (Familie Meliceen.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Benjamin Heyne, der in einem Werke mehrere ostindische Pflanzen beschrieben hat: „Heyn's tracts, historical and statistical on India.“ London 1804. 4. Man darf Heynea nicht mit Haynea verwechseln. (s. die Gattung Haynea Willd.)

1. *Heynea trijuga* Roxb. Dreipaarigblättrige Heynea.

Ein Baum dessen Aeste absteilen. Blätter gefiedert; sie bestehen aus drei Paaren und einem einzelnen Blättchen. Blumen klein, weiß, und bilden winkelfständige weitschweifige Rispen. Vaterl. Nepal. h

2. *Heynea quinquejuga* Spr. (*Trichilia rusinervis* Blum.)

Blätter 5—7 paarig gefiedert. Blättchen länglich-eiförmig, unten an den Adern gelbroth-silzig. Blumen in Rispen gesammelt, deren Aeste gelbroth-silzig sind. Vaterl. Java. h

3. *Heynea multijuga* Blum. Vielpaarigblättrige Heynea.

Blätter sechs- oder mehrpaarig gefiedert. Blättchen länglich, an der Basis an beiden Seiten ungleich. Blumentrauben einzeln, winkelfständig. Vaterl. Java. h

Kultur. Alle drei Arten gedeihen am besten in warmen Häusern. Fortpflanzung durch Saamen, die man in Töpfe oder Napfe säet und in ein warmes Beet stellt.

Hibbertia Salisb. Parad. 73. Hibbertie.

Kelch fünfblättrig, die Frucht einschließend. Corolle fünfblättrig. Staubfäden zahlreich, bodenständig. Griffel 2—5. Kapseln gehäuft stehend; jede 1—2 saamig.

Polyandria Trigynia (Familie Dilleniceen.)

Diese Gattung widmete Salisbury seinem botanischen Freunde dem Hrn. W. Hibbert Esq. ?

† *Floribus* 2gynis. *Capsulis* pilosis vel lepidotis.

Blumen mit zwei Griffeln versehen. Kapseln behaart oder schuppig = schildrig.

1. *Hibbertia pedunculata* R. Brown. Gestielte Hibbertie.
Stengel aufrecht. Blätter linienförmig, stumpflich, am Rande fast zurückgerollt. Blumen gestielt, zweigriffelig. Fruchtknoten grau = filzig. Waterl. Neuhollland. h

2. *Hibbertia serpyllifolia* R. Br. Feldthymianblättrige Hibbertie.

Blätter elliptisch, lederartig, oben glatt, unten filzig. Fruchtknoten zottenhaarig. Waterl. Neuhollland. h

3. *Hibbertia aspera* Cand. Scharfblättrige Hibbertie.

Blätter länglich, stumpf, am Rande meist zurückgerollt, oben scharflich, unten zottenhaarig. Fruchtknoten behaart. Waterl. Neuhollland.

4. *Hibbertia canescens* Sieb. Graue Hibbertie.

Blätter linien = spatelförmig, oben behaart, grau, unten glatt. Aeste zottenhaarig. Fruchtknoten filzig. Waterl. Neuhollland. h

5. *Hibbertia hermanniaefolia* Cand. Hermannienblättrige Hibbertie.

Blätter umgekehrtenförmig, oben zottenhaarig, unten sternhaarig = filzig. Fruchtknoten filzig. Waterl. Neuhollland. h

6. *Hibbertia elongata* R. Br.

Blätter länglich, oben glatt, unten sternhaarig = filzig, zottig. Fruchtknoten schildrig. Waterl. das nördliche Neuhollland. h

7. *Hibbertia cistifolia* R. Br. Cistusblättrige Hibbertie.

Blätter länglich, oben sternhaarig = filzig, unten mit weißen Zottenhaaren bekleidet. Fruchtknoten schildrig. Waterl. wie vorige Art.

8. *Hibbertia tomentosa* R. Br. Filzige Hibbertie.

Blätter länglich = linienförmig, auf beiden Seiten zottig = filzig. Fruchtknoten schildrig. Waterl. wie N. 6.

9. *Hibbertia lepidota* R. Br. Schildrige Hibbertie.

Blätter linienförmig, langgespitzt, auf beiden Seiten, wie die Fruchtknoten, schildrig. Blumenstiele gipfelsständig, gesäuft. Waterl. wie N. 6.

†† *Floribus* 2—5 gynis. *Capsulis* glabris.

Blumen mit 2—5 Griffeln versehen. Kapseln glatt.

10. *Hibbertia volubilis* Andrew. Repos. Hierher gehört: *Dillenia scandens* Willd. f. Lexic. B. 3. D. *vollubilis* Venten. f. 1 Nachtr. B. 2. S. 701. und *D. speciosa* Curt. (nec. Thunb.) Waterl. Neuholland. h Abbild. Curt. Mag. t. 449. Andrews Repert. t. 126.
11. *Hibbertia dentata* R. Br. Gezähnte Hibbertie.
Stengel gewunden. Blätter länglich, gespitzt, gezähnt, die Zähne mucronenspitzig, unten sehr scharf. Blumen gestielt. Waterl. Neuholland; die Insel van Diemen. h
12. *Hibbertia saligna* R. Br. Weidenblättrige Hibbertie.
Stengel aufrecht. Blätter länglich-linienförmig, langgespitzt, mit einem schwieligen Mucrone an der Spitze, ganzrandig, unten zottenhaarig. Blumen stiellos. Waterl. Neuholland. h
13. *Hibbertia procumbens* Candolle. Gestreckte Hibbertie.
Stengel gestreckt. Blätter linienförmig, dicklich, aderlos. Blumen gestielt, gipfelständig. Die Saamen in eine markige Substanz eingesenkt. Hierher gehört: *Dillenia procumbens* Labill. f. 1. Nachtr. B. 2. S. 701.
14. *Hibbertia virgata* R. Br. Ruthenförmige Hibbertie.
Stengel aufrecht, dünn. Blätter linienförmig, stumpflich, glatt. Blumen stiellos. Waterl. Neuholland. h
15. *Hibbertia fasciculata* R. Br. Büschelblättrige Hibbertie.
Stengel aufrecht, ästig, die Ästchen filzig. Blätter büschelförmig stehend, linien-pfriemenförmig, glatt. Blumen stiellos. Waterl. Neuholland.
16. *Hibbertia linearis* R. Br. Linienförmige Hibbertie.
Stengel aufrecht. Äste dünn. Blätter linienförmig, ganzrandig, glatt. Blumen stiellos. Waterl. Neuholland. h
17. *Hibbertia obtusifolia* Cand. Stumpfblättrige Hibbertie.
Stengel aufrecht. Blätter linienförmig, stumpf, mit einem Mucrone versehen. Blumen stiellos. Waterl. Insel van Diemen.
18. *Hibbertia diffusa* R. Br. Weisschweifige Hibbertie.
Stengel niedrig, ästig, weisschweifig. Blätter umgekehrte

eyförmig, an der Spitze gezähnt, glatt. Blumen stiellos. Vaterl. Neuhollland. h

19. *Hibbertia monogyna* R. Br. Eingriffelige Hibbertie.

Stengel aufrecht, mehr oder weniger ästig. Blätter spatelförmig, an der Spitze 2—3 zählig, glatt. Blumen stiellos, eingriffelig. Vaterl. Neuhollland.

20. *Hibbertia grossularifolia* Salisb. parad. 73. Stachelbeerblättrige Hibbertie.

Hibb. crenata Andrews Repos. t. 472.

Stengel gestreckt. Blätter fast kreisrund, gekerbt-gezähnt. Blumenstiele einzeln, den Blättern gegenüber stehend, länger als die Blätter. Blumen fast 10griffelig. Vaterl. Neuhollland und Afrika. h (Abbild. Sims. in Bot. mag. t. 1218.)

Kultur. Die Hibbertien kommen alle aus Neuhollland und entwickeln ihre Blumen im Sommer und Herbst. Man überwintert sie in Glashäusern und behandelt sie, in Hinsicht auf Boden, Fortpflanzung und Vermehrung wie die Diklenien, mit denen sie zunächst verwandt sind.

Hibbertia crenata Andr. f. *Hibbertia grossularifolia* N. 20.

Hibiscus Linn. Hibiscus; Eibisch; Ibis. S. Lexic.

B. 4. (Schubers Handb. t. 193. Gaertn. Sem. t. 134.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 3. S. 678.

Kelch doppelt, äußerer (Hülle) ein-, fünf- oder vielblättrig; innerer fünfspaltig. Corolle fünfblättrig. Staubfäden zahlreich, in eine Säule verwachsen. Narben fünf. Kapsel fünffächerig, die Fächer verwachsen, drei oder mehrsaamig. Saamen glatt oder wollig.

Monadelphica Polyandria (Familie Malvaceen.)

Die Gattung Hibiscus enthält jetzt an die 100 Arten, die größtentheils aus warmen Ländern kommen und zur Zierde unserer Gewächshäuser dienen. Es sind theils Bäume, Sträucher oder Staudensträucher, theils krautartige Pflanzen, deren Blätter wechselnd stehen, ungetheilt oder tief 3—5 oder 7lappig sind. Blumen winkel- und gipfelständig, zuweilen fast ährenständig. Corollen gelb, weiß, roth, violett, schwarzroth.

I. *Corolla convoluto-cylindrica*.

Corollenblätter übereinanderliegend-eingerollt = cylindrischförmig.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Verikon B. 4. beschriebenen Arten: *H. liliiflorus* Lampas, *membranaceus*, *spiralis*, *senegalensis*, *tubulosus*, *columnarius* Cavan. *H. calycinus* Willd. und folgende.

1. *Hibiscus pedunculatus* Thunb. Linn. Suppl. Vanggeslietter Hibiscus f. Lexic. 1. Aufl. B. 4. S. 653.

Stengel strauchig, wie die Aeste und Blätter strichborstig-zottig. Blätter gestielt, eiförmig, 3—5 lappig, die Lappen stumpf, gekerbt-gezähnt. Blumenstiele lang, einzeln, winkelfständig, einblüthig. Hülle vielblättrig, kürzer als der Kelch. Corolle fast glockenförmig, roth. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. h Blühz. Sommer. (Abbild. Cavan. Diss. 3. t. 66. f. 2.)

2. *Hibiscus hybridus* Dietr. Bastard-Hibiscus.

H. caule fruticoso hispido, foliis petiolatis plerisque trilobis hispidis pedunculis solitariis axillaribus elongatis unifloris, involuero 10 phyllo calycibus longiore, corolla subcampanulata rosea Du.

Hib. pedunculatus Var. Hortulan.

Stengel strauchig, ästig, 4—6 Fuß hoch, wie die Aeste, und Blätter scharfborstig-rauh. Blätter gestielt, wechselnd stehend, die untern ungetheilt, rundlich, obere dreilappig, an der Basis abgestutzt, die Lappen stumpf-gerundet, der mittlere größer als die seitenständigen, alle fast doppelt gekerbt-gezähnt, 1—2 Zoll lang, auf beiden Seiten feinborstig, unten gerippt-geadert. Aesterblätter sehr klein, faden-friemenförmig, hinfällig. Blumenstiele einzeln, in den obern Blattwinkeln, einblüthig, oben unter der Blume gelenkartig verdickt, doppelt länger als die Blätter mit ihren Stielen. Blume übergebogen. Hülle zehublättrig, abstehend, etwas länger als der Kelch, die Blättchen spatelförmig, an der Basis verdünnt, am Rande mit kurzen Wimperhaaren versehen. Kelch fünfspaltig, anliegend. Corolle schön rosenroth, fast glockenförmig. Corollenblätter länglich-umgekehrtepförmig, ganzrandig, 10—14 Linien lang. Staubfädensänschen so lang als die Corollenblätter. Antheren rundlich, rosenroth. Narben 5, rundlich, etwas hervorragend. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. h Blühz. im hiesigen bot. Garten Jul. bis Oktob.

Dieser Hibiscus ist allerdings dem *Hib. pedunculatus* Thunb. zunächst verwandt, aber unterschieden durch die Blätter, die untern und die an den winkelfständigen Aesten sind. rundlich (fast kreisrund) ungetheilt, gekerbt-gezähnt; die

obern alle nur dreilappig, nicht 3—5 lappig wie bei jenem, die Hüllblätter etwas länger als der Kelch, mehr offen stehend. Im hiesigen Garten steht dieser Hibiscus im warmen Hause, doch nimmt er auch mit Durchwinterung im Glashause vorlieb.

3. *Hibiscus Boryanus* Candolle.

Blätter ungetheilt, eysförmig, glatt. Blumenstiele abgekürzt. Hüllen (äußerer Kelch) 5—7 blättrig, über den inneren fünfzähligen Kelch hervorragend. Vaterl. Mascaren = Insel.

4. *Hibiscus biflorus* And. Spr. Syst. veg. Suppl. p. 19. Zweiblumiger Hibiscus.

Blätter länglich = lanzettförmig, entfernt gezähnt, geadert, behaart = filzig. Blumenstiele winkelförmig, straff, gabelförmig getheilt, zweiblümig. Hülle vierblättrig, sternhaarig = filzig. Blättchen groß, breit = lanzettförmig. Kelch wollig = zottenhaarig. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. ☉ ?

5. *Hibiscus fragilis* Carrd. Zerbrechlicher Hibiscus; Eibisch.

Blätter eysförmig, undeutlich dreilappig, gezähnt, glatt. Blumenstiele einzeln, winkelförmig, so lang als die Blätter. Hülle fünfblättrig. Vaterl. Ins. Mascaren. h

6. *Hibiscus tubiflorus* Sess. Röhrenblumiger Hibiscus.

Blätter herzförmig, gespißt, fast buchtig, gezähnt = sägerandig, zottenhaarig. Blumenstiele einzeln, einblümig, doppelt länger als die Blattstiele. Hülle vielblättrig. Corolle röhrig, eingerollt = cylindrisch. Vaterl. Mexiko.

7. *Hibiscus parviflorus* Weinmann.

Blätter herzförmig, eckig, gekerbt, unten filzig. Blumen klein, gekerbt, kürzer als die Blattstiele. Hüllblätter spatelförmig. Kelch so lang als die Corolle. Vaterl. Südamerika. ?

II. *Corolla expansa*. Corolle offen = ausgebreitet.

† Calyce spathacea longitudinaliter fisso.

Kelch scheidenartig, der Länge nach gespalten.

Hierher gehören die im Verisum und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *H. Manihot*, *fioulneus*, *esculentus* Linn. *H. longifolius* Willd. und folgende.

8. *Hibiscus Pseudo-Manihot* Cand. Unächter schwefelgelber Hibiscus.

Stengel aufrecht. Blätter dreispaltig, filzig. Einschnitte eysförmig, langgespißt, grob gezähnt. Hülle vierblättrig, scharfborstig. Corolle schwefelgelb. Diese Art kommt in einigen

Gärten als Varietät von *H. Manihot* vor, unterscheidet sich aber am meisten durch dreispaltige filzige Blätter und durch vierblättrige Hüllen; bei jener sind die Blätter siebenstheilig und die Hüllen fünfblättrig. Vaterl. Insel Mascaren.

†† *Involucris foliolis appendiculatis s. apice furcatis.*

Hüllblättchen mit Anhängen versehen oder an der Spitze gabelsförmig.

Hib. surrattensis Linn. *H. furcatus* Willd. *H. scaber* Michx. *H. bifurcatus* Cav. (s. Lexic. und 1. Nachtr.) gehören hierher und folgende Arten.

9. *Hibiscus uncinellus* Sess. Hakenförmiger Hibiscus.

Stengel strauchig, ästig, mit rückwärts stehenden Haaren besetzt. Blätter herzförmig, handförmig, 3—5 spaltig, gezähnt. Die Hüllblättchen auf dem Rücken mit einem hakenförmigen Anhang versehen. Vaterl. Mexico. h

10. *Hibiscus furcellatus* Desrouss. (*H. diodon* Cand.)

Stengel strauchig, ästig, aufrecht. Aeste und Blätter filzig. Blätter herzförmig, fast eckig. Hüllblätter walzenrund, gespalten. Kelche scharfborstig. Vaterl. Guiana. h

††† *Involucro 5—polyphylo aequali.*

Hülle fünf- oder vielblättrig, gleich.

* Kelche fast blätterartig.

A. *Seminibus glabris.* Saamen glatt.
a. *Armati.* Bewaffnete Arten.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon beschriebenen Arten: *H. cannabinus*, *vitifolius* Linn. *H. aculeatus* Dietr. *H. trilobus* Cav. *H. domingensis*, *diversifolius* Jacq. *H. obtusifolius* Willd. und folgende.

11. *Hibiscus unidens* Ker. Bot. Mag. Einzähniiger Hibiscus.

Stengel krautartig, mit gehäuftstehenden Stacheln besetzt. Blätter handförmig-fünfstheilig, unten ohne Drüsen. Einschnitte lanzettförmig, sägerandig. Hüllblättchen abstehend, gewimpert, inwendig mit einem Zahne versehen. Kelche scharfborstig. Corolle gelb, inwendig an der Basis schwarzroth. Vaterl. Brasilien. ☉ Blühz. Sommer.

12. *Hibiscus Lambertianus* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Sp. V. p. 291. t. 478. Synops B. 3. S. 256.

Stengel krautartig, einfach, 4—6 Fuß hoch, mit zarten

Stacheln besetzt, an der Spitze viereckig. Blätter ey-lanzettförmig, langgespitzt, an der Basis gerundet, sägerandig, oberseits scharfborstig, unten grau-silzig. Aetherblätter linien-pfriemenförmig, silzig. Blumen gestielt, einzeln, winkelförmig, an der Spitze des Stengels groß. Hülle 10—11 blättrig, wenig kürzer als der Kelch. Corollenblätter purpurroth. Fruchtknotenächer vielsaamig. Narben schildförmig. Diese Art ist dem *H. bifurcatus* Cav. zunächst verwandt. Waterl. Caracas, (im Thal de Aragua) ☉? Blüht daselbst im April.

13. *Hibiscus heterotrichus* Cand.

Stengel mit scharfen zerstreustehenden Borsten besetzt. Blätter herzförmig, 3—5 lappig, die Lappen gespitzt, gezähnt, wie die Kelche rauchhaarig. Blumenstiele abgekürzt. Blumen übergebogen. Waterl. Amerika. ?

14. *Hibiscus splendens* Fraser. Graham, *descript. of rara plant. etc.* Prächtiger Hibiscus.

Stengel strauchig-holzig, ästig, aufrecht, rund, grün, mit zerstreut stehenden Stacheln und Sternhaaren besetzt, 6—8 Fuß hoch und höher. Aeste und Blätter abwechselnd zerstreut stehend. Blätter gestielt, handförmig, 3—5 theilig, 6—7 Zoll lang, geädert, behaart, unten wenig stachlig. Die Lappen ey-lanzettförmig, ungleich sägezählig. Aetherblätter pfriemenförmig, hinfällig. Blumenstiele einzeln, winkelförmig, einblüthig, so lang als die Blattstiele, oben schief gegliedert, gekrümmt. Hülle vielblättrig, behaart. Kelch fünfspaltig, länger als die Hülle, weichhaarig, mit rothen Rippen. Corollenblätter an der Basis mit dunkelrother Wolke und gelben Flecken geziert. Staubfädensäule blaßroth. Antheren und Narben dunkelroth. Fruchtknoten seidenhaarig, fünffächerig, vielsaamig.

Den Saamen von dieser sehr schönen Pflanze sandte Hr. Fraser im Herbst 1828. dem botanischen Garten zu Edinburgh (in Schottland), wo sie im warmen Hause daselbst im Mai 1828 ihre prächtigen Blumen entwickelte; auch im Königl. bot. Garten bei Berlin hat sie im Juli 1832. Blüthen und reifen Saamen getragen. Hr. Fraser berichtet über diese Pflanze, daß er sie als die Königin aller australischen Pflanzen betrachte. Er habe Stämme von 22½ Fuß Höhe gesehen, deren Blumen vom reinsten Nelken- und Carmoisinroth

in der Blüthezeit 9 Zoll im Durchmesser breit waren und fast die ganze Pflanze bedeckten.

b. Jnermes unbewaffnete Arten.

I. Fruticosi. Sträucher (oder Staudensträucher.)

Hierzu gehören die im Lexikon beschriebenen Arten: *H. Rosa sinensis*, *svriacus*, *clypeatus*, *Abelmoschus mutabilis* Linn. *H. micans*, *ferrugineus*, *lasiocarpus* Cav. *H. microphyllus* Vahl. und folgende.

15. *Hibiscus attenuatus* Bosc. in Verhandl. des Vereins zur Beförd. des Gartenbaues IV. B. 2tes Heft, Tab. I.

Blätter gestielt, länglich-eiförmig, langgespitzt, an der Basis verdünnt, sägeartig, gerippt, glatt, die untern über der Mitte ausgeschweift oder mit zwei kurzen Lappen versehen. Blumenstiele einzeln winkelförmig, einblüthig, so lang oder etwas länger als der nebenstehende Blattstiel. Blume groß, offenstehend, 6—7 Zoll im Durchmesser breit, aufrecht. Hülle vielblättrig, kürzer als der Kelch, die Blätter linien-friesenformig, fast anliegend. Corollenblätter umgekehrteiförmig, weißlich oder blaßrosenroth, gestreift-geadert, an der Basis dunkelrosenroth. Geschlechtsheile dreimal kürzer als die Corollenblätter. Antheren gedrängt stehend. Griffel hervorragend, mit fünf kopfförmigen stumpfen Narben. Ein prächtiger Hibiscus, der sich durch Anstand und Größe der Blumen empfiehlt.

16. *Hibiscus borbonicus* Link Enum. pl. hort. berlin. 2. p. 216.

Stengel strauchig, ohne Stacheln. Blätter rundlich-herzförmig, fast lappig, ungleich gekerbt, unten fast filzig. Austerblätter linienförmig, langgespitzt. Hüllblätter länglich, langgespitzt, an der Basis verdünnt. Corolle gelb. Vaterl. Ins. Bourbon. h

17. *Hibiscus spathaceus* Blum. Scheidenartiger Hibiscus.

Blätter rundlich-herzförmig, langgespitzt, gezähnt, unten weißfilzig, mit fünf Drüsen versehen. Austerblätter groß, lappenförmig, die Blumenstiele tragend. Hüllblätter lanzettförmig, mit gelbrothen Haaren bekleidet, fast so lang als der Kelch. Vaterl. Java. h

18. *Hibiscus velutinus* Cand. Sammtartiger Hibiscus.

Blätter herzförmig, stumpf gezähnt, auf beiden Seiten weich, grau-zottenhaarig. Blumenstiele länger als die Blattstiele. Hüllblätter spatelförmig. Kapsel sehr scharfborstig. Vaterl. die moluccischen Inseln. h

19. *Hibiscus oriocarpus* Cand.

Blätter eiförmig, dreilappig, die Lappen langgespitzt, ganzrandig, glatt. Blumenstiele länger als die Blattstiele. Hüllblätter länglich, wellenrandig. Kapseln sehr scharfborstig. Vaterl. Ostindien. ♀

20. *Hibiscus Cavanillesii* Bonpl. Kunth J. c. V, p. 290. Cavanillischer Hibiscus.

Stengel strauchig, ästig, aufrecht. Blätter rauten-eiförmig, langgespitzt, 1—2 Zoll lang, 1 Zoll breit, grob sägerandig, wenig behaart. Corollenblätter violett. Fruchtknotenächer meist vierfaamig. Griffel fünfspaltig. Vaterl. Südamerika, am Magdalenenflusse. ♀ Blühz. August.

21. *Hibiscus sulfureus* Kunth J. c. V, p. 289. Neu-Andalusischer schwefelgelber Hibiscus.

Stengel staudenstrauchig. Blätter länglich-eiförmig, stumpflich, ganzrandig, oben glattlich, unten zartgrau-silzig, 18—19 Linien lang, 10—11 Linien breit. Blumenstiele einzeln, winkels- und gipfelständig. Hülle fast so lang als der Kelch. Corollenblätter schwefelgelb, an der Basis purpurroth. Fruchtknotenächer meist vierfaamig. Narben vielspaltig-kopfförmig. Vaterl. Neu-Andalusien. ♀ Blühz. September — Januar.

22. *Hibiscus affinis* Kunth J. c. V, p. 289. Synops. 2. p. 256.

Stengel staudenstrauchig. Aeste behaart. Blätter länglich, gespitzt, an der Basis gerundet, ganzrandig, unten grau-silzig. Hülle so lang oder etwas länger als der Kelch. Corollenblätter schwefelgelb, an der Basis purpurroth. Fruchtknotenächer 4—5 faamig. Griffel 3—5 spaltig. Vaterl. Newgranada. ♀ Blühz. Juni.

23. *Hibiscus racemosus* Lindley Bot. reg. 917. Traubenblüthiger Hibiscus.

Stengel strauchig, wie die Blätter mit sternförmig stehenden Breunborsten besetzt. Blätter langgestielt, fünfspaltig, die Lappen gespitzt, sägerandig, unten silzig. Blumen in gipfelständige Trauben gesammelt. Hüllblättchen so lang als der Kelch, aber die Corollenblätter viel kürzer als dieser. Vaterl. Nepal. ♀

24. *Hibiscus mauritianus* Spr. (H. ficulnoides Lindl. in Bot. reg. 938.)

Stengel niedrig, staudenstrauchig, silzig. Blätter langge-

stiel, fast herzförmig-rundlich, stumpf, meist dreilappig, ausgeschweift-gezähnt. Blumenstiele meist einzeln stehend. Waterl. Ins. Mascaren. h

25. *Hibiscus venustus* Blum. Hübscher Hibiscus.

Blätter rundlich-herzförmig, halb dreispaltig. Einschnitte gespitzt, grob gezähnt, unten sternhaarig-silzig. Blumenstiele winkelförmig, kürzer als die Blattstiele. Hülle meist fünfblättrig. Kapseln fünfeckig, sehr scharfborstig. Waterl. Java in Gärten. h

26. *Hibiscus virgatus* Blum. Ruthenförmiger Hibiscus.

Aeste ruthenförmig. Blätter linien-lanzettförmig, lang-gespitzt, an der Spitze gezähnt, die untersten umgekehrteiförmig, dreilappig. Blumenstiele winkelförmig, kürzer als die Blätter. Hülle 8-10 blättrig. Waterl. Java, in Gärten. h

II. Herbacei. Krautartige.

Zu dieser Abtheilung mit krautartigen Stengeln gehören die im Perikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *H. Moscheutos*, *palustris*, *sororius*, *militaris* Linn. *H. speciosus* Ait. *H. grandiflorus* Michx. *H. lunarifolius* Willd. *incanus* Ehrh. Wendl. *H. pruriens* Roxb. und folgende.

27. *Hibiscus aquaticus* Cand. Wasserliebender Hibiscus. (*H. palustris* Sav.)

Stengel krautartig. Blätter eiförmig, gezähnt, fast dreilappig, unten silzig. Blumenstiele winkelförmig, an der Basis gelenkig. Waterl. Sicilien.

28. *Hibiscus roseus* Thourouss. in Loisl. Deslongch. Fl. Gallie. Rosenrother Hibiscus. (*H. palustris* Thor. Cand.)

Stengel krautartig, ästig. Blätter herzförmig, fast dreilappig, gezähnt, unten silzig. Blumenstiele winkelförmig, über der Mitte mit einem Gelenke versehen. Corollenblätter rosenroth. Wächst an Bässern in Gascognien. (Provinz in Frankreich.)

29. *Hibiscus unicaulis* Cand. Einstenglicher Hibiscus.

Stengel krautartig, einfach, zottenhaarig. Blätter tief herzförmig-rundlich, eckig, buchtig-gezähnt, oben behaart, unten grau-zottenhaarig. Blumenstiele einzeln stehend, kürzer als die Blattstiele. Hüllblättchen spatelförmig, so lang als der Kelch. Kapsel sehr scharfborstig. Waterl. Südenropa. ?

30. *Hibiscus fugax* Martius.

Blätter fast stiellos, länglich, langgespitzt, unten wie die Aeste filzig. Blumenstiele winkelförmig, einblütmig, kürzer als die Blätter. Vaterl. Brasilien. ☉ ?

31. *Hibiscus panduraeformis* N. L. Burm.

Blätter herz-lanzettförmig, gespitzt, eckig, ungleich gezähnt, wie die Aeste filzig. Blumenstiele winkelförmig, so lang als die Blattstiele. Hüllblättchen stumpf, kürzer als der Kelch. Vaterl. Ostindien.

B. Seminibus lanatis. Saamen wollig.

Hib. phoeniceus, militaris, micranthus Linn. H. rhombifolius, clandestinus Cav. H. gossypinus Thunb. (s. Lexic.) gehören hierher und folgende.

32. *Hibiscus Rosa malabarica* Koen. Malabarischer Rosenhibiscus.

Stengel strachig, wie die Aeste scharfborstig. Blätter herzförmig, fast dreilappig, sägerandig. Blumenstiele so lang als die Blätter. Hüllblättchen linienförmig, kürzer als der Kelch. Corollenblätter roth. Saamen wollig. Vaterl. Ostindien. h

33. *Hibiscus betulifolius* Kunth J. c. V. p. 292. Birkenblättriger Hibiscus.

Stengel krautartig, ästig. Blätter delta-eiförmig, gespitzt, an der Basis gerundet, gefleckt-gezähnt, wenig behaart. Afterblätter linienförmig, steif. Blumenstiele winkelförmig und fast gipfelförmig. Hüllblättchen so lang als der Kelch. Corollenblätter weiß. Kapseln fast kugelig. Saamen wollig. Hr. Dr. Kunth bemerkt (Synopsis pl. 3. p. 257.), daß dieser Hibiscus dem H. phoeniceus Linn. sehr nahe verwandt sey, vielleicht nur eine Varietät sey, welche sich durch weiße Corollenblätter und krautartigen Stengel unterscheidet. ? Vaterl. Caracab. 4 Blüth. Septemb.

** Calycibus membranaceis inflatis.

Kelche häutig, aufgeblasen.

Hib. vesicaria Cav. (s. Lexic.) gehört hierher und folgende Arten:

34. *Hibiscus Trionum* Linn. (s. Lexic.)

Stengel krautartig, mehr oder weniger ästig-weitschweilig, rauchhaarig. Blätter glattlich, gezähnt, obere dreitheilig, der mittlere Lappen viel länger als die seitenständigen. Hülle kürzer als der häutige aufgeblasene Kelch. Corollenblätter blaßgelb, inwendig an der Basis dunkelpurpur oder schwarz

roth. Waterl. Italien, Kärnthen, Siebenbürgen und Taurien. ○ Blühz. Sommer. (Abbild. Curt. Bot. Mag. t. 209.)

Zu dieser Art, die in unsern Gärten längst bekannt ist, gehören: *H. ternatus* Cav. *H. africanus* Roth. *H. hispidus* Mill. Bot. reg. 806. var.

35. *Hibiscus Richardsonii* Sweet. Richardson's Hibiscus.

Stengel staudenstrauchig, wie die Blätter borstig = behaart. Blätter fünfstheilig, die Lappen linien = lanzettförmig, ungleich gezähnt, die seitenständigen kürzer als der mittlere. Blumenstiele kürzer als die Blattstiele. Hülle kürzer als der häutige aufgeblasene Kelch. Waterl. Neuhoiland. 4 h

++++ Involucro monophyllo multidentato.

Hülle einblättrig, vielzählig.

Zu dieser vierten Abtheilung gehören die im Lexikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *H. tiliaceus* Linn. *H. elatus* Sw. *H. abutiloides* Willd. und folgende.

a. Strauch- oder baumartige.

36. *Hibiscus tricuspidatus* Banks. Cavan. Dreispitziger Hibiscus.

Hib. hastatus Forster. Linn. Suppl. 310.

Stengel baumartig, ästig, wie alle Theile zart, grau = filzig. Blätter gestielt, lanzett = spießförmig = dreilappig, fast ganzrandig. Asterblätter länglich, geschwänzt, ganzrandig. Blumenstiele winkeln- und gipfelförmig, meist dreiblümig, fast doldentraubig. Bracteen den Asterblättern ähnlich. Hülle kürzer als der Kelch. Kapsel kugelförmig. *H. tricuspidatus* Lexic. erste Auflage gehört hierher und kann daselbst ausgetrichen werden. Waterl. die Societäts-Inseln. h (Abbild. Cavan. Dissert. 3. t. 55. f. 2.)

37. *Hibiscus similis* Blum.

Blätter herz = kreisförmig, langgespitzt, feingekerbelt, unten weiß sternhaarig = filzig, mit 3–5 Drüsen versehen. Hülle 10spaltig. Waterl. Java. h

38. *Hibiscus Azanzae* Cand. Mexikanischer Hibiscus.

Stengel strauchig. Blätter glatt, untere herzförmig, lappig, obere eiförmig. Hülle meist 10spaltig. Waterl. Mexiko. h

b. Krautartige.

Hib. sabdariffa, *digitatus* Cav. f. Lexic. gehören hierher.

Kultur der Hibiscusarten im Allgemeinen. Siehe Lexikon
B. 4. und I. Nachtrag B. 3. S. 681. Zu den daselbst
S. 182. angegebenen Synonymen gehören noch folgende:

Synonymen.

- Hibiscus acerifolius** Link ist **Pavonia acerifolia** Willd.
f. 2. Nachtr.
— **aculeatus** Walt. (nec Dietr.) f. **Hibiscus** sca-
ber Michx. (1. Nachtr.)
— **acuminatus** Cav. f. Lexic. ist **Pavonia acumi-**
nata Spr.
— **africanus** Roth f. **Hibiscus** Trionum N. 34.
— **bicornis** Meyer ist **Hibiscus bifurcatus** Cav.
f. Lexic.
— **cancellatus** Linn. Suppl. f. **Pavonia cancel-**
lata Lexic.
— **ceylanicus** Linn. f. **Pavonia zeylanica** Lexic.
— **cordifolius** Linn. Suppl. (f. Lexic.) ist **Pavo-**
nia Mutisii Kunth.
— **diodon** Cand. f. **Hibiscus furcellatus** N. 10.
— **ficulneus** Cav. (nec Linn.) f. **Hibiscus diver-**
sifolius Lexic.
— **flabellatus** Poir. ist **Hibiscus aculeatus** Dietr.
Lexic.
— **hastatus** Forstr. f. **Hibiscus tricuspis** N. 36.
— **maculatus** Desrouss. ist **Hibiscus trilobus** Cav.
f. Lexic.
— **ovatus** Cav. f. Lexic. ist **Pavonia ovata** Spr.
— **palmatius** Cav. ist **Hibiscus Manihot** var. f.
Lexic.
— **palustris** Save (nec Linn.) f. **Hibiscus aqua-**
ticus N. 27.
— **Patersonius** Andr. f. **Lagunaea squamea** Vent.
— **pentacarpos** Linn. (f. Lexic.) ist **Pavonia ve-**
neta Spr.
— **pentaspermus** Bertero ist **Pavonia Berterii**
Spr.
— **populneus** Linn. (f. Lexic.) ist **Thespesia**
populnea Corr.
— **rigidus** Linn. Suppl. (f. Lexic.) ist **Hibiscus**
militaris var.
— **riparius** Pers. (f. 1. Nachtr.) **Hibiscus milita-**
ris Lexic.
Hibis-

- Hibiscus simplex* Linn. Sp. pl. ist *Sterculea platanifolia* L.
 — *solandra* Herit. ist *Lagunaea squamea* Vent.
 — *spinifex* Linn. f. *Pavonia spinifex* Lexic.
 — *ternatus* Cav. f. *Hibiscus Trionum* N. 34.
 — *timoriensis* Cand. ist *Hibiscus Manihot* Var.
 — *Trionum* Thunb. ist *Hibiscus vesicarius* f. Lexic.
 — *tripartitus* Forsk. ist *Hibiscus cannabinus* f. Lexic.

Hicorius amarus Rafin. ist *Carya amara* Nuttall.

Hicorius integrifolius Rafin. ist *Carya integrifolia* Spr.

Hidalgia ternata Clav. f. *Schlechtend. Linnaea* B. 6. p. 3. S. 406.

Hieracium Linn. Habichtstrauch f. Lex. B. 4. (Echlophs Handb. t. 22.)

Character generic f. 1. Nachtr. B. 3. S. 682.

Blüthenbede (Reich) vielblättrig (vielschuppig) die Schuppen linienförmig, wie Dachziegel über einander liegend. Fruchtboden nackt. Saamentrone ungestielt (aufliegend), haarsförmig.

Syngenesia 1. Ordn. (Familie Compositae; Eichoreen.)

Im ersten Nachtrage B. 3. S. 699. habe ich schon bemerkt, daß diese Gattung, die jetzt über 100 Arten enthält, vor allen andern zur Familie der Eichoreen (oder Semiosculosen) gehörenden Gattungen einer neuen Revision bedarf, die aber Herr Sprengel bei der Bearbeitung und Herausgabe des Linneischen Systems; *Systema Vegetabilium* nicht beachtet und angewandt zu haben scheint, besonders in Beziehung auf die Anordnung und Stellung der Synonymen, so wie der Aufstellung neuer Arten.

I. Scapigera. Habichtsträuter ohne Stengel. Schaft oder Blumenstiel ungestielt.

A. Scapo unifloro. Schaft einblüthig.

In dieser ersten Abtheilung gehören die im Verisum und ersten Nachtrage beschriebenen Arten: *Hier. alpinum* Linn. *H. aspestre* Jacq. *H. glabratum* Hopp. *H. rupestre* Atl. *H. aureum* Scop. *H. pinnatifidum* Willd. und folgende:

Diatr. Ber. 2r. Nachtr. IV. Bb.

1. *Hieracium pumilum* Hopp. (nec Linn.) Niedriges Habichtskraut.

Wurzel einfach, ohne Sprossen. Wurzelblätter spatel-lanzettförmig, fast gezähnt, sehr haarig. Schaft aufrecht, nur 2 Zoll hoch, behaart, einblüthig. (*H. brevicapum* Cand. ist eine Varietät mit 2—3 Blumen.) Vaterl. Südeuropa, auf den Salzburger Alpen. 4.

2. *Hieracium simplex* Viviani. Einfaches Habichtskraut.

Wurzel einfach, ohne Sprossen. Wurzelblätter länglich spatelförmig, buchtig-gezähnt, filzig. Schaft glatt, schuppig, einblüthig.

3. *Hieracium chilense* Chamis. in Schlechtend. Linn. B. 6. Heft 1. S. 100. Chilisches Habichtskraut.

Wurzelstoc dick, schief. Blätter zahlreich, gehäuft stehend, stiellos, gespitzt, ganzrandig oder entfernt gezähnt, behaart, wollig. Stengel (Schaft?) 4—8 Zoll hoch, mit langen geraden Haaren bekleidet ein oder mehrblüthig? Nach der in Linnaea a. a. O. gegebenen weitläufigen aber nicht geregelten Diagnose ist nicht wohl zu entscheiden, ob diese Art zu dieser oder einer andern Abtheilung gehört. Vaterl. Chile. 4?

B. Scapo plurifloro. Schaft mehrblüthig.

Hier. angustifolium Hopp. H. capense, praemorsum, venosum, Emelini dubium, Pilosella Linn. H. laniferum Cav. H. incarnatum Jacq. H. bifidum Kit. H. croceum Lam. H. repens Willd. (f. Lexic. und 1. Nachtr.) gehören hierher und folgende Arten.

4. *Hieracium auriculae-folium* Willd. Aurikelflättziges Habichtskraut.

Wurzelblätter länglich, stumpf, sägerandig, glatt. Keine Sprossen. Schaft höher als bei dem vorhergehenden Arten, glatt, doldentraubig, vielblüthig. Blumen gelb. Vaterl. die Penniner Alpen. 4.

5. *Hieracium Auricula* Linn. (*H. auriculatum* Lexic. 1. Aufg.)

Wurzelsprossen kurz, kriechend. Wurzelblätter lanzettförmig, gespitzt, ganzrandig, wie der Schaft mit gelbrothen Haaren bekleidet. Schaft aufrecht, 1—1½ Zoll hoch. Blumen 4—6—8 doldenständig. Kelchschuppen schwärzlich, sparsam vorst. Zu dieser Art hat Sprengel *H. dubium* Fl. la-nic. gezogen, Vaterl. Europa, auf Tristen. 4.

6. *Hieracium Bessarianum* Spr. Besseriſches Habichtskraut.

Hier. auriculatum Bess. H. collinum Willd.

Sproſſen lang, ausgebreitet. Wurzelblätter länglich-lanzzettförmig, ſtumpſich, gezähnt, rauchhaarig. Schaft 1—2 Fuß hoch und höher, borſtig, vielblümig. Blumen abſtehend, eine zuſammengeſetzte Doldentraube bildend. Kelſchuppen ſchwärzlich, borſtig-behaart. Vaterl. Deutſchland und Frankreich. 4 Blühg. Sommer.

7. *Hieracium Gochnatii* Spr. Gochnatiſches Habichtskraut.

Hier. collinum Gochnat. H. cymosum Fl. danic. (nec Linn.)

Sproſſen verlängert. Wurzelblätter lanzzettförmig, geſpitzt, ganzrandig, wenig behaart. Schaft 2 Fuß hoch und höher, behaart, auf ſeinem Gipfel, wie die vorhergehende Art, eine Doldentraube tragend, deren Aeſte ausgeſperret ſind. Kelſchuppen ſcharfborſtig. Vaterl. Frankreich und Deutſchland. 4

8. *Hieracium Bauhini* Bess. Bauhiniſches Habichtskraut.

Hier. glaucescens Bess. var.

Sproſſen ſehr lang, ausgebreitet, wenig behaart. Blätter lanzzettförmig, geſpitzt, ganzrandig, glattlich, gewimpert. Schaft aufrecht, glatt, doldentraubig. Kelſchuppen filzig. Wächſt in Deutſchland und Frankreich. 4

9. *Hieracium flagellare* Willd. Langsproſſiges Habichtskraut.

Sproſſen ſehr lang, ausgebreitet, behaart. Blätter ſpatel-lanzzettförmig, ganzrandig, behaart, unten wenig filzig-grauſch. Schaft aufrecht, behaart, zwei oder mehrblümig. Blumenſtiel verlängert. Kelſchuppen borſtig. Blümchen gelb, gleichfarbig. Wächſt in Deutſchland, Frankreich und Tauſien. 4

Zu dieſer Art hat Spreng. folgende gezogen: Hier. bifurcatum M. a Bieb. H. brachiatum Cand. H. collinum Bess. ſiehe 1. Nachtr. B. 3. S. 690. und die Verſgleichung mit H. Pilosella Linn.

II. Caulescens. Habichtskräuter mit Stengeln verſehen.

† Stengel mit wenigen Blättern beſetzt.

a. Stengel wenigblümig.

10. *Hieracium staticifolium* All. H. saxatile, chondriloides Jacq. H. murorum Linn. H. Halleri Vill. H.

E c 2

lanatum, pallens Kit. *H. nigrescens* Willd. (f. Lexic. und 1. Nachtrag) gehören hierher und folgende Arten.

11. *Hieracium sonchifolium* M. a Bieb. Sonchusblättriges Habichtskraut.

Stengel krautartig, aufrecht, wenigblättrig, ästig, wenigblümig. Blätter schrotsägeförmig, grau-silzig. Blumenstiele lang. Kelchschuppen borstig-behaart. Vaterl. Kaukasus. 4

12. *Hieracium hybridum* Chaix, Bastard-Habichtskraut.

Blätter fast federig-behaart. Wurzelblätter länglich, an beiden Enden verdünnt, gezähnt, Stengelblätter linienförmig. Kelchschuppen schwärzlich, drüsig-behaart. Wächst auf Alpen in der Schweiz und Frankreich (im Delphinat.) 4

13. *Hieracium pulmonarium* Smith. (*H. pulmonarioides* Vill.)

Stengel meist dreiblümig, straff. Wurzelblätter gestielt, lanzettförmig, tief ungleich, gezähnt, borstig-behaart, gesteckt. Stengelblätter gewöhnlich nur zwei, einfarbig. Wächst auf Alpen in Frankreich. 4

14. *Hieracium prunellifolium* Gouan. Prunellenblättriges Habichtskraut.

Stengel gestreckt, wenigblümig. Blätter alle gestielt, eiförmig, gezähnt, glatt, die Stiele gezähnt. Blumenstiele einblümig. Zu dieser Art gehört *Crepes pygmaea* Linn. (f. Lexic. 1. Aufl.) und *Hieracium pumilum* Linn. (nec Hopp., Jacq.) f. Lexic. 1. Aufl. B. 4. S. 630.) Wächst auf Alpen im mittlern Europa. 4

15. *Hieracium humile* Hoss. Zwerg-Habichtskraut.

H. pumilum Jacq. *H. Jacquini* Villars var.

Stengel niedrig, meist zweiblümig, behaart. Blätter länglich-eiförmig, gespitzt, an der Basis fiederspaltig, behaart. Kelchschuppen borstig. Wächst auf Alpen im südlichen Europa. 4

16. *Hieracium incisum* Hopp. Eingeschnittenes Habichtskraut.

Stengel meist zweiblümig. Blätter fast gestielt, länglich-eiförmig, langgespitzt, eingeschnitten-gezähnt, unten wenig behaart. Kelchschuppen behaart-silzig. Wächst auf Alpen in Syrien. 4

17. *Hieracium obovatum* Lapeyr. Eiförmiges Habichtskraut.

Stengel wenigblüthig. Blätter glatt. Wurzelblätter gestielt, umgekehrteiförmig, Stengelblätter langgespitzt. Vaterl. die Pyrenäen.

b. Caule multifloro. Stengel vielblüthig.

Hierher gehören die im Lexikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten; . H. cymosum, aurantiacum, Gronovi Linn. H. glaucum All. H. molle Jacq. H. fallax marianum Willd. H. Lawsoni Vill. und folgende.

18. *Hieracium praealtum* Villars. Hohes Habichtskraut.

H. florentinum Hall. (nec All. Vill.)

Stengel 3—4 Fuß hoch, mit wenigen Blättern besetzt, vielblüthig, oben sitzig. Blätter lanzettförmig, ganzrandig, grau- oder bläulichgrün, glatt, nur an der Basis und an der Mittelrippe mit Wimperhaaren besetzt. Blumen zahlreich, in rispenartige zusammengezogene Doldentrauben gesammelt, gelb. Kelchschuppen schwärzlich, sitzig. H. obscurum Reichenb. ist eine Varietät mit behaartem Stengel. Vaterl. Europa. 4

19. *Hieracium cymosum* Linn. f. Lexic. 1. Aufl. B. 4. S. 645.

Stengel aufrecht, wenig blüthig, wie die Blätter borstig-behaart, 1—2 Fuß hoch. Blätter fast spatel-lanzettförmig, verlängert, fast gezähnt. Blumen klein, gelb und bilden eine zusammengesetzte gipfelständige Doldse. Kelchschuppen doppelt behaart. Hier. sabinum Sebast. H. Neßleri Vill. sind Varietäten. Vaterl. Europa. 4

20. *Hieracium bracteolatum* Smith. Habichtskraut mit Bracteen.

Stengel aufrecht, ästig, zottenhaarig. Wurzelblätter leierförmig, gezähnt, wenig behaart. Blumenstiele lang, fast doldentraubig, mit schuppenförmigen Bracteen besetzt. Vaterl. Sicilien und Macedonien. 4

21. *Hieracium denudatum* Lapour. Nacktstengliches Habichtskraut.

Stengel unten ästig, oben nackt. Blätter gestielt, länglich, an beiden Enden verdünnt, fast ganzrandig, zottenhaarig. Blumen in schlaffen Rispen. Kelchschuppen glatt. Vaterl. Pyrenäen. 4

†† Caule folioso. Stengel mit vielen Blättern besetzt.

a. Stengel ein- oder wenigblüthig.

Hierher gehören die im Lexikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *H. montanum* Jacq. *H. villosum*, *livadum* Linn. *H. andryaloides* Vill. *H. flexuosum* Kit. *H. foetidum* Willd. *H. intybaceum* Jacq. und folgende.

22. *Hieracium anchusaefolium* Bertol. Anchusaablättriges Habichtskraut.

H. verbascifolium Villars. (nec Persoon.)

Stengel blättrig, fast einblümig, sehr zottenhaarig. Blätter lanzettförmig, langgespißt, ganzrandig, filzig. Wächst auf Alpen in Frankreich, 4

23. *Hieracium rhomboidale* Lapeyr. Rautenförmiges Habichtskraut.

Stengel einfach, aufrecht. Wurzelblätter gestielt, rautenförmig, an der Basis, so wie die Stiele, seiden-zottenhaarig. Stengelblätter stiellos, umfassend, herzförmig. Blumenstiele meist drei, winkelförmig. Kelchschuppen borstig, ausgebrüht, zottig-klebrig. Vaterl. die Pyrenäen, 4

24. *Hieracium trichodephalum* Willd.

Stengel wenigblümig, oben zottenhaarig. Blätter länglich-lanzettförmig, fast gezähnt, glatt, die obern stiellos. Kelchschuppen zottenhaarig. Diese Art bedarf noch einer genauern Beobachtung und Bestimmung. Das Vaterl. ist noch unbekannt.

25. *Hieracium crinitum* Smith.

Stengel aufrecht, sehr haarig. Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, fast gezähnt, behaart. Blumen fast traubenständig. Vaterl. Sicilien und Kleinasien. 4

26. *Hieracium hispidum* Don. Scharfborstiges Habichtskraut.

Stengel aufrecht, ästig, sehr scharfborstig. Aeste einblümig. Blätter länglich, stumpf, gezähnt, die Zähne mucronenspißig, auf beiden Seiten scharfborstig.

27. *Hieracium speciosissimum* Willd. Spec. pl. Suppl. Sehr schönes Habichtskraut.

Stengel einfach, aufrecht, oben behaart-borstig. Blätter alle stiellos, lanzettförmig, nach oben gezähnt, glatt. Blumen groß, gelb. Kelchschuppen borstig. *Hier. speciosum* Hornem. (f. 1. Nachtr. B. 3. S. 699.) hat Sprengel als Varietät zum *Hier. flexuosum* Kit. gezogen.

3. Stengel vielblümig.

* Blätter ganzrandig.

Hier. porrifolium Linn. H. echoides Luminiz. Kt. f. Lexic. und I. Nachtr. gehören hierher, und folgenden Arten.

28. *Hieracium glaberrimum* Spr. Glattes Habichtskraut.

Stengel sehr ästig, wie die Blätter und Blumenstiele glatt. Blätter lanzettförmig, ganzrandig, grau- oder bläulichgrün, die obern stiellos, umfassend. Blumen rispenständig. Blumenstiele schuppig. Vaterl. Südeuropa. ?

29. *Hieracium altissimum* Lapeyr. Sehr hohes Habichtskraut.

Stengel einfach, aufrecht, wie die Blätter wenig behaart. Wurzelblätter umgekehrt eiförmig-länglich, am Stiele herablaufend. Stengelblätter breit, herzförmig, alle ganzrandig, fast gewimpert. Blumen rispenständig. Blumenstielen und Kelchschuppen schuppig. Vaterl. Südeuropa, die Pyrenäen; Englaud und Schottland. ? 4

30. *Hieracium seabrum* Michx. Rauhes Habichtskraut.

Stengel sehr einfach, unten scharfborstig, oben rauh. Blätter stiellos, länglich-eiförmig, ganzrandig, auf beiden Seiten schwielig, scharf. Blumentraube gipfelständig, fast zusammengefasst. Vaterl. Nordamerika. 4

31. *Hieracium incarnum* M. a Bieb. Graues Habichtskraut.

Stengel ziemlich hoch, einfach, ästig. Blätter stiellos, umfassend, länglich, ganzrandig, fast gewellt, grau, gewimpert. Spitze doldentraubig, sehr ästig. Kelche doppelt, behaart, klebrig. Vaterl. Kaukasus. 4

32. *Hieracium prostratum* Cand. Gestrecktes Habichtskraut.

Stengel einfach, gestreckt, wie die Blätter sehr zottenhaarig. Blätter länglich, meist ganzrandig. Blumen rispenständig. Kelchschuppen glattlich. Vaterl. Südeuropa. ?

** Blätter gezähnt.

Zu dieser Abtheilung mit beblättertem vielblüthigem Stengel und gezähnten Blättern gehören die im Verikon und I. Nachtrage beschriebenen Arten: H. sabaudum, paludosum, cerinthoides, pyrenaicum, amplexicaule, paniculatum, umbellatum, Kalmii Linn. H. ramosum, racemosum, foliosum Kt. H. rotundatum Kt. Hornem. H. praenanthoides, lanceolatum Vill. H. lap-

sanoides Gouan. *H. laevigatum*, fruticosum, ciliatum Willd. *H. undulatum* Ait. *H. eriophorum* Cand. St. Amand. und folgende.

33. *Hieracium vulgatum* Fries. Gemeines Habichtskraut.

Stengel aufrecht, mehr oder weniger ästig, oben filzig. Blätter länglich-lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt, nach oben grob gezähnt, glattlich. Blumen fast doldentraubig. Kelchschuppen wie Dachziegel über einander liegend, filzig.

Zu dieser Art gehört: *H. maculatum* Smith. *H. murorum* β. *H. sylvaticum* fl. dan. *H. Lachenalii* C. G. Gmel. Waterl. fast ganz Europa in Wäldern an Rändern, Mauern u. a. D. 4 Blühz. Sommer.

34. *Hieracium sylvaticum* Linn. Waldliebendes Habichtskraut s. Lexic. 1. Aufl. 4. B.

Stengel ästig, aufrecht, wenig behaart. Blätter alle gestielt, länglich, an beiden Enden verdünnt, wenig gezähnt, behaart. Blumen rispenständig. Kelchschuppen wie Dachziegel über einander liegend. Wächst in Europa, besonders in Deutschland in Wäldern. 4

35. *Hieracium boreale* Fries. Nördliches Habichtskraut.

Stengel aufrecht, unten fast einfach, oben sehr ästig, 2—3 Fuß hoch. Aeste wechselnd, rispenartig stehend, meist einblümig. Blätter alle stiellos, lanzettförmig, langgespitzt, oben glattlich, unten scharf, untere gezähnt, oberste ganzrandig. *H. sabaudum* Engl. bot. 349. fl. dan. 871. *H. sylvaticum* Rostkov. *H. auriculatum* Willd. herb. hat Spr. hierher gezogen. Waterl. das nördliche Deutschland, England und Dänemark. 4

36. *Hieracium polyphyllum* Willd. Spec. pl. Suppl. Vielblättriges Habichtskraut.

Stengel ästig, aufrecht, vielblättrig, an der Basis scharfborstig, oben glattlich. Die untern Blätter spatelförmig, nach oben gezähnt, die obern fast ganzrandig. Kelchschuppen scharfborstig.

37. *Hieracium denticulatum* Smith. Gezähntes Habichtskraut.

H. praenanthoides Smith. fl. brit.

Stengel aufrecht, einfach, scharf. Blätter stiellos, länglich, ungleich drüsig-gezähnt, glatt, unten bläulich-grün. Blumen doldentraubig. Blumenstiele drüsig-behaart. Waterl. Schottland. 4

Dieses Habichtskraut scheint nur eine Varietät von *H. praeananthoides* Lam. Villars zu sein, denn *H. praeananthoides* Villars. Dauph. 3. p. 108. ist in Flora britan. cur. Roem. 9. p. 835. bei *H. praeananthoides* citirt, nebst *H. Kalmii* Sym. Synops et 4. *spicatum* All. Die übrigen Synonymen, welche Pers. Synops. zum *H. praeananthoides* zählt, und die Spr. nicht erwähnt, hat s. 1. Nachtr. B. 3. S. 997.

38. *Hieracium carpathicum* Bess. Carpathisches Habichtskraut.

H. Milleri Link. Enum. 2. p. 287. *H. sudeticum* Tauschier.

Stengel einfach, wie die Blätter behaart. Wurzelblätter gestielt, länglich, gespitzt, an der Basis verdünnt. Stengelblätter meist stiellos, umfassend, lanzettförmig, alle gezähnelt. Blumen rispenständig. Blumenstiele und Kelche drüsig-borstig-behaart. Vaterl. die Carpathen und Sudeten. 4

39. *Hieracium latifolium* Frol. Breitblättriges Habichtskraut.

H. croaticum Lapeyr. Fl. pyren.

Stengel aufrecht, mehr oder weniger ästig, oben glattlich. Blätter länglich, borstig-behaart, meist gezähnelt. Stengelblätter halb umfassend. Blumen in Doldentrauben, deren Stiele und Kelchschuppen schwarzlich-behaart sind. Wächst auf den Pyrenäen. 4

40. *Hieracium macrophyllum* Pursh. Großblättriges Habichtskraut.

Stengel 3—4 Fuß hoch und höher, gefurcht, scharfborstig. Blätter groß, herzförmig-länglich, halb umfassend, entfernt groß gezähnt, glattlich, unten an den Rippen filzig. Blumen rispenständig, die Aeste der Rispe ausgesperrt-doldentraubig. Blumenstiele lang, wie die Kelche glatt. Vaterl. Nordamerika. 4

41. *Hieracium spinulosum* Spr. Feindorniges Habichtskraut.

Lepécaune spinulosa Lapeyr.

Stengel krautartig, mehrere aus einer Wurzel, wie die Blätter glatt. Blätter lang-lanzettförmig, stumpf, tief ausgebeissen, feindornig gezähnelt, die untersten gestielt, obere stiellos, umfassend. Blumen rispenständig. Kelchschuppen schlaff, an der Basis filzig. Vaterl. die Pyrenäen. 4

42. *Hieracium compositum* Lapeyr. Zusammengesetztes Habichtskraut.

Stengel ästig, wie die Blätter grau-flockenhaarig. Wurzelblätter länglich, fast gezähnt. Stengelblätter umfassend, sägerandig. Aeste Blumen tragend, zweispaltig, line. zusammengesetzte Rispe bildend, doppelt behaart. Vaterl. die Pyrenäen. 4.

43. *Hieracium erianthon* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. IV. p. 4. t. 303.

Stengel aufrecht, $1\frac{1}{2}$ bis 2 Fuß hoch, einfach, unten weißlich-wollig, oben filzig. Die Wurzelblätter sind gestielt, lanzettförmig, gespitzt, undeutlich gezähnt. Stengelblätter größer und länger als die Wurzelblätter, ungestielt, entfernt gezähnt, stumpf, an der Basis schmal, oben filzig, grün, unten weiß-wollig; die obersten unter der Rispe viel kleiner als die mittleren, linien-lanzettförmig, ganzrandig. Die Blumen gelb, gestielt, in eine vielblümige, doldentraubartige Endrispe gesammelt. Der Kelch ist halbkugelig, vielblättrig, mit grauer Wollé dicht bekleidet. Die Blümchen fast wie bei folgender Art. Vaterl. Südamerika, die Provinz Venezuela. ?

44. *Hieracium Avillae* Kunth J. c. IV. p. 3. Avillaisches Habichtskraut.

Stengel aufrecht, 1 Fuß hoch, einfach, rostfarbig rauhaarig. Blätter lanzettförmig, fast ungestielt, rauhaarig, entfernt gezähnt, auf der Unterfläche graulich. Die Blumen bilden eine gipfelfständige, ästige Rispe, deren Spindel fast knieartig gebogen, filzig-scharfborstig ist. Kelch länglich-cylindrisch; die Schuppen liegen dachziegelförmig über einander, sind linien-lanzettförmig, grün, glatt, die äußeren zurückgeschlagen, viel kürzer als die innern. Blümchen gelb (?), an der Spitze fünfzählig, flach. Vaterl. Südamerika, der Berg Avila. 4 Blühz. Septemb.

45. *Hieracium asperrimum* Don. Sehr scharfes Habichtskraut.

Stengel aufrecht, walzenrund, sehr scharfborstig. Blätter lanzettförmig, stumpf, buchtig-gezähnt, unten mit Borsten besetzt. Blumen doldentraubig. Vaterl. Nepal. 4.

46. *Hieracium turbinatum* Spr. (*Lepideaune turbinata* Lapeyr.)

Stengel einfach, aufrecht, wie die Blätter an der Basis

gottenhaartig. Blätter stiellos, umfassend. Saamen klee-
förmig. Vaterl. die Pyrenäen.

Es ist noch nicht entschieden, ob diese Art der Gattung
Hieracium angehört und so scheinen auch noch einige neue
von Sprengel aufgestellte Arten einer nähern Beobachtung und
Vergleichung mit andern längst bekannten Arten zu bedürfen.
Vergleichen auch manche von ihm angezeigte Synonymen.

Kultur. Die meisten Habichtskräuter sind krautartige per-
ennirende Pflanzen, die in unsern Gärten unter freiem Him-
mel gedeihen und fast in jedem Boden vorkommen. Nur
wenige, die in warmen Ländern vorkommen, überwintert
man in Gewächshäusern, z. B. Nr. 3, 43, 44 und das
strauchige Habichtskraut Hier. fruticosum Willd. (s. 1,
Nachtr. B. 3, S. 692.) welches von den canarischen Inseln
kommt. Sie tragen fast alle gelbe, Ake einige pomeranzens-
farbige, purpurrothe oder weiße Blumen, die im Juni —
August, manche auch früher oder später sich entwickeln. Fort-
pflanzung durch Saamen und Wurzeltheilung.

In den im dritten Bande v. Nachtr. S. 700. angezeig-
ten Synonymen gehören noch folgende

Synonymen.

Hieracium acutifolium Vill. ist Hieracium staticifoli-
um 1. Nachtr.

Auricula Bess. (nec Linn.) s. Hieracium
Bessarianum N. 6.

balsameum Asso ist Hieracium amplexi-
caule Var. s. Lexic.

bifurcum M. a B. s. Hieracium flagellare
N. 9.

blattarioides Linn. (s. Lexic. 1. Aufl.) ist
Hieracium pyrenaicum Linn. s. Lexic.

brachiatum Cand. s. Hieracium flagellare
N. 9.

bupleuroides C. C. Gmel. ist Hieracium
glaucum Var. s. 1. Nachtr.

bupleuroides Billard. s. Hieracium flexuo-
sum 1. Nachtr.

canadense Michx. ist Hieracium sabau-
dum Linn. s. Lexic.

collinum Bess. s. Hieracium flagellare
N. 9.

Hieracium pulmonarioides Vill. f. *Hieracium pulmonarium* N. 13.

— *rupicarpa* Schrank. ist *Hieracium alpinum*.

— *speciosum* Hornem. (f. 1. Nachtr.) ist *Hieracium flexuosum* 1. Nachtr.

— *sudeticum* Tausch. f. *Hieracium carpathicum* N. 38.

— *tubulosum* Lam. ist *Hieracium intybaceum* Jacq. f. 1. Nachtr.

Hierochloë Gmel. Pal. de Beauvois t. 12. f. 5. (*Holcus* Linn. et Auct.)

Ahrchen rispenständig. Kelche dreiblümig, trocken; die zwei seitenständigen Blüthen sind männlich, ungekränzt, die mittlere ist ♀. Die Corollenklappen mucronenspitig oder dornig. Nectar-schuppen fast kreisrund. Fruchtknoten schnabelförmig. Narbe schwarz.

Triandria Digynia (Familie Gräser.)

1. *Hierochloë boreale* Roem. et Schult. (*Holcus borealis* Schrad. *H. repens* Host. *H. odoratus* Linn. f. Lexic. 1. Aufl. B. 4.)

Wurzel kriechend. Stalm glatt. Blätter etwas breit, gespißt. Rispe fast einseitig. Blumenstiele glatt. Kelche filzig, die Corollenklappen der männlichen Blüthen gespalten, ungekränzt. Nectar-schuppen gespalten, lanzettförmig. Waterl. das nördliche und mittlere Europa. 4

2. *Hierochloë fragrans* R. et Sch. ist *Holcus fragrans* Willd. Parsh. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 12.

3. *Hierochloë australis* R. et Sch. (*Hierochl. odorata* P. d. Peauv. *Holcus australis* Schrad.)

Wurzel kriechend. Blätter schmal, gespißt. Rispe ausgebreitet. Blumenstiele oben filzig. Kelche wimperhaarig, fast gleich, die Corollenklappen der männlichen Blüthen gespalten, auf dem Rücken mit einer Granne versehen. Nectar-schuppen kreisrund. Wächst im mittlern Europa. 4

4. *Hierochloë glabra* Trinius. Glatte Hierochloë.

Wurzel kriechend. Blätter schmal. Rispe ausgebreitet. Blumenstiele und Blümchen glatt, die letztern fast gleich, die Corollenklappen der männlichen Blüthen abwechselnd abgestutzt, gerippt, abwechselnd zweispitzig, ohne Grannen. Die Klappen derwitterblüthe ungetheilt, unbewehrt. Nectar-schuppen lanzettförmig. Waterl. Daurien.

5. *Hierochloë redolens* R. et Schumacher. *Holcus redolens* Forst. Vahl. 1. Nachtr. B. 4.

6. *Hierochloë antarctica* R. Brown. (*Diarrheum antarcticum* Labill.)

Stamm aufrecht. Blätter kurz. Röhre ästig, weitschweifig, fast überhängend. Kelchklappen lanzettförmig, gewimpert, so lang als die Blümchen. Corollenklappen an beiden Seiten gegrannt, sitzig. Die Grannen gerade, die Klappen der mittlern Blüthe mucronenspitzig. Vaterl. das nördliche Neuhol-
land. 24

7. *Hierochloë alpina* R. et Sch. (*Aira alpina* Liljebl. siehe *Holcus alpinus* Swartz. Wahlenb. ? f. 1. Nachtr. B. 4. S. 10.)

8. *Hierochloë pauciflora* R. Br. Wenigblümige Hierochloë.

Wurzelblätter eingerollt, kürzer als der Stamm. Röhre einfach, traubig. Kelche glatt, die männlichen Blüthen oben sehr kurze Grannen tragend. Vaterl. die Ins. Melville.

Hierochloë parviflora Bresl. ist *Aira sicula* Spr.

Hilaria Humb. Kunth Nov. Gen. et Sp. pl. 1. p. 117. *Hilarie*.

Aehren zu 3 in einer Hülse; die zwei seitenständigen Aehren vielblümig, männlich, die mittlere einblümig, weiblich. Hülse einblättrig, unregelmäßig sechsseitig. Kelchklappen und Nectarschuppen fehlen. Zwei Corollenklappen. Drei Staubfäden, zwei Griffel. Narbe federartig. Samen eingeschlossen. Triandria, Digynia (Familie Gräser.)

Diese Gattung hat Hr. v. Humboldt bestimmt und sie dem Hrn. Aug. S. Hilaire zu Ehren *Hilaria* genannt. Hilaire (Akademiker in Paris), hat auf seinen Reisen in Tropenländern viele neue Pflanzen gesammelt und diese in sehr schätzbaren Werken herausgegeben: „Plantes usuelles des Bräsiiliens. fasc. 1—6. Paris 1824—1825. 4. Flora Brasiliæ meridionalis fasc. 1—4. etc. 1824—1826. 4. Observ. in Mem. du mus. et in Ann. des scienc. nat.“

Es ist jetzt nur eine Art bekannt.

1. *Hilaria tenchroides* Kunth J. c. 1. t. 37. Tenchroideartige Hilarie.

Stamm ästig, gestreckt, Wurzel treibend, kriechend; an den Knoten behaart. Blätter gezähnt, die Scheiden an der Mündung gewimpert. Aehren einzeln, spitzständig, nicht

gegliedert. Die Spindel der Achse keilförmig gebogen. Vaterl. Mexiko. 4 Blühz. Aug. September.

Hillia Linn. Swartz. *Hillia*. E. Lexic. B. 4. (Gaertn. Sem. t. 197.)

Kelch sechspaltig, von Bracteen unterstügt. Corolle röth-
rig, sehr lang. Staubfäden 6, eingeschlossen. Kapsel lang,
schotenförmig, zweifächerig. Saamen mit gefranzter Flügel-
haut versehen.

Hexandria Monogynia (Familie Rubiaceen.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn
Dr. Joh. Hill, ein Engländer und Medicus in London.
Er lieferte ein Werk: *The vegetable System* Vol.
1—26. London 1759—1775. fol. welches 1521 Kupfer-
tafeln mit 5624 Pflanzen-Abbildungen enthält, da aber die
Pflanzen bisweilen nicht alle der Natur getreu abgebildet sind,
so ist dieses große und theure Werk, welches ich bei Joh.
Banks in London sah, für jetzige Zeiten nicht mehr brauch-
bar. Johann Hill starb im Jahr 1775.

Hillia brasiliensis Schlechtend. in *Linnaea* B. 42
S. 2. S. 201. Brasilische Hillie.

Alle Theile der Pflanze glatt. Stengel strauchig, ästig,
die untern Aeste meist gegenüberstehend, stumpf, viereckig, die
obern zweitheilig. Blätter elliptisch, an beiden Enden ver-
dünn, der Rand durchscheinend, fast zurückgeschlagen. Blu-
men einzeln, gipfelständig, hängend. Corollenröhre fast drei
Zoll lang, gerade, aufrecht, der Rand sechspaltig. Staub-
fäden eingeschlossen. Antheren länglich. Griffel fadenförmig,
eingeschlossen. Narbe zweilappig. Kapsel 2½ Zoll lang, Va-
terl. das südliche Brasilien.

Hillia longiflora et *tetrandra* Swartz. f. Lexic. B. 4.

Hillia parasitica Linn. ist *Hillia longiflora* Sw. f.
Lexic.

Himantalia lorea Lyngb. ist *Gyliosira ericoides* Ag.

Himantia Persoon mycol.

Unterlage ästig, bleibend. Aeste gleich lang, fast geglie-
dert.

Cryptogamia Sect. V. (Pflanzartige Gewächse.)

In Syst. Veg. ed. Sprengel sind fünf Arten aufgeführt,
welche auf Baumrinden und faulem Holze vegetiren.

Himantoglossum Sprengel *Longoglossum* Richard.

Blumenblätter gewölbt. Lippe verlängert, keilförmig dreitheil-

lig, an der Basis sackförmig = höckerig, der mittlere Einschnitt gespalten.

Gynandria Monandria (Familie Orchideen.)

1. *Himantoglossum hircinum* Spr. ist *Orchis hircina* Scop. Willd. Swartz. f. Lexic. B. 6. (Satyrium Linn.)

2. *Himantoglossum caprinum* Spr. (*Orchis hircina* M. a Bieb.)

Blumenblätter gewölbt. Lippe dreitheilig, gleichbreit, von der Basis bis zur Mitte fzig, die seitenständigen Lappen schief = lanzettförmig, der mittlere sehr lang, an der Spitze gespalten. Waterl. Laurien. 4

3. *Himantoglossum anthropophorum* Spr. ist *Ophrys anthropophora* Linn. f. Lexic. B. 6. (Aceras R. Brown.)

4. *Himantoglossum parviflorum* Spr. ist *Orchis parviflora* Willd. f. 1. Nachtr. B. 5. S. 386.

5. *Himantoglossum satyrioides* Spr. ist *Orchis satyrioides* Steven. f. 1. Nachtr. B. 5. S. 402.

Hippeastrum pulverulentum Sims. ist *Amaryllis acuminata* Ker.

— *stylosum* Sims. ist *Amaryllis maracensis* Ker.

— *subbarbatum* Herber in bot. mag. 2475. ist *Amaryllis miniatum* R. et P.

Hippia Linn. Sp. Suppl. Hippie f. Lexic. B. 4.

Charact. generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 2.

Blüthendecke (Kelch) halbkugelig, dachziegelschuppig. Fruchtknoten gewölbt, nackt. Scheidenblümchen röhrig, männlich. Strahlblümchen weiblich, abgefürzt, zählig, auch zweilappig oder zungenförmig. Saamen zusammengebrückt, leucospermig, glatt. Saamentrone fehlt.

Syngenesia 4 Ordn. (Familie Campasieae.)

1. *Hippia bogotensis* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Sp. IV. p. 301.

Stengel krautartig, aufrecht, glatt. 2 Blätter wechselstehend, doppelt fiederspaltig, die Lappen eingeschnitten = gezähnt. Blumenstiele gipfelständig, 3—5 blüthig, fast doldenkränzig. Waterl. Aengrauade, bei Santa Fe de Bogota. 4

2. *Hip-*

2. *Hippia peduncularis* Kunth. J. c. IV. p. 301. Ges
stielte Hippie.

Stengel krautartig, kriechend. Blätter wechselnd stehend,
buchtig = fiederspaltig, spitzig = gezähnt. Blumenstiele gipfels-
ständig, einzeln oder doldentraubig. Vaterl. Quito, 4 Blühz.
Mai, Juni.

Hippia frutescens Linn. Suppl. f. Lexic. B. 4.
Hipp. integrifolia L. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 2. die da-
selbst beigelegten Synonymen können ausgestrichen werden.

Kultur. Diese Gewächse überwintert man im warmen
Haufe und vermehrt sie durch die Aussaat des Saamens und
durch Wurzeltheilung.

Synonymen.

- Hippia minuta* Linn. Suppl. f. Lexic. ist *Gymnostyles*
minuta Spr.
Hippia minuta Mutes ist *Gymnostyles Mutisii* Spr.
Hippia stolonifera Brot. f. 1. Nachtr. ist *Gymnostyles lu-*
sitana Spr.

Hippion Sprengel Syst. Veg. (*Gentiana* Spec. Linn.
Exacum Willd.)

Kelch vierspaltig. Corolle präsentirtellerförmig. Antheren
zweifächerig, nicht gedreht. Narbe kopfförmig. Kapsel zwei-
theilig, die Klappen nach innen gebogen und bilden die Mut-
terfrucht an denen die Saamen sitzen.

Pentandria Monogynia (Familie Gentianeen.)

1. *Hippion viscosum* Spr. (*Gentiana viscosa* Ait. siehe
Exacum viscosum Lexic. B. 4.)
2. *Hippion verticillatum* Spr. (*Gentiana verticillata*
Linn. f. Exacum verticillatum Willd. Lexic. B. 4.)
3. *Hippion hyssopifolium* Spr. (*Gentiana hyssopifolia*
Linn. Exacum hyssopifolium Willd. f. Lexic. B. 4.
nebst Anleitung zu ihrer Kultur daselbst S. 124—126.)
4. *Hippion contraversum* Spr. (*Sabbatia verticillata*
Syst. Veg. 1. p. 580.)

Curtia gentianoides Schlechten. Linnaea p. 210.

Schubleria stricta Mart. Fl. Bras. t. 187.

Stengel sehr einfach, rund, straff. Blätter quirlförmig
stehend, stiellos, länglich = eiförmig, zurückgeschlagen, gespitzt,
dreirippig. Blumen in doldentraubige Rispen gesammelt. Va-
terl. Brasilien.

Dietr. Ex. 2r. Nachtr. IV. Bd.

§ f

5. *Hippion diffusum* Spr. Weitschweifiges Hippion.

Schübleria diffusa et conferta Mart. J. c.

Stengel dünn, oben getheilt, weitschweifig. Blätter zu 3—4 quirlförmig stehend, eiförmig, gespitzt. Blumen in schlaffen Rispen. Vaterl. Brasilien.

6. *Hippion patulum* Spr. Ausgebreitetes Hippion.

Schübleria patula Mart. J. c. t. 188.

Stengel dünn, rispenartig, ausgebreitet. Blätter linienförmig. Corolleneinschnitte spitzlich. Vaterl. Brasilien.

Hippion aetivum et *pusillum* Schmidt ist *Gentiana aetiva* R. et Sch.

Hippocratea Linn. *Hippocratee*, f. Lexic. B. 4. (Jacq. amer. t. 9.)

Character generic. f. 1. Nachtr.

Kelch fünfpaltig, stehen bleibend. Corollenblätter 5, an der Basis breiter, lappenförmig. Staubfäden 3, zuweilen 4—5, am Grunde breiter, verbunden. Antheren fast zweiknöpfig, einfächerig, sie öffnen sich an der Spitze trompetenförmig. Griffel einfach. Narbe stumpf. Kapseln 3, zusammenhängend, zweiflappig. Saamen 2—4, an der Basis geklügelt.

Triandria Monogynia (Familie Hippocrateen.)

1. *Hippocratea arborea* Roxb. Baumartige Hippocratee.

Stamm baumartig. Aestchen kletternd. Blätter zu 2 einander gegenüberstehend, länglich, feinspitzig, sägeartig gezähnt. Die Blumen bilden winkelförmige Doldentrauben. Kapseln länglich-linienförmig, zweisaamig. Zu dieser Art hat Sprengel *H. disperma* Vahl. gezogen f. 1. Nachtr. B. 4. S. 3. Vaterl. Ostindien. h

2. *Hippocratea excelsa* Kunth in H. et B. Nov. gen. et Sp. pl. V. p. 107.

Ein hoher Baum, dessen Aestchen grau-braun, glatt, in der Jugend vierseitig und grün sind. Die Blätter stehen einander gegenüber, zuweilen fast wechselseitig, sind gestielt, elliptisch-länglich, am Rande gewellt-gekerbt, geadert, lebersartig, ungefähr 3 Zoll lang, 17 bis 18 Linien breit, die Stiele an der Basis mit zwei kleinen eiförmigen Ackerblättern versehen. Die Blumenstiele zweispaltig, vielblüthig, pulverartig-scharfborstig, braun, drei bis viermal kürzer als die Blätter, mit kleinen eiförmigen Bracteen besetzt. Die Blumen gleichen an Größe und Farbe denen der *Ribes alpina* L.

Waterl. Merito, zwischen Acapulco und der Hauptstadt.
 ♀ Blühz. April.

5. *Hippocratea obtusifolia* Roxb. Stumpfbältrige Hippocratee.

Stengel strauchig, ästig, glatt. Nester mit Gabelranken versehen. Blätter länglich, stumpf, ganzrandig. Blumen in winkels- und gipfelständige Doldentrauben gesammelt. Kapseln umgekehrtepförmig, vierfaamig. Waterl. Coromandel. (Ostindien.) ♀

4. *Hippocratea verrucosa* Kunth J. c. V. p. 138 Warzige Hippocratee.

Ein Schlingstrauch, mit cylindrischen, warzigen, grauen, sehr ausgebreiteten Nester. Die Blätter stehen einander gegenüber, sind gestielt, elliptisch-länglich, an beiden Enden gespitzt, am Rande undeutlich und entfernt sägeartig gezähnt, lederartig, glatt, fast 3 Zoll lang, 15—16 Linien breit. Blumenstiele winkelsständig, ästig-zweitheilig, glatt. Bracteen gegenüberstehend, klein, eiförmig. Blumen klein, gestielt. Corolle fünfblättrig, grün. Kapseln umgekehrtepförmig. Waterl. Neugranada. ♀ Blühz. März, April. *Hippocratea acapulcensis* Kunth scheint nur eine Varietät zu seyn, die hierher gehört.

5. *Hippocratea celastroides* Kunth J. c. V. p. 136. Ce-
 lastrusartige Hippocratee.

Stengel strauchig und windet sich. Nester walzenrund, glatt, ausgebreitet. Blätter gestielt, länglich-lanzettförmig, gespitzt, entfernt sägeartig gezähnt, geädert, fast lederartig, glatt, fast 3 Zoll lang, 8—11 Linien breit, die Stiele am Grunde mit sehr kleinen eiförmigen langgespitzt-pfriemenförmigen Afterblättern versehen, welche abfallen. Blumenstiele winkels- und gipfelständig, einzeln oder gepaart, an der Spitze zweitheilig, vielblümig, glatt, doppelt kürzer als die Blätter, an den Theilungswinkeln mit kleinen, eiförmigen, an der Basis gefranzten Bracteen besetzt. Der Kelch ist fünfspaltig, grün, die Corolle fünfblättrig, gleich, glattgrün, dreimal länger als der Kelch. Kapseln an der Basis zusammenhängend, horizontal absteigend, rundlich-umgekehrtepförmig. Waterl. Mexico. ♀ Blühz. April.

6. *Hippocratea acutiflora* Less. Spitzblumige Hippocratee.

Stengel strauchig. Blätter länglich-oval, gezähnt. Blu-

men in zweitheiligen Doldentrauben, die kürzer als die Blätter sind. Kapseln umgekehrteiförmig. Vaterl. Mexiko. h

7. *Hippocratea emarginata* Rudg. Ausgekerbte Hippocratee.

Blätter umgekehrteiförmig, ganzrandig, nur an der Spitze ausgekerbt, glatt. Nesselchen scharf. Blumenrispen winkelförmig. Antheren rundlich. Vaterl. Guiana. h

8. *Hippocratea uniflora* Sess. Einblumige Hippocratee.

Blätter länglich-herzförmig, ganzrandig. Blumenstiele einblüthig. Kapseln umgekehrt-eiförmig. Vaterl. Mexiko. h

9. *Hippocratea velutina* Afzel.

Blätter länglich, gespißt, scharf, ganzrandig, unten, wie die Nesselchen, mit feinen gelbrothen Borsten bekleidet. Blumenrispen winkelförmig, zweitheilig. Vaterl. Guiana und Brasilien.

Kultur der Hippocrateen, im Allgemeinen siehe Lexikon B. 4. S. 657. Zu den Synonymen, welche ich im 1. Nachtrage B. 4. S. 6. angezeigt habe, gehören noch folgende

Synonymen.

Hippocratea acapulcensis Kunth f. *Hippocratea verrucosa* N. 4.

— discolor Meyer ist *Hippocratea laevigata*.

— disperma Vahl. f. *Hippocratea arborea* N. 1.

— elliptica Kunth ist *Hippocratea ovata* f. 1. Nachtr.

Hippocrepis Linn. Pferdehufshülse; Hufeisen f. Lexic. B. 4. (Schluhr. t. 206.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 6.

Hülse zusammengeedrückt, gegliedert, zwischen den Gliedern buchtig = ausgeschweift.

Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflanzen.)

1. *Hippocrepis glauca* Tenor. Graugrüne Hufeisenshülse.

Aus der Wurzel erheben sich mehrere ausdauernde Stengel, die Rasen bilden. Blätter gefiedert, grau- oder bläulich-grün. Blättchen spatelförmig, an der Spitze eingedrückt (ausgekerbt.) Die Blumen bilden Dolden. Gliederhüllen fast aufgetrieben (strobend), scharf. Vaterl. Neapel und Sicilien. 24

2. *Hippocrepis ciliata* Willd. (*H. annua* Lag. *H. dicarpa* M. a Bieb.)

Wurzel einjährig. Stengel krautartig, fast aufrecht. Blätter gefiedert. Blättchen spatel-linienförmig, fast ausgekerbt. Blumenstiele 2–4 blüsig. Gliederhüllen flach. Saamen gerändert, unten mit Barthaaren besetzt. Vaterl. Spanien, Sicilien und das südliche Frankreich. ☉

Kultur. Diese Gewächse gedeihen in unsern bot. Gärten unter freiem Himmel und werden durch Saamen vermehrt.

- Hippomane* Linn. Manischenbaum f. Lexic. B. 4. Kennzeichen der Gattung verbessert und berichtigt im 1. Nachtrage B. 4. S. 7.

Hippomane Mancinella et spinosa Linn. f. Lexic. Zur letztern Art gehört *Sapium ilicifolium* Willd. f. 1. Nachtr. B. 7. S. 477.

Hippomane biglandulosa Linn. f. Lexic. 1. Aufl. B. 4. ist *Sapium Hippomane* Meyer. f. 1. N. B. 7. S. 476.

Hippomane biglandulosa Aub. f. *Sapium aucuparium* Jac. 1. Nachtr. i

Hippophaë Linn. Sanddorn f. Lexic. B. 4. (Schluhrs Handb. 1: 32.)

Hippophaë argentea Pursh. ist *Shepherdia argentea* Nuttall.

Hippophaë canadensis L. f. Lexic. ist *Shepherdia canadensis* Nuttall.

- Hippuris* Linn. Tannenwedel f. Lexic. B. 4. (Gaertn. Sem. t. 84.)

Blumen winkelförmig. Fruchtknoten einfach, mit sehr kleinen Zähnen (eine Art von Kelch) gekrönt. Ein Staubfaden der mit dem Griffel auf dem Fruchtknoten steht, anfänglich mit letzterem verbunden ist, dann bei völliger Entwicklung seitwärts sich entfernt, frei steht und eine rundliche Anthere trägt. Ruß kuglich, einsamig.

Monandria Monogynia (Familie Najaden.)

1. *Hippuris montana* Ledeb. Berg-Tannenwedel.

Stengel kletternd, fast ästig. Blätter zu 6, quirlförmig stehend, linienförmig, gespitzt. Vaterl. das westliche Nordamerika. 4

- Hiptage* Gaertn. Sem. t. 116. *Hiptage* (Gaertnera Schreb. Roxb.)

Kelch fünfstheilig, an der Basis drüsig. Fünf gewimpert-gefranzte Corollenblätter. Staubfäden 10, davon einer länger ist als die übrigen. Ein Griffel. Drei einsamige vierflügelige Früchte; die Flügel ungleich.

Decandria Monogynia (Familie Malpighiaceen.)

1. *Hiptage Madablota* Gaertn. Ostindische Hiptage.

Hierher gehört *Gaertnera racemosa* Roxb. f. Lexic. erste Auflage B. 4. S. 247.

Banisteria bengalensis Linn. *B. unicapsularis* Lam. *Molina racemosa* Cavan. diss. 2. t. 116.

Blätter ey-lanzettförmig, langgespitzt. Blumen in gipfelständige Trauben gesammelt. Vaterl. Ostindien. h

2. *Hiptage obtusifolia* Cand. Stumpfblättrige Hiptage.

Gaertnera obtusifolia Roxb. Corom.

Blätter umgekehrteyförmig, fast mucronenspitzig. Blumentrauben winkels- und gipfelständig. Vaterl. China. h

Kultur. Beide Arten gedeihen am besten in warmen Häusern und lassen sich, außer der Aussaat des Saamens, auch durch Stecklinge vermehren und fortpflanzen.

Hiraea Jacq. Hiräe f. Lexic. B. 4.

Kelch fünfstheilig, mit oder ohne Drüsen. Fünf fast kreisrunde Corollenblätter, mit Nägeln versehen. Staubfäden 10, an der Basis zusammenhängend. Drei einsamige Früchte, die auf dem Rücken kammförmig und mit einer Flügelhaut umgeben sind.

Decandria Trigynia (Familie Malpighiaceen.)

Die Arten, welche der Gattung *Hiraea* angehören, sind meist Schlingsträucher, deren Blätter zu 2 einander gegenüber stehen. Die Blumen blaß, violett, weiß oder gelb, in Trauben gesammelt, die Rispen bilden und mit Bracteen versehen sind.

† *Calycibus eglandulos.* Kelche ohne Drüsen.

Hiraea reclinata Jacq. *H. odorata* Willd. f. Lexic. gehören hierher und folgende Arten.

1. *Hiraea glabra* Spr. Glatte Hiräe.

Stengel strauchig, wie die Blätter glatt. Blätter länglich-eyförmig, glänzend. Blumen in dreitheiligen gipfelständigen Rispen, mit angedrückten Paaren bekleidet. Vaterl. Brasilien. h

2. *Hiraea hypericoides* Burch. Hypericumartige Hiräe.

Stengel strauchig. Blätter linienförmig, auf beiden Sei-

ten glatt. Blumentrauben rispenständig. Vaterl. das südliche Afrika. h

3. *Hiraea indica* Roxb. Hierher gehört *Triopteris indica* f. Lexic. B. 10.

4. *Hiraea nutans* Roxb. Ueberhängende Hirde.

Stengel strauchig. Blätter eiförmig, langgespitzt, oben glatt, unten mit angedrückten Borsten bekleidet. Blumentrauben rispenständig, überhängend. Vaterl. Ostindien. h

†† Calycibus glandulosus. Kelche mit Drüsen versehen.

5. *Hiraea oblongifolia* Cand. (*Mascagnia oblongifolia* et *americana* Bertero.)

Stengel strauchig, kletternd. Blätter länglich-eiförmig, gespitzt, oben glatt, unten filzig. Blumen rispenständig. Kelche drüsig. Vaterl. Südamerika, am Magdalenenflusse. h

6. *Hiraea ovatifolia* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Sp. pl. V. p. 170.

Blätter eiförmig, langgespitzt, ganzrandig, an der Basis gerundet, gestielt, die Stiele ohne Drüsen. Blumen in winkelfständigen Rispen, die fast so lang als die Blätter sind. Vaterl. Cumana, an schattigen Orten. h

7. *Hiraea divaricata* Kunth J. c. V. p. 169. Ausgesperrte Hirde.

Blätter länglich, langgespitzt, gerippt, glatt, gestielt, die Stiele mit 3—7 Drüsen besetzt. Blumenrispen winkelfständig, doppelt länger als die Blätter. Kelche drüsig und mit angedrückten Haaren bekleidet. Corollenblätter blaßviolet. Vaterl. Cumana. h Blühz. Septemb.

Kultur. In Hinsicht auf Standort, Boden und Fortpflanzung behandelt man die Hiraea wie die Banisterien f. Periton und 1. Nachtr.

Hiraea prunifolia, *complicata* et *nitida* hat Kunth als zweifelhafte Arten aufgeführt. f. Kunth Synops. pl. 3. p. 186.

Hirschfeldia inflexa Presl. ist *Sinapis heterophylla* Lag.

Hirschfeldia integrifolia Presl. ist *Sinapis panormitana* Spr.

Hirtella Linn. Hirtelle. (Vahl. Simb. 2. t. 31.)

Kelch fünfspaltig, stehen bleibend, an der Basis gespornt,

lig, an der Basis sackförmig = höckerig, der mittlere Einschnitt gespalten.

Gynandria Monandria (Familie Orchideen.)

1. *Himantoglossum hircinum* Spr. ist *Orchis hircina* Scop. Willd. Swartz. f. Lexic. B. 6. (Satyrium Linn.)

2. *Himantoglossum caprinum* Spr. (*Orchis hircina* M. a Bieb.)

Blumenblätter gewölbt. Lippe dreitheilig, gleichbreit, von der Basis bis zur Mitte fzig, die seitenständigen Lappen schiel = lanzettförmig, der mittlere sehr lang, an der Spitze gespalten. Vaterl. Lurien. 2

3. *Himantoglossum anthropophorum* Spr. ist *Ophrys anthropophora* Linn. f. Lexic. B. 6. (Aceras R. Brown.)

4. *Himantoglossum parviflorum* Spr. ist *Orchis parviflora* Willd. f. 1. Nachtr. B. 5. S. 386.

5. *Himantoglossum satyrioides* Spr. ist *Orchis satyrioides* Steven. f. 1. Nachtr. B. 5. S. 402.

Hippeastrum pulverulentum Sims. ist *Amaryllis acuminata* Ker.

— *stylosum* Sims. ist *Amaryllis maracensis* Ker.

— *subbarbatum* Herber in bot. mag. 2475. ist *Amaryllis miniatum* R. et P.

Hippia Linn. Sp. Suppl. Hippie f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 2.

Blüthendecke (Kelch) halbkugelig, dachziegelschuppig. Fruchtknoten gewölbt, nackt. Scheidenblümchen röhrig, männlich. Strahlblümchen weiblich, abgefügt, zählig, auch zweilappig oder zungenförmig. Saamen zusammengedrückt, leulensförmig, glatt. Saamentrone sehr.

Syngenesia 4 Ordn. (Familie Campaniace.)

1. *Hippia bogotensis* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Sp. IV. p. 301.

Stengel krautartig, aufrecht, glatt. Blätter wechsell. stehend, doppelt fiederspaltig, die Lappen eingeschnitten = gezähnt. Blumenstiele gipfelständig, 3—5 blüthig, fast dorsitransig. Vaterl. Neugranada, bei Santa Fe de Bogota. 2

2. *Hip-*

2. *Hippia peduncularis* Kunth. J. c. IV. p. 301. Ges
stielte Pippie.

Stengel krautartig, kriechend. Blätter wechselnd stehend,
buchtig = fiederspaltig, spitzig = gezähnt. Blumenstiele gipfels-
ständig, einzeln oder doldentraubig. Vaterl. Quito. 24 Blüthz.
Mai, Juni.

Hippia frutescens Linn. Suppl. f. Lexic. B. 4.
Hipp. integrifolia L. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 2. die das-
selbst beigelegten Synonymen können ausgestrichen werden.

Kultur. Diese Gewächse überwintert man im warmen
Haufe und vermehrt sie durch die Aussaat des Saamens und
durch Wurzeltheilung.

Synonymen.

Hippia minuta Linn. Suppl. f. Lexic. ist *Gymnostyles*
minuta Spr.

Hippia minuta Mutes ist *Gymnostyles Mutisii* Spr.

Hippia stolonifera Brot. f. 1. Nachtr. ist *Gymnostyles lu-*
sitanica Spr.

Hippion Sprengel Syst. Veg. (*Gentiana* Spec. Linn.
Exacum Willd.)

Kelch vierspaltig. Corolle präsentirtellerförmig. Antheren
zweifächerig, nicht gedreht. Narbe kopfförmig. Kapsel zwei-
theilig, die Klappen nach innen gebogen und bilden die Mut-
terfrucht an denen die Saamen sitzen.

Pentandria Monogynia (Familie Gentianeen.)

1. *Hippion viscosum* Spr. (*Gentiana viscosa* Ait. siehe
Exacum viscosum Lexic. B. 4.)

2. *Hippion verticillatum* Spr. (*Gentiana verticillata*
Linn. f. *Exacum verticillatum* Willd. Lexic. B. 4.)

3. *Hippion hyssopifolium* Spr. (*Gentiana hyssopifolia*
Linn. *Exacum hyssopifolium* Willd. f. Lexic. B. 4.
nebst Anleitung zu ihrer Kultur daselbst S. 124—126.)

4. *Hippion contraversum* Spr. (*Sabbatia verticillata*
Syst. Veg. 1. p. 580.)

Curtia gentianoides Schlechten. Linnaea p. 210.

Schubleria stricta Mart. Fl. Bras. t. 187.

Stengel sehr einfach, rund, straff. Blätter quirlförmig
stehend, stiellos, länglich = eiförmig, zurückgeschlagen, gespitzt,
dreirippig. Blumen in doldentraubige Rispen gesammelt. Va-
terl. Brasilien.

Dietr. Ex. 2r. Nachtr. IV. Bd.

§ f

5. *Hippion diffusum* Spr. Weitschweifiges Hippion.

Schübleria diffusa et conferta Mart. J. c.

Stengel dünn, oben getheilt, weitschweifig. Blätter zu 3—4 quirlförmig stehend, eiförmig, gespitzt. Blumen in schlaffen Rippen. Waterl. Brasilien.

6. *Hippion patulum* Spr. Ausgebreitetes Hippion.

Schübleria patula Mart. J. c. t. 188.

Stengel dünn, rippenartig, ausgebreitet. Blätter linienförmig. Corolleneinschnitte spitzlich. Waterl. Brasilien.

Hippion aetivum et *pusillum* Schmidt ist *Gentiana aetiva* R. et Sch.

Hippocratea Linn. *Hippocratee*. f. Lexic. B. 4. (Jacq. amer. t. 9.)

Character generic. f. 1. Nachtr.

Kelch fünfspaltig, stehen bleibend. Corollenblätter 5, an der Basis breiter, kappenförmig. Staubfäden 3, zuweilen 4—5, am Grunde breiter, verbunden. Antheren fast zweiknöpfig, einfächerig, sie öffnen sich an der Spitze trompetenförmig. Griffel einfach. Narbe stumpf. Kapseln 3, zusammenhängend, zweiflappig. Saamen 2—4, an der Basis geklügelt.

Triandria Monogynia (Familie Hippocrateen.)

1. *Hippocratea arborea* Roxb. Baumartige Hippocratee.

Stamm baumartig. Aestchen kletternd. Blätter zu 2 einander gegenüberstehend, länglich, feinspitzig, sägeartig gezähnt. Die Blumen bilden winkelförmige Doldentrauben. Kapseln länglich-linienförmig, zweisaamig. Zu dieser Art hat Sprengel *H. disperma* Vahl. gezogen f. 1. Nachtr. B. 4. S. 3. Waterl. Ostindien. h

2. *Hippocratea excelsa* Kunth in H. et B. Nov. gen. et Sp. pl. V. p. 107.

Ein hoher Baum, dessen Aestchen grau-braun, glatt, in der Jugend vierseitig und grün sind. Die Blätter stehen einander gegenüber, zuweilen fast wechselseitig, sind gestielt, elliptisch-länglich, am Rande gewellt-gekerbt, geadert, leberartig, ungefähr 3 Zoll lang, 17 bis 18 Linien breit, die Stiele an der Basis mit zwei kleinen eiförmigen Ackerblättern versehen. Die Blumenstiele zweispaltig, vielblüthig, pulverartig-scharfborstig, braun, drei bis viermal kürzer als die Blätter, mit kleinen eiförmigen Bracteen besetzt. Die Blumen gleichen an Größe und Farbe denen der *Ribes alpina* L.

Waterl. Mexiko, zwischen Acapulco und der Hauptstadt.
 ♀ Blühz. April.

3. *Hippocratea obtusifolia* Roxb. Stumpfblättrige Hippocratee.

Stengel strauchig, ästig, glatt. Ästchen mit Gabelranken versehen. Blätter länglich, stumpf, ganzrandig. Blumen in winkels- und gipfelständige Doldentrauben gesammelt. Kapseln umgekehrtepförmig, viersaamig. Waterl. Coromandel. (Ostindien.) ♀

4. *Hippocratea verrucosa* Kunth J. c. V. p. 138 Warzige Hippocratee.

Ein Schlingstrauch, mit cylindrischen, warzigen, grauen, sehr ausgebreiteten Ästen. Die Blätter stehen einander gegenüber, sind gestielt, elliptisch-länglich, an beiden Enden gespitzt, am Rande undeutlich und entfernt sägeartig gezähnt, lederartig, glatt, fast 3 Zoll lang, 15—16 Linien breit. Blumenstiele winkelsständig, ästig-zweitheilig, glatt. Bracteen gegenüberstehend, klein, eiförmig. Blumen klein, gestielt. Corolle fünfblättrig, grün. Kapseln umgekehrtepförmig. Waterl. Neugranada. ♀ Blühz. März, April. *Hippocratea acapulcensis* Kunth scheint nur eine Varietät zu seyn, die hierher gehört.

5. *Hippocratea celastroides* Kunth J. c. V. p. 136. Celastrusartige Hippocratee.

Stengel strauchig und windet sich. Ästchen walzenrund, glatt, ausgebreitet. Blätter gestielt, länglich-lanzettförmig, gespitzt, entfernt sägeartig gezähnt, geadert, fast lederartig, glatt, fast 3 Zoll lang, 8—11 Linien breit, die Stiele am Grunde mit sehr kleinen eiförmigen langgespitzten pfriemenförmigen Austerblättern versehen, welche abfallen. Blumenstiele winkels- und gipfelständig, einzeln oder gepaart, an der Spitze zweitheilig, vielblümig, glatt, doppelt kürzer als die Blätter, an den Theilungswinkeln mit kleinen, eiförmigen, an der Basis gefranzten Bracteen besetzt. Der Kelch ist fünfpaltig, grün, die Corolle fünfblättrig, gleich, glattgrün, dreimal länger als der Kelch. Kapseln an der Basis zusammenhängend, horizontal abstehend, rundlich-umgekehrtepförmig. Waterl. Mexico. ♀ Blühz. April.

6. *Hippocratea acutiflora* Sess. Spitzblumige Hippocratee.

Stengel strauchig. Blätter länglich-oval, gezähnt. Blu-

men in zweitheiligen Doldentrauben, die länger als die Blätter sind. Kapseln umgekehrteiförmig. Vaterl. Mexiko. h

7. *Hippocratea emarginata* Rudg. Ausgekerbte Hippocratee.

Blätter umgekehrteiförmig, ganzrandig, nur an der Spitze ausgekerbt, glatt. Ästchen scharf. Blumenrispen winkelförmig. Antheren rundlich. Vaterl. Guiana. h

8. *Hippocratea uniflora* Sess. Einblumige Hippocratee.

Blätter länglich-herzförmig, ganzrandig. Blumenstiele einblümig. Kapseln umgekehrt-eiförmig. Vaterl. Mexiko. h

9. *Hippocratea velutina* Afzel.

Blätter länglich, gespitzt, scharf, ganzrandig, unten, wie die Ästchen, mit feinen gelbrothen Borsten bekleidet. Blumenrispen winkelförmig, zweitheilig. Vaterl. Guiana und Brasilien.

Kultur der Hippocrateen, im Allgemeinen siehe Lexikon B. 4. S. 657. In den Synonymen, welche ich im 1. Nachtrage B. 4. S. 6. angezeigt habe, gehören noch folgende

Synonymen.

Hippocratea acapulcensis Kunth f. *Hippocratea verrucosa* N. 4.

— discolor Meyer ist *Hippocratea laevigata*.

— disperma Vahl. f. *Hippocratea arborea* N. 1.

— elliptica Kunth ist *Hippocratea ovata* f. 1. Nachtr.

Hippocrepis Linn. Pferdehufshülse; Hufeisen f. Lexic. B. 4. (Schuhr. t. 206.)

Character generic. f. I. Nachtr. B. 4. S. 6.

Hülse zusammengedrückt, gegliedert, zwischen den Gliedern buchtig-ausgeschweift.

Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflanzen.)

1. *Hippocrepis glauca* Tenor. Graugrüne Hufeisenhülse.

Aus der Wurzel erheben sich mehrere ausdauernde Stengel, die Rasen bilden. Blätter gefiedert, grau- oder blaulichgrün. Blättchen spatelförmig, an der Spitze eingedrückt (ausgekerbt.) Die Blumen bilden Dolden. Gliederhülsen fast aufgetrieben (strobend), scharf. Vaterl. Neapel und Sicilien. 24

2. *Hippocrepis ciliata* Willd. (H. annua Lag. H. dicarpa M. a Bieb.)

Wurzel einjährig. Stengel krautartig, fast aufrecht. Blätter gefiedert. Blättchen spatel-linienförmig, fast ausgekerbt. Blumenstiele 2—4 blüsig. Gliederhüllen flach. Saamen gerändert, unten mit Barthaaren besetzt. Vaterl. Spanien, Sicilien und das südliche Frankreich. ☉

Kultur. Diese Gewächse gedeihen in unsern bot. Gärten unter freiem Himmel und werden durch Saamen vermehrt.

- Hippomane* Linn. Manschenißbaum f. Lexic. B. 4. Kennzeichen der Gattung verbessert und berichtigt im 1. Nachtrage B. 4. S. 7.

Hippomane Mancinella et spinosa Linn. f. Lexic. Zur letztern Art gehört *Sapium ilicifolium* Willd. f. 1. Nachtr. B. 7. S. 477.

Hippomane biglandulosa Linn. f. Lexic. 1. Aufl. B. 4. ist *Sapium Hippomane* Meyer. f. 1. N. B. 7. S. 476.

Hippomane biglandulosa Aub. f. *Sapium aucuparium* Jac. 1. Nachtr. i

Hippophaë Linn. Sanddorn f. Lexic. B. 4. (Schubert Handb. 1. 32.)

Hippophaë argentea Pursh. ist *Shepherdia argentea* Nuttall.

Hippophaë canadensis L. f. Lexic. ist *Shepherdia canadensis* Nuttall.

- Hippuris* Linn. Tannenwedel f. Lexic. B. 4. (Gaertn. Sem. t. 84)

Blumen winkelförmig. Fruchtknoten einfach, mit sehr kleinen Zähnen (eine Art von Kelch) gekrönt. Ein Staubfaden der mit dem Griffel auf dem Fruchtknoten steht, anfänglich mit letzterem verbunden ist, dann bei völliger Entwicklung seitwärts sich entfernt, frei steht und eine runde Anthere trägt. Ruß kuglich, einsamig.

Monandria Monogynia (Familie Najaden.)

1. *Hippuris montana* Ledeb. Berg-Tannenwedel.

Stengel kesselförmig, fast ästig. Blätter zu 6, quirlförmig stehend, linienförmig, gespißt. Vaterl. das westliche Nordamerika. 4

- Hiptage* Gaertn. Sem. t. 116. *Hiptage* (Gaertnera Schreb. Roxb.)

Kelch fünfstheilig, an der Basis drüsig. Fünf gewimpert-gefranzte Corollenblätter. Staubfäden 10, davon einer länger ist als die übrigen. Ein Griffel. Drei einsamige vierflügelige Früchte; die Flügel ungleich.

Decandria Monogynia (Familie Malpighiaceen.)

1. *Hiptage Madablota* Gaertn. Ostindische Hiptage.

Hierher gehört *Gaertnera racemosa* Roxb. f. Lexic. erste Auflage B. 4. S. 247.

Banisteria bengalensis Linn. *B. uncapularis* Lam. *Molina racemosa* Cavan. diss. 2. t. 116.

Blätter ey-lanzettförmig, langgespitzt. Blumen in gipfelständige Trauben gesammelt. Vaterl. Ostindien. †

2. *Hiptage obtusifolia* Cand. Stumpfblattrige Hiptage.

Gaertnera obtusifolia Roxb. Corom.

Blätter umgekehrteyförmig, fast mucronenspitig. Blumentrauben winkels- und gipfelständig. Vaterl. China. †

Kultur. Beide Arten gedeihen am besten in warmen Häusern und lassen sich, außer der Aussaat des Saamens, auch durch Stecklinge vermehren und fortpflanzen.

Hiraea Jacq. Hirde f. Lexic. B. 4.

Kelch fünfstheilig, mit oder ohne Drüsen. Fünf fast kreisrunde Corollenblätter, mit Nägeln versehen. Staubfäden 10, an der Basis zusammenhängend. Drei einsamige Früchte, die auf dem Rücken samenförmig und mit einer Flügelhaut umgeben sind.

Decandria Trigynia (Familie Malpighiaceen.)

Die Arten, welche der Gattung *Hiraea* angehören, sind meist Schlingsträucher, deren Blätter zu 2 einander gegenüber stehen. Die Blumen blaß, violett, weiß oder gelb, in Trauben gesammelt, die Rispen bilden und mit Bracteen versehen sind.

† *Calycibus eglandulosus*. Kelche ohne Drüsen.

Hiraea reclinata Jacq. *H. odorata* Willd. f. Lexic. gehören hierher und folgende Arten.

1. *Hiraea glabra* Spr. Statte Hirde.

Stengel strauchig, wie die Blätter glatt. Blätter länglich-eyförmig, glänzend. Blumen in dreitheiligen gipfelständigen Rispen, mit angedrückten Paaren bekleidet. Vaterl. Brasilien. †

2. *Hiraea hypericoides* Burch. Hypericumartige Hirde.

Stengel strauchig. Blätter linienförmig, auf beiden Sei-

ten glatt. Blumentrauben rispenständig. Vaterl. das südliche Afrika. †

3. *Hiraea indica* Roxb. Hierher gehört *Triopteris indica* f. Lexic. B. 10.

4. *Hiraea nutans* Roxb. Ueberhängende Hiraea.

Stengel strauchig. Blätter eiförmig, langgespitzt, oben glatt, unten mit angedrückten Borsten bekleidet. Blumentrauben rispenständig, überhängend. Vaterl. Ostindien. †

†† *Calycebus glandulosus*. Kelche mit Drüsen versehen.

5. *Hiraea oblongifolia* Cand. (*Mascagnia oblongifolia* et *americana* Bertéro.)

Stengel strauchig, kletternd. Blätter länglich-eiförmig, gespitzt, oben glatt, unten filzig. Blumen rispenständig. Kelche drüsig. Vaterl. Südamerika, am Magdalenaflusse. †

6. *Hiraea ovatifolia* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Sp. pl. V. p. 170.

Blätter eiförmig, langgespitzt, ganzrandig, an der Basis gerundet, gestielt, die Stiele ohne Drüsen. Blumen in winkelfständigen Rispen, die fast so lang als die Blätter sind. Vaterl. Cumana, an schattigen Orten. †

7. *Hiraea divaricata* Kunth J. c. V. p. 169. Ausgesperrte Hiraea.

Blätter länglich, langgespitzt, gerippt, glatt, gestielt, die Stiele mit 3—7 Drüsen besetzt. Blumenrispen winkelfständig, doppelt länger als die Blätter. Kelche drüsig und mit angedrückten Haaren bekleidet. Corollenblätter blaßviolet. Vaterl. Cumana. † Blühz. Septemb.

Kultur. In Hinsicht auf Standort, Boden und Fortpflanzung behandelt man die Hiräen wie die Banisterien f. Lexikon und 1. Nachtr.

Hiraea prunifolia, *complicata* et *nitida* hat Kunth als zweifelhafte Arten aufgeführt. f. Kunth Synops. pl. 3. p. 186.

Hirschfeldia inflexa Presl. ist *Sinapis heterophylla* Lag.

Hirschfeldia integrifolia Presl. ist *Sinapis panormitana* Spr.

Hirtella Linn. Hirtelle. (Vahl. Simb. 2. t. 31.)

Kelch fünfspaltig, stehen bleibend, an der Basis gespornt,

gefärbt. Corollenblätter 5, rundlich, wie die Staubfäden in die Wand des Kelches eingefügt. Staubfäden 3—5—7—9, sehr lang, spiralförmig, eingerollt. Griffel einfach, an der Basis des gestielten Fruchtknotens eingefügt, fadenförmig. Narbe abgestutzt. Frucht (ausgetrocknete Beere) meist umgekehrt-eiförmig, nicht aufspringend, einsamig, die Schale sehr zart, häutig.

Icosandria Monogynia (Familie Rosaceen; Chrysobalanen R. Br.)

Die Hirtellen sind Bäume oder Sträucher, deren Blätter wechselnd stehen, ungetheilt und gestielt sind. Blumen gestielt, in winkels- und gipfelförmige Trauben gesammelt. In der allg. bot. Zeitung 1832. Literaturberichte p. 78. haben die HH. Martius et Zuccarini neue Arten, welche dieser Gattung angehören, in folgenden Abtheilungen aufgeführt.

† Racemis simplicissimis. Blumentrauben sehr einfach.

1. *Hirtella floribunda* Schlechtend. Linnaea II. p. 548.

Neste in der Jugend wie die Blatt- und Blumenstiele scharfborstig, fast wöllig. Blätter länglich-lanzettförmig, gespitzt, unten scharfborstig. Blumentrauben 12—18 blüthig, aufrecht. Bracteen viel kürzer als die Blumenstielen. Blumen klein, ockergelb, 7—9 fädig. Vaterl. Brasilien. ♀

2. *Hirtella pilosissima* Mart. et Zuccar. Sehr haarige Hirtelle.

H. americana Aubl. (nec Jacq.) f. *H. americana* Swartz. Lexic. B. 4.

3. *Hirtella oblongifolia* Cand.

Neste in der Jugend, so wie die Blatt- und Blumenstiele wenig filzig. Blätter länglich-herzförmig oder eiförmig, langgespitzt, häutig, glatt. Blumentrauben lang, walzenrund, vielblüthig, aufrecht. Bracteen viel kürzer als die Blumenstielen. Kelchröhre sehr kurz. Blumen 5—6 fädig. Vaterl. Neuspanien und Brasilien. ♀

4. *Hirtella hexandra* Kunth H. et B. Nov. Gen. et Sp. V. p. 245. Sechsfädige Hirtelle.

Blätter länglich, stumpf, an der Basis verdünnt, lederartig, glatt, nur an den Rippen filzig, oben glänzend. Trauben einfach, zu 3 gipfelförmig, feinborstig. Blumen mit 6 Staubfäden versehen. Vaterl. Südamerika, am Orinoco-flusse. ♀ Blüthz. Mai.

5. *Hirtella coriacea* Mart. et Zuccar. Lederartige Hirtelle.

Blätter herz-eiförmig, gespitzt oder stumpf, lederartig, oben glatt, unten filzig, etwas scharf. Trauben winkels- und gipfelständig, vielblümig, straff. Blumen mit 6 Staubfäden versehen. Kelchröhre fast cylindrisch, die Einschnitte eiförmig, inwendig seidenhaarig. Vaterl. Brasilien. ♀ Blüth. April.

6. *Hirtella angustifolia* Schott in Syst. veg. ed. Spr. Schmalblättrige Hirtelle.

Blätter schmal, linien-lanzettförmig, an der Basis fast herzförmig, gespitzt, auf beiden Seiten scharfborstig. Trauben einfach, überhängend. Blumen 7-9 fädig. Vaterl. Brasilien. ♀

†† *Racemis compositis* s. *paniculatis*.

Blumen in zusammengesetzten Trauben, die Rispen bilden.

7. *Hirtella ciliata* Mart. et Zuccar. Gewimperte Hirtelle.

Ein kleiner Baum, dessen Äste mit rothfarbem Filze bekleidet sind. Blätter elliptisch-eiförmig, an beiden Enden gerundet, mit kurzer feiner Spitze. Blumen siebenfädig, in gipfelständige Rispen gesammelt, deren Bracteen und Kelchtheile mit Stieldrüsen gekranzt sind. Vaterl. Brasilien. ♀

8. *Hirtella bracteata* Mart. et Zuccar. Hirtelle mit vierreihigen Bracteen.

Blätter elliptisch-umgekehrtenförmig, feinspizig, häutig, oben glatt, unten an den Rippen filzig. Blumen dreifädig, in zusammengesetzte gipfelständige Trauben gesammelt. Bracteen eiförmig, gespitzt, fast kreuzweis gegenüberstehend; sie liegen wie Dachziegel über einander, bilden vier Reihen und bedecken die Blumenstiele. Vaterl. Brasilien, die Provinz Rio negro. ♀ Blüth. Octob.

9. *Hirtella elongata* Mart. et Zuccar. Langtraubige Hirtelle.

Blätter lederartig, länglich, feinspizig, an der Basis gerundet, auf beiden Seiten glatt. Blumen mit sechs Staubfäden versehen. Trauben zusammengesetzt, rispenförmig, fast 1 Fuß lang. Bracteen fast wie bei voriger Art, aber an der Spitze abstehend-zurückgeschlagen, auch die Blätter gleichen denen der *Hirt. bracteata*, sind aber lederartig, bei jener häutig. Vaterl. Brasilien. ♀ Blüht daselbst im November.

10. *Hirtella Cosmibuena* Lam. Jllustr. p. 114. ist *Hirt. peruviana* Persoon Synops. f. 1. Nachtrag zum Lexic. B. 4. C. 7.
11. *Hirtella mollicoma* Kunth in H. et Bonpl. Nov. Gen. et Sp. pl. VII. p. 263. t. 658. Candolle Prodr. II. p. 528. hat Spr. (Syst. veg. cur. p. 86.) zur vor- hergehenden *H. Cosmibuena* gezogen. Waterl. Neugranada. h
12. *Hirtella glandulosa* Sprengel neue Entdeckung I. p. 303. Syst. veget. 1. p. 722. Drüsige Hirtelle.
Ein 18—20 Fuß hoher Baum, dessen Aeste gottig-sitzig sind. Blätter länglich-eiförmig, feinspizig, unten gottenshaarig (gelblich-sitzig.) Blumen fünffädig, in zusammengesetzten gipfelständigen Trauben (Rispen) deren Aeste, Blumenstiele und Bracteen mit gestielten Drüsen besetzt sind. Corollenblätter weiß, gewimpert. Kelchröhre cylindrisch. Waterl. Brasilien.
13. *Hirtella pendula* Soland. Lam. Encyc. III. p. 134. Hängende Hirtelle.
Blätter länglich-herzförmig, langgespizt, oben glatt, unten sitzig-scharf, 2—3 Zoll lang, 1½ Zoll breit. Aestchen und Blattstiele mit gelbrothem Filze bekleidet. Die Blumen bilden gipfelständige Rispen, deren Aestchen ausgesperrt und mit sehr kurzen Bracteen besetzt sind. Waterl. Südamerika; die Insel. St. Lucia. h
14. *Hirtella physophora* Mart. et Zuccar.
Alle Theile dieser Hirtelle sind mit langen abstehenden Haaren bekleidet. Blätter kurzgestielt, länglich, feinspizig, an der Basis gerundet, die Stiele mit Blasen versehen. Blumen vierfädig, in gleichhohe einfache Trauben gesammelt, die Rispen bilden. Waterl. Brasilien, die Provinz Rio Negro. h Blühz. März und April.
In der oben erwähnten bot. Zeitung bemerkt Fr. v. Martius, daß diese Hirtelle sehr merkwürdig sey und durch die großen Blasen, welche sich an beiden Seiten der Blattstiele bilden, von allen Arten dieser Gattung sich unterscheide. Diese Blasen dienen den Ameisen zu Schlupfwinkeln, besonders der *Myrmica tenella* Fabr. von welcher Fr. Martius viele todte Exemplare in solchen Blasen fand.
15. *Hirtella bicornis* Mart. et Zuccar. Zweihörnige Hirtelle.

Aeste glatt. Blätter elliptisch = eiförmig, feinspitzig. Blumen fünfzählig, trauben- = rispensständig. Fruchtknoten etwas zusammengedrückt, umgekehrt = herzförmig = zweihörnig. Vaterl. Brasilien in Wäldern. ♀ Blüth. September.

16. *Hirtella polyandra* Kunth J. c. VI. p. 246. t. 565. Vielzählige Hirtelle.

Blätter länglich oder länglich = umgekehrteiförmig, mit kurzer Spitze, ledertartig, oben glatt, glänzend, unten weißfilzig. Blumen vielzählige, in gipfelsständigen sehr ästigen Rispen, deren Aeste graufilzig sind. Vaterl. Mexiko. ♀ Blüth. April — Mai.

Kultur. Die Hirtellen verlangen gute lockere Dämmerde (Wald- oder Erikenerde) mit etwas Lehm gemischt, und warme Standörter, denn sie kommen aus Tropenländern. N. 16. nimmt auch mit Durchwinterung im Glashaufe vorlieb. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.

Synonymen.

Hirtella americana Jacq. f. *Hirtella triandra* Lexic. B. 4.

— *canomensis* Spr. ist *Moquilea canomensis* Mart.

— *hirsuta* Lam. ist *Hirtella rugosa* Pers. f. Lex. B. 4.

— *indecora* Schott. ist *Hirtella paniculata* Lam. f. Lex. B. 4.

— *portoricensis* Willd. ist *Hirtella rugosa* Pers. f. Lex. B. 4.

Hoarea corydaliflora Sweet ist *Pelargonium flavum* Ait. f. Lexic.

— *nutans* Sweet ist *Pelargonium flavum* Ait.

— *ovalifolia* Sweet ist *Pelargonium ovalifolium* Cand.

— *radicata* Sweet ist *Pelargonium radicum* Vant.

— *reticulata* Sweet ist *Pelargonium reticulatum* Cand.

— *selinifolia* Sweet ist *Pelargonium pilosum* Pers.

— *setosa* Sweet ist *Pelargonium pilosum* Pers.

Hoffmannia Swartz. *Hoffmannia* f. Lexic. B. 4.

Diese Gattung ist dem Andenken einiger Botaniker, den

H. Rasper Moriz und Georg Franz Hoffmann gewidmet, welche sich sämmtlich durch die Herausgabe botanischer Schriften um die Wissenschaft verdient gemacht haben. 1) Caspar Hoffmann (geb. 1621, † 1698) lieferte ein Werk: *Florae altorfinae delicias hortenses*. Altorf. 1660—1677. 4. Sein Sohn Johann Moriz Hoffmann (geb. 1653, † 1727) gab 1703 ein Verzeichniß der Gartenpflanzen heraus. 2) Georg Franz Hoffmann erster Professor der Botanik in Erlangen, dann in Göttingen und zuletzt in Moskau, wo er 1832? starb. Seine vorzüglichsten botanischen Werke sind folgende: *Historia salicum iconibus illustrata* vol. 1. 2. t. 1—31. Lips. 1785—1791. *Plantae lichenosae* vol. 1—3. Lips. 1789—1801. fol. Deutschlands Flora Th. 1—2. Neue Aufl. 1800—1801. Georg Franc. Hoffmann genera Plantarum umbelliferarum etc. mit 3 Kupfertafeln. Mosquae 1814. gr. 8. u. 4. kleinere Schriften.

Von der Gattung *Hoffmannia* sind jetzt nur zwei Arten bekannt.

1. *Hoffmannia pedunculata* Swartz f. Lexic. B. 4.

H. jamaicensis Spr. Syst. veg. 1. p. 416.

Stengel krautartig. Aeste kottenhaarig. Blätter gegenüberstehend, gestielt, eiförmig, langgespitzt, glänzend. Blüthenstiele einzeln winkelförmig. Vaterl. Jamaica. 4

2. *Hoffmannia amicorum* Spr. (Syst. veg.) ist *Portlandia tetrandra* Forst. f. Lexic. B. 7.

Hoffmannseggia Cavan. Hoffmannseggia f. Lexic. B. 4.

Kelch fünfstheilig. Fünf Corollenblätter, deren Nägel haarig-drüsig sind; das oberste Corollenblatt ist größer als die übrigen und gefleckt. Staubfäden 10, die Hälfte haarig-drüsig, einer ist oft unfruchtbar. Narbe keulenförmig. Hülse dünn, zusammengedrückt.

Decandria Monogynia (Familie der Hülsenpflanzen.)

Diese Gattung hat Cavanilles bestimmt und sie dem Herrn Grafen von Hoffmannsegg zu Ehren *Hoffmannseggia* genannt. Herr Graf Hoffmannsegg sammelte auf seiner Reise nach Brasilien viele Pflanzen, die er Willdenow mittheilte. Ferner auf einer naturhistorischen Reise durch Portugal, mit Herrn Dr. Link (jetzt Geh. Medicinalrath in Berlin.) Beide Botaniker haben die portugiesischen Pflanzen sorgfältig beschrieben und abgebildet: *Flore portu-*

gaise Berl. 1809—1814. fol. Ein Prachtwerk mit sehr schönen illuminirten Abbildungen. Uebrigens siehe meine Bemerkungen hierüber im ersten Nachtrage B. 5. S. 529. In Dresden unterhält der Hr. Graf jetzt noch einen reichen bot. Garten, dessen Verzeichniß im Jahr 1824 unter folgendem Titel erschien: Verzeichniß der Pflanzenskultur in dem Gräfl. Hoffmannseggischen Garten zu Dresden und Rammenan. 8.

Die zwei Arten, welche der Gattung Hoffmannseggia angehören: *H. Falcaria* et *trifoliata* Cav. habe ich im Lexic. B. 4. beschrieben.

Hoitzia Jussieu. Hoizia.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 9., nebst den beigefügten Bemerkungen.

Kelch röhrig, fünfteilig, gleich, meist von Bracteen unterstügt. Corolle trichterförmig, fünfspaltig, fast gleich. Staubfäden 5, herporragend. Narbe dreispaltig. Kapsel dreisächerig, dreiflappig von dem bleibenden Kelche gekrönt. Samen zusammengedrückt.

Pentandria Monogynia (Familie Polemoniaceen.)

Die Arten, welche zu dieser Gattung gehören, sind Sträucher, Staudensträucher, oder krautartige Pflanzen, deren Blätter wechselnd stehen und sägerandig sind. Blumen in einzeln winkelfständigen Trauben, die mit Bracteen besetzt sind. Corollen scharlachroth, blau oder violet.

1. *Hoitzia linearis* L. Spr. *Collomia linearis* Nuttall. hierher gehört auch *Phlox linearis* Cav. f. Lexic. B. 7. S. 160.

Blätter linienförmig, am Rande zurückgerollt, scharf. Blumentöpfchen klebrig. Vaterl. Chili.

2. *Hoitzia Cervantesii* Kunth in Humb. et B. Nov. gen. et Sp. 3. p. 164.

Aeste drüsig-feinborstig. Blätter fast stiellos, länglich oder länglich-lanzettförmig, scharf sägeartig gezähnel. Blumen gepaart, an den Spigen der Aeste gehäuft stehend, mit linienförmigen einrippigen Bracteen, die nach der Spige zu gezähnel-stachelig und drüsig-behaart sind. Corollen violet. Vaterl. Mexico. h

3. *Hoitzia coccinea* Cav. f. 1. Nachtr. B. 4. Hierher gehört *Cantua Hoitzia* Willd. f. Lexic. B. 2. (*Hoitzia mexicana* Lam.)

Stengel stundenförmig, aufrecht. Blätter fast stiellos, länglich = eiförmig, an beiden Enden verdünnt, gespitzt, dornig = gezähnt, behaart. Blumenstiele in den obern Blattwinkeln einblümig, oder 2—4 blümige Büschel bildend. Bracteen lanzettförmig, kurzgestielt, dornig = gezähnt, geädert, borstig. Corolle hochroth, 10—14 Linien lang. Geschlechtstheile hervorragend. Vaterl. Mexico, bei S. Rosa. ♀

Diese Stierpflanze wird wegen ihrer ziemlich großen hoch oder scharlachrothen Blumen auch in den Gärten in Mexico kultivirt. Im hiesigen bot. Garten hat sie in diesem Jahr zum erstenmal ihre lieblichen Blumen entwickelt.

4. *Hoitzia aristata* Kunth J. c. 3. p. 164. Gegrannete Hoizie.

Blätter gestielt, eiförmig, doppelt sägezähmig. Blumen an den Spitzen der Aeste gehäuft stehend. Bracteen eiförmig, durchscheinend, gezähnt, die Zähne grannenspizig, glatt, grün, neapaderig, die äußeren herzförmig. Vaterl. Mexico. ♀ ?

5. *Hoitzia conglomerata* Kunth J. c. 3. p. 165.

Aestchen zottenhaarig = drüsig. Blätter kurzgestielt, eiförmig, sägezähmig, die Zähne spizig. Blumen einzeln, an den Spitzen der Aestchen kopfförmig = geknaut. Bracteen lanzettförmig, gezähnt = stachlich, geädert, drüsig = behaart. Corollen violett. Vaterl. Mexico. ♀

6. *Hoitzia nepetaefolia* Schlechtend. Linnaea B. 6. H. 3. p. 385. Nepetablättrige Hoizie.

Stengel aufrecht, straff, unten einfach, oben ästig, 3—4 Fuß hoch. Blätter keilförmig, oder länglich = eiförmig, gespitzt, sägerandig, die Serraturen langgespitzt, glatt, unten blaß, die Stiele wie die Aeste filzig. Blumen winkelförmig, gestielt, so groß wie die des *Lythrum hyssopifolia* Linn. Kelch röhrig, 2 Linien lang, fünfspaltig. Einschnitte durchscheinend, lanzettförmig, gespitzt. Corolle fünf Linien lang, purpur = oder blaulich = purpurröthlich. Bracteen lanzettförmig, ganzrandig. Vaterl. Mexico. ? 24 ?

7. *Hoitzia Löselia* Spr. Hierher gehört *Löselia ciliata* Linn. f. Lexic. B. 5. S. 564.

Kultur. Die Hoizien pflanzt man in gute lockere Dammerde, Wald = oder Lauberde mit Sand und wenig Lehm oder Rasenerde gemischt und überwintert sie im Glashause. Fortpflanzung durch Saamen, die Sträucher auch durch Stecklinge.

Holarrhena Rob. Brown. *Holarrhena*.

Corolle präsentellerförmig, fünfspaltig, die Einschnitte gleich. Der Schlund nackt. Antheren 5, in die Corollenröhre eingefügt. Narbe frei.

Pentandria Monogynia (Familie Contorten.)

1. *Holarrhena mitis* R. Br. Hierher gehört *Carissa mitis* Vahl. f. Lexic. B. 2.

Ein Strauch, dessen Aeste oben zweitheilig sind. Blätter gestielt, länglich oder länglich-lanzettförmig. Blumen in Doldentrauben gesammelt. Vaterl. Ostindien. †

Holcus Linn. Honiggras, siehe Lexic. und 1. Nachtrag.

Von dieser Gattung hat Sprengel in Syst. veg. B. 1. S. 292. nur sieben Arten aufgeführt und den Character genericus so gestellt: Flores paniculati polygami. Calix 2valvis 2florus. Cor. ♀ mutica, ♂ dorso aristata.

Blumen rispenständig, polygamisch. Kelch 2klappig, 2blüthig. Die Corolle der Zwitterblume unbewehrt, die männliche auf dem Rücken mit einer Granne versehen.

Triandria Digynia (Familie Gräser.)

1. *Holcus avenaceus* Scopol. ist *Avena elatior* Linn. f. Lexic. Arrhenatherum P. B.
2. *Holcus bulbosus* Schrad. f. 1. Nachtr. B. 4.
3. *Holcus mollis* Linn. f. Lexic. B. 4.
4. *Holcus lanatus* Linn. f. Lexic. B. 4.
5. *Holcus capillaris* Thunb. f. 1. Nachtrag.
6. *Holcus nervosus* Roxb. Geripptes Honiggras; Pferdegras.

Stamm aufrecht. Blätter und Scheiden bläsig oder blattrig behaart. Kelchklappen gerippt. Vaterl. Coromandel. 4 ?

7. *Holcus ciliatus* Roxb. Gewimpertes Honiggras.

Stamm knotig, bartig. Rispe gleichbreit, behaart. Blätter Scheiden und Kelchklappen mit Blättern (Hockenbläschen) besetzt, behaart-gewimpert. Vaterl. Coromandel. 4

Die übrigen Arten, welche Linn. Thunb. Willd. u. A. unter *Holcus* aufgeführt haben, gehören andern Gattungen an, wie aus folgender Synonymen-Liste deutlich hervorgeht.

Synonymen.

- Holcus australis* Schrad. f. *Hierochloë australis* N. 3.
 — *avenacea* Thunb. (nec Scop.) f. *Sorghum avenaceum*.

- Holcus bicolor* Linn. f. Lexic. f. *Sorghum bicolor* Willd.
- *burealis* Schrad. f. *Hierochloë boreale* 2 Nachtr. N. 1
- *caffrorum* Thunb. f. 1. Nachtr. ist *Sorghum saccharatum* Pers. f. 1. Nachtr.
- *cernuus* Willd. f. 1. Nachtr. ist *Sorghum cernuum* Willd.
- *decolorans* Willd. f. 1. Nachtr. ist *Sorghum decolorans* R. et Sch.
- *Dochna* Forst. ist *Sorghum saccharatum* Pers. f. 1. Nachtr.
- *Durra* Forst. ist *Sorghum vulgare* Pers.
- *elongatus* R. Brown. ist *Andropogon elongatus* Spr.
- *fulvus* R. Brown. ist *Andropogon tropicus* Spr.
- *halapensis* Linn. f. Lexic. ist *Sorghum halapense* 1. Nachtr.
- *laxus* Linn. f. Lexic. ist *Uniola gracilis* Michx. f. 1. Nachtr.
- *odoratus* Linn. f. Lexic. f. *Hierochloë boreale* 2. Nachtr. N. 1.
- *odoratus* Michx. f. *Hierochloë fragrans* 2. Nachtr. N. 2.
- *pallidus* R. Brown. f. *Pollinea pallida*.
- *parviflorus* R. Brown. ist *Anatherum parviflorum* Spr.
- *plumosus* R. Brown. ist *Andropogon australis* Spr.
- *racemosus* Forst. f. *Penisetum alopecuroides* Spr.
- *repens* Host. f. Lexic. f. *Hierochloë boreale* 2. Nachtr. N. 1.
- *saccharatus* Ard. Lexic. f. *Sorghum saccharatum* 1. Nachtr.
- *serratus* Thunb. Lexic. ist *Panicum serratum* Spr.
- *setifolius* Thunb. f. 1. Nachtr. ist *Anatherum setifolium* Spr.
- *Sorghum* Linn. f. Lexic. ist *Sorghum vulgare* Pers. f. Nachtr.
- *spicatus* Linn. f. Lexic. f. *Penicillaria spicata* Willd. *Penisetum typhoideum* Pers. Hol-

Holcus strictus Linn. f. Lex. ist *Aira obtusata* Michx.?
— *tenuis* Trinius ist *Aira sicula* Spr.

Holigarna Buchan. *Holigarna*.

Blumen polygamisch. Kelch und Corolle fünfstheilig. Fünf Staubfäden. Drei Griffel. Nuß einsamig.

Pentandria Trigynia (Familie Caprifolien.?)

1. *Holigarna longifolia* Roxb. Langblättrige *Holigarna*.

Ein hoher Baum, dessen Aeste absteilen. Blätter wechselnd stehend, gestielt, länglich = spatelförmig, steif, gefranzt. Blumen weiß, rispenständig. Vaterl. Ostindien. h

Holböllia Wallich *Flora nepalensis*. *Holböllie*.

Blumen monöisch. Blüthendecke sechsblättrig, doppelreihig. Staubfäden 6, an der Basis mit Drüsen bedeckt. Griffel 3. Beere länglich, balgartig, einsächerig, viel-samig.

Hexandria Trigynia (Familie Menispermeeen.?)

1. *Holböllia latifolia* Wall. Breitblättrige *Holböllie*.

Blätter fünfzählig. Blättchen länglich = eiförmig, dreirispig. Blumen traubenständig. Vaterl. Nepal. (Abbild. Wallich *Fl. nepal.* t. 16.)

2. *Holböllia angustifolia* Wall. *Fl. nepal.* t. 17. Schmalblättrige *Holböllie*.

Blätter stehenzählig. Blättchen linien = lanzettförmig, langespitzt. Blumen doldenständig. Vaterl. Nepal.

Beide Arten kommen aus Nepal und verlangen in unsern Gärten Durchwinterung im warmen Hause oder in einem Tepidarium (8—10 Grad Wärme Réaumur.)

Holmskiöldia Retz. *Holmskiöldie* f. Lexic. B. 4.

Kelch groß, glockenförmig, gefärbt, ausgeschweift. Corolle trichterförmig, zwelappig. Oberlippe zweilappig, untere dreispaltig. Staubfäden 4, ungleich lang. Beere viersamig.

Didynamia Angiospermia (Familie Verbenaceen.)

Diese Gattung widmete Retzius dem Andenken eines dänischen Edelmanns Herrn Theodor v. Holmskiöld (geb. 1732. † 1794.) Holmskiöld hat sich durch die Untersuchung und Bestimmung der Reulenschwämme um die Wissenschaft verdient gemacht. Diese Schwämme, besonders die in Dänemark vorkommenden, hat er abgebildet und ein Prachtwerk geliefert: „*Beata ruris otia, fungis danices impensa* Hav. 1790. fol.“

Dietr. Lex. 2r Nachtr. IV. Bd.

G 9

1. *Holmskioldia sanguinea* Retz. Beschreibung und Kultur siehe Lexic. B. 4.

Blumenstiele meist dreiblümig, doldentraubig. Kelch purpur- oder blutroth. Corolle scharlachroth. (Abbild. in Hoffmanns phytographischen Blättern und im Garten-Magazin.) In dieser Holmskioldie gehört *Halingia coccinea* Smith. exot. botan. t. 18. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 612. und *Platunium rubrum* Juss.

Hololepis pedunculata Cand. f. *Haynea pedunculata*.

Holoregmia viscida Nees f. *Martynia spathacea*.

Holostemma Rob. Brown. *Holostemma*. (Adiakoen. Reed, malab. 9. t. 7.)

Corolle radförmig, fünfstheilig, Kranz (Corona) ungetheilt, ringförmig. Autheren 5. Pollenmasse gepaart, an der Spitze angeheftet, hängend.

Pentandria Digynia (Familie Contorten.)

1. *Holostemma Rheedianum* Spr. Rheedisches *Holostemma*.

Stengel aufrecht. Blätter länglich, feingespitzt, glatt. Blumen in stiellosen Dolden. Waterl. Ostindien.

2. *Holostemma Candolleianum* Spr. (*Fischera scandens* Cand.)

Stengel kletternd. Blätter länglich-herzförmig, zottenhaarig. Waterl. Südamerika. ?

Holosteum Linn. Spurre; Sparre f. Lexic. erste Aufl. B. 4. daselbst S. 674. sehe man zu *Holosteum umbellatum* Linn.:

Stengel 3—5—8 Zoll lang, wie die Blätter glatt und grau- oder blaugrün. Blumenstiele sparrig, fast klebrig-silzig, zur Zeit der Fruchtreife zurückgeschlagen.

Holosteum succulentum Linn. Lexic. ist *Arenaria peplodes* Linn. (var. ?) f. Lexic. B. I. sehe daselbst hinzu: *Polycarpon uniflorum* Walt.

Holosteum cordatum Linn. f. Lexic. ist *Drymeria cordata* Kunth.

Holosteum tetraphyllum Thunb. f. Lexic. ist *Polycarpon tetraphyllum* Linn.

Homalanthus Adr. Jussieu. *Homalanthus*.

Blumen monöisch. Kelch zweilappig, fast drüsig. Keine Corolle. Staubfäden kurz, an der Basis verbunden. Griffel zweitheilig. Kapsel zweifächerig, zweisaamig. Saamen mit einer Mantelhaut versehen, hängend.

Monadelphia Triandria (Familie Euphorbiaci. ?)

1. *Homalanthus populifolius* Graham. Pappelblättriger Homalanthus.

Omalanthus Leschenaultianus Adr. Juss. t. 16.

Omalanthus populifolius Grah. in Jameson Edinb. Journ. 1827. p. 175. Hooker bot. mag. 2750.

Ein Strauch, 10—14 Fuß hoch, dessen Aeste und Blätter glatt sind. Blätter wechselnd stehend, gestielt, eiförmig, langgespitzt, ganzrandig, die Stiele an der Spitze mit einer Drüse versehen. Die Blumen bilden winkels- und gipfelständige Trauben, die männlichen stehen über den weiblichen Blumen. Vaterl. Neuholland und Java. ♀

- Homalium Jacquin. Homalium Lexic. B. 4.

Kelch und Corolle 6—7 blättrig, die Corollenblätter an der Basis mit 6—7 Drüsen versehen, zwischen diesen eben so viele Staubfadenbündel; jeder Bündel besteht aus drei Staubfäden. Griffel 3. Kapsel einfächerig, viel-saamig, die Saamen an den Klappenwänden hängend.

Polyandria Trigynia (Familie Rosaceen. ?)

1. *Homalium incanum* Persoon Synops. t. I. Nachtrag B. 4. S. 15, und meine Bemerkungen daselbst.

Die Blumen sind nur mit einem Griffel versehen, s. Syst. veg. ed. Sprengel. B. IV. cur. p. 210.

2. *Homalium angustifolium* Smith. Schmalblättriges Homalium.

Blätter lanzettförmig, fast ganzrandig. Die Blumen bilden winkelsständige traubenförmige Aehren. Die innern Kelchtheile sind stumpf. Vaterl. das westliche Afrika. ♀

3. *Homalium Napimoga* Spr. (*Napimoga guianensis* Aubl.)

Blätter oval-länglich, gekerbt, glatt. Blumenähren gestielt, winkelsständig, dünn, fadenförmig, unterbrochen. Corolle fülzig, ohne Drüsen. Vaterl. Guiana. ♀ ?

Kultur. Die Homaliumarten lieben gute Dammerde (Wald- oder Lauberde) mit wenig Leimen oder Rasenerde gemischt und warme Standörter, denn sie kommen aus warmen Ländern. N. 1. kann im Sommer im Freien stehen, dann nimmt sie auch mit Durchwinterung im Glashause vorlieb. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und Stedlinge in warmen Beeten.

- Homalocenchrus Pollich. ist *Leersia oryzoides* Swartz.

Homoeanthus Bonpl. Spr. Syst. veg. **Homanthis** Kunth Synops. **Homoianthus** et **Jsanthus** Cand. Kunth J. c.

Blüthendecke (Kelch) halbkuglich, vielblättrig, die Blätter (Schuppen) schlaff, wie Dachziegel über einander liegend. Fruchtboden flach, fast nackt. Blümchen alle zweilippig, gleich, die Einschnitte der Unterlippe fadenförmig, meist gedreht. Antheren zweiborstig. Saamen nur wenig zusammengedrückt. Saamentrone stiellos, behaart oder scharf.

Syngenesia I. Ordn. (Familie Verdicieen.)

Die Arten, welche dieser Gattung angehören, sind krautartige, aufrechte Pflanzen, deren Blätter wechselnd stehend, den Stengel umfassen, gezähnt = dornig oder fiederspaltig sind. Blumen gipfelständig, einzeln oder doldentraubig, blau oder weiß.

1. *Homoeanthus pungens* Kunth Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. IV. pag. 14. Stechender Homöanthus.

Chaetanthera pungens Humb. et Bonpl. Pl. aeq.

2. p. 146. t. 127.

Stengel krautartig, aufrecht, fast einfach. Blätter gezähnt = dornig, lanzettförmig. Stengelblätter wechselnd stehend, stiellos, halb umfassend, ey = lanzettförmig, fast herzförmig gezähnt, scharf. Blumen einzeln stehend, blau. Die äußeren Kelchschuppen gezähnt = dornig. Vaterl. Quito an den feuer-speienden Bergen Pichinchae et Antisanæ. ☉ Blüht daselbst im Januar.

2. *Homoeanthus multiflorus* Kunth J. c. IV. p. 14. Vielblümiger Homöanthus.

Chaetanthera multiflora H. et B. Plant. aeq. 2. p. 163. t. 135.

Jsanthus multiflorus Cand. in Ann. du Mus.

Stengel krautartig, aufrecht, einfach, rundlich, mehr oder weniger behaart, 1—2 Fuß hoch. Blätter umgekehrt herzförmig, gezähnt, die Zähne sparrig, pfriemenspizig = dornig. Blumen zahlreich, geknault = doldentraubig. Kelchschuppen ganzrandig, langgespitzt. Vaterl. Standort und Blühz. wie vorhergehende Art. ☉

3. *Homoeanthus pinnatifidus* Kunth. Fiederspaltiger Homöanthus.

Chaetanthera pinnatifida H. et B. Plant. aeq. 2. p. 170. t. 136.

Kein Stengel. Wurzelblätter gestielt, fiederspaltig, die Einschnitte stumpf. Schaft wurzelständig, einblümig. Die aus-

heren Kelchschuppen gezähnt-dornig. Blümchen weiß. Waterl. Quito. ☉ Blühz. Julius!

Kultur. Die Saamen von diesen krautartigen Pflanzen säet man in unsern bot. Gärten in ein warmes Beet, setzt hernach die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe, oder wenn kein Frost mehr zu fürchten ist, an einer schützlichen Stelle ins freie Land. Auch können sie im Saamenbeete, wovon im Sommer die Fenster abgenommen werden, bis zur Saamenreife unverseht stehen bleiben.

Homoeocladia Ag. Schlechtend. *Linnaea* B. 8. Heft 5. S. 590. zwei Arten: *H. maritima* et *anglica*, sind Conserven.

Homonoea Loureiro *Flora Cochinchinensis*.

Blumen dicklich, in Köpfchen gesammelt. ♂ Schuppen zu 3 stehend. Kelch corollinisch, dreiblättrig. Staubfäden sehr zahlreich, gebüschelt. Aetheren rundlich. ♀ Schuppen einfach, vielspalstig. Kein Kelch. Ein Fruchtknoten mit drei Narben. Kapsel dreifächerig.

Dioecia Polyadelphia (Familie Trifolien. ?)

1. *Homonoea riparia* Lour.

Ein Baum, dessen Blätter wechselnd stehen, linien-lanzettförmig, ganzrandig und sitzig sind. Die Blumen bilden linienförmige fast gipfelständige Köpfchen. Waterl. Cochinchina an Wässern. H

Homoplitis polystachya Trin. ist *Pollinia polystachys* Spr. *Honkenia peploides* Ehrh. f. *Arenaria peploides* Lex. 2. Aufl.

Hookeria Smith. *Hookeria*. (*Hypnum* Linn. u. a.)

Kapselzähne lang, gedreht, frei. Borste (Kapselstiel) eisenständig.

Cryptogamia Sect. II. (Familie Laubmoose.)

Diese Laubmoosgattung führt ihren Namen zu Ehren eines berühmten Botanikers in England, des Herrn Willh. Jackson Hooker, der sich durch die Bearbeitung und Herausgabe einiger schätzbaren Werke um die Wissenschaft verdient gemacht hat. 1) *Jungermaniarum icones* fasc. I—20. London 1813. fol. (ein Prachtwerk.) 2) Fortsetzung der von Curtis bearbeiteten Londoner Flora: „*A. continuation of flora londinensis* 1816. fol.“ 3) Reisebeschreibung: *A. tour in Ireland*. London 1804. 8. Auch zu

Salisbury (schöner Werte: „Paradisus londinensis“ hat Hooker die Abbildungen geliefert.

† Foliis exstipulatis. Blätter ohne Afterblätter.
I. Enervis. Blätter ohne Rippen.

1. *Hookeria lucens* Smith. (*Hypnum lucens* Linn. *Leskea* Cand. Schwägr.)

Stengel gestreckt, ziemlich einfach. Blätter rundlich-eiförmig, stumpf, ganzrandig, neuhadrig, glänzend; sie liegen wie Dachziegel über einander und bilden 2 Reihen. Kapsel eiförmig, horizontal stehend. Haube ungetheilt, mit eingesenkten Punkten versehen. Vaterl. Nordamerika. 4

2. *Hookeria flavescens* Hook. (*Hypnum praelonga* Willd.)

Stengel kriechend, ästig. Nessel ziemlich einfach, fast zusammengebrückt. Blätter schlaff, eiförmig, langgespitzt, ganzrandig, dachziegelförmig gelagert. Kapsel überhängend. Haube an der Basis vielspalzig. Vaterl. Surinam. 4

3. *Hookeria acutifolia* Hook. Schwägr. Epigblättrige Hookeria.

Stengel kriechend, fast ästig. Blätter zweireihig, schief, eiförmig, langgespitzt, ganzrandig. Kapsel länglich, horizontal stehend. Haube glatt. Vaterl. Nepal.

†† Foliis uninervis. Blätter einrippig.

4. *Hookeria microcarpa* Hook. (*Hypnum microcarpon* Hedw.)

Stengel fast einfach. Blätter abstehend, breit, umgekehrt-eiförmig, sehr stumpf, ganzrandig. Kapsel aufrecht, kapsel- oder krugförmig.

5. *Hookeria Dicksonii* Hook.

Stengel scheidig, ästig. Blätter breit, eiförmig, langgespitzt, gerändert, ganzrandig, schlaff, neuhadrig. Kapsel überhängend. Haube an der Basis gespalten. Vaterl. Europa. ?

6. *Hookeria radiculosa* Hook. Wurzelnde Hookeria.

Stengel kriechend, Wurzeln treibend. Blätter eiförmig, gespitzt, nicht gerändert, ganzrandig. Kapsel eiförmig, übergebogen. Haube ungetheilt. Vaterl. Südamerika, am Orinoko. 4

††† Foliis binerviis. Blätter zweirippig.

a. Integerrimis. Blätter ganzrandig.

7. *Hookeria pendula* Hook. Hängende Hookeria.

Stengel niedersiegend, ästig. Nessel gekrümmt. Blätter eiförmig, gespitzt, wie Dachziegel über einander liegend.

Kapsel hängend. Haube behaart. Waterl. Quito und Neugranada. 4

8. *Hookeria affinis* Willd. Arnott.

Stengel niederliegend, ästig. Aeste zusammengebrückt. Blätter wie Dachziegeln über einander liegend, länglich, langge-
spitzt. Kapseln übergebogen. Deckel schnabelförmig. Haube
glatt. Waterl. Brasilien.

9. *Hookeria diaphana* Hook. (*Hypnum diaphanum* Swartz.)

Aeste blättrig, schlaff. Blätter zweireihig, abste-
hend, schief, eiförmig, langgespitzt, durchscheinend, netzaderig. Wa-
terl. Java. 4

10. *Hookeria pallescens* Hook.

Stengel fast aufrecht, scheidig, ästig. Blätter eiförmig,
stumpf, wie Dachziegeln über einander liegend. Kapsel über-
hängend, umgekehrt-eiförmig. Haube geschlitzt, glatt. Waterl.
Südamerika, am Orinoko. 4

11. *Hookeria filiformis* Hook. Fadenförmige Hookerie.

Hypnum Ternstroemiae Bridel. *Hypn. undata* Hook.

Stengel aufsteigend, fast ästig. Blätter zweireihig, abste-
hend, länglich-eiförmig, ausgehöhlt, an der Basis ganzran-
dig, die Spitze lang, gebogen, fast gezähnt. Borste (Kapsel-
stiel) aufrecht, glatt. Kapsel übergebogen, keulenförmig.
Waterl. Guadalupe und Jamaika. 4

β *Foliis serratis*. Blätter sägeartig gezähnt.

12. *Hookeria polytrichoides* Spr. (*Hypnum polytrichoi-*
des Hedw. *Neckera* Swartz.)

Stengel aufrecht, fast ästig. Blätter wechselnd stehend,
eh-lanzettförmig, langgespitzt, gebogen, an der Spitze gezäh-
nt. Borste sehr kurz. Haube behaart. Waterl. Jamaika. 4

13. *Hookeria scabriseta* Hook. (*Hypnum rigidum* Schwägr.)

Stengel aufrecht, scheidig, ästig. Aeste zusammengebrückt.
Blätter wie Dachziegeln über einander liegend, eiförmig,
gespitzt, an der Spitze gezähnt. Kapselstiel scharfborstig.
Kapsel übergebogen. Haube gefranzt, oben weichstachelig. Wa-
terl. Guiana und am Orinoko. 4

14. *Hookeria cristata* Hook. Kammförmige Hookerie.

Leskea cristata Hedw. (*Chaetophora* Brid.)

Pterygophyllum asplenioides Briff.

Stengel aufrecht, meist ästig. Blätter umgekehrt-eiför-

stig, gespitzt, nebadrig, saftig, gebogen, an der Spitze gezähnt. Borste bogenförmig, fleischig, mit kammförmigen Schuppen besetzt. Kapsel birnförmig. Haube vielspaltig, schuppig. Waterl. Insel Mascaren.

15. *Hookeria leptorrhincha* Hook.

Stengel ästig. Blätter schlaff, dachziegelförmig über einander liegend, ey-lanzettförmig, langgespitzt, an der Spitze gezähnt. Kapsel cylindrisch, aufrecht. Deckel pfriemenspizig. Haube glatt, sechs-spaltig. Wächst auf den caraisischen Inseln.

16. *Hookeria bipinnata* Spr. (*Neckera bipinnata* Schw.)

Stengel scheidig, ästig. Nester zweireihig. Blätter dachziegelförmig gelagert, eyförmig, stumpflich, ausgehöhlt, fast gezähnt, mit starken Rippen. Borste gekrümmt. Kapsel glatt. Deckel pfriemenspizig. Haube fast behaart. Wat. Guiana. 4

17. *Hookeria Parkeriana* Hook.

Stengel lang, ästig. Nester anliegend = ange-drückt. Blätter zweireihig, dachziegelförmig, länglich, gespitzt, wellenrandig, an der Spitze gezähnt. Kapsel lang, horizontal stehend. Haube geschlitzt. Wächst in Surinam.

18. *Hookeria lacte-virens* Hook.

Stengel scheidig, ästig. Blätter zweireihig, abste-hend, eyförmig, langgespitzt, gerändert, an der Spitze fast sägezäh-nig. Kapsel eyförmig, überhängend. Haube ungetheilt. Waterl. Hibernia.

19. *Hookeria Langsdorffii* Hook.

Stengel und Blätter und Kapsel wie bei vorhergehender Art, aber die Haube ist fast behaart und sechs-spaltig. Wächst in Brasilien.

20. *Hookeria albicans* Hook. Weißliche Hookerie.

Leskea albicans Hedw. Sw. *Racopilum Aubertii* P. Beauv. *Hypnum vesiculosum* et *Pterygophyllum albicans* Bridel muscol.

Nester ange-drückt. Blätter zweireihig, abste-hend, eyförmig, gespitzt, sägerandig, nebadrig, durchscheinend, weißlich. Kapsel eyförmig, überhängend. Haube an der Basis geschlitzt. Waterl. Ostindien.

21. *Hookeria incurva* Hook. (*Chaetophora incurva* Hornsch.)

Stengel scheidig, ästig. Blätter zweireihig, abste-hend, länglich = umgekehrteyförmig, stumpf, sägerandig, nebadrig.

Kapsel überhängend. Haube an der Basis geschnitten. Wächst in Chili.

22. *Hookeria falcata* Hook.

Stengel gestreckt. Nester aufrecht. Blätter schelfförmig = einseitig, linien-lanzettförmig, langgespitzt, an der Spitze gezähnt. Kapsel eiförmig, horizontal stehend. Haube an der Spitze scharf. Vaterl. Neugranada. 24

23. *Hookeria depressa* Hook. (*Leskea depressa* Hedw.)

Stengel kriechend. Nester niedergedrückt. Blätter schlaff, länglich, gespitzt, an der Spitze sägerandig, ausgetrocknet, gedreht. Kapsel eiförmig, überhängend. Haube an der Basis eingeschnitten. Wächst in Ost- und Westindien. 24

24. *Hookeria repens* Hook. Kriechende Hookerie.

Stengel kriechend. Nester zusammengedrückt, seidenhaarig. Blätter zweireihig, ey-lanzettförmig, langgespitzt, an der Spitze gezähnt, neugadrig, die Rippen undeutlich. Kapsel horizontal stehend. Haube ungetheilt. Wächst auf den caraisischen Inseln.

II. *Foliis bipulatis*. Blätter mit Afterblättern versehen.

25. *Hookeria pennata* Smith. Federförmige Hookerie.

Anictangium bulbosum Hedw. *Leskea pennata* Labill.

Cyathophorum pteridioides P. Beauv. *Pterygophyllum* Brid.

Stengel einfach, aufrecht. Blätter zweireihig, sehr absteigend, ey-lanzettförmig, sägerandig, ohne Rippen. Afterblätter kreisrund, mucronenspitzig, gezähnt. Vorste (Kapselstiel) abgefürzt. Kapsel eiförmig, aufrecht. Vaterl. Neuholland, van Diemen und Neuseeland.

26. *Hookeria quadrifaria* Smith. (*Pterygophyllum* Bridel musc.)

Stengel aufrecht, fast ästig. Blätter vierreihig, absteigend, eiförmig, neugadrig, einrippig. Afterblätter rundlich, aufrecht. Kapsel cylindrisch, hängend. Neuseeland. 24

27. *Hookeria laricina* Hook. (*Hypnum laricinum* Kunth.)

Stengel aufrecht, oben ästig. Blätter zweireihig, absteigend, eiförmig, gespitzt, wellenrandig, an der Spitze gezähnt. Afterblätter herzförmig, angedrückt. Kapsel überhängend, fein punktiert. Wächst im südlichen Afrika.

28. *Hookeria tamariscina* Hook. (*Leskea tamarisc.* Hedw. *Hypnum Tamarisci* Schw.)

Stengel und Blätter wie bei *H. laricina*, aber die Aeste sind gebüschelt. Afterblätter eiförmig, langgespitzt, gerändert, eingeschnitten = gesägt. Borsten winkelförmig. Kapseln eiförmig, hängend.

29. *Hookeria rotulata* Smith. (*Leskea rotulata* Hedw.)

Stengel, Blätter und Aeste wie bei vorhergehender Art. Afterblätter klein, gerundet, mucronenspitzig. Kapsel eiförmig, überhängend.

30. *Hookeria concina* Hook. (*Leskea concina* Hook. musc. exot.)

Stengel aufrecht, oben ästig. Blätter zweireihig, abstehend, lanzettförmig, gespitzt, gerändert, scharf sägerandig. Kapsel aufrecht, cylindrisch. Deckel langgeschäbelf. Waterl. Neuseeland.

31. *Hookeria filiculaeformis* Hook. (*Leskea filiculaeformis* Hedw.)

Stengel aufrecht, oben ästig. Blätter zweireihig, abstehend, eiförmig-lanzettförmig, gespitzt, ganzrandig, ohne Rippen. Kapsel überhängend, eiförmig.

32. *Hookeria tomentosa* Spr. Filzige Hookerie. (*Hypnum tomentosum* Hedw.)

Stengel kriechend. Aeste aufrecht. Blätter zweireihig, länglich, feinspitzig, an der Spitze gezähnt. Afterblätter herzförmig = feinspitzig. Kapsel übergebogen. Deckel schnabelförmig. Wächst in St. Domingo, Guiana und Ins. Mascarien. 4

Synonymen.

Hookeria Arbuscula Sm. f. *Hypnum Arbuscula* Hooker.

— *flexilis* Sm. f. *Hypnum flexile* Hooker.

— *leskeoides* Hooker f. *Leskea Bonplandii* Hook.

— *splachnoides* Schwägr. f. *Tayloria splachnoides* Hook.

Hopea Roxburgh. f. *Hoppea*.

Hopea tinctoria Linn. f. *Symplocos tinctoria* Lex. 8. 9.

Hopkirkia Sprengel Syst. Veg. 3. p. 356. N. 2688.

Blüthendecke (Kelch) dachziegelschuppig. Fruchtboden spreizig. Saamen zottenhaarig. Die Saamenkrone besteht aus zwei Gramen, die nach oben scharf sind.

Syngenesia 1 Ordn. (Familie Compositae; Eupatorien.)

1. *Hopkirkia Eupatorium* Spr. (Salmea Eupatoria Cand.)
 Aeste ausgesperret, behaart. Blätter länglich-eyförmig, fast
 gezähnt, auf beiden Seiten nackt. Vaterl. Südamerika.

2. *Hopkirkia scandens* Spr. (Salmea scandens Cand.)
 Stengel strauchig. Aeste kletternd, glatt. Blätter eyförmig,
 langgespitzt, fast ganzrandig, glatt. Blumen gestielt,
 fast rispenständig. Vaterl. Jamaica, Portoriko, Neuspanien.
 Zu dieser Art hat Sprengel *Bidens scandens* Linn. ge-
 zogen s. Lexic. B. 2. Auch *Calea Amellus* Linn. s.
 Lexic. B. 2.

3. *Hopkirkia hirsuta* Spr. (Salmea hirsuta Cand.) ist
Bidens hirsuta Swartz. s. 1. Nachtr. B. 1. S. 491.

4. *Hopkirkia fruticulosa* Spr. (Armania fruticulosa
 Bertero.)

Ein kleiner Strauch, dessen Aeste aufrecht und walzenrund
 sind. Blätter rauten-eyförmig, gekerbt, auf beiden Seiten
 zottenhaarig-silzig. Blumenstiele meist zu 3, gipfelförmig.
 Vaterl. Südamerika, am Magdalenenflusse. h

Hoplotheca Nuttall. (Gomphrena Spec.)

Reich einblättrig, fünfspaltig, von 2 Bracteen unterstützt,
 die Röhre cylindrisch, fünf Staubfäden tragend. Antheren
 einfächerig. Narbe kopf-pinsel förmig. Schlauchfrucht einsaa-
 mig, in dem bleibenden hartwerdenden Reich geschlossen.

Pentandria Monogynia (Familie Chenopodeen; Ama-
 ranthen.)

1. *Hoplotheca lactea* Mart. (Gomphrena lactea Cand.)
 Stengel staudenstrauchig, aufrecht. Blätter eyförmig, sil-
 zig, unten weißlich. Blumen in unterbrochenen Aehren, die
 Rispen bilden. Vaterl. das tropische Amerika. h

2. *Hoplotheca floridana* Nutt. (Gomphrena floridana
 Spr. Syst. Veg. 1. p. 824. gehört hierher.)

Stengel aufrecht, einfach, drüsig. Blätter stiellos, lanzett-
 förmig, gespitzt, oben bläsig (blättrig) scharf, unten dicht
 seidenhaarig-wollig. Aehren stiellos, ruthenförmige Rispen
 bildend. Vaterl. Florida.

3. *Hoplotheca tomentosa* Mart. Filzige Hoplothete.

Stengel aufrecht, zottenhaarig. Blätter fast rund, stumpf,
 silzig-wollig. Blumen in gestielte Aehren gesammelt, die ein-
 ander gegenüber stehen. Vaterl. Brasilien, am Flusse Platum.

4. *Hoplotheca sericea* Mart. Seidenhaarige Hoplothete.

Gomphrena sericea Hoffmannsegg.

Stengel aufrecht, wie die Blätter seidenhaarig = zottig. Blätter linien-lanzettförmig, gespitzt. Blumenähren gestielt, einander gegenüber stehend. Vaterl. Brasilien.

5. Hoplotheca lanata Mart. f. Gomphrena lanata N. 29.

Kultur. Diese Gewächse behandelt man, in Hinsicht auf Erdreich und Standort, wie die tropischen Gomphrenen, mit denen sie verwandt sind. Fortpflanzung durch Saamen, die strauchartigen auch durch Stecklinge in warmen Beeten.

Hoppea Dietr. (Hoppea Roxb. Spr. Syst. veg.) Hoppea.

Der Kelch besteht aus fünf Blättern, davon 2 zuletzt in Fruchtflügel auswachsen. Corolle fünftheilig, gedreht. Staubfäden abwechselnd zwiespaltig. Narbe einfach. Kapsel einsamig.

Dodecandria Monogynia.

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Dr. David Heinrich Hoppe Sanitätsrath, Professor der Botanik und Präsident der königl. bot. Gesellschaft zu Regensburg. Dr. D. H. Hoppe erwarb sich um die Wissenschaft besonders dadurch ein hohes Verdienst, daß er seit vielen Jahren die Alpenpflanzen an Ort und Stelle sorgfältig untersucht und in einigen Schriften genau charakterisirt und bestimmt hat: Botanisches Taschenbuch 1794—1806. Allgemeine bot. Zeitung u. a. Diese beschwerlichen Reisen besonders auf die salzburgischen Alpen hat er auch in seinem Alter zur Beförderung der Wissenschaft noch fortgesetzt (L. bot. Zeitung 1832) und nicht allein viele blühende Pflanzen sondern auch Saamen für bot. Gärten gesammelt.

1. Hoppea odorata (Hoppea Roxburgh. Spr. Syst. veg. 2. p. 447.) Wohlriechende Hoppea.

Ein Baum, dessen Blätter alterniren. Diese sind länglich-eyförmig, unten nehabdrig, in den Winkeln der Rippen drüsig. Blumen gelb, ährenrispenständig. Vaterl. Calcutta. h

Kultur: warmes Haus. Fortpflanzung durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.

Hoppea dichotoma Willd. Vahl. ist Platona pusilla Roxb. und muß im Lexic. 1. Aufl. B. 4. C. 676. aufgestrichen werden.

Hoppea speciosa Reichenb. ist Cineraria sibirica Linn. f. Lexic. B. 3.

Hordeum Linn. Gerste f. Lexic. B. 4.

Reiße einblümig und stehen zu 3 neben einander in einer

Aehre; die seitenständigen Blümchen sind oft nur männlich und mit 2 Borsten versehen. Die untere Blüthenklappe trägt an der Spitze eine lange fadenförmige Granne. Samen rundig oder nackt.

Triandria Digynia (Familie Gräser.)

I. *Hordeum Hystrix* Roth.

Blätter zottenhaarig. Stalm aufrecht. Blümchen auf dem Rücken glatt, die seitenständigen fadenförmig. Fruchtknoten schwammig. Vaterl. Spanien. ☉

Die übrigen Arten s. Lexic. B. 4.

Synonymen.

- Hordeum ascendens* Humb. ist *Hordeum secalinum* Schreb. s. Lexic.
 — *capense* Thunb. ist *Hordeum secalinum* Schreb. s. Lexic.
 — *chilense* R. et Sch. ist *Hordeum maritimum* With. s. Lexic.
 — *coeleste* Viborg ist *Hordeum vulgare* L. var. s. Lexic.
 — *geniculatum* All. ist *Hordeum maritimum* s. Lexic.
 — *marinum* Huds. (nec Linn.) ist *Hordeum maritimum* s. Lexic.
 — *nodosum* Sav. s. Lexic. ist *Hordeum bulbosum* s. Lexic.
 — *pratense* Huds. s. *Hordeum secalinum* s. Lex.
 — *rigidum* Roth. ist *Hordeum maritimum* s. Lexic.
 — *strictum* Desf. Schousb. s. Lexic. ist *Hordeum bulbosum* s. Lexic.

Horkelia californica Schlechtend. ist *Sibbaldia californica* Spr.

Hormiscium alatum Ehrenb. s. *Monilia alata* Spr.

Hormiscium expansum Kunz. s. *Monilia expansa* Spr.

Hornemannia Willd. s. 1. Nachtr. B. 4.

Hornemannia ovata Link. ist *Tittmannia ovata* Reich.

Hornemannia viscosa Willd. s. 1. Nachtr. ist *Tittmannia viscosa* Reichenb.

Hornschuchia Nees a Esenb. Hornschuchie.

Kelch unten stehend, lederartig, fast abgestutzt. Corolle sechstheilig, doppelt. Antheren linienförmig, fast aufsteigend.

Hexandria Monogynia.

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Dr. Hornschuch Professor der Botanik zu Greifswalde.

1. *Hornschuchia Bryotrophe* Nees. Denkw. der bot. Gesellschaft in Regensburg 2. t. 11.

Blätter an der Basis ungleich, länglich, langgespitzt, dreifach gerippt, unten an den Rippen sitzig. Blumenstiele wurzelständig, traubig. Vaterl. Brasilien. 2?

2. *Hornschuchia Myrtillus* Nees. Denkw. der bot. Gesellschaft in Regensburg. 2. t. 12.

Blätter elliptisch = länglich, an beiden Enden schmaler, unten so wie die Aeste sitzig. Blumenstiele einblüthig, seitständig. Vaterl. Brasilien. 2.

Kultur. Beide Arten verlangen gute lockere Erde und warme Standörter, denn sie kommen aus Brasilien. Fortpflanzung durch Samen und Wurzeltheilung.

Hornstedtia Reitz. Willd. f. Lexic. erste Aufl. B. 4. ist *Amomum* Linn.

Horsfieldia odorata Willd. f. 1. Nachtr. B. 4. hat Sprengel zu *Myristica* gezogen.

Hortensia f. Lexic. erste Aufl. B. 4. siehe *Hydrangea*.

Hortia Vandell. Portie.

Kelch fünfzählig, stehen bleibend. Fünf Corollenblätter mit Nägeln versehen, die an der Basis bartig sind. Fünf Staubfäden mit zweifächerigen Antheren gekrönt, die an der Rückseite sitzen. Kapsel fünffächerig, 1—2 saamig.

Pentandria Monogynia (Familie Rutaceen.)

1. *Hortia brasiliana* Vandell. Brasilische Portie.

Stengel staudenstrauchig, wie die Blätter glatt. Blätter wechselnd stehend, spatelförmig, hell-punktirt. Blumen rosenschroth, in Aesterdolden gesammelt. Vaterl. Brasilien. h (Abbild. Hilar plant. us. brasil. t. 17.)

Horta coerulea Jacq. ist *Cornutia punctata* Willd.

— *coerulea* Trattinn. ist *Funkia* Spr.

— *latifolia* Humb. ist *Cornutia pyramidata* Spr.

— *longifolia* Humb. ist *Cornutia flaminea* Vahl.

Hostea viridiflora Willd. f. Lexic. B. 4. (*Matelea* Aubl.)

Diese Gattung widmete Willdenow dem österreichischen Leibargte Herrn Dr. Nic. Thom. Host, der sich durch die

Bearbeitung und Herausgabe einiger schätzbaren Schriften um die Wissenschaft verdient gemacht hat, besonders durch sein großes Prachtwerk: „Icones et descriptiones graminum austriacorum. Vienn. 1801—1814. Vol. 1—4.

Hottonia Linn. Hottonie f. Lexic. B. 4. (Gaertn. d. fruct. Suppl. t. 198.)

Kelch fünftheilig. Corolle kurzröhrig, der Rand fünflappig, flach. Fünf Antheren in der Corollenröhre sitzend. Ein Griffel. Kapsel kugelig, mit dem bleibenden Griffel gekrönt.

Pentandria Monogynia (Familie Primulaceen.)

Diese Gattung widmete Linné dem Andenken eines alten Botanikers in Holland, Herrn Pet. Hotton (geb. 1648. † 1709). Hotton wurde nach Hermanns Tode Director des bot. Gartens zu Bruden 1696.

1. **Hottonia inflata** Elliott. Aufgeblasene Hottonie.

Hott. palustris Pursh. (nec Linn.)

Blätter lammförmig = federspaltig. Stengel krautartig. Blumen quirlförmig stehend, gestielt, die Stiele mit aufgeblasenen Knoten versehen. Corolle so lang als der Kelch. Vaterl. Georgien in Sümpfen und an feuchten Stellen. 4 ?

Hottonia palustris Linn. Hotton. sessiliflora Vahl. f. Lexic. B. 4.

Synonymen.

Hottonia indica Linn. (f. Lexic.) ist *Limnophila gratioloides* R. Br.

— *litoralis* Lour. ist *Erythraea cochinchinensis* Spr.

— *palustris* Pursh. f. *Hottonia inflata* N. 1.

— *serrata* Willd. f. Lexic. 1. Aufl. ist *Serpicula verticillata* Linn. *Udora* Spr. Syst. veg. 1. p. 170.

Houmiri balsamifera Aubl. f. *Myrodendron amplexicaule*.

Houstonia Linn. Houstonie f. Lexic. B. 4. (Gaertn. Sem. t. 49.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. C. 20.

Kelch vierspaltig. Corolle trichterförmig, vierspaltig. Vier Staubfäden. Ein Griffel. Narbe einfach. Kapsel zweifächerig. Saamen wenige, an einen schwammigen Knoschen, der an der Scheidewand befestigt ist.

Tetrandria Monogynia (Familie Gentianen.)

Im ersten Nachtrage B. 4. S. 29. habe ich schon bemerkt, daß diese Gattung dem Dr. Houston gewidmet ist. Wilh. Houston lebte viele Jahre auf den Antillen und in Spanien, wo er viele Pflanzen sammelte und daselbst 1733. starb. Die Pflanzen, welche Houston in Cuba, Jamaica und in der Gegend von Vera Cruz beobachtete, hat nachher Joh. Banks genauer untersucht, bestimmt und herausgegeben: Bibl. Banks I. 187.: *Reiquiae Houstonianae*. London 1781. 4. mit 26 Kupfern. Dieses Werk sah ich in Banks Bibliothek (Soho squer) im Sommer 1797.

1. *Houstonia minima* Beck. Kleine Houstonie.

Stengel aufrecht, einfach, etwas scharf. Blätter spatelförmig, gewimpert. Blumenstiele einblümig, gipfelständig. Die Einschnitte des Kelches breit, eiförmig, gespißt, aufrecht. Diese Art ist der folgenden *H. patens* sehr nahe verwandt, aber unterschieden durch den einfachen Stengel und durch die breiteren Einschnitte des Kelches. Waterl. Nordamerika, am Missouri-Flusse.

2. *Houstonia patens* Elliott. Carol. austr. p. 191. Ausgebreitete Houstonie.

H. Linnaei β. Michx.

Stengel ästig, weitschweifig. Aeste ausgesperret, scharf. Blätter spatel-lanzettförmig, gewimpert. Blumenstiele gipfelständig. Die Einschnitte des Kelches linienförmig, die der Corolle stumpf. Waterl. Nordamerika; Carolina am sandigen Meerufer, an sehr trockenen dürrn Orten. 4

3. *Houstonia tenuifolia* Nuttall. Dünablättrige Houstonie.

Stengel aufrecht, gabelästig, glatt. Blätter schmal, dünn, linienförmig. Blumenstiele bosdenkrautartig, borstig. Waterl. die Provinz Tennessee in Nordamerika.

4. *Houstonia rotundifolia* Michx. Rundblättrige Houstonie.

Anonymos procumbens Walt. Carol.

Stengel krautartig, kriechend. Blätter gestielt, rundlich, dicklich, gewimpert. Blumenstiele winkelförmig, einblümig. Waterl. Carolina. 4

5. *Houstonia serpyllifolia* Michx. Feldthymianblättrige Houstonie.

Stengel niederliegend, sehr ästig. Aeste fadenförmig, fast kriechend. Blätter spatelförmig, stumpf. Blumenstiele gipfelständig, lang, einblümig. Waterl. Virginien und Carolina. 4

6. Hou-

6. *Houstonia tenella* Pursh. Fl. amer. septentrion. Barte Houstonie.

Stengel fadenförmig, kriechend. Blätter kreisrund, gespitzt, gerippt. Blumenstiele gipfelständig, sehr lang, einblümig. Waterl. Carolina.

Synonymen.

Houstonia angustifolia Michx. ist *Houstonia longifolia* Willd. f. Lexic.

— *coccinea* Andr. Willd. (f. 1. Nachtr. B. 4.) ist *Bouvardia Jacquinii* Humb.

— *Linnaei* β Michx. f. *Houstonia patens* N. 2.

— *pubescens* Rafin. ist *Houstonia purpurea* Linn. f. Lexic.

— *varians* Michx. ist *Houstonia purpurea* Linn. f. Lexic.

Houttuynia Thunb. f. Lexic. B. 4.

Diese Gattung widmete Thunberg dem Herrn Dr. Martin Houttuyn Arzt zu Amsterdam, der eine vollständige Geschichte aller damals bekannten Pflanzen nach dem Linnéschen System bearbeitet hat. Amsterdam 1774—1783. 8.

Es ist nur eine Art bekannt: *Houttuynia odorata* Thunb. f. Lexic.

Hovea Rob. Brown. Hovea.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 23.

Reich zweisippig; die Oberlippe stumpf, niedergedrückt, breiter als die Unterlippe. Corolle schmetterlingsförmig. Schiffecken stumpf. Staubfäden alle verwachsen. Hülse stiellos, bauchig, zweisaamig.

Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflanzen.)

1. *Hovea Celsii* Bonpl. Eelsische Hovea.

Blätter länglich, mucronenspizig, lederartig, glatt. Blumenstiele winkelfständig, gehäuft. Waterl. Neuholland. h

2. *Hovea lanceolata* Sims. Bot. reg. Lanzettförmige Hovea.

Blätter lanzettförmig, mucronenspizig, unten filzig. Blumenstiele zu 2 winkelfständig. Waterl. Neuholland. h

3. *Hovea elliptica* Cand. Elliptische Hovea.

Blätter elliptisch-länglich, ausgekerbt, oben glänzend, unten fast filzig. Blumenstiele gepaart, winkelfständig, kürzer als die Blätter. Waterl. Neuholland und Afrika. h

4. *Hovea chorizemaefolia* Cand. Chorizemablättrige Hovea.

Blätter länglich-lanzettförmig, buchtig-dornig, mucronenspizig. Waterl. Zeylon. h

Dierr. Exr. 2r. Nachtr. IV. Bd.

spizig, lederartig, glatt. Afterblätter dornig. Kelch zottenhaarig. Waterl. wie vorhergehende Art N. 3.

5. *Hovea purpurea* Sweet Fl. austr. or the plants of New-Holland. N. 13.

Aeste aufrecht, rostfarbig = filzig. Blätter länglich = liniensförmig, stumpf, mucronenspizig, am Rande zurückgerollt, oben glatt, negadrig, unten filzig. Afterblätter klein, pfriemenspizig. Blumenstiele winkelförmig, gepaart, mit Bracteen versehen. Kelch rostfarbig = filzig. Corolle purpurroth. Waterl. Neu Süd-Wallis. h

Die Hoven sind kleine Bäume oder Sträucher, die aus Neuholand kommen und in unsern Gärten mit Durchwinterrung im Glashause vorlieb nehmen. Fortpflanzung durch Saamen, auch durch Stedlinge.

- Hovenia* Thunb. *Hovenia* f. Lexic. B. 4.

Kelch fünfstheilig. Fünf Corollenblätter, die zusammengerollt sind. Fünf eingeschlossene Staubfäden. Ein Griffel mit drei Narben. Kapsel kugelig, dreiknöpfig, dreisaamig.

Pentandria Monogynia (Familie Rhamneen.)

1. *Hovenia dulcis* Thunb. f. Lexic. B. 4. man sehe daselbst hinzu: Waterl. Nepal.
2. *Hovenia acerba* Lindl. Bot. reg. Chinesische *Hovenie*.

Aeste und Blätter filzig. Blätter wechselnd stehend, länglich, geadert, sägerandig. Die Blumen bilden dreitheilige Rippen. Waterl. China. h

Kultur. Beide Arten überwintert man im Glashause und vermehrt sie, außer den Saamen, auch durch Stedlinge, in warmen Beeten.

- Hoya* Rob. Brown in Wern. transact. 1. p. 16. Prodr. Flor. Nov. Holland. *Hoya*. (*Asclepias* Spec. L.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 24.

Corolle radförmig, fünfstheilig, das Befruchtungsständchen (Nektartrone) hat fünf niedergedrückte Blättchen (Platten), aus deren inneren Winkeln ein Zahn hervortritt, unter dem die Anthere liegt. Balgkapsel glatt, vielisaamig. Saamen mit Haartronen versehen.

Pentandria Digynia (Familie Contorten.)

Diese Gattung widmete Rob. Brown dem Herrn Thomas Hoy Botanikus in England, der in seinem Garten viele seltene und neue Pflanzen kultivirt.

1. *Hoya carnosa* R. Br. Fleischige Hoya; Porzellanblume
f. f: Nachtrag.

Hierher gehört *Asclepias carnosa* Linn. f. Lexic. 1. Auflage. *Stapelia chinensis* Lour. *Schollia crassifolia* Jacq.

Dieser ästige Schlingstrauch, dessen oval = längliche lederartig = fleischige ausdauernde Blätter am Rande mehr oder weniger zurückgeschlagen und oft gefleckt sind, ist in unsern Gärten allgemein bekannt und wird von den Blumenfreunden wegen der zierlichen porzellanfarbigen Blumen, die in reiche winkelftändige Dolden gesammelt sind, sehr geliebt und geachtet. In einem Zimmer, welches im Winter geheizt wird und wo man die schlingenden Aeste inwendig an den Fenstern hinauf leitet, gedeiht er eben so gut als in einem warmen Hause (Treibhaus) und trägt fast den ganzen Sommer viele überhängende Dolden. Die Blumen enthalten einen süßen Saft. Corolle weiß, die Platten der Nectartrone roth, unten gefurcht. Balgkapsel 5—6 Zoll lang, walzenrund. Waterl. das tropische Amerika. h

2. *Hoya viridiflora* R. Br. ist *Asclepias volubilis* Linn.
f. Lexic. B. 4.

Stamm windend. Blätter fast herz = eiförmig, langgespitzt, häutig, glatt. Blumen in einfache, aufrechte Dolden gesammelt. Corollen grün, glatt. Die Platten des Befruchtungs säulchens (Nectartrone) nicht gefurcht. Waterl. Seylon. h

3. *Hoya pallida* Lindley. Bot. reg. 951. Blasse Hoya.

Blätter ey = lanzettförmig, langgespitzt, fleischig, geadert. Blumen in dichte Dolden gesammelt, blaß, weiß = röthlich, die Corollen etwas stumpf. Waterl. Indien. ?

4. *Hoya lanceolata* Wallich. Lanzettblättrige Hoya.

Blätter lanzettförmig, langgespitzt, glatt. Blumen in wenigblümigen Dolden. Die Platten des Befruchtungs säulchens länglich = linienförmig, unten gefurcht. Waterl. Nepal. h

5. *Hoya linearis* Wall. Linienblättrige Hoya.

Blätter linienförmig, stumpf, fleischig, auf beiden Seiten, so wie der fadenförmige Stengel, dicht mit Haaren bekleidet. Waterl. Nepal.

Sur Hoya hat Sprengel (Syst. Veg. 1. p. 843.) *Tylophora* R. B. gezogen, die sich fast nur durch die fehlenden Bähne des Befruchtungs säulchens (Nectarfranz) von Hoya unterscheidet, und folgende Arten als zweite Abtheilung aufgestellt,

6. *Hoya grandiflora* Spr. Großblumige Hoya.

Tylophora grandiflora Rob. Brown. Prodr. Fl. Nov. Holland.

Stengel staudenstrauchig und windet sich. Aeste und Blätter filzig. Blätter herz- eyförmig, gespitzt, häutig, zu 2 einander gegenüber stehend. Blumen gestielt, in fast stiellose einfache wenigblumige Dolden gesammelt, größer als die der folgenden Arten. Nectarfranz ohne Zähne. Vaterl. Neuholland. h

7. *Hoya barbata* Spr. Bartige Hoya. (*Tylophora* R. Br.)

Blätter oval, gespitzt, glattlich. Blumen in fast gepaarten Dolden, deren gemeinschaftliche Stiele kürzer als die Blätter sind. Corollen mit Barthaaren bekleidet. Wat. Neuholland.

8. *Hoya flexuosa* Spr. Gebogene Hoya. (*Tylophora* R. Br.)

Blätter herzförmig, länglich, geadert. Dolden wechselnd stehend, stiellos. Blumenstiele knieartig gebogen. Corollen nicht gebartet. Vaterl. Neuholland.

9. *Hoya paniculata* Spr. Rispenblüthige Hoya. (*Tylophora* R. Br.)

Blätter glattlich, untere herzförmig, obere eyförmig, lang gespitzt. Blumen in zweitheilige Rispen gesammelt. Die Einschnitte der Corolle oben zungenförmig. Vaterl. Neuholland.

Kultur im Allgemeinen. Die Hoyaen verlangen gute lockere Erde, Laub- oder Walderde, die gehörig mit Sand und wenig Lehm- oder Rasenerde gemischt wird. Die vier letzten Arten überwintert man in Glashäusern oder andern frostfreien Behältern. Fortpflanzung durch Saamen, Ableger und Stecklinge.

Huanaca acaulis Cav. ist *Oenanthe Huanaca* Spr. Kann im 1. Nachtr. *Huanca* (*Huanaca*) ausgestrichen und die Beschreibung der Art *H. acaulis* zu *Oenanthe* gezogen werden.

Hubertia Ambavilla Bory. ist *Senecio Ambavilla* Pers. f. Lexic.

Hubertia tomentosa Bory. ist *Senecio daphnoides* Poir. f. 2. Nachtr.

Hudsonia Linn. Hudsonie. (Gaertn. fructib. t. 210.)

Kennzeichen der Gattung und *H. ericoides* f. Lex. B. 4.

Diese Gattung hat Linné bestimmt und sie Herrn Willh.

Hudson zu Ehren *Hudsonia* genannt. Hudson war Apotheker in London und einer der würdigsten Verfasser der brit.

Fischen Floren, die außer J. Eduard Smith's Flora Britannica in England erschienen sind. Seine Flora anglica gab er in London im J. 1762 heraus und die 2 Aufl. erschien im Jahr 1778. Er starb 1793.

1. *Hudsonia montana* Nuttall. Bergliebende Hudsonie.

Stengel niederliegend, wie die Blätter glattlich. Blätter fadenförmig, lang, pfriemenspizig. Blumenstiele gipfelfständig. Kelchtheile langgespitzt, wollig. Kapseln dreisaamig. Waterl. das nördliche Carolina.

2. *Hudsonia tomentosa* Nutt. Filzige Hudsonie.

Stengel und Blätter grau = filzig. Blätter eiförmig, angedrückt, wie Dachziegeln über einander liegend. Blumen fast stiellos, gehäuft. Kelchtheile stumpf. Waterl. Nordamerika. 24 ?

3. *Hudsonia australis* Spr. Südliche Hudsonie.

Stengel glattlich, aufrecht. Blätter linien = lanzettförmig, unten mit zerstreuten abstehenden Haaren besetzt. Blumen gestielt, einzeln, gipfelfständig. Kelchtheile langgespitzt, wenig borstig. Waterl. Monte Video.

Humata ophioglossoides Cav. f. *Davallia heterophylla*.

Humata pinnatifida Cav. f. *Davallia pinnatifida*.

Humbertia Commers. f. *Endrachium* 1. Nachtr.

Humboldtia Vahl. f. Lexic. B. 4.

— *acutiflora* Ruiz et Pav. f. *Stelis acutiflora* Willd.

— *cordata* Ruiz et Pav. f. *Stelis cordata* Willd.

— *lanceolata* Ruiz et Pav. f. *Stelis lanceolata* Willd.

— *oblonga* Ruiz et Pav. f. *Stelis oblonga* Willd.

— *parviflora* Ruiz et Pav. f. *Stelis polytachia* Willd.

— *purpurea* Ruiz et Pav. f. *Stelis purpurea* Willd.

— *revoluta* Ruiz et Pav. f. *Stelis revoluta* Willd.

Humirium floribundum Mart. f. *Myrandrum*.

Hunteria Roxburgh. Hunterie.

Kelch fünfstheilig. Corolle trichterförmig. Staubfäden 5. Narbe zweilappig. Beeren zwei, 1—2 saamig.

Pentandria Monogynia (Familie Sapoteen.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Alex. Hunter, der mit Mustel die Wärme für den einzigen Grund des Aufsteigens der Pflanzensäfte hält: Geological Essays. Vol. I. p. 170.

1. *Hunteria corymbosa* Roxb. Doldentraubige Hunterie.

Ein Baum, dessen Aeste abstehend-aufrecht sind. Blätter zu 2 gegenüberstehend, länglich, ganzrandig, glatt. Blumen weiß, in gipfelförmige Doldentrauben gesammelt. Vaterl. Malaga. †

In unsern Gärten gedeiht dieser Baum am besten in einem warmen Hause. Fortpflanzung durch die Aussaat des Saamens und durch Stedlinge.

Hura Linn. f. Lexic. B. 4. und 1. Nachtr. B. 4.

Hura Siamensium König f. Globba Königiana Spr.

Hutchinsia Rob. Brown.

Character generic. f. 1. Nachtrag B. 4.

Corollenblätter gleich. Schötchen elliptisch, die Klappen fahnenförmig, gerändert-geflügelt, die Fächer einsamig.

Tetrandria Siliculosa (Familie Kreuzblumen.)

Die Arten, welche hierher gehören, sind krautartige Pflanzen, die in unseren botanischen Gärten unter freiem Himmel gedeihen und aus Saamen gezogen werden. Einige Arten habe ich schon in diesem Werke unter *Iberis* und *Lebidium* aufgeführt und beschrieben. Es sind folgende, die nach R. Brown hierher gehören.

† Blätter ungetheilt.

1. *Hutchinsia rotundifolia* R. Br. (*H. pygmaea* Viv.)
ist *Iberis rotundifolia* Linn. f. Lexic. B. 5.2. *Hutchinsia cepeaefolia* Cand. ist *Iberis cepeaefolia*
Linn. f. Lexic. B. 5.3. *Hutchinsia pumila* Cand. (*Iberis pumila* Stev. M.
a Bieb.)

Stengel niedrig. Blätter fast fleischig, untere langgestielt, oval, ganzrandig, obere länglich, pfeilförmig. Schötchen an beiden Enden verdünnt. Griffel hervorragend. Vaterl. Kaukasus. ○

4. *Hutchinsia stylosa* Cand. Langgriffelige Hutchinsie. (*Iberis stylosa* Tenor.)

Stengel krautartig. Blätter fast fleischig, untere gestielt,

länglich = umgekehrtenförmig, fast ganzrandig, obere länglich, halb umfassend. Staubfäden und Corollenblätter gleich lang. Schötchen länglich, stumpf. Griffel hervorragend. Bat. Neapel.

5. *Hutchinsia brevistyla* Cand. Kurzgrifflige Hutchinsie.

Blätter gestielt, fast fleischig, gehäuft stehend, umgekehrtspindelförmig, fast gezähnt. Schötchen ausgekerbt. Griffel sehr kurz. Vaterl. Syrien.

6. *Hutchinsia trinervia* Cand. Dreirippige Hutchinsie.

Blätter stiellos, umfassend, länglich = herzförmig, dreirippig, ganzrandig. Staubfäden und Corollenblätter fast gleich lang. Vaterl. Persien.

7. *Hutchinsia hastulata* Cand.

Blätter fast spießförmig = länglich, umfassend, fast gezähnt. Schötchen verlängert, abgestutzt. Vaterl. Persien.

†† Blätter gefiedert oder fiederspaltig.

8. *Hutchinsia calycina* Desv. ist *Lepidium calycinum* Stev. Willd. f. Lexic. B. 5.

9. *Hutchinsia alpina* R. Br. ist *Lepidium alpinum* Linn. f. Lexic. B. 5.

10. *Hutchinsia brevicaulis* Spr. (*Lepidium brevicaulis* Hoppe.)

Stengel kurz. Blätter leyerförmig = gefiedert. Blättchen umgekehrtenförmig. Schötchen länglich = umgekehrtenförmig, stumpf. Griffel abfallend. Wächst auf den höchsten Alpen in Kärnten und Krain.

11. *Hutchinsia petraea* R. Br. ist *Lepidium petraeum* Linn. f. Lexic. B. 5.

12. *Hutchinsia procumbens* Cand. ist *Lepidium procumbens* Linn. f. Lexic. B. 5.

Hutchinsia Agardh. ist *Polysiphonia* Grew. Sprengel. Cryptogamia Sect. IV.

Hyacinthus Linn. Hyacinthe, f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 29.

Corolle sechsspaltig, regelmäßig. Staubfäden 6, in die Corollenröhre eingefügt. Der Fruchtknoten mit drei Nectardrüsen versehen. Kapsel dreifächerig, in jedem Fache nur wenige Samen.

Hexandria Monogynia (Familie Coronarien.)

1. *Hyacinthus spicatus* Smith. Aehrenförmige Hyacinthe.

Blätter linien-lanzettförmig, fast länger als der Schaft. Blumen ährenständig. Staubfäden ausgebreitet (flach). Vaterl. Griechenland. 4

2. *Hyacinthus sulfureus* Poir. Schwefelgelbe Hyacinthe.

Blätter linienförmig, kürzer als der Schaft. Blumentrauben ährenständig. Corolle keulen-glockenförmig, schwefelgelb. Staubfäden über die Corollenröhre hervorragend. Vaterl. das südliche Afrika. 4

Hyacinthus orientalis, *amethystinus*, *convallarioides*, *romanus* Linn. *H. flexuosus* Thunb. f. Lexic. B. 4. Die übrigen daselbst beschriebenen Arten gehören zur Gattung *Muscari* Desfont. f. 1. Nachtr.

Hybanthus globosa Lamb. f. *Toxicodendron* (*Jatropha* Gaertn. ?)

Hybanthus Jacq. (*Viola* Willd.) *Hybanthus*.

Kelch fünfstheilig, irregulär, nach unten höckerig-verlängert. Corolle fünfblättrig, ungleich, das obere Blatt kappenförmig verlängert, zweispaltig; unter den untern Corollenblättern sitzen am Fruchtknoten zwei kreisrunde Nectardrüsen. Fünf Antheren, ohne Fortsätze. Ein pfriemenförmiger Griffel. Kapself dreiklappig; an jeder Klappe hängen zwei Saamen.

Pentandria Monogynia (Familie Jonidien.)

1. *Hybanthus hapanensis* Jacq. amer. 77. t. 175. f. 24. *Viola Hybanthus* Willd. (nec. Aubl.)

Stengel strauchig, ästig. Blätter länglich, ausgekerbt, fast sägerandig, glatt. Ackerblätter gedrängt stehend, stachelspizig. Blumenstiele zweispaltig, wenigblümig. Vaterl. Cuba. f. *Viola Hybanthus* Aubl. f. Lexic. B. 10. ist *Corynostilis Hybanthus* Mart. f. 2. Nachtr. B. 3.

2. *Hybanthus concolor* Spr. (*Viola concolor* Furl. Forst.)

Stengel krautartig, aufrecht. Blätter spatel-lanzettförmig, gezähnt, filzig. Ackerblätter pfriemenspizig. Blumenstiele abgekürzt, dreiblümig; das fünfte Corollenblatt zweispaltig. Vaterl. Nordamerika.

Hydnocarpus Vahl. Stachelfrucht. (Abbild. Gaertn. fructib. t. 60.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 29.

Blumen polygamisch. Kelch und Corolle fünfblättrig, die Corollenblätter mit den Kelchblättern wechselnd, und an der Basis mit Nectarshuppen versehen. Fünf Staubfäden. Ein

Griffel. Beere kugelförmig, einsäckerig, viel-saamig. Saamen runzlig.

Pentandria Monogynia (Familie Rhamneen.)

1. *Hydnocarpus molucanus* Spr. Moluckische Stachelfrucht. *Vareca moluccana* Roxburgh. Corom.

Blätter wechselnd stehend, lanzettförmig, gespitzt, ganzrandig, glatt. Blumenstiele winkelfständig, vielblümig. Vaterl. die moluckischen Inseln. h

2. *Hydnocarpus lanceolatus* Spr. Lanzettblättrige Stachelfrucht.

Vareca lanceolata Roxb.

Blätter wechselnd stehend, lanzettförmig, glatt, parallel geadert. Blumen in winkelfständige doldentraubige Büschel gesammelt. Vaterl. wie vorhergehende Art. h

3. *Hydnocarpus heteroclitus* Spr. (*Vareca heteroclita* Roxb.)

Blätter wechselnd stehend, lanzettförmig, gekerbt, glatt, unten in den Winkeln der Rippen drüsig = grubig. Afterblätter Schwerdtförmig. Blumen winkelfständig, geknaut, stiellos. Vaterl. Ostindien. h

Kultur. Die Arten dieser Gattung verlangen gute Erde und warme Standörter, denn sie kommen aus Ostindien. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.

Hydnophytum Formicarum Jack. ist *Lasiostoma Formicarum* Spr.

Hydnum Linn. Stachelschwamm. (Abbild. Nees a Esenb. myc. t. 32.)

Diese Schwammgattung unterscheidet sich hauptsächlich dadurch, daß regelmäßige Stacheln und Zacken aus dem Hymenium hervorstehen.

Cryptogamia Sect. V. (Familie Schwämme.)

Im Syst. Veg. ed. Spr. sind 78 Arten aufgestellt, von denen ich nur die vorzüglichsten, welche in Europa in Wäldern vorkommen, hier bemerke. Es sind folgende:

I. *Stipite centrali*. Der Strunk (Stiel) steht in der Mitte des Hutes.

1. *Hydnum imbricatum* Linn. (*H. cervinum* Pers. *squarrosum* Nees.)

Hut fleischig, flach, gewürfelt = schuppig. Die Zähne stachel-

spitzig, aschgrau. Strunk kurz, fleischig. Wächst in Europa in Fichtenwäldern, und ist essbar, besonders in Italien eine delikate Speise.

2. *Hydnum subsquamosum* Batsch. (*H. squamosum* Bull. *imbricatum* Schum.)

Hut niedergedrückt, ungleich, fleischig, schuppig, fast gegürtelt.

3. *Hydnum repandum* Linn. Ausgeschweiffter Stachel-
schwamm.

H. flavidum et *rufescens* Schaeff. *imbricatum* Bolt. *carnosum* et *clandestinum* Batsch. *medium* Pers. obs. *rufescens* Pers. sind Varietäten.

Hut fleischig, glattlich, flach, fast gefurcht, am Rande ausgeschweift, 2—3 Zoll im Durchmesser breit, gelb = braunlich. Stacheln ungleich lang, gerade. Strunk fleischig, rund, blaßgelb, 1—2 Zoll hoch. Wächst in Nadelwäldern in Europa, besonders in Deutschland, zuweilen halb in der Erde und ist essbar. (Abbild. Trattin. österr. Schwämme und in dessen mycol. Cabin. Wachsthum N. 24.)

4. *Hydnum infundibulum* Swartz. Trichterförmiger Stachel-
schwamm.

Hut trichterförmig, glatt, fleischig, am Rande zurückgeschlagen = gefaltet. Stacheln gleich lang, weiß, dann blaß. Strunk ungleich. Wächst in Fichtenwäldern.

5. *Hydnum suaveolens* Scopol. Wohlriechender Stachel-
schwamm.

Hut flach, gerunzelt, klebrig, lederartig. Stacheln violett. Strunk kurz, dick. Wächst in Kärnthen und hat einen dem Lavendel gleichenden Geruch. Einige Varietäten unterscheiden sich durch einen größeren gewölbten Hut, der in der Mitte mehr oder weniger filzig, weiß oder blaulich ist, durch die Stärke und Farbe des Strunkes u. s. w.

6. *Hydnum compactum* Pers. (*H. foriforme* Schaeff. Schwämme.)

Hut korkig, wellenrandig, filzig, olivenfarbig = aschgrau, innenwendig braun und blau. Stacheln blaß. Strunk sehr kurz. Wächst in Nadelwäldern.

7. *Hydnum ferrugineum* Fries. Rostfarbiger Stachelschwamm.

Hut korkig, sehr weich, zottenhaarig, niedergedrückt, rostfarbig. Stacheln und Strunk verlängert, einfarbig. Wächst in Nadelwäldern.

8. *Hydnum nigrum* Fries. Schwarzer Stachelschwamm.

Hut korkig = lederartig, filzig, blau = schwarz gegürtelt, inwendig wie der Strunk, schwarz. Stacheln weiß. Wächst in Nadelwäldern. *H. pullum* Sw. *H. corrugatum* et *meloleucum* Fr. sind Varietäten.

9. *Hydnum velutinum* Fries. Sammtartiger Stachelschwamm.

Hut trichterförmig, fast lederartig, zottenhaarig. Strunk filzig, wie die Stacheln rindig = rostfarbig. Wächst in Nadelwäldern.

10. *Hydnum cyathiforme* Bull. Becherförmiger Stachelschwamm.

Hut lederartig, meist becherförmig, glattlich, gestreift = gegürtelt. Stacheln braun. Strunk rostfarbig. Wächst in Wäldern. *H. concrescens* Pers. *H. zonatum* Batsch. *H. scrobiculatum* Fr. *H. connatum* Schultz sind Varietäten.

11. *Hydnum tomentosum* Linn. Filziger Stachelschwamm.

Hut lederartig, fast trichterförmig, zottenhaarig, braungrau, der Rand und die Stacheln weiß. Strunk kurz, dick, braun. (*H. cyathiforme* Schöff. ist derselbe Schwamm). Wächst in Wäldern.

Zu dieser Abtheilung mit centralständigem Strunke gehören noch folgende Arten: *Hydnum sublamellosum* Bull. *H. laevigatum* Sw. *H. fuligino-album* et *candidum* Schmidt. *H. violascens* Schw. *H. fraceolens* Sw. *H. auranticum* Alb. *H. canum* Schw.

II. Stipite laterali. Strunk seitenständig.

12. *Hydnum Auriscalpium* Linn. Ohrschiffelförmiger Stachelschwamm.

Hut nieren- oder halbzirkelförmig, fast lederartig, gegürtelt, wie der Strunk, zart = zottenhaarig, gelb = braun. Stacheln meist einfarbig. Wächst an Fichtenzapfen.

13. *Hydnum orientale* Fries. (*H. Auriscalpium* Lour.)

Der ganze Körper milchweiß. Hut halbkuglig, flach, glatt. Strunk kurz, flach. Wächst an Baumwurzeln in Cochinchina.

14. *Hydnum adustum* Schweinitz.

Hut lederartig, nierenförmig, zottenhaarig, rindig, am Rande mit einer braunen Binde. Stacheln schwärzlich. Wächst in Carolina.

15. *Hydnum gelatinosum* Scopoli. (*H. cristallinum* Müll. fl. dan. *H. pusillum* Brot. sind Varietäten.)

Hut fleischig = gallertartig, blasig, braun = oder weißlich =

blaulich. Stacheln weich, weißlich. Strunk kurz, dick, graulich. Wächst an Baumstämmen.

III. Sessila. Hut ausliegend, ohne Strunk.

† Recta depressa. Hut gerade, die Oberfläche niedergedrückt.

16. *Hydnum erinaceus* Bull.

Körper herzförmig, fleischig, weiß. Hut faserig = zerrissen, inwendig gegittert. Stacheln sehr lang, hängend. Wächst an Baumstämmen.

17. *Hydnum cirratum* Pers. (Abbild. Fl. dan. 1789. f. 2.)

Hut halbrund, fast lappig, fleischig, blaß, oben mit kleinen zerstreuten Schuppen und Stoppenhaaren besetzt. Stacheln sehr lang, einfarbig. Wächst an Baumstämmen. (*H. paradoxum* Schultz et *diversitens* Fr. sind Varietäten.)

18. *Hydnum papyraceum* Wulffen. Papierartiger Stachelschwamm.

Hüte, mehrere dachziegelförmig über einander liegend, häutig, schneeweiß, glatt. Stacheln nadelförmig, einfach oder vielspaltig. Wächst an Baumstämmen in Kärnten.

19. *Hydnum pendulum* Alb. et Schw.

Hüte wie Dachziegeln über einander liegend, convex, häutig, gefaltet, an einander gedrückt = schuppig, gelb = weißlich. Stacheln zerrissen, schmutzig, in entfernten Reihen. Wächst auf Fichtenholz. *Sistotrema conchatum* Ehrenb. *Hydnum crispum* Schöff. sind Varietäten.

20. *Hydnum strigosum* Swartz. (*H. parasiticum* Pers.)

Hut lederartig, gerunzelt, schuppig = strieglich, schwärzlich. Stacheln lang, aschgrau. Wächst an Baumstämmen.

21. *Hydnum ochraceum* Pers. Ocherfarbiger Stachelschwamm.

Körper weissschweißig = zurückgeschlagen. Hut fast lederartig, runzlich, gegürtelt, ocherfarbig. Stacheln sehr klein, gedrängt stehend, fleischig. Wächst an Baumstämmen. (*H. minutum* Schum Fl. dan. 1789. f. 1. ist eine Varietät.)

22. *Hydnum fusco-violaceum* Fries. (*Sistotrema* Ehrenb.)

Hüte, mehrere wie Dachziegeln über einander liegend, fleischig = flockig, braun = violett, gegürtelt, fast filzig, am Rande faserig, gezähnt, eingeschnitten. Wächst auf Fichtenholz.

† Resupinata. Umgewandt; verkehrtliegend.

* *Aculeis integris aequalibus*.

23. *Hydnum macrodon* Pers.

Körper gelbroth. Stacheln schief, sehr lang, hängend.
Wächst auf Fichtenholz.

24. *Hydnum membranaceum* Bull. Häutiger Stachelschwamm.

Körper ästig-weitschweifig, zart, glatt, feuergelb-rothfarbig. Stacheln in der Mitte gerade. Wächst auf Fichtenholz.

25. *Hydnum ferrugineum* Pers. Rothfarbiger Stachelschwamm.

Körper weitschweifig, filzig, rothfarbig. Stacheln gespitzt, meist ungetheilt. Wächst auf Baumstämmen.

26. *Hydnum sulfureum* Schwägr. Schwefelgelber Stachelschwamm.

Körper ästig-weitschweifig, zart, schwefelgelb, am Rande durchscheinend. Stacheln sehr klein, fast fehlend. Wächst in Carolina an Baumstämmen.

27. *Hydnum Pinastris* Fr.

Körper ästig-weitschweifig, blaßgelb, der Rand durchscheinend. Stacheln schief stehend, pfriemenspizig, glatt. Wächst auf Fichtenholz.

28. *Hydnum fragile* Pers. Zerbrechlicher Stachelschwamm.

Körper häutig, weiß. Zähne (Stacheln) pfriemenspizig, sehr lang, zerbrechlich, knieartig gebogen.

29. *Hydnum fasciculare* Alb. et Schw.

Der Hut fehlt. Stacheln weiß, gebüschelt, hängend. Wächst an Baumstämmen und faulem Holze.

30. *Hydnum diaphanum* Schrad.

Körper weitschweifig, häutig, durchscheinend, glatt. Stacheln weiß, pfriemenspizig. Wächst an Baumstämmen.

31. *Hydnum obtusum* Schrad.

Körper häutig, weiß. Stacheln kurz, stumpf, weiß, an der Spitze zottenhaarig. Wächst an Buchenstämmen.

32. *Hydnum farinaceum* Pers.

Körper weitschweifig, krustenförmig, blaß, fast durchscheinend. Stacheln weiß, sehr zart, feinspizig, meist entfernt stehend. Wächst an Baumstämmen.

** *Aculeis compressis subincisis, variis s. angulatis*. Stacheln zusammengedrückt, fast eingeschnitten oder eckig.

33. *Hydnum Boltonii* Spr (Boletus obliquus Bolt. fung. t. 74.)

Körper lederartig, schmutzig, gelblich. Zähne (Stacheln)

zusammengebrüdt, stumpf, schief, abgestutzt. Wächst auf Baumrinden.

34. *Hydnum Barba Jovis* Bull. Bartiger Stachelschwamm. Körper ausgebreitet, filzig, blaß. Stacheln walzenrund, filzig, an der Spitze bartig, pomeranzen gelb. Wächst an Baumstämmen.

35. *Hydnum fimbriatum* Cand. Gefranzter Stachelschwamm. Körper ausgebreitet, häutig, fast gerippt, incarnat-gelb-
roth, am Rande gefranzt. Stacheln körnerig, dann vielspal-
tig. Wächst an Baumstämmen.) *Sistotrema fimbriata* Pers.)
H. cristulatum et *subtile* Fr. sind Varietäten.

36. *Hydnum viride* Fr. (*Sistotrema viridis* Alb. et Schw.) Körper ausgebreitet, filzig, sehr weich, grün. Stacheln aufrecht, kegelförmig, fast eingeschnitten. Wächst auf Eichenholz.

37. *Hydnum quercinum* Fr. (*H. candidum* Willd. *Sistotrema querc.* Pers.)

Dieser Schwamm wächst auf Eichenholz, ist ausgebreitet, glatt, blaß-weiß. Stacheln fast aneinander gedrückt, dick, weiß, eingeschnitten. (*H. Pseudo-Boletus* Cand. ist eine Varietät.)

38. *Hydnum fagineum* Fr.

Körper fast ausgebreitet, glatt, weiß- oder blaßgelb. Stacheln gehäuft stehend, lang, verbunden-gebüschelt, stumpf, ungetheilt. Wächst an Buchenstämmen in dichten Wäldungen in Deutschland, bei Eisenach u. a. G.

39. *Hydnum spathulatum* Schrad. (*Sistotrema spathulata* Pers.)

Körper ausgebreitet, weiß. Stacheln dicht stehend, spatelförmig, an der Spitze filzig. Wächst auf Tannenstämmen.

40. *Hydnum argutum* Fr.

Körper ausgebreitet, weiß, filzig. Stacheln schief, gespißt, sägezähnig. Wächst auf Birkenholz.

Hydrangea Linn. *Hydrangea*. Kennzeichen der Gattung siehe Lexic. B. 4. (Gaertn. fruct. t. 30.)

Decandria Digynia (Familie *Ericaceae*.)

1. *Hydrangea anomala* Wallich. Stengellose *Hydrangea*.

Stengel strauchig. Blätter eiförmig, langgespißt, buchtig-gezähnt, fast nackt, nur die Rippen und Stiele behaart. Blumen gleichförmig, in gipfelständige behaarte Ästerröschen gesammelt. Waterl. Nepal. H

2. *Hydrangea cordata* Michx. Herzförmige Hydrangea.

Blätter fast herz = eysförmig, langgespitzt, grob gezähnt, unten glatt. Blumen in Astersolden gesammelt, die fast gestrahlt sind. Waterl. Carolina.

3. *Hydrangea hortensis* Smith ic. pict. 12, Curt. Bot. Mag. 438. (*Viburnum virens* et *serratum* Thunb. *Primula mutabilis* Lour. *Hortensia opulifolia* Lam. *H. speciosa* Persoon. Hierher gehört: *Hortensia mutabilis* Schneck. ic. 36.)

Blumen in sehr große reiche gestrahlte gipfelständige Asters oder Trugdolden gesammelt; die Zwitterblümchen sind klein, gestielt, und stehen einzeln in den untern Theilungswinkeln der Astersolde.

Diesen allgemein bekannten und beliebten Zierstrauch, der auch durch die Kunst zu einem kleinen Baum gezogen werden kann, habe ich im Verikon B. 4. unter dem Namen *Hortensia mutabilis* genau beschrieben und eine Anleitung zur Kultur beigelegt, auch in einer kleinen Schrift: „Der Wintergärtner 2c.“ fünfte Auflage. Ulm b. Ebner 1853. die Mittel angegeben, wodurch die rothen Blumen in blaue verwandelt werden können.

Die prächtige Hydrangea kommt aus China und Japan und wird in Deutschland in Glashäusern und ähnlichen frostfreien Behältern überwintert, doch hält sie auch in milden Climaten unter einer guten Bedeckung die Winter im Freien aus. Im hiesigen bot. Garten sind einige Exemplare von dieser schönen Hydrangea im freien Lande in Gruppen zusammengestellt; die Stengel werden im Spätherbst von den Blättern befreit, mit Hacken auf die Erde befestiget, dann 1—2 Fuß hoch mit trockener Laube (Baumblättern) bedeckt. Auf diese Laubdecke wird ein Dach von Stroh oder Brettern gestellt um Nässe und Frost abzuhalten.

4. *Hydrangea nivea* Michx. Weißblättrige Hydrangea.

Blätter eysförmig, langgespitzt, gezähnt, die Zähne mucronenspizig, unten schneeweiß = filzig. Blumen in gestrahlte Astersolden gesammelt. Zu dieser Art gehört: *Hydrangea radiata* Walter f. Lexic. 1. Aufl. B. 4. S. 703. und *H. glauca* Hortul. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 30. Waterl. Carolina und Louisiana. h

5. *Hydrangea quercifolia* Bart. f. Lexic. B. 4. Eichensblättrige Hydrangea.

H. radiata Smith ic. pict. p. 12. (non Walt.)

Stengel strauchig, 3—5 Fuß hoch. Blätter länglich, buchtig-gezähnt, gerunzelt, unten filzig, die Stiele und Rippen braun. Blumen in gipfelständige gestrahlte Rispen gesammelt. Die Strahlblümchen unfruchtbar, viertheilig, rosenroth und grünlich-weiß; die fruchtbaren viel kleiner als die Strahlblümchen, an den Aesten der Rispe zahlreich, gebüschelt. Vaterl. Georgien und Kolrida. H (Abbild. Bot. mag. t. 975.) Im hiesigen bot. Garten blüht diese Art von April — Juni und wird im Glashause überwintert.

6. *Hydrangea heteromala* Wallich.

Stengel strauchig. Blätter länglich, langgespitzt, sägeartig gezähnt, unten filzig. Asterdolden gestrahlt, weitschweifig, sehr ästig, behaart, die Strahlblümchen ungetheilt. H

7. *Hydrangea aspera* Don. Scharfe Hydrangea.

Stengel strauchig. Aeste filzig. Blätter lanzettförmig, langgespitzt, sägeartig gezähnt, unten mit grauem Filze dicht bekleidet. Blumen in gestrahlten Doldentrauben, die weitschweifige Rispen bilden. Strahlblümchen eysförmig, mucronenspitig, sägerandig. Vaterl. Nepal. H

Kultur im Allgemeinen. Die Hydrangen sind Biersträucher, deren Blätter einander gegenüber, die Blumen in Asterdolden oder Rispen stehen. Alle lieben guten nährhaften Boden und werden auf die bekannte Art und Weise durch Stecklinge vermehrt.

Synonymen.

Hydrangea glauca Hortul. f. *Hydrangea nivea* N. 4.

— radiata Walt. f. *Hydrangea nivea* N. 4.

— radiata Smith. f. *Hydrangea quercifolia* N. 5

Hydranthelium callitrichoides Kunth ist *Willichia* Spr.

Hydrastis Linn. f. Lexic. 1. Aufl. B. 4.

Keich corollinisch, dreiblättrig. Keine Nectarien. Staubfäden zahlreich, bodenständig. Griffel zahlreich. Karpopien (Echaalsaamen) beerartig, einsamig, zusammenhängend.

Polyandria Polygynia (Familie Ranunculaceen.)

1. *Hydrastis canadensis* Linn. (*Warneria canadensis* Mill.)

Wurzel knollig, gelb. Stengel krautartig. Blätter gestielt, 2—3 zählig, handförmig. Blättchen eingeschnittensägerandig. Blumen röthlich, gestielt, einzeln stehend. Früchte roth, den Himbeeren gleichend. Vaterl. Nordamerika. 4

Hydro-

Hydrocleis Commers. ist *Limnocharis Commersonii* Spr.
Hydrococcus rivularis Kz. f. Schlechtend. *Linnaea* B.
 8. Heft 3. S. 380.

Hydrocoryne Schwab.

Laub keulenförmig, fast schwammig, gallertartig, die Fäden sehr zart, verwirrt.

Cryptogamia Sect. IV. (Familie Tremelloideen.)

1. *Hydrocoryne spongiosa* Schwab.

Eine schmutzig grüne Alge, deren keulenwurmförmige Theile zusammengesetzt und dicht in einander geschlungen (verwirrt) sind. Sie findet sich an überschwemmten Orten und Teichen.

Hydrocotyle Linn. Wassernabel f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 31.

Dolben einfach. Hülle vier- oder mehrblättrig. Corollensblätter 5, gleich, gespitzt, ganz. Staubfäden 5. Griffel 2, ausgesperret. Narben fast kopfförmig. Früchte fast kreisrund, oder linsen- nierenförmig, zusammengedrückt, auf dem Rücken mit drei Rippen versehen; bei einigen Arten ist die Fruchtrinde stark netzförmig geadert.

Pentandria Digynia (Familie Doldenpflanzen; *Hydrocotylinen*.)

Diese Gattung enthält jetzt einige 60 Arten. Es sind krautartige, ästige, kriechende oder aufrechte Pflanzen, die in ihrer Wildniß theils in Wässern und an überschwemmten Orten, theils an feuchten Stellen wachsen. Einige Arten sind strauchig oder staudenstrauchig. Bei den krautartigen sind die Blumenstiele oft wurzelständig. Blumen weiß oder roth.

I. **Foliis peltatis.** Blätter schildförmig.

Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Lexikon und ersten Nachtrage beschriebenen Arten: *H. vulgaris*, *umbellata* Linn. *H. bonariensis* Lam. und folgende.

† **Foliis indivisis.** Blätter schildförmig, ungetheilt.

1. *Hydrocotyle pusilla* Richard. Kleiner Wassernabel.

Blätter kreisrund, undentlich gekerbt, wenig behaart. Blumen in gestielten Dolben, weiß. Vaterl. Monte Video.

2. *Hydrocotyle polytachya* Rich. ist *H. tribotrys* Ruiz et Pav. f. 1. Nachtr. B. 4.

Blätter kreisrund, gekerbt, glatt. Blumen in quirlförmigen Dolben.

3. *Hydrocotyle interrupta* Mühlenb.

Blätter kreisrund, doppelt gekerbt. Blumen quirlständig, Dietr. Ber. 2r. Nachtr. IV. Bd. S i

und bilden fast ästige unterbrochene Aehren. Wächst in Sumpfen und Gräben in Pensylvanien und Carolina. 4

† Foliis lobatis. Blätter schildförmig, gelappt.

H. gracilis, *quinqueloba* R. et P. f. 1. Nachtr. gehören hierher und folgende.

4. *Hydrocotyle Humboldtii* Rich. Quittoischer Wassernabel.

Blätter freisrund, sechsappig, zottenhaarig, die Lappen gespitzt, sägerandig. Dolden wurzelständig, gestielt, vielblümig. Vaterl. Quito. 4

5. *Hydrocotyle aconitifolia* Rich. Aconitumblättriger Wassernabel.

Blätter siebenlappig, glatt, die Lappen gespitzt, eingeschnitten = sägezähnig. Dolden gestielt, wurzelständig, vielblümig, abstehend. Vaterl. Peru an Gräben und überschwemmten Orten. 4

6. *Hydrocotyle Barbarossa* Schlechtend. Barbarossas Wassernabel.

Stengel krautartig, Wurzeln treibend. Blätter freisrund, achtlappig, die Lappen gekerbt, mit gelbrothen Borstenhaaren bekleidet. Dolden langgestielt, vielblümig. Vaterl. Brasilien. 4

7. *Hydrocotyle Asterias* Schlechtend. Niederliegender warziger Wassernabel.

Stengel krautartig, niederliegend. Blätter 3—5 lappig, gestielt, wenig behaart, die Lappen lanzettförmig, doppelt sägezähnig. Dolden lang gestielt, vielblümig. Früchte warzig. Vaterl. Brasilien. 4

II. Foliis cordatis, reniformibus. Blätter herzförmig oder nierenförmig.

Hierher gehören die im Verison und ersten Nachtrage beschriebenen Arten: *H. asiatica* Linn. *H. repanda* Pers. *H. globiflora* R. et P. und folgende.

† Foliis crenatis s. dentatis. Blätter gekerbt oder gezähnt.

8. *Hydrocotyle nummularioides* Richard. Münzblättriger Wassernabel.

Stengel gestreckt, wurzelnd, kriechend. Blätter herznierenförmig, gekerbt, glatt. Blumenstiele einblümig, kürzer als die Blätter. Vaterl. Mascaren = Insel. 4

9. *Hydrocotyle glechomoides* Rich. Glechomaartiger Wassernabel.

Blätter herz-eiförmig, stumpf, fast gekerbt, zottenhaarig. Blumenstiele einblümig. Früchte zottenhaarig. Wächst im Magellanen-Land.

10. *Hydrocotyle dentata* Rich. Gezählter Wassernabel.

Blätter nierenförmig, gezähnt, glattlich. Blumenstiele dreiblümig. Vaterl. Mascaren-Insel.

11. *Hydrocotyle eriantha* Rich. (H. reniforme Thunb.)

Stengel aufrecht. Blätter gestielt, nierenförmig, gezähnt, glatt, die Stiele an der Basis ausgebreitet. Blumenstiele gehäuft, wenigblümig. Hülle vierblättrig, zottenhaarig. Vaterl. Kap der guten Hoffn., 4

12. *Hydrocotyle plebeja* R. Brown.

Blätter gestielt, nierenförmig, doppelt gekerbt, glatt, die Stiele an der Basis mit Ackerblättern versehen. Blumenköpfchen vielblümig, gestielt. Vaterl. Neuholand.

13. *Hydrocotyle abbreviata* Rich. Abgekürzter Wassernabel.

Blätter sehr breit, nierenförmig, an der Spitze abgekürzt, wie abgebissen, undeutlich gekerbt, glatt. Blumenstiele gehäuft stehend. Köpfchen wenigblümig. Vaterl. Madagascar. 4

14. *Hydrocotyle leucocephala* Schlechtend. Weißköpfiger Wassernabel.

Stengel krautartig, wurzelnd. Blätter nieren-kreisförmig, fast grippig, doppelt gezähnt, auf beiden Seiten wenig behaart. Dolden kugelförmig, vielblümig. Früchte glatt. Vaterl. Brasilien. 4

15. *Hydrocotyle spicata* Lam. ist H. hirsuta Swartz. f. Lexic. 1. Aufl. B. 4.

Stengel krautartig, wie die Blätter rauchhaarig. Blätter nieren-herzförmig, gekerbt. Blumen geknaut und bilden lange unterbrochene Aehren. Vaterl. Domingo in Waldbergen. 4

16. *Hydrocotyle leptostachys* Rich.

Blätter herz-nierenförmig, oben behaart, unten glatt. Blumen in dünnen unterbrochenen wenigblümigen Aehren, die so lang als die Blätter sind. Vaterl. Cuba und Jamaika.

17. *Hydrocotyle Bonplandii* Rich. Neugranadischer Wassernabel.

Stengel kriechend. Blätter nierenförmig, feingekerbt, behaart. Dolden gestielt, etwas ausgebreitet. Wat. Neugranada. 4

18. *Hydrocotyle Thunbergiana* Spr. ist H. natans Thunb. f. Lexic. 1. Aufl. B. 4.

Blätter nieren-herzförmig, fast gekerbt, glatt. Dolben
stiellos, vielblümig, abgekürzt. Wächst auf d. Kap d. g.
Hoffu. in Bächen und stehenden Wässern.

+++ Foliis angulatis, obsolete lobatis.

Blätter eilig, undeutlich gelappt.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon und 1. Nach-
trage beschriebenen Arten: *H. americana* Linn. *H. in-*
crassata, *citriodora* R. et P. und folgende.

19. *Hydrocotyle moschatus* Forst. Bisamduftender Was-
sernabel.

Stengel krautartig. Blätter nierenförmig, fünfeckig, ge-
zähnt, borstig-behaart. Blumenköpfschen gestielt, sitzig. Wa-
terl. Neuzeeland. *H. moschata* Forst. wird im Lexic.
1. Aufl. ausgestrichen.

20. *Hydrocotyle compacta* Rich. Compacter Wassernabel.

Blätter nieren-kreisförmig, fast gelappt, gekerbt, sitzig,
kurzgestielt. Blumenköpfschen gestielt, compact, vielblümig.
Waterl. Neuzeeland und Neu-Caledonia.

21. *Hydrocotyle heteromeria* Rich.

Blätter langgestielt, nierenförmig, undeutlich gelappt, ge-
kerbt, glatt. Blumenköpfschen gestielt. Früchte warzig. Wa-
terl. Neuzeeland.

22. *Hydrocotyle capitata* Thuars. (*H. hispida* Hamilt.
Don. *H. hirta* R. Br. *H. nepalensis* Hooker.)

Blätter nieren-kreisförmig, undeutlich gelappt, gekerbt,
wie der Stengel scharfborstig. Blumenköpfschen kugelförmig,
vielblümig, kurzstielig. Waterl. Neuholland und Nepal.

23. *Hydrocotyle peduncularis* R. Br. Langstieliger Was-
sernabel.

Blätter klein, nierenförmig, undeutlich gelappt-gezähnt,
sitzig. Blumenköpfschen gestielt, wenigblümig. Waterl. Neu-
holland. 24

24. *Hydrocotyle alchemilloides* Rich. Schwefelfußartiger
Wassernabel.

Blätter nieren-kreisförmig, fast lappig, gekerbt, behaart.
Dolben gestielt, vielblümig, abstehend. Waterl. Peru. 24

++++ Foliis lobatis. Blätter lappig, ober getheilt.

Hyd. ranunculoides Linn. *sibthorpioides* (s. Lexic.
und 1. Nachtr.) und folgende.

25. *Hydrocotyle tripartita* R. Br. Dreitheiliger Wassernabel.

Stengel und Blätter behaart. Blätter breitkeilig, die Lappen keilsförmig, eingeschnitten = gezähnt, die seitenständigen fast gespalten. Blumenköpfchen wenigblümig. Waterl. Neuhoiland.

26. *Hydrocotyle intertexta* R. Br.

Stengel und Blätter glatt. Blätter fast nierenförmig, unregelmäßig, 3—5 lappig, die Lappen gezähnt. Blumenköpfchen kurzgestielt. Waterl. Neuhoiland.

27. *Hydrocotyle pulchella* R. Br. Biertercher Wassernabel.

Blätter nierenförmig, fünflappig, die Lappen dreizählig. Blumenköpfchen gestielt. Waterl. Neuhoiland.

28. *Hydrocotyle elegans* R. Br. Hübscher Wassernabel.

Stengel und Blätter glatt. Blätter nierenförmig, fünflappig, die Lappen gespitztgezähnt. Blumenköpfchen wenigblümig. Waterl. Neuhoiland.

29. *Hydrocotyle grossularioides* Rich. Stachelbeerblättriger Wassernabel.

Blätter nierenförmig, fünflappig, die Lappen keilsförmig, doppelt = sägezählig. Blumenköpfchen gestielt, kugelförmig. Waterl. Mascaren = Insel.

30. *Hydrocotyle macrodus* Spr. (*H. moschata* Thunb. non Forst.)

Stengel und Blätter behaart. Blätter herz = nierenförmig, siebenlappig, die Lappen gespitzt, gleich, ganzrandig. Dolde wenigblümig, fast kopfförmig. Hülle zweiblättrig, groß. Waterl. Kap d. g. Hoffn. *Hyd. calliodus* Schlechtend. ist eine Varietät, deren Stengel und Blätter glatt sind.

31. *Hydrocotyle Chamaemorus* Schlechtend. Chilischer Wassernabel.

Stengel kriechend. Blätter nierenförmig, siebenlappig, gerippt, doppelt gefeibt, glatt. Blumenstiele kurz, wie die Blattstiele mit scharfen rückwärts stehenden Borsten besetzt. Dolden kopfförmig, vielblümig. Früchte harzig = punktiert. Waterl. Chili. 4

32. *Hydrocotyle javanica* Thunb. Javanischer Wassernabel.

Stengel und Blätter glatt. Blätter nieren = kreisförmig, siebenlappig, die Lappen eckig, gespitzt, gefeibt. Blumenköpfchen gestielt, kugelförmig, vielblümig. Hülle vielblättrig. Waterl. Java. 4

33. *Hydrocotyle nitidula* Rich. (*Hyd. eymbalarifolia* Mühlenb.)

Stengel und Blätter glatt. Blätter fast nieren-freisförmig, 5—7 lappig, die Lappen dreizählig. Blumentöpschen gestielt.

34. *Hydrocotyle geranioides* Rich. Storchschnabelartiger Wassernabel.

Stengel und Blätter rauchhaarig. Blätter groß, freis-hertzförmig, lappig, die Lappen stumpf, gekerbt. Dolden gestielt, vielblümig, abstehend. Waterl. Peru. 24

35. *Hydrocotyle natans* Cyr. (nec. Thunb.) Schwimmender Wassernabel.

Stengel und Blätter schwimmend, glatt. Blätter nierenförmig, viellappig, die Lappen stumpf, gekerbt. Dolden kurz gestielt, wenigblümig. Waterl. Neapel. 24

III. Foliis hastatis. Blätter spießförmig.

36. *Hydrocotyle alata* Rich. Geflügelter Wassernabel.

Stengel krautartig, aufrecht, geflügelt, wie die Blätter glatt. Blätter spießförmig, eckig. Dolden gestielt, wenigblümig. Waterl. Neuholand.

IV. Foliis cuneiformibus s. oblongis, lanceolatis, linearibus.

Blätter keilförmig, länglich, auch lanzett- oder linienförmig.

Hyd. solandra, glabrata, linifolia, virgata, chinensis Linn. f. Lexic. gehören hierher und folgende.

37. *Hydrocotyle tridentata* Linn. Dreizähliger Wassernabel.

Stengel strauchig, aufrecht, filzig. Blätter keilförmig, schmal, an der Spitze dreizählig, filzig. Blumenstiele gehäuft, winkelförmig, einblümig. Waterl. das Kap d. g. Hoffn. h Die kurze und undeutliche Beschreibung im Lexic. erste Aufl. B. 4. S. 607. wird ausgestrichen, auch die folgende Art.

38. *Hydrocotyle triloba* Thunb. f. Lexic. 1. Aufl.

Stengel strauchig, aufrecht, glatt. Blätter breit, keilförmig, lederartig, an der Spitze wie abgebissen, dreizählig, fast dreilappig. Blumentöpschen dreiblümig. Waterl. Kap d. g. Hoffn. h

39. *Hydrocotyle plantaginea* Spr. Kletternder Wassernabel.

Stengel kletternd, behaart. Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, ganzrandig, dreirippig. Blumenstiele winkelförmig, fast einzeln. Waterl. Kap d. g. Hoffn.

40. *Hydrocotyle bupleuroides* Rich. Bupleurumartiger Wassernabel.

Stengel staudenstrauchig, gestreckt, glatt. Blätter länglich-umgekehrteiförmig, ganzrandig, dreirippig. Blumenstiele dreiblümig. Waterl. Kap d. g. Hoffn. h

V. Foliis compositis. Blätter zusammengesetzt.

41. *Hydrocotyle muscosa* R. Br.

Stengel und Blätter behaart. Blätter fünfzählig = gefingert. Blättchen keilsförmig, fast gezähnt. Blumentöpfchen gestielt, wenigblümig. Waterl. Neuhollland.

42. *Hydrocotyle multifida* Rich. Vielspaltiger Wassernabel.

Blätter fünfzählig = gefingert. Blättchen meist dreilappig, stumpf, unten wie die Eriale feinborstig. Dolden gestielt. Hüllblättchen eiförmig. Waterl. Neugranada.

43. *Hydrocotyle ambigua* Pursh.

Wurzelblätter zusammengesetzt. Dolden gestielt, meist dreiblümig. Waterl. Louisiana.

44. *Hydrocotyle composita* Pursh. Zusammengesetzter Wassernabel.

Hyd. bipinnata Mühlenb. Sison halbosum Michx. Erigenia bulbosa Nuttall.

Wurzel knollig = zwiebelartig. Stengel aufrecht, einfach, zweispaltig. Blätter meist vierzählig. Blättchen keilsförmig, fast eingeschnitten, glatt. Dolden wenigblümig. Waterl. Nordamerika. 24

Kultur im Allgemeinen s. 1. Nachtr B. 4. S. 34. Die Arten, welche in Tropenländern wild wachsen, gedeihen am besten in warmen Häusern; die wasserliebenden pflanzt man in Wasser- oder Sumpfbehälter zc. Die Sumpfliebenden in Blumentöpfe, die in Untersäße (Näpfe) gestellt werden.

Synonymen.

Hydrocotyle bipinnata Mühl. s. *Hydrocotyle composita* N. 44.

— *calliodus* Schlechtend. s. *Hydrocotyle macrodus* N. 30

— *cymbalarifolia* s. *Hydrocotyle nitidula* N. 33.

— *hispida* Hamilt. s. *Hydrocotyle capitata* N. 22.

— *lineata* Michx. s. 1. Nachtr. ist *Hydrocotyle chinensis* Lexic.

— *modesta* Schlechtend. ist *Hydrocotyle umbellata* Lexic.

— *moschata* Thunb. s. *Hydrocotyle macrodus* N. 30.

- Hydrocotyle multiflora* R. et P. ist *Hydrocotyle bonariensis* Lexic.
 — *natans* Thunb. f. *Hydrocotyle Thunbergiana* N. 18.
 — *nepalensis* Hook. f. *Hydrocotyle capitata* N. 22.
 — *reniforme* Walt. ist *Hydrocotyle repanda* 1. Nachtr.
 — *saniculaefolia* Lam. ist *Spananthe saniculaefolia* 1. Nachtr.
 — *tenella* Don. ist *Hydrocotyle sibthorpioides* 1. Nachtr.
 — *tomentosa* Thunb. Linn. fil. ist *Hydrocotyle solandra*.

Zu den vorstehenden Synonymen gehören noch einige, welche ich im 1. Nachtrage B. 4. S. 35. angezeigt habe.

Hydrodicton Roth. *Conversa* Linn. Vell.

- *pentagonum* Vauch. ist *Conversa reticulata* Linn.
 — *umbilicatum* Ag. ist *Conversa umbilicata* Vell.

Hydrogeton Pers.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 35.

Kein Kelch. Corolle dreiblättrig. Staubfäden 6, an der Basis erweitert (ausgebreitet). Drei einfache Griffel. Kapseln 3, häutig, zweisaamig, und öffnen sich seitlich nach innen.

Hexandria Trigynia (Familie Hydrochariden.)

1. *Hydrogeton fenestralis* Pers. (*Ouvirandra* Thuars.)

Blumenschaft vieljährig, in der Mitte aufgeblasen. Blumen roseuroth. Uebrigens f. 1. Nachtrag. Da diese Pflanze in Madagascar in Wässern wächst, so muß sie in unsern Gärten in einen Wasserbehälter, der in einem warmen Hause angelegt ist, oder in ein anderes wasserhaltendes Gefäß gepflanzt werden.

Hydrogeton heterophyllum Lour. f. *Potamogeton octandrus* Poir.

Hydroglossum Willd. ist *Lygodium* Swartz f. 2. Nachtr.

Hydrolea Linn. Kleber. f. Lexic. B. 4. (Abbild. Gaertn. Sem. t. 55.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 35.

Kelch fünfstheilig, stehen bleibend. Corolle glocken- oder

radbförmig, meist fünfspaltig. Staubfäden 3, eingeschlossen, an der Basis ausgebreitet (flach). Antheren pfeilsförmig, 2, selten 3 Griffel. Narben abgestutzt. Kapsel 2—3 fächerig, viel-saamig. Scheidewand verdickt.

Pentandria Digynia (Familie Hydroleen.)

1. *Hydrolea corymbosa* Macbr. Doldentraubiger Kleber.

Stengel unbewaffnet, glattlich. Blätter lanzettförmig. Blumen in gipfelfständige Doldentrauben gesammelt. Kelche scharfborstig, kürzer als die Corolle. Staubfäden so lang als die Corolle. Waterl. Carolina.

2. *Hydrolea inermis* Lour. Chinesischer Kleber.

Stengel unbewaffnet, sehr einfach, wie die linien-lanzettförmigen Blätter glatt. Blumenstiele winkelfständig, einblüsig. Waterl. das südliche China. ☉?

3. *Hydrolea elatior* Schott.

Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden *H. corymbosa* am meisten durch den höhern Stengel und durch scharfborstige Kelche.

4. *Hydrolea megapotamica* Spr.

Stengel krautartig, drüsig-zottenhaarig. Blätter lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt, behaart. Blumen in gipfelfständige Doldentrauben gesammelt. Waterl. Rio grande.

Kultur im Allgemeinen s. Lexikon und 1. Nachtrag.

Synonymen.

Hydrolea crispa R. et P. f. 1. Nachtr. B. 4. ist *Wigandia crispa* Kunth.

— *mollis* Willd. herb. ist *Wigandia caracasana* Kunth.

— *quadrivalvis* Walt. f. *Hydrolea caroliniana* I. Nachtr.

— *trigyna* Swartz f. Lexic. ist *Hydrolea spinosa* Linn. var. f. Lexic.

— *urens* R. et P. f. 1. Nachtr. ist *Wigandia urens* Kunth.

Hydromystria Meyer in *Primitiae Flor. essequiboensis* p. 152.

Flor. hermaphr. Calyx 3—phyllus. Cor. 3—petala.

Flor. fem. Calyx subtubulosus, 3—partitus. Styli 12.

Cor. squamae 3. Caps. ovata 1—locularis. Meyer.

Blumen mandisch. Kelch dreiblättrig, gefärbt. Corolle:

dreiblättrig, die Blätter zart, linien-lanzettförmig, absehend. Staubfäden 6, sehr kurz. Antheren viel^r länger als die Staubfäden, lanzettförmig. Griffel 3, pfriemenförmig, behaart. Kapsel eiförmig, einfächerig.

Hexandria Trigynia (Familie Juncaceae.)

1. *Hydromystria stolonifera* Meyer. Sprossende Hydromystria.

Wurzel gebüschelt = sprossend, die Stolonen (Sprossen) 3—4 Zoll lang, so dick wie ein Gänsefuß, an der Spitze Wurzeln treibend. Blätter gestielt, fleischig, rundlich-eiförmig, ganzrandig, flachlich, 1 Zoll lang, 8—9 Linien breit, unten gerippt = punktiert, glänzend. Schäfte 3—5, wurzelständig, kürzer als die Blattstiele, dünn, einblümig, unter der Blume etwas stärker als unten, weiß. Blume klein, weiß.

Diese krautartige Pflanze wächst in Surinam in Guiana in stehenden Wässern und Sümpfen, blüht daselbst im August. In unsern bot. Gärten pflanzt man sie in einen ihrer Größe angemessenen Blumentopf und stellt diesen ins warme Haus, und zwar in einen Untersatz, der mit Fluß- oder Regenwasser gefüllt wird.

Hydropeltis purpurea Michx. siehe 1. Nachtrag B. 4. hierher gehört *Brasenia peltata* Pursh.

Kelch und Corolle dreiblättrig. Staubfäden bodenständig. Kapseln zahlreich, zweisaamig s. 1. Nachtr.

Hydrophora minima Tod. ist *Mucor aquosus* Mart.

Hydrophyllum Linn. Rinnenblume s. Lexic. 1. Auf. (Abbild. Gaertn. Sem. t. 110.)

Kelch fünfstheilig. Corolle glockenförmig, fünfspaltig und hat inwendig fünf rinnenförmige, fast röhrlige Nectarien. Staubfäden 5, hervorragend. Antheren länglich, gespalten. Griffel zweispaltig. Kapsel einfächerig, zweiflappig, vierisaamig.

Pentandria Monogynia (Familie Hydrophyllaceae; Asperifoliae.)

1. *Hydrophyllum virginicum* Linn. Virginische Rinnenblume; Wasserblatt.

Wurzelblätter gestielt, fiederspaltig, die Einschnitte eiförmig, sägerandig. Blumenstiele länger als die Blattstiele, traubig. Blumen weiß-grünlich. Kapsel zweiflappig. Samen kugelförmig. Vaterl. Virginien. 4 Blüthz. Junius. (Abbild. Schumbr. Handb. t. 35.)

2. *Hydrophyllum canadense* Linn. Canadische Rinnenblume.

Wurzel ästig = faserig. Blätter gestielt, herzförmig, fünflappig = ectig, gezähnt, glatt, die Stiele fast ectig, 10—14 Zoll lang, aufrecht; aus den Winkeln derselben entwickeln sich, sowie bei der vorhergehenden Art, die Blumenstiele, welche meist zweitheilig und kürzer als die Blattstiele sind. Blumen in zweitheiligen dichten Doldentrauben. Corollen weiß oder gelblich. Staubfäden hervorstehend, am Grunde zottenhaarig. Waterl. Nordamerika. 4 Blühz. im hiesigen bot. Garten, zu Ende Mai und im Juni.

Beide Arten wachsen in Nordamerika in feuchten Boden, gedeihen aber auch in unsern Gärten sehr gut unter freiem Himmel und werden durch Wurzeltheilung vermehrt.

Die unvollständige Charakteristik der Gattung Hydrophyllum so wie der beigefügten Arten kann im Lexikon erste Aufl. ausgestrichen werden.

Hydrophyllum appendiculatum Michx. f. 1. Nachtr. ist *Nemophila*.

— lineare Pursh. f. *Eutoca Menziesii* 2. Nachtr.

— magellanicum Lam. f. 1. Nachtr. ist *Phacelia circinata* Jacq.

Hydropityon Gaertn. Sem. t. 183. *Hydropityon*.

Reich fünflättrig. Fünf gerundete Corollenblätter. Staubfäden 10, dick, behaart. Antheren herzförmig. Kapsel einsächerig, fünflappig, viel-saamig.

Decandria Monogynia (Familie Caryophyllen. ?)

1. *Hydropityon ceylanicum* Gaertn. Seylonisches *Hydropityon*.

Hottonia indica Linn. f. Lexic. erste Aufl. B. 4. gehört hierher. Es ist eine niedrige krautartige Pflanze, deren quirlförmig stehende Blätter fiederspaltig sind. Blumen gestielt, einzeln, winkelftändig. Waterl. Seylon.

Hydrurus penicillatus Ag. ist *Coccochiores Myosurus* Spr.

Hygrocrocis atramenti Ag. ist *Conversa atramenti* Lyngb.

Hygromitra stipitata Nees. ist *Helvella viscosa* Spr.

Hygromitra tremella Nees. ist *Helvella lubrica* Scop.

Hygrophila Rob Brown. *Hygrophila*.

Reich röhrig, halb fünfspaltig, gleich. Corolle rachenförmig, zweilappig. Staubfäden 4. Antheren unbewehrt, die Fächer parallel. Kapsel viel-saamig, mit angewachsener Scheidewand.

Didynamia Angiospermia (Familie Acantheen.)

1. *Hygrophila formosa* Spr. ist *Ruellia formosa* Hum-

boldt, die ich im 1. Nachtrage B. 7. S. 300. besser und vollständiger beschrieben habe als Sprengel.

2. *Hygrophila ringens* R. Br. ist *Ruellia ringens* Linn. f. Lexic. B. 8.

3. *Hygrophila angustifolia* R. Br. Schmalblättrige Hygrophila. Stengel gestreckt. Blätter schmal, lanzett-linienförmig, ganzrandig. Blumen gehäuft, winkelförmig, mit gewimperten Bracteen versehen. Waterl. Neuholand.

4. *Hygrophila brasiliensis* Spr. (*Dicliptera tetrandra* Nees & Esenb.)

Stengel strauchig, ästig, behaart. Blätter länglich, ganzrandig, abwechselnd kleiner. Die Blumen bilden gipfelförmige, einseitige Aehren, die zottenhaarig sind. Bracteen eiförmig, feinspizig, dreirippig. Waterl. Brasilien. ♀

Kultur. N. 3. überwintert man im Glashause, die übrigen im warmen Hause. Sie lieben gute lockere Erde (Laub- oder Walderde) und lassen sich, außer den Saamen auch durch Stecklinge vermehren und fortpflanzen. *Hylogyne speciosa* Salisb. f. *Telopea speciosissima* 1. Nachtrag B. 9. S. 31., im 2. Nachtrag B. 3. S. 501. auch unter *Embothrium spathulatum* Cav. aufgeführt, aber so wie im Lexic. B. 3. nur kurz charakterisirt. Ausführlich ist die Diagnose bei *Telopea*.

- Hymenaea* Linn. Locustabaum f. Lexic. B. 4.

Kelch lederartig, röhrig, fast glockenförmig, der Rand 4—5 spaltig. Corolle fünfblättrig, ungleich, in die Kelchröhre eingefügt. Staubfäden 10, alle fruchtbar, frei stehend. Ein borstenförmiger Griffel. Narbe stumpf. Hülse holzig, einschäferig. Saamen in eine mehlig-breiige Substanz eingebettet.

Decandria Monogynia (Familie Hülsenpflanzen.)

1. *Hymenaea Candolleana* Kunth in H. et B. Nov. gen. et sp. pl. IV. p. 323. t. 566.

Stamm baumartig. Blätter gepaart. Blättchen lederartig, länglich, ausgekerbt, an der Basis ungleich, glatt, glänzend. Blumenstiele gipfelförmig, vielblümig. Blumen weiß, gestielt. Fruchtknoten gestielt, vielSaamig. Waterl. Mexico, bei Acapulco. ♀ Blüht daselbst im April.

2. *Hymenaea floribunda* Kunth J. c. IV. t. 567. Vielblümiger Locustabaum.

Blättchen lederartig, länglich, fast langgespitzt, stumpf, an der Basis ungleich, glatt. Blumen gestielt und bilden

winkelständige, ästige, vielblümige Rispen. Fruchtknoten stiellos, Hülse eiförmig, feinborstig, 1—2 saamig. Waterl. Guiana, zwischen Trapiche et Angosturam. ♀ Blühz. Juni.

Beide Arten sind Bäume, deren Blätter wechselnd stehen und gepaart sind. Die gemeinschaftlichen Blattstiele an der Basis mit gepaarten Afterblättern versehen. Blumen gestielt, gipfel- oder winkelständig, in wenigblümige Trauben oder Rispen gesammelt. Corollenblätter weiß. Hülse eiförmig oder länglich. N. 2. stellt man ins warme Haus. N. 1. nimmt auch mit Durchwinterung im Glashause vorlieb. Fortpflanzung durch Saamen in warmen Beeten.

Hymenanthera Rob. Brown. *Hymenanthera*.

Kelch fünfblättrig, ziegeldachförmig. Corollenblätter länger als der Kelch. Staubfäden 5, an der Basis verbunden, auf dem Rücken schuppig. Ein Griffel mit gespitzter Narbe. Kapsel fast beerartig, zweifächerig; jedes Fach enthält einen Saamen.

Pentandria Monogynia (Familie Jonidien.)

1. *Hymenanthera angustifolia* R. Br.

Stengel krautartig. Blätter schmal, linienförmig, ganzrandig. Waterl. Neuholland.

2. *Hymenanthera dentata* R. Br.

Blätter länglich, gezähnt. Waterl. Neuholland.

Hymenella Sess. *Hymenelle*.

Kelch viertheilig. Corolle vierblättrig, die Blätter ganz. Staubfäden 4, mit den Corollenblättern wechselnd, an der Basis ein dreizähliger Kranz. Griffel 3. Kapsel dreifächerig.

Tetrandria Trigynia (Familie Caryophyllen.)

1. *Hymenella möhringioides* Sess. Möhringiaartige Hymenelle.

Eine zarte krautartige Pflanze, fast wie *Moehringia muscosa* Linn. deren Stengel dünn, fast fadenförmig ist. Blätter linienförmig. Blumen gestielt, winkelständig, weiß. Waterl. Mexico. ☉ ?

Hymenella Fries. ist *Thelephora odorata* var.

Hymenocallis Herber. *Pancratium Dryandri*.

Hymenocallis guianensis Herb. f. *Pancratium guianense* Ker.

Hymenocallis speciosa Herb. f. *Pancratium speciosum*.

Hymenocallis undulata Herb. f. *Pancratium undulatum*.

Hymenocarpus circinatus Willd. ist *Medicago circinata* Linn.

510 Hymenocarpus. Hymenopappus.

Hymenocarpus nummularus Willd. Link. ist *Medicago*
Nummularia Cand.

Hymenocarpus radiatus Willd. Link. ist *Medicago* ra-
diata Linn.

Hymenodictyon flaccidum Wallich. ist *Cinchona* flac-
cida Spr.

Hymenodictyon obovatum Wallich. ist *Cinchona* obo-
vata Spr.

Hymenolepis ophioglossoides Kaulfus ist *Acrostium spi-*
catum Linn. Suppl. *Onoclea* Sw. *Lomaria* Willd.
(Familie der Farrenkräuter.)

Hymenopappus Herit. (*Cephalophora* Cav. ic. 6.
t. 599.)

Character generic. f. I. Nachtr. B. 4. S. 38.

Blüthendecke (Kelch) vielblättrig, gleich. Fruchtboden nackt.
Blümchen alle röhrig. Saamen viereckig, mit vielen häuti-
gen Spreublättchen gekrönt.

Syngenesia I. Ordn. (Familie Compositae; Eupatorien.)

1. *Hymenopappus glaucus* Spr. Hierher gehört *Cephalo-*
phora glauca Cav. siehe die vollständige Beschreibung im
1. Nachtrage B. 2. S. 175. Ferner *Santolina tinctoria*.

2. *Hymenopappus integrifolius* Spr. (*Polypteris inte-*
grifolia Nuttall.) •

Stengel krautartig, fast ästig. Blätter fast gedrängt ste-
hend, linien-lanzettförmig, ganzrandig, scharf. Blumenstiele
dreispaltig, fast doldentraubig. Kelchblätter abstehend, die
Spreublättchen der Saamentrone linienförmig = feinspizig. Vaterl.
Georgien.

3. *Hymenopappus matricarioides* Spr. Syst. Veg. 3. p. 450.

Stengel ästig. Blätter gegenüber stehend, gestielt, ran-
ten-eiförmig, stumpf, gekerbt, glattlich. Blumenstiele dols-
dentraubig. Kelchblätter abstehend, die Spreublättchen der
Saamentrone lanzettförmig, eingeschnitten = zerschligt. Vaterl.
Cuba. ☉ ?

4. *Hymenopappus pedatus* Lagasc. Hierher gehört *Stevia*
pedata Cav. Willd. siehe die vollständige nach der Natur
gefertigte Beschreibung im Vericon B. 9. S. 527. (*Agera-*
tum pedatum Ortega.)

5. *Hymenopappus scabiosaeus* Herit. f. I. Nachtr. B. 4.
S. 39. (*Rothia carolinensis* Lam.)

6. *Hymenopappus tenuifolius* Pursh.

Stengel ästig, wie die Blätter weißwollig. Blätter fast doppelt fiederspaltig, die Einschnitte linienfadenförmig. Blumen rispenständig. Saamen sehr zottenhaarig. Vaterl. Nordamerika, am Missuri-Flusse.

Kultur. Diese Gewächse zieht man aus Saamen, der von N. 1. 3. und 4. ins warme Beet, von den übrigen auf den Umschlag des Beetes oder ins freie Land gesät wird.

Hymenophallus Nees a Esenb. fung. Der Hut variiert in Hinsicht auf Form und Gestalt und trägt unten die Fruchtblenden (Deckhäutchen).

Cryptogamia Sect. V. (Familie Schwämme; Fungi hymenio fluxo s. fatiscente.)

1. *Hymenophallus Hadriani* Nees. (Phallus Hadriani Venten.)

Hut glockenförmig, wellenrandig. Hüllen obere becherförmig, die untern abwechselnd zurückgeschlagen.

2. *Hymenophallus indusiatus*. Phallus indusiatus Vent.

Hut kegelförmig, neßförmig. Deckhäutchen sehr schlaff. Wächst in Guiana und Carolina.

3. *Hymenophallus duplicatus* Nees. (Phallus duplicatus Bosc.)

Hut groß, zellig. Deckhaut gefaltet. Strunk sehr dick, mit einem großen Wulste versehen. Wächst in Carolina.

4. *Hymenophallus Daemonum* Spr. (Phallus Daemonum Rumph amboin. 6. t. 56. f. 7.)

Hut eiförmig, neßförmig. Deckhaut hängend, gefaltet. Strunk voller Löcher. Wächst auf den moluckischen Inseln.

Hymenophyllum Smith. Act. Taur. t. 9. f. 8. Schkuhr Crypt. t. 135. Hautfarn.

Character generic. f. Lexic. B. 4. C. 712.

Der Fruchthoden ist säulenförmig und mit Fruchthäuschen besetzt, die in einem zweiflappigen Behälter eingeschlossen sind.

Diese Gattung enthält jetzt 47 Arten, die im System nach der Gestalt des Laubes (Wedel) eingetheilt und geordnet sind.

I. Fronde simplici. Laub einfach.

1. *Hymenophyllum cruentum* Cav. Blutfarbiger Hautfarn.

Laub (Wedel) einfach, eiförmig-lanzettförmig, gefleckt, blutroth, 3—4 Zoll lang, 1 Zoll breit. Strunk haarförmig. Wächst auf der Insel St. Carlos de Chilcé auf Baumstämmen. 4

2. *Hymenophyllum asplenoides* Swartz. Streiffarmartiger Hautfarn s. Lexic. 1. Aufl. B. 4.

Laub länglich-lanzettförmig, fiederspaltig, hängend, die untersten Einschnitte buchtig-lappig, die übrigen zweilappig. Waterl. Jamaica auf hohen Bergen an Baumstämmen. 24

II. Fronde bi-tripinnatifida.

Laub (Wedel) zwei- oder dreifach gefiedert, oder fiederspaltig.

† Laub glatt. Einschnitte ganzrandig.

Hymenophyllum demissum, *sanguinolentum*, *decurrens*, *dilatatum*, *denticulatum* Swartz. s. Lexic. B. 4. gehören hierher und folgende Arten.

1. *Hymenophyllum pectinatum* Cavan. Kammförmiger Hautfarn.

Laub lanzettförmig, gefiedert. Blättchen nach oben tief eingeschnitten-kammförmig. Einschnitte linienförmig. Waterl. wie N. 1. 24

2. *Hymenophyllum Blumianum* Spr. (*H. pectinatum* Nees a Esenb.)

Laub linienförmig, fiederspaltig. Einschnitte stumpf, fast fiederspaltig. Waterl. Java. 24

3. *Hymenophyllum fumarioides* Bory. in litt. Willd. Sp. pl. Erdrauchartiger Hautfarn.

Wurzelstock kriechend, dünn-fadenförmig. Strunk 1-2 Zoll lang. Laub gefiedert, 2 Zoll lang. Blättchen fiederspaltig. Einschnitte linienförmig, stumpf, zweispaltig. Fruchthäuschen an der Spitze sitzend. Deckhaut stumpf-eingedrückt. Laubspindel geflügelt. Waterl. Mascaren-Insel in Wäldern. 24

4. *Hymenophyllum flabellatum* Labill. Nov. Holl. 2. 1. 250. Fächerförmiger Hautfarn.

Laub gefiedert. Blättchen fiederspaltig. Einschnitte meist dreispaltig, stumpf. Fruchthäuschen gipfelständig. Deckhaut rundlich-elliptisch. Laubspindel fast geflügelt. Strunk rund. Waterl. Neuholland, van Diemenland. 24

5. *Hymenophyllum australe* Labill. Willd. (*H. rarum* R. Br.) Südlicher Hautfarn.

Laub doppelt fiederspaltig. Einschnitte linienförmig, untere zweispaltig. Hautdecke ausgekerbt-zweizählig. Waterl. van Diemenland. 24

6. *Hymenophyllum nitens* R. Br. Glänzender Hautfarn.

Laub dreifach fiederspaltig, lanzettförmig, glänzend. Einschnitte

schnitte linienförmig, fast ausgekerbt. Deckhaut umgekehrte-
förmig = freisrund. Vaterl. wie die vorhergehende Art. 4

7. *Hymenophyllum gracile* Bory. Willd. Schlanke Haut-
farn. (*H. tenellum* Don.)

Stunk rund, haarförmig, 1—2 Zoll lang. Laub doppelt
gefiedert, 1—2 Zoll lang. Fiedern und Blättchen entfernt
stehend, die untern zweitheilig. Einschnitte linienförmig, zwei-
spaltig, stumpf, die obersten einfach, linienförmig. Laubspin-
del gerändert. Vaterl. Mascaren = Insel und Nepal. 4

8. *Hymenophyllum ramosissimum* Don. Sehr ästiger
Hautfarn.

Laub dreifach gefiedert. Blättchen tief fiederspaltig. Ein-
schnitte linien = keilsförmig, fast gespalten. Fruchthäuschen sehr
kurz. Spindel walzenrund. Vaterl. Nepal. 4

9. *Hymenophyllum crispum* Kunth in Humb. Nov. gen.
1. p. 26. Krauser Hautfarn.

Stunk fast behaart. Laub doppelt fiederspaltig. Einschnitte
linienförmig, ganzrandig, wellenrandig = gekräuselt. Die Klap-
pen der Deckhaut gewimpert. Vaterl. Neugranada, an Ber-
gen in der Provinz Venezuela. 4

10. *Hymenophyllum javanicum* Spr. (*H. crispum* Nees
a Esenb.)

Stunk geflügelt. Laub dreifach fiederspaltig. Blättchen
dreieckig, herablaufend, fiederspaltig. Einschnitte linienförmig,
stumpf, wellenrandig. Fruchtlager gerundet. Vaterl. Java. 4

11. *Hymenophyllum Filicula* Bory. Bierlicher Hautfarn.

Wurzelstock fadenförmig, kriechend, mit sehr kleinen schwarz-
braunen Spreublättchen und Filze bekleidet. Laub doppelt
gefiedert, 1—2 Zoll lang. Blättchen zweispaltig, linienförmig,
die untersten fiederspaltig. Einschnitte linienförmig. Spin-
del geflügelt. Deckhaut eiförmig, an der Spitze wenig ver-
dünnt. Vaterl. Mascaren = Insel; Bourbon in Wäldern. 4

12. *Hymenophyllum floribundum* Kunth J. c. p. 27.
Vielblüthige Deckhaut.

Laub doppelt gefiedert, glatt. Fiedern zweitheilig = fieders-
paltig. Einschnitte linienförmig, ganzrandig, stumpf = einges-
drückt. Stunk und Spindel geflügelt. Fruchthäuschen an
den Spitzen der Einschnitte. Die Klappen der Deckhaut eiförmig,
stumpfsich. Vaterl. Neugranada, die Provinz Es-
mana. 4

Dietr. Ver. 2r Nachtr. IV. Bd.

R f

13. *Hymenophyllum fuciforme* Swartz. (*H. fucoides* Cavan. nec. Sw.)

Stunk geflügelt. Laub dreifach gefiedert. Fiedern wechselnd stehend, sehr lang. Blättchen linienförmig, fast ausgerandet. Waterl. wie N. 1. 4

14. *Hymenophyllum emarginatum* Swartz. Ausgerandeter Hautfarn.

Stunk walzenrund. Laub doppelt gefiedert. Blättchen fiederspaltig. Einschnitte zweitheilig, linienförmig, ausgerandet, das Endblättchen länger als die untern. Spindel geflügelt. Waterl. Java an Bergen. 4

15. *Hymenophyllum polyanthos* Swartz. (*Trichomanes polyanthos* Sw.)

Stunk gerändert. Laub doppelt gefiedert. Blättchen fiederspaltig. Einschnitte linienförmig, stumpf, die untersten gespalten. Spindel geflügelt. Deckhaut eysförmig. Waterl. Jamaica in Waldbergen an schattigen Orten. 4

16. *Hymenophyllum axillare* Swartz. Winkelfrüchtiger Hautfarn.

Stunk walzenrund. Laub doppelt gefiedert. Blättchen fiederspaltig. Einschnitte linienförmig, fast ausgerandet. Fruchthäuschen winkelförmig, gestielt, kugelförmig. Spindel gerändert. Waterl. Jamaica auf den höchsten Bergen, an Baumstämmen an schattigen moosigen Orten. 4

17. *Hymenophyllum clavatum* Swartz Fl. ind. occid. 3. Keulenförmiger Hautfarn.

Trichomanes clavatum Sw. prod. 137.

Stunk fast zweischneidig. Laub doppelt gefiedert. Blättchen fiederspaltig. Einschnitte linienförmig, gespalten, stumpf. Spindel fast gerändert. Fruchthäuschen an den Spizen der Blättchen sitzend, keulenförmig. Deckhaut eysförmig, sehr glatt, stumpf-eingedrückt. Waterl. das südliche Jamaica auf Bergen. 4

18. *Hymenophyllum ricciaefolium* Bory. Willd. (*Adiantum tenellum* Jacq. collect. 3. t. 21. f. 3.)

Wurzelstock kriechend, fadenförmig, glatt. Laub doppelt gefiedert, 2 Zoll lang. Fiedern einseitig. Blättchen, untere fiederspaltig, obere dreitheilig. Einschnitte linienförmig, stumpf. Spindel geflügelt. Fruchthäuschen umgekehrt-eysförmig. Waterl. Insel Mascaren. 4

†† Laub glatt, gefleckt oder sägerandig.

19. *Hymenophyllum tunbrigense* Swartz. Spr. (H. tunbridgense Willd. Sp. pl.)

Trichomanes tunbridgense Sp. pl. 1561.

H. cupressiforme Labill.

Stunk walzenrund. Laub doppelt fiederspaltig. Einschnitte linienförmig, sägerandig. Fruchthäufchen einzeln, in den obern Winkeln. Vaterl. Schottland, Norwegen, Kärnthen und Italien auf Alpen. 4

20. *Hymenophyllum unilaterale* Willd. Einseitiger Hautfarn.

Wurzelstock kriechend, fadenhaarförmig. Stunk haarförmig, rund, glatt, 1 Zoll lang. Laub gefiedert. Blättchen gefingert-fiederspaltig, einseitig. Einschnitte linienförmig, fast gespalten, sägerandig. Spindel rund, glatt. Fruchthäufchen stiellos. Deckhaut länglich, stumpf, ganzrandig. Vaterl. die Insel Bourbon auf hohen Bergen. 4

21. *Hymenophyllum plicatum* Kaulf. Gefalteter Hautfarn.

Stunk und Spindel geflügelt-gezähnt. Laub doppelt gefiedert, fast dreieckig geschwänzt. Blättchen gefingert-eingeschnitten. Einschnitte linienförmig, gefaltet-wellenrandig, sägerandig, die Serraturen spitzig. Fruchthäufchen an den Spitzen der Einschnitte sitzend. Deckhaut aufgeblasen. Vaterl. Chili an Bergen. 4

22. *Hymenophyllum spinulosum* Kunth J. c. 1. p. 26.

Feindorniger Hautfarn.

Stunk rundlich, mit kleinen Schuppen bedeckt. Laub gefiedert, glatt. Blättchen zweitheilig-fiederspaltig. Einschnitte linienförmig, abgestutzt, feindornig-gezähnt. Spindel geflügelt. Die Klappen der Deckhaut rundlich, ganzrandig. Vaterl. Neugranada, zwischen La Guayra et Caracas an sonnigen trockenen Orten. 4

23. *Hymenophyllum fucoides* Swartz. Tangartiger Hautfarn.

Stunk wenig behaart. Laub doppelt fiederspaltig. Einschnitte linienförmig, abstehend, meist gespalten, spitzig, sägerandig. Spindel geflügelt, ganzrandig. Vaterl. Jamaika in Waldbergen. 4

24. *Hymenophyllum bivalve* Swartz. Zweiklappiger Hautfarn. f. Lexic. B. 4.

Trichomanes bivalve Forst.

Laub doppelt gefiedert. Blättchen fiederspaltig. Einschnitte fast gespalten, linienförmig, sägerandig, die Serraturen spitzig. Spindel geflügelt, sägerandig. Fruchthäufchen gestielt, umge-

kehrteypförmig, ganzrandig. Deckhaut zweiflappig. Waterl. die Societäts-Inseln. 4

25. *Hymenophyllum multifidum* Swartz. Vieltheiliger Hautfarn.

Trichomanes multifidum Forst.

Strunk walzenrund. Laub doppelt gefiedert. Blättchen gefingert = fiederspaltig. Einschnitte linienförmig, 'spizlich, gespalten, sägerandig. Spindel gerändert. Deckhaut ganzrandig. (Abbild. Schluhr's Crypt. t. 135. b.) Waterl. Ins. oceani pacifici. 4

26. *Hymenophyllum dichotomum* Cavan. Gabelblättriger Hautfarn.

Laub doppelt gefiedert. Blättchen gefingert = fiederspaltig. Einschnitte linienförmig, zweispaltig, wellenrandig = dornig. Spindel geflügelt, sägerandig. Waterl. wie N. 1.

27. *Hymenophyllum dentatum* Cav. Gezähnter Hautfarn.

Laub dreifach gefiedert. Blättchen linien = haarförmig, entfernt gezähnt. Fruchthäuschen zapfenförmig. Deckhaut absterbend. Waterl. wie N. 1.

††† Laub behaart oder gewimpert.

28. *Hymenophyllum caespitosum* Gaudich. Rasenbildender Hautfarn.

Strunk haarförmig. Laub gefiedert, an den Mittelrippen, so wie die Spindel behaart. Blättchen länglich = eypförmig, ausgehöhlt, ganzrandig, und liegen wie Dachziegel übereinander. Dieser Farn, dessen zahlreiche Stünke haarförmig scharfborstig sind und Rasen bilden. Wächst auf den Falklands-Inseln. 4

29. *Hymenophyllum elegans* Spr. Häßlicher Hautfarn.

Strunk und Laub sehr zart. Laub gefiedert. Blättchen stiellos, 3—5 theilig, mit langen zerstreutstehenden Haaren bekleidet. Einschnitte meist linienförmig, stumpf, ganzrandig, an den Spizen die sehr kleinen rundlichen Fruchthäuschen tragend. Waterl. Brasilien. 4

30. *Hymenophyllum plumosum* Kaulf. Federförmiger Hautfarn.

Laub gefiedert, auf beiden Seiten filzig. Blättchen wie Dachziegel übereinander liegend, lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt, eingeschnitten = gezähnt. Einschnitte gespalten, an den Spizen keulenförmige Fruchtlager tragend. Brasilien. 4

31. *Hymenophyllum trichophyllum* Kunth J. c. I. p.

27. Cumanaischer Hautfarn.

Laub doppelt gefiedert, rostfarbig = behaart. Fiedern einseitig, zweitheilig = fiederspaltig. Einschnitte linienförmig, fast ganzrandig. Spindel walzenrund. Fruchthäuschen an den Spitzen des Laubes. Die Klappen der Deckhaut halbkreisförmig, behaart. Wat. Neugranada, die Provinz Cumana an Bergen. 4

32. *Hymenophyllum hirsutum* Swartz. Rauher Hautfarn.

Trichomanes hirsutum Sp. pl. 1561.

Filicula digitata Plum. filic. 73. t. 50. f. 5.

Stunk gerändert, scharfborstig. Laub hängend, gefiedert, auf beiden Seiten strieglich = borstig. Blättchen gefütert = fiederspaltig, auch einfach, linienförmig, stumpf. Spindel geflügelt. Fruchtlager an den Spitzen des Laubes. Waterl. Jamaika und Domingo auf hohen Bergen an Baumstämmen. 4

33. *Hymenophyllum sericeum* Swartz. Seidenhaariger Hautfarn.

Trichomanes Plum. filic. 56. t. 73.

Stunk walzenrund, glatt. Laub doppelt gefiedert, hängend, oben rostfarbig = filzig = zottenhaarig, unten scharfborstig. Blättchen fiederspaltig. Einschnitte linienförmig, stumpf, die untersten gespalten. Spindel gerändert. Fruchthäuschen an den Spitzen des Laubes. Waterl. Jamaika an schattigen Orten und an Baumstämmen. 4

34. *Hymenophyllum Borrani* Willd. Borstiger Hautfarn.

Wurzelstock fadenförmig, kriechend, mit zerstreuten Borsten besetzt. Laub gefiedert. Blättchen fiederspaltig, die untersten und obersten kleiner als die mittlern. Einschnitte linienförmig, stumpf, fast eingedrückt, die untersten gespalten, an den Atern borstig. Spindel geflügelt, gewimpert. Waterl. die Insel Bourbon. 4

35. *Hymenophyllum aeruginosum* Cramich. (Trichomanes Thuars.)

Stunk fadenförmig. Laub doppelt fiederspaltig, borstig = behaart. Blättchen gespalten, linienförmig, spizlich. Waterl. Mascaren = Insel. 4

36. *Hymenophyllum elasticum* Willd. Elastischer Hautfarn.

Stunk rund, glatt, 3 Zoll lang. Laub doppelt gefiedert. Die untern und obern Fiedern kleiner als die mittlern, laugespizt. Blättchen fiederspaltig. Einschnitte linienförmig, stumpf, an den Mittelrippen behaart, am Rande gewimpert.

Spindel walzenrund, scharfborstig. Fruchthäufchen klein, an den Spizen der Einschnitte. Deckhaut rundlich, am Rande gewimpert. Waterl. die Mascaren-Insel und Bourbon. 4

37. *Hymenophyllum hirtellum* Swartz. Feinborstiger Hautfarn.

Strunk walzenrund, scharfborstig. Laub doppelt gefiedert, die untern Fiedern größer als die obern. Blättchen fiederspaltig, herablaufend. Einschnitte linienförmig, stumpflich, an den Mittelrippen feinborstig, am Rande gewimpert. Spindel geflügelt. Waterl. Jamaika an hohen Bergen und in Wäldern an schattigen Orten zwischen Laubmoosen. 4

38. *Hymenophyllum ciliatum* Swartz. Gefranzter Hautfarn. Trichomanes Sw. prod. 136. Hedw. filic.

Laub doppelt fiederspaltig. Einschnitte linienförmig, einfach oder gespalten, stumpf, am Rande gewimpert, an den Rippen feinborstig. Strunk und Spindel geflügelt, gewimpert. Waterl. Nordamerika und Westindien an Baumstämmen. 4

39. *Hymenophyllum lineare* Swartz. Linienförmiger Hautfarn.

Strunk glatt. Laub doppelt gefiedert, hängend. Blättchen entfernt stehend, fiederspaltig. Einschnitte linienförmig, stumpf-eingedrückt, einfach oder gespalten, gewimpert. Spindel oben geflügelt, unten rund, borstig. Waterl. Jamaika auf hohen Bergen an Baumstämmen. 4

Im Lexikon erste Aufl. B. 4. habe ich noch einige hierher gehörende Arten beschrieben; die übrigen welche daselbst nur angezeigt sind, können ausgestrichen werden, zumal da ich sie in den vorstehenden Abtheilungen nochmal aufgeführt und vollständiger charakterisirt und unterschieden habe.

Die meisten Hautfarn kommen aus Tropenländern und gedeihen daher am besten in warmen Häusern. Sie lieben leichte Dämmerde (Laub- oder Walderde) und werden durch Saamen und Wurzeltheilung vermehrt.

Synonymen.

Hymenophyllum crispum Nees f. *Hymenophyllum javanicum* N. 10.

— cupressiforme Labill. f. *Hymenophyllum tunbrigense* N. 19.

— fucoides Cav. f. *Hymenophyllum fuciforme* N. 13.

— humilis Nees ist *Hymenophyllum denticulatum* Lexic.

Hymenophyllum pectinatum Nees f. **Hymenophyllum**
Blumianum N. 2.

— rarum R. Br. f. **Hymenophyllum** au-
strale N. 5.

— tenellum Don. f. **Hymenophyllum**
gracile N. 7.

Hymenopogon Wallich. **Hymenopogon**.

Kelch fünfstheilig. Corollenröhre lang, der Rand präsentir-
tellerförmig, fünfspaltig. Staubfäden 5, in die Corollenröhre
eingefügt. Kapsel zweifächerig, vierklappig. Saamen an bei-
den Seiten mit häutigen Anhängen versehen.

Pentandria Monogynia (Familie Rubiaceen.)

1. **Hymenopogon parasiticus** Wallich.

Stengel strauchig. Blätter gegenüber stehend, langgespitzt,
zottenhaarig. Blumen in dreitheilige Doldentrauben gesammelt.
Ein schwarzhender Strauch, der in Ostindien auf Baumstäms-
men vegetirt. ♀

Hymenospron Spr. **Hymenospron**. (Gaert. Sem. t. 25.)

Kelch glockenförmig, halb vierspaltig, an der Basis mit
zwei Bracteen versehen, der obere Einschnitt größer als die
seitenständigen, aufsteigend. Corolle schmetterlingsförmig, das
Fähnchen zurückgeschlagen, länglich = umgekehrtepförmig, schwie-
lig. Schiffehen fast sichelförmig. Staubfäden 10, zweibrü-
drig. Narbe fast keulenförmig. Scheibe fast frugförmig.
Hülse zusammengedrückt, an beiden Seiten nach oben geflüs-
gelt = gerändert, vielseedig. Saamen linsenförmig.

Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflanzen.)

1. **Hymenospron sericeum** Spr. Seidenhaariges **Hymenospron**.

Dioclea sericea Kunth in Humb. Nov. gen. et Sp.
VI. p. 437. t. 576.

Stengel strauchig und windet sich. Blätter dreizählig.
Blättchen fast herzförmig = elliptisch, mucronenspizig, oben sil-
zig, unten wie die Kelche und Hülsen, seidenhaarig = silber-
farbig. Corolle blau. Hülsen gelblich = seidenhaarig. Vaterl.
Neugranada, bei Honda. ♀ Blühz. Junius.

2. **Hymenospron apurense** Spr. (**Dioclea apurensis**
Kunth J. c. VI. p. 438.)

Stengel strauchig, gewunden. Blätter dreizählig. Blätt-
chen elliptisch = länglich, mucronenspizig, glatt, nur unten an
den Rippen mit Strichborsten besetzt. Hülsen wenig behaart.
Vaterl. am Orinoco = Flusse. ♀ Fruchtstiel Mai,

3. *Hymenospron rubrum* Spr. Rotes Hymenospron.
Dioclea Jacquiniana Cand.

Hierher gehört *Dolichos ruber* Jacq. siehe Lexic. erste Aufl. B. 4.

Stengel strauchig, windend. Blätter dreizählig. Blättchen eyförmig, gespitzt, glatt. Blumen roth, in schlaffen Trauben. Vaterl. Martinique. h

Die Arten dieser Gattung sind holzige strauchige Pflanzen, deren Stengel sich winden. Blätter gestielt, dreizählig, das Endblättchen von den seitenständigen entfernt stehend. Der gemeinschaftliche Blattstiel an der Basis mit Axtblättern versehen. Blumen blau oder roth in winkelförmige Trauben gesammelt. Sie entwickeln sich im Sommer. In Hinsicht auf Standort, Boden und Fortpflanzung behandelt man sie wie die Arten der Gattung *Dolichos* und andere Hülsenpflanzen, die aus Tropenländern kommen.

Hymenostachys diversifrons Bory. ist *Trichomanes elegans* Rudg.

Hymenostomum Rob. Brown. Prod. Fl. Nov. Holl.

Kapselmund häutig. Haube halb.

Cryptogamia Sect. II. (Familie Laubmoose.)

1. *Hymenostomum microstomum* R. Brown.

Gymnostomum Hedw. *Bryum* Dickson. *Hypnum brachycarpon* et *squarrosus* Nees a Esenb.

Stengel fast einfach. Blätter linien-pfriemensförmig, rinnig, abgehend, wellend gedreht. Kapsel oval, fast schief. Deckel pfriemensspizig, schief. Wächst in Deutschland und England.

2. *Hymenostomum obliquum* Nees.

Stengel ziemlich einfach. Blätter linien-lanzettförmig, an der Spitze eingerollt. Kapsel schief, länglich-cylindrisch. Deckel kegelförmig, kurz. Wächst in Deutschland. 24

3. *Hymenostomum rutilans* Nees. (*Gymnostomum rutilans* Hedw. *Hym. globosum* et *crispatum*? Hornsch.)

Stengel fast ästig, linien-lanzettförmig, pfriemensspizig, rinnig. Vorste (Kapselstiel) verlängert, strohfarbig. Kapsel länglich. Deckel pfriemensspizig, röhlich. Deutschland. 24

4. *Hymenostomum Griffithianum* Spr. (*Gymnostomum* Smith. *Bryum* Dicks.)

Stengel einfach. Blätter spatelförmig, stumpf, schlaff. Vorste fleischig. Kapsel umgekehrtepförmig. Deckel stumpf. England. 24

5. *Hymenostomum cubense* Spr. ist *Syrhropodon incompletus* Schwägr.

Hymenothecium Lagasc. ist *Aegopogon* Humb.

Hyoscyamus Linn. Bilsentraut f. Lex. B. 4. (Schluhrs Handb. t. 44.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. C. 39.

Kelch röhrig, fünfspaltig. Corolle trichterförmig, bisweilen einseitig gespalten; der Rand schief, fünfkappig. Fünf Staubfäden. Ein Griffel. Kapsel vielSaamig; mit einem Deckel versehen, der ringsum aufspringt.

Pentandria Monogynia (Familie Solaneen.)

1. *Hyoscyamus Scopolia* Linn. Glockenförmiges Bilsentraut.

Scopolia carniolica Jacquin obs. 1. p. 32. t. 20.

Wurzel ästig. Stengel krautartig, aufrecht, walzenrund, wie die Blätter glatt, gabelförmig, getheilt, 1 Fuß bis 18 Zoll hoch, die Aeste einfach, abstehend. Blätter gestielt, länglich = eiförmig, ganzrandig, fast gerunzelt, dunkelgrün. Blumenstiele fadenförmig, einzeln, winkelförmig, überhängend. Corolle glockenförmig, fast abgestutzt, braunroth. Vaterl. Oesterreich und Bayern in Wäldern. 4 Bllh. März, April. Abbild. Sturms Deutschlands Flora fasc. 21. Curt. Bot. mag. t. 1126. Hillar. 20. t. 6.

Diese Art hat Schultes in Syst. veg. V. p. XXIII. et p. 312. als eine selbstständige Gattung *Scopolina* aufgeführt, aber wir haben schon eine *Scopolia* Smith (*Toddalia* Lam.)

2. *Hyoscyamus orientalis* M. a Bieb. Kaukasisches Bilsentraut.

Stengel krautartig, aufrecht. Blätter delta = eiförmig, ausgeschweift. Blumen aufrecht. Staubfäden länger als die Corolle. Fruchtkelch aufgeschwollen. Vaterl. Kaukasus.

Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören, f. Lexikon und 1. Nachtrag.

Hyoseris Linn. Kennzeichen der Gattung und der Arten siehe Lexikon B. 4.

Synonymen.

Hyoseris amplexicaulis Michx. f. *Krigia amplexicaulis*.

— angustifolia Michx. f. *Krigia* Dandelion.

— biflora Walt. f. *Krigia amplexicaulis*.

— caroliniana Walt. f. *Krigia caroliniana*.

Hyoseris cretica Cav. f. Lexic. ist *Hedypnois rhagadioloides*.

— *foetida* Linn. f. Lexic. ist *Lapsana foetida* Scop.

— *hirta* Balb. Willd. f. 1. Nachtr. und die daselbst angezeigten Synonymen.

Hyospathe Martius Gen. et Spec. Palmarum Fasc.

1. p. 3. t. 1. 2.

Reich dreitheilig. Corolle dreiblättrig. Sechs Staubfäden
Drei Griffel. Beere einsamig.

Hexandria Trigynia (Familie Palmen.)

1. *Hyospathe elegans* Mart. J. c.

Eine zierliche Palme, etwa 6 Fuß hoch, deren Stod (Stamm) nackt, aber tief geringelt ist. Laub (Wedel) gipfelständig, gefiedert = gespalten. Früchte olivenförmig. Diese Art verlangt in unsern Gärten eine Stelle im warmen Haus, sowie alle Palmen, die aus Tropenländern kommen. h

Hypaelyptum Vahl. f. 1. Nachtr. (*Hypolytrum* Richard. *Hypoclytrum* Auct.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 42.

Aehren vielblättrig. Schuppen wie Dachziegeln über einander liegend. Blüthenhülle (Reich) zweiflappig. Keine Corolle, keine Borsten.

Triandria Monogynia (Familie Cyperaceen; Cypergräser.)

1. *Hypaelyptum microcephalum* R. Brown. Prod. Flor. Nov. Holl. (*Hypolytrum* Spr.)

Stamm dreiseitig. Hülle zweiblättrig, sehr lang. Aehren klein, kugelförmig, zu 3 stehend. Schuppen linienförmig, abgestutzt, gegraunt. Vaterl. Neuholland. 4?

2. *Hypaelyptum nemorum* R. Br. (*Hypolytrum* Spr. Syst. veg. 1. p. 232.)

Hypolytrum nemorum Pal. de Beauv.

Hierher *Schoenus nemorum* Vahl. siehe die Beschreibung im Lexikon B. 8. S. 617.

3. *Hypaelyptum gracile* Richard. (*Hypolytrum* Sp.)

Stamm dünn, zart. Blätter schmal. Aehren stiellos, zu 3 beisammen stehend, frug = eiförmig. Schuppen spatelförmig.

4. *Hypaelyptum latifolium* Richard. Pers. Breitblättriges *Hypaelyptum*.

Stamm und Blätter groß, glatt. Blätter breit, dreirippig. Aehren oval, in gipfelständige doppelt zusammengesetzte Dol-

den Trauben gesammelt. Blümchen nur mit zwei Staubfäden versehen. Hüllblätter wechselnd stehend. Wächst in Indien. (*Tunga diandra* Roxb. gehört hierher. Auch *H. diandrum* Alb. Dietr. scheint nur eine Varietät zu seyn.)

5. *Hypaelyptum laevigatum* Spr. (*Tunga laevigata* Roxb.)

Wurzel ästig = faserig. Stängel aufrecht, dreikantig, fast nackt, glatt. 1—2 Fuß hoch und höher. Blätter scheidig, kürzer als der Stängel. Achse kopfförmig, eiförmig, stiellos, gipfelförmig. Hülle 2—3 blättrig, sehr lang. Vaterl. Ostindien. 4 ?

6. *Hypaelyptum trinervium* Willd. herb. (*Hypolytrum trinervium* Alb. Dietr.)

Hierher *Scirpus anomalus* Vahl. f. Lexic. B. 8. S. 645. Wächst in Ostindien an und in Teichen. 4

7. *Hypaelyptum macrocephalum* Gaudich. in Froye. Voyage. p. 415.

Achsen büschelförmig = gehäuft. Die Büschel kopfförmig, von langen Bracteen (Hüllblättchen) unterstützt. Wächst auf den molukischen Inseln. 4 ?

8. *Hypaelyptum triceps* (*Tunga triceps* Roxb.) ist *Hypaelyptum sphacelatum* var. f. 1. Nachtr.

Hypaelyptum Berterii Spr. ist *Schoenus pusillus* Swartz.

Hypecoum Linn. Lappenblume. (Schubers Handb. t. 27.)

Charakter generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 43.

Kelch klein, zweiblättrig. Corolle vierblättrig. Corollenblätter ungleich, meist dreilappig. Staubfäden 4. Narben 2. Schote gegliedert.

Tetrandria Digynia (Familie Papavereen.)

1. *Hypecoum imberbe* Sibthorp. Fl. graec. t. 156. Ungebartetes *Hypecoum*; Lappenblume.

Stängel krautartig. Blätter doppelt zusammengesetzt, die Einschnitte linienförmig. Kelchblätter gezähnt = gewimpert. Corollenblätter meist dreilappig, glatt. Schote bogenförmig. Vaterl. Griechenland, die Ins. Cypern. ☉

Die übrigen hierher gehörenden Arten siehe Lexikon und

1. Nachtrag.

Die Lappenblumen (*Hypecoum*) sind niedrige krautartige Pflanzen, mit gefiederten oder doppelt zusammen gesetzten Blättern und meist gelben Blumen, die im Sommer sich entwickeln. Man zieht sie aus Samen, die in ein temperirtes Mistbeet oder auf dem Umschlage desselben ausgesät werden,

und setzt hernach die jungen Pflanzen an einer schützlichen Stelle ins freie Land. Auch kann der Saame von den milder zärtlichen Arten, im Frühlinge sogleich an der bestimmten Stelle ins Land in leichte lockere Erde ausgesät werden.

Hypelata P. Brown. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 44.

Blumen oft polygamisch. ♂ Kelch 4—5 blättrig. Corolle fünfblättrig. Ein Nectarium auf der Scheibe, um den Fruchtknoten, 8 Staubfäden tragend. Griffel kurz. Narbe niedrig gebogen, dreiseitig. Steinfrucht markig, einsamig.

Octandria Monogynia (Familie Sapindeen.)

1. *Hypelata trifoliata* Swartz.

Dieser kleine Baum oder Strauch ist im 1. Nachtrage B. 4. genau und vollständig beschrieben.

Hypericum Linn. Johanniskraut; Harthen f. Lex. B. 4.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 45.

Kelch fünftheilig. Corolle fünfblättrig. Staubfäden zahlreich, in fünf Bündel verwachsen. Keine Nectardrüsen. 3—5 Griffel. Kapsel drei- oder fünfklappig, die Klappenränder eingebogen und bilden doppelte Scheidewände. Saamen sehr klein.

Polyadelphia Polyandria (Familie Guttiferen; Hypericeen.)

Diese schöne Gattung enthält jetzt 112 Arten. Es sind strauchartige, staudenstrauchige oder krautartige Pflanzen, deren Blätter einander gegenüber stehen, ganzrandig, und oft drüsig-punktirt sind. Blumen meist gelb, einzeln oder in Doldentrauben-Rispen gesammelt. Im System sind die Arten nach der Zahl ihrer Griffel geordnet und in zwei Hauptabtheilungen aufgeführt. Diese Abtheilung habe ich auch im 1. Nachtrage benutzt und zugleich die Namen derjenigen Arten, welche im Verikon B. 4. in alphabetischer Ordnung stehen, bei jeder Abtheilung angezeigt.

I. Pentagyna. Fünf Griffel in jeder Blume.

† Fruticosa, Stengel strauchig,

1. *Hypericum oblongifolium* Chois. (*H. uralum* Hamilt. Dun.)

Stengel strauchig, ästig. Aeste zusammengedrückt. Blätter stiellos, länglich, gerippt, hell-punktirt. Blumen einzeln, gipfelständig. Kelch und Corollenblätter gerippt-gedert. Vaterl. Ostindien. h

2. *Hypericum bracteatum* Don. (*H. cordifolium* Cand. *H. coriaceum* Blum.)

Neste walzenrund. Blätter halb umfassend, länglich, lederartig, glatt. Bracteen herzförmig. Kelch und Corolle so lang als der Griffel. Java. h

3. *Hypericum cernuum* Roxb. Uebergebogenes Johanniskraut.

Neste walzenrund. Blätter länglich, mucronenspizig, graugrün. Blumenstiele meist zu 3 stehend, übergebogen. Kelchblätter gespitzt. Staubfäden und Griffel sehr lang. Waterl. Ostindien. h

4. *Hypericum Leschenaultii* Cand. (*H. triflorum* Blum.)

Leschenaultisches Johanniskraut.

Neste walzenrund. Blätter elliptisch-länglich, stumpf, hell-punktirt. Kelchblätter gespitzt. Griffel über die Corollenblätter hervorragend. Waterl. Java. h Blühz. Sommer.

†† Herbacea. Stengel krautartig.

5. *Hypericum macrocarpon* Michx. ist *H. ascyroides* Willd. f Lexic. B. 4. S. 726. (*H. rostratum* Rafin.)

6. *Hypericum brasiliense* Cand. Brasilisches Johanniskraut.

Stengel krautartig. Neste vierkantig, fast geflügelt. Blätter umfassend, linien-lanzettförmig, spizlich, abstehend, unten punktirt. Blumen rispenständig. Kelchblätter linienförmig, langgespitzt. Waterl. Brasilien, am großen Flusse (Rio grande). h

II. Trigyna. Blumen mit drei Griffeln versehen.

† Fruticosa. Stengel strauchig.

α. Blätter breit.

7. *Hypericum inodorum* Willd. f. Lexic. B. 4.

Stengel strauchig, 2—3 Fuß hoch. Neste zweischnedig, braun. Blätter fast stiellos, elliptisch-länglich, ganzrandig, fast lederartig, oben dunkelgrün, fast gerunzelt, glatt, unten blaß, gerippt-geadert, $2\frac{1}{2}$ Zoll lang, $1\frac{1}{2}$ Zoll breit, die obern etwas größer. Blumenstiele gipfelförmig, meist zu 3 beisammen stehend, abgekürzt, aufrecht. Blumen geruchlos. Kelchblätter lanzettförmig. Corollenblätter gelb, spatel-liniensförmig, so lang als die Staubfäden. Waterl. Kreta und Kleinasien. h Blüht im hiesigen Garten vom Mai bis Juli und daquert gelinde Winter im freien Lande aus.

8. *Hypericum milleporum* Willd. herb. Vielbrüßiges Johanniskraut.

Neste walzenrund. Blätter fast stiellos, lanzettförmig, an beiden Enden verdünnt, gerippt, hell-punktirt, am Rande,

so wie die lanzettförmigen Kelchblätter, drüsig = gezähnt. Blumen in Doldentrauben gesammelt. Waterl. Teneriffa. h

9. *Hypericum biflorum* Lam. Zweiklümiges Johanniskraut. Aeste walzenrundlich. Blätter gestielt, länglich = eiförmig, gespitzt, geadert. Blumenstiele winkelförmig, zweiklümig. Kelchblätter stumpf. Staubfäden haarig = pinselförmig, so lang als die Griffel. Hierher gehört *H. chinense* Reiz. (non Linn.) f. Lexic. erste Aufl. B. 4. Waterl. China. h

10. *Hypericum Mutisianum* Kunth. in Humb. Nov. gen. et Sp. pl. V. p. 185.

Blätter rundlich = eiförmig, stumpf, gerippt, harzig = zottenhaarig; sie liegen wie Dachziegel über einander und bilden vier Reihen. Blumen gipfelständig, einzeln kurzgestielt. Hierher gehört *H. mexicanum* Linn. fil. f. Lexic. erste Aufl. B. 4. Waterl. Neugranada, bei S. Fe. de Bogota. h Blüht. Julius, August.

11. *Hypericum thymifolium* Kunth. J. c. V. p. 186. t. 455.

Stengel strauchig, sehr ästig. Aeste zweitheilig, vierkantig, glatt. Blätter gegenüber stehend, stiellos, länglich, ganzrandig, einrippig, flach, dicklich, glatt, drüsig = punktiert, $3\frac{1}{2}$ Linie lang, $1\frac{1}{3}$ Linie breit. Blumen an den Spizen und in den Theilungswinkeln der Aestchen gestielt, aufrecht, so groß wie Blumen des *H. pulchrum* L. Kelchblätter länglich, gespitzt, zart punktiert. Corollenblätter goldgelb, sehr abstehend, glatt, länger als die Staubfäden. Antheren klein, rundlich = zweiförmig. Griffel kürzer als die Staubfäden. Kapsel länglich. Waterl. Südamerika. h Blüht. Sommer.

12. *Hypericum thyoides* Kunth (*thuoides*) J. c. V. p. 144. t. 456. Lebensbaumartiges Johanniskraut; Hartheu.

Ein sehr ästiger Strauch, mit runden, runzligen, braunen Aesten, an denen die Ueberbleibsel der ältern trockenen Blätter sitzen. Die Aestchen stehen gegenüber und sind mit Blättern dicht besetzt. Die Blätter decussiren, d. h. sie stehen kreuzweis einander gegenüber, sehr genähert, fast dachziegelförmig über einander liegend, sehr kurz gestielt, eiförmig, ganzrandig, einrippig, glatt, flach, lederartig, $1-1\frac{1}{2}$ Linie lang. Blumen einzeln gipfelständig, sehr kurzgestielt, so groß wie die Blumen des *H. hirsutum*, gelb. Kelch, Corolle, Staubfäden und Stempel wie bei der vorhergehenden Art.

Wegen des zierlichen Anstandes und der lieblichen Blumen,

welche gegen das lebhafteste Grün der kleinen, zahlreichen Blätter recht artig abstechen, verdient diese Art in jeder Sammlung ausländischer Pierpflanzen aufgenommen zu werden. Vaterl. die Andeskette in Südamerika. ♀ Blühz. Aug.

13. *Hypericum nanum* Poir. Zwerg-Johanniskraut.

Neste weitschweifig. Blätter gedrängt stehend, rundlich-eiförmig, fast lederartig, glatt, ungedrückt, hell punktiert. Blumen gestielt, in Doldentrauben gesammelt. Kelchblätter lanzettförmig. Vaterl. Syrien. ♀

β. Blätter schmal.

Hyp. heterophyllum Vent. H. laricifolium, Kruthiolaefolium Juss. (s. I. Nachtrag) gehören hierher und folgende Arten.

14. *Hypericum acerosum* Kunth J. c. V. p. 145. t. 457. Nadelblättriges Johanniskraut.

Stengel sehr ästig. Nesselchen und Blätter dicht stehend. Blätter wie Dachziegeln über einander liegend, nadelartig, ganzrandig, glatt, steif, $2\frac{1}{2}$ Linie lang, die obersten neben den Blumen etwas länger als die untern. Blumen einzeln, gipfelsständig, kurz gestielt, gelb. Kelchblätter länglich-lanzettförmig. Vaterl. die Andeskette in Quito. ♀ Blühz. Julius.

Diese schöne Species ist dem H. Kruthiolaefolium Juss. (s. I. Nachtr.) zunächst verwandt, aber unterschieden durch einen höhern und stärkern Stengel, durch kleinere aber mehr genäherte Blätter und größere Blumen.

15. *Hypericum aciculare* Kunth J. c. V. p. 190. (H. acerosum Willd. herb.)

Neste straff. Blätter dicht stehend, wie Dachziegeln über einander liegend, faden-pfriemensförmig, die obern, neben den Blumen lanzettförmig, abstehend, scharfrandig. Blumen einzeln gipfelsständig. Kelchblätter lanzettförmig. Corollenblätter feinspizig. Vaterl. Quito, die Provinz Eora. ♀ Blühz. August.

†† Herbacea. Stengel krautartig.

α. Calycibus integerrimis.

Kelchblätter ganz (glatt) randig.

Hyp. cilicifolium Vent. H. virgatum Lam. H. dolabriforme Vent. siehe 1. Nachtrag gehören hierher und folgende Arten.

16. *Hypericum quadrangulum* (quadrangulare Linn.)
f. Lexic. B. 4.

Diese in Europa, besonders in Deutschland an Wassergruben und an feuchten sumpfigen Orten wildwachsende Pflanze variiert nach der Verschiedenheit des Standortes mit einem niedrigen oder höheren Stengel, der mehr oder weniger vieredig-geflügelt, zuweilen fast runder ist, daher haben einige Botaniker dergleichen Varietäten als selbstständige Arten aufgeführt. *B. B. H. tetrapterum* Fr. Nov. Fl. Suec. P. 11. f. Schlechtendal *Linnaea* B. 4. Heft 3. S. 413. und 415. Ferner *H. dubium* Leers f. 1. Nachtr. *H. maculatum* All. u. a. Auch variiert diese Pflanze an verschiedenen Standörtern. Zuweilen mit wellenrandigen Blättern, aber *Hyp. undulatum* Schousb. (f. 1. Nachtr.) welches Sprengel hierher gezogen hat, ist eine besondere Art, denn die Pflanze, welche ich unter dem Namen *Hyp. undulatum* erhalten habe, dauert im hiesigen Garten nicht unter freiem Himmel aus, sondern wird in einem frostfreien Behälter überwintert f. 1. Nachtr. B. 4. S. 49.

17. *Hypericum stellarioides* Kunth ist *Hyp. parviflorum* Willd. f. Lexic. B. 4. Wahrscheinlich gehört hierher auch *H. quinquenervium* Walt. und *H. mutilum* Ait. Kew. f. 1. Nachtr. B. 4.

18. *Hypericum pilosum* Walt. ist *H. setosum* Ait. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 52. *H. simplex* Pursh. Auch *Acjrum villosum* Linn. f. Lexic. 1. Aufl. gehört hierher.

19. *Hypericum simplex* Michx.

Unterscheidet sich von dem vorhergehenden hauptsächlich durch längliche, rinnige, angedrückte Blätter, die stockig-sitzig sind, und durch fast stiellose gipfelständige Blumen, mit gewimperten Kelchblättern. Waterl. Carolina. 4

20. *Hypericum frondosum* Michx. Vielblaubiges Johanniskraut.

Neste zweischneidig, wie die Blätter glatt. Blätter länglich-umgekehrteiförmig. Blumen fast einzeln, gipfelständig. Kelchblätter ungleich, so lang als die Corollenblätter. Griffel verbunden. Das Synonym *H. frondosum* im 1. Nachtrage B. 4. S. 53. wird ausgestrichen. Waterl. Teneriffa und Nordamerika. 4

21. *Hypericum amoenum* Pursh. Liebliches Johanniskraut.

Neste zweischneidig. Blätter elliptisch, am Rande gekräuselt-zurückgerollt, unten grau- oder blaulichgrün. Blumen meist einzeln stehend, stiellos. Kelchblätter eiförmig, langgezipft.

spitzt. Corollenblätter zurückgeschlagen, länger als die Staubfäden. Griffel verbunden. Wächst in Georgien. 4

22. *Hypericum sessiliflorum* Willd. herb.

Neste walzenrund. Blätter halb umfassend, länglich = herzförmig, ohne Rippen, punktiert. Blumen meist stiellos, in gipfelfständige Doldentrauben gesammelt. Kelchblätter länglich, gespitzt, länger als die Corollenblätter. Griffel verbunden. Nordamerika.

23. *Hypericum songaricum* Ledeb.

Stengel zusammengedrückt. Blätter herzförmig = elliptisch, stumpf, blauschgrün, punktiert. Kelchblätter langgespitzt.

24. *Hypericum myrtifolium* Lamarck. Myrtenblättriges Johanniskraut.

Neste rundlich. Blätter umfassend, länglich, fast herzförmig, hellpunktiert, fast lederartig. Die Blumen bilden gestielte, gipfelfständige Asterdolden. Kelchblätter länglich, gespitzt, kürzer als die Corollenblätter. Griffel verbunden. Waterl. Nordamerika. 4

25. *Hypericum involutum* Choix. (*Ascyrum involutum* Labillard.) Eingewolltes Johanniskraut.

Stengel krautartig, aufsteigend, vierflügelig. Blätter länglich = eiförmig, stumpf, hell = punktiert. Die Blumen bilden zweitheilige schlaffe Rispen. Kelchblätter lanzettförmig, gespitzt. Corollenblätter eingewollt. Griffel abgekürzt. Waterl. das nördliche Neuhoiland. 4

26. *Hypericum Lalandii* Choix.

Stengel vieredig, schwarz = punktiert. Blätter fast umfassend, lanzettförmig, gespitzt, angedrückt, am Rande zurückgerollt. Die Blumen bilden zweitheilige, wenigblümige Rispen. Kelchblätter linien = lanzettförmig, länger als die Corollenblätter. Waterl. das Kap d. g. Hoffn. 4

27. *Hypericum australe* Tenor. Ant. Spreng. Tent. Suppl. Syst. veg. p. 21.

Stengel aufsteigend oder fast aufrecht, wie die Blätter glatt. Blätter halb umfassend, länglich = elliptisch, stumpf, geadert, am Rande schwarz = punktiert. Die Blumen bilden dreitheilige Asterdolden. Kelchblätter ganzrandig, wie die Corollenblätter schwarz = punktiert. Waterland Sardinien an Asterrändern. 4

28. *Hypericum annulatum* Morison elench. 1. p. 9. Ant. Spr. J. c. p. 21.

Dietr. Ver. ex. Nachtr. IV. Bd.

8 1

Stengel aufrecht, oben glatt, unten wie die Blätter gabelig. Blätter halb umfassend, länglich = oval, geädert, hellpunktirt. Die Blumen bilden dreitheilige rispenartige Aesthoden, deren Bracteen drüsig sind und die Blumenstiele ring = quirlförmig stehen. Kelchblätter lanzettförmig, gespitzt, drüsig = gewimpert. Vaterl. Sardinien, auf Bergen. 4 Blühz. Juli.

29. *Hypericum pusillum* Chois. Kleines Johanniskraut; Hartheu.

Ascyrum humifusum Labill. Hyp. brevistylum Chois.

Stengel gestreckt, viereckig. Blätter länglich, stumpf, hellpunktirt. Blumenstiele gipfelständig. Corollenblätter lanzettförmig, länger als die Kelchblätter. Griffel sehr kurz. Neuholland.

30. *Hypericum sphaerocarpon* Michx. Rundfrüchtiges Hartheu.

Stengel aufrecht, viereckig. Blätter linienförmig, stumpf, punktirt. Die Blumen bilden nackte zweitheilige Rippen. Kelchblätter gespitzt. Kapseln kugelförmig. Nordamerika. 4

31. *Hypericum denticulatum* Kunth. Gezähneltes Hartheu.

H. caulibus herbaceis simplicibus apice bifidis plurifloris, foliis lineari-lanceolatis margine retrorsum denticulatis, floribus decandris trigynis, petalis oblique lanceolatis. Humb. et Bonpl. J. c. V. p. 148. t. 458.

Aus der holzigen Wurzel entwickeln sich krautartige, aufrechte oder aufsteigende, einfache Stengel, die an der Spitze zweitheilig sind. Die Blätter stehen einander gegenüber, ohne Stiele, sind linien = lanzettförmig, gespitzt, am Rande rückwärts gezähnt, glatt, grün, fast eisenfarbig, 4—5 Linien lang, $\frac{2}{3}$ —1 Linie breit. Blumen kurz gestielt, winkelförmig und gipfelständig, gelb, so groß wie die Blumen des *H. humifusum*, dem diese Art gleicht. Kelchblätter lanzettförmig. Vaterl. Mexico. 4 Blühz. Septemb.

32. *Hypericum fastigiatum* Kunth. Gleiches Hartheu.

H. caule herbaceo erecto superne ramoso, ramis elongatis subfastigiatis, foliis oblongo-lanceolatis margine revolutis, floribus icosandris, trigynis, petalis unilatero-obovatis. Humb. et Bonpl. J. c. V. p. 151.

Stengel krautartig, aufrecht, an der Spitze mit gleich ho-

hen, viereckigen, glatten Aesten versehen, die wie die Blätter einander gegenüber stehen. Blätter länglich = lanzettförmig, gespitzt, am Rande zurückgerollt, glatt, 9—10 Linien lang, $2\frac{1}{4}$ Linie breit, die obern neben den Blumen linien = pfriemensförmig. Die Blumen zwölfwännig, dreigriffelig. Corollenblätter einseitig, umgekehrteiförmig. Narben fast trichterförmig. Waterl. Mexiko. 2. Blühz. Septemb.

33. *Hypericum paniculatum* Kunth. Rispenblüthiges Hartheu.

H. caule herbaceo stricto pyramidato-ramoso, multifloro, foliis oblongis subius glaucescentibus, floribus 5—7—andris, trigynis, petalis linearibus. Humb. et Bonpl. J. c. V. p. 151. t. 459.

Eine krautartige, aufrechte, fast pyramidenförmige, 1 Fuß hohe Pflanze, mit spindelförmiger, senkrecht gehender Wurzel. Stengel straff, oben rispenartig getheilt. Aeste, wie die Blätter, einander gegenüber stehend. Blätter länglich, gespitzt, ganzrandig, glatt, mit hellen Punkten, oben lichtgrün, unten graulich = oder meergrün, 9—10 Linien lang, 2—3 Linien breit, die obern, neben den Blumen schmal, linienförmig = länglich. Blumen gestielt, gelb, nur mit wenigen (5—7 Antheren) versehen. Corollenblätter schmal. (Hyp. indecorum et uliginosum Kunth J. c. V. sind Varietäten.) Waterl. Mexiko, Quito, Caracas, bei Urio. 2. Blühz. Sept.

34. *Hypericum elongatum* Ledeb. Verlängertes Hartheu.

Stengel krautartig. Aeste rund. Blätter stiellos, büschelförmig stehend, linienförmig, blaulichgrün, nicht punktiert, am Rande zurückgerollt. Blumenstiele gegenüber stehend. Kelchblätter stumpf, gestreift. Corollenblätter groß, am Rande drüsig. Waterl. Rußland, am Teiche. Saison in Ditione im Lande der Kirgisen (Bewohner der Steppen am Ural.) 2.

β. Calycibus glanduloso-serratis.

Kelchblätter drüsig = sägerandig.

35. *Hypericum dentatum* Lois. Gezähntes Hartheu.

Stengel fast einfach, walzenrund, aufrecht. Blätter fast den Stengel umfassend, länglich, hell = punktiert, glatt, die obersten gezähnt = gefranzt. Blumen doldentranbig. Waterl. Inf. Stöckad. 2.

36. *Hypericum fimbriatum* Lam. ist *H. Richerii* Vill.

l. Lexic. 1. Aufl. B. 4. Zu dieser Art hat Sprengel folgende gezogen: Hyp. androsaemifolium Vill. H. calabricum N. E. Burserii Cand.

Stengel walzenrund, fast einfach. Blätter umfassend, eiförmig, am Rande schwarz-punktirt. Blumen meist doldentraubig, 3—5 griffelig. Kelchblätter gefranzt. Wächst auf Alpen im mittlern und südlichen Europa. 4

37. *Hypericum nervosum* Don. Nerviges Hartheu.
Hyp. elodeoides Candolle.

Stengel aufrecht, fast einfach. Blätter umfassend, oval, vielrippig, an der Basis drüsig, unten blaulichgrün, glatt. Blumen in doldentraubige Rispen gesammelt. Kelchblätter lanzettförmig, gespitzt, kammförmig-drüsig. Vaterl. Nepal. 4

38. *Hypericum pallens* Don. (*H. nepalense* Cand.)

Stengel walzenrund. Blätter stiellos, länglich, stumpf, häutig, gerippt, glatt. Blumen rispenständig. Kelchblätter lanzettförmig, langgespitzt, drüsig. Corollenblätter oval, mucronenspitzig. Nepal. 4

39. *Hypericum formosum* Kunth. Schönes Hartheu; hübsches Johanniskraut.

H. caule herbaceo erecto apice corymboso multifloro, foliis ovato-oblongis obtusis margine undulato-crispis subtus glaucescentibus, calyce petalisque glanduloso-ciliatis capsulis trilocularibus. Humb. et Bonpl. J. c. V. p. 152. t. 460.

Stengel krautartig, aufrecht, an der Spitze doldentraubenartig getheilt, vielblümig, 1—2 Fuß hoch. Die Blätter stehen einander gegenüber ohne Stiele, sind eiförmig-länglich, stumpf, ganzrandig, wellenförmig-gekräuselt, glatt, oberseits grün, unten grau- oder blaulichgrün, punktirt, 10—14 Linien lang, 6—7 Linien breit. Blumen gestielt, winklig und gipfelständig, so groß wie die Blumen des *H. perforatum* L. Blumenstiele mit linienförmigen Bracteen besetzt. Corollenblätter gelb, halb, d. h. es ist nur eine Seite ausgebildet, diese ist umgekehrteiförmig-keilsförmig, gespitzt, gerippt, glatt, nach der Spitze zu mit schwarz-violetten Punkten versehen, am Rande zart, drüsig gefranzt. Staubfäden zahlreich, kürzer als die Corollenblätter, mit kleinen, rundlichen Antheren gekrönt. Vaterl. Mexico. 4 Blüht. Septemb.

40. *Hypericum capitatum* Choisy. Kopfförmiges Hartheu.

Stengel walzenrund, aufrecht. Blätter linienförmig, stumpflich, blaulichgrün, hell-punktirt, glatt. Blumen kopfförmig stehend. Kelchblätter eiförmig, drüsig-sägezahnig. Wächst am Euphrat. 4

41. *Hypericum confertum* Choix. Dichtblumiges Hartheu.

Stengel aufrecht, an der Basis zottenhaarig. Blätter büschelförmig stehend, lanzettförmig, gespitzt, hell-punktirt, am Rande zurückgerollt, zottenhaarig. Blumen gestielt, gipfelförmig, dicht beisammen stehend. Kelchblätter glatt, am Rande drüsig. Das Vaterland von dieser Art kennt man noch nicht genau. Sprengel hat Kleinasien angezeigt jedoch mit ?

42. *Hypericum Sarothra* Michx. (*H. nudicaule* Walt.)

Stengel niedrig, aufrecht, ästig. Blätter sehr klein, gespitzt, angebrückt, hell-punktirt. Blumen wechselnd stehend, wenigblümig. Hierher gehört *Sarothra gentianoides* Linn. die im Lexic. 1. Aufl. B. 8, S. 623. ausgestrichen wird.

Im Lexikon erste Auflage habe ich von dieser Gattung *Hypericum* 89 Arten beschrieben, von denen aber manche nach genauerer Beobachtung und Vergleichung theils als Synonymen, theils nur als Varietäten zu betrachten sind, oder andern Gattungen angehören, wie aus folgender Synonymenliste deutlich hervorgeht.

Synonymen.

Hypericum acerosum Willd. herb. f. *Hypericum aciculare* N. 15.

— *acuminatum* Lam. f. *Vismia acuminata* Poir.

— *aegyptiacum* Linn. f. Lexic. 1. Auflage ist *Martia polyandra* Spr.

— *alpinum* Kitaib. f. *Hypericum fimbriatum* N. 36.

— *alternifolium* Labill. f. *Reaumuria hypericoides* Willd.

— *amplexicaule* Lam. ist *Hypericum pyramdatum* Lexic.

— *androsæmifolium* Vill. f. *Hypericum fimbriatum* N. 36.

— *angustifolium* Presl. f. *Hypericum elegans* Lexic.

— *arborescens* Vahl. f. Lexic. ist *Vismia arborescens* Choix.

— *aspalathoides* Willd. ist *Hypericum heterophyllum* 1. Nachtr.

— *attenuatum* Fisch. ist *Hypericum corymbosum* var. f. Lexic.

- Hypericum bacciferum** Linn. f. Lexic. *ist Vismia bac-*
cifera Pers.
- **brevistylum** Choisy. f. **Hypericum pusillum**
N. 29.
- **Burserii** Cand. f. **Hypericum fimbriatum**
N. 36.
- **calabricum** N. E. f. **Hypericum fimbria-**
tum N. 36.
- **cayennense** Linn. f. Lexic. *ist Vismia cay-*
ennensis Pers.
- **chinense** Retz. f. Lexic. *ist Hypericum bi-*
florum N. 9.
- **chinense** Linn. *ist Hypericum monogy-*
num Lexic.
- **cochinchinense** Lour. *ist Vismia cochin-*
chinensis Spr.
- **cordifolium** Cand. f. **Hypericum bractea-**
tum N. 2.
- **coriaceum** Blum. f. **Hypericum bractea-**
tum N. 2.
- **cuspidatum** Willd. herb. *ist Vismia ferru-*
ginea Kunth.
- **densiflorum** Pursh. *ist Hypericum rosmari-*
nifolium Lexic.
- **elatum** Ait. f. Lexic. *ist Hypericum cana-*
riense Lexic.
- **elodeoides** Cand. f. **Hypericum nervosum**
N. 37.
- **grandiflorum** Choisy. *ist Hypericum cana-*
riense Lexic.
- **guineense** Linn. Suppl. f. Lexic. *ist Vismia*
guineensis Choisy.
- **hedyotifolium** Poir. *ist Hypericum virga-*
tum 1. Nachtr.
- **javanicum** Blum. *ist Hypericum patulum*
Lexic.
- **indecorum** Kunth. f. **Hypericum panica-**
tum N. 33.
- **juniperinum** Kunth. *ist Hypericum Brathys*
Sm. f. Lexic.
- **kalmianum** Forsk. (non Linn. non du Roi.)
ist Hypericum revolutum Vahl. f. Lexic.

- Hypericum Kohlstanum** Spr. f. 1. Nachtr. ist **Hypericum elegans** Willd. f. Lexic.
- **laevigatum** Ait. f. 1. Nachtr. ist **Hypericum nudiflorum** 1. Nachtr.
- **lasianthus** Linn. hort. Clif. f. **Gordonia Lasianthus** Lexic.
- **lauriforme** Lam. **laurifolium** Willd. f. 1. Nachtr. ist **Vismia lauriformis** Chois.
- **liotardi** Vill. ist **Hypericum humifusum** Var. f. Lexic.
- **lusitanicum** Poir. ist **Hypericum origanifolium**.
- **macrocarpon** Michx. ist **Hypericum ascyroides** Lexic.
- **mexicanum** L. fil. f. Lexic. f. **Hypericum Mutisianum** N. 10.
- **micranthum** Chois. ist **Hypericum corymbosum** Lexic.
- **moesicum** Spr. ist **Hypericum punctatum** Willd. Lexic.
- **moranense** Kunth. ist **Hypericum canadense** Lexic.
- **nepalense** Cand. f. **Hypericum pallens** N. 38.
- **nudicaule** Walt. f. **Hypericum Sarothra** N. 42.
- **pauciflorum** Kunth. ist **Hypericum canadense** Lexic.
- **petiolatum** Linn. fil. ist **Vismia lauriformis**.
- **punctatum** Lam. ist **Hypericum corymbosum** Lexic.
- **quinquenervium** Walt. ist **Hypericum parviflorum** Lexic.
- **reticulatum** Poir. ist **Vismia latifolia** Chois.
- **rostratum** Rafin. f. **Hypericum macrocarpon** N. 5.
- **rufescens** Lam. ist **Vismia rufescens** f. Lex. N. 10.
- **sessilifolium** Aubl. f. Lexic. ist **Vismia sessilifolia** Pers.
- **stellarioides** Kunth. ist **Hypericum parviflorum** Lexic.
- **strictum** Kunth. ist **Hypericum strathiolae-folium** Lexic.

Hypericum tarquense Kunth ist *Hypericum virgatum*
f. 1. Nachtr.

— *tenuifolium* Pursh ist *Hypericum rosmarinifolium* Lexic.

— *tetrapetalum* Lam. f. *Ascyrum stans*. 1 Nachtr.

— *tinctorum* Willd. herb. ist *Hypericum laricifolium* 1. Nachtr.

— *triflorum* Blum. f. *Hypericum Leschenaultii* N. 4.

— *uliginosum* Kunth f. *Hypericum paniculatum* N. 33.

— *uratum* Hamilt. f. *Hypericum oblongifolium* N. 1.

Zu den vorstehenden Synonymen gehören noch einige, welche ich im 1. Nachtrage B. 4. S. 52—53. angezeigt habe, die Sprengel in Syst. Veg. größtentheils ausgelassen, d. h. nicht erwähnt hat.

Hyperrhiza caroliniensis Bosc.

Ein kleiner, kugelförmiger, schwarzer, weicher Schwamm, der zur Familie der Hülsenbauchpilze gehört, und im südlichen Carolina sich findet.

Hypha Persoon. mycol.

Dasselbst sind 6 Arten aufgestellt, die man zur Gattung *Byssus* gezogen hat.

Hyphaene Gaertn. Sem. 2. p. 13. t. 82. f. 4. Hyphäne.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 53.

Blumen dideisch. Kelch und Corolle dreitheilig. Die männliche enthält sechs Staubfäden, die weibliche einen Fruchtknoten mit drei Narben. Steinfrucht einsamig, die Schale lederartig.

Dioecia Hexandria Pers. (Hexandria Trigynia Spr.) Familie Palmen.

1. *Hyphaene coriacea* Gaertn. J. c. t. 82.

Hyphaene Cuciphera Pers. f. 1. Nachtr. (Cucifera thebaica Delil.)

Stamm (Stoß) geringelt, an der Basis zweitheilig, ästig. Laub (Wedel) gefingert=handförmig, glatt. Strunk (Laubstiel) dornig, wie bei *Chamaerops*. Diese Palme wächst in Ober=Ägypten, scheint aber in unsern großen Gärten, trotz der sehr zahlreichen Palmenarten, welche Marius u. a. nach Europa gebracht haben, jetzt noch selten zu sein. In

dem Pariser Verzeichniß: *Tableau de l'école de botanique du Museum. Paris 1814 p. 20.* ist sie unter dem Namen *Cucifera thebaica Delil.* angezeigt und steht daselbst im warmen Hause. h

Hyphasma flavescens, floccosum et roseum Rebert. ist Byssus.

Hypnea hamulosa Lamauroux. ist *Chondria hamulosa* Ag.

Hypnum Linn. Astmoos. Hedwig. stirp. 4. t. 4.

Die Borsten (Frucht- oder Kapselstiele) entwickeln sich aus den Blattwinkeln (seitenständig.) Haube halb. Die Wimpern stehen frei zwischen den Zähnen.

Cryptogamia Sect. 2. (Familie Laubmoose.)

Diese Gattung zählt jetzt 131 Arten, die im Syst. Veg. ed. Sprengel nach der Gestalt, Beschaffenheit und Stellung der Blätter eingetheilt und geordnet sind.

I. *Foliis distichis vel bifariam imbricatis.*

Blätter zweireihig, abstehend oder wie Dachziegeln über einander liegend.

† Blätter gerippt.

1. *Hypnum spiniforme* Linn.

Stengel aufrecht, einfach. Blätter zweireihig, linienförmig, straff, sägeartig gezähnt. Kapsel übergebogen. Deckel schief, schnabelförmig. Waterl. Kap d. g. Hoffm. und Mascaren = Insel.

2. *Hypnum subbasilare* Hooker.

Stengel fast einfach, aufrecht. Blätter zweireihig, abstehend, lanzettförmig, gebogen, an der Spitze sägerandig. Kapsel hängend, länglich.

3. *Hypnum distichum* Swartz.

Stengel einfach, aufrecht. Blätter zweireihig, länglich-eyförmig, an der Spitze gezähnt. Kapsel walzenrund, horizontal stehend. Deckel mit Kreuzschnabel. Neuseeland. 4

4. *Hypnum radiatum* Schwägr.

Stengel aufrecht, einfach. Blätter zweireihig, abstehend, lanzettförmig, spitzig-sägerandig. Kapsel walzenrund, hängend. Insel Mascaren. 4

5. *Hypnum bifarium* Hook. Zweireihiges Astmoos.

Stengel aufrecht, fast ästig. Blätter zweireihig, entfernt stehend, lanzettförmig, sägerandig. Kapsel eiförmig, horizontal. Deckel kreuzschnablig. Wächst in Neuseeland. 4

6. *Hypnum spininervium* Hook.

Stengel aufrecht, ästig. Aeste fast büschelförmig, stehend. Blätter schlaff, zweireihig, abstehend, eiförmig, gespitzt, sägerandig, die Rippen oben gezähnt. Kapsel gefurcht, walzenrund, übergebogen. Neuseeland.

7. *Hypnum arcuatum* Hedwig. Spec. Muscor. ed. Schwägr. t. LXII.8. *Hypnum Boryanum* Schwägr.

Stengel niederliegend, ästig. Blätter zweireihig, wie Dachziegeln über einander liegend, eiförmig, stumpf, ganzrandig, mit 2 Streifen versehen. Ins. Mascaren.

9. *Hypnum Sipha* Bridel.

Stengel kriechend, fast einfach. Blätter zweireihig, lanzettförmig, langgespitzt, ganzrandig. Kapsel länglich, an der Basis höckerig. Deckel pfriemenspizig. Carolina. 4

10. *Hypnum riparium* Linn.

Stengel niederliegend, ästig. Blätter zweireihig, abstehend, eiförmig, ganzrandig. Kapsel übergebogen. Deckel kegelförmig. Wächst in Europa in Quellen und an überschwemmten Orten. 4

11. *Hypnum undulatum* Linn. Wellenblättriges Astmoos.

Stengel liegend, ästig. Blätter zweireihig, wie Dachziegeln über einander liegend, länglich, gespitzt, wellenrandig. Kapsel länglich, gefurcht, übergebogen. Wächst auf Alpen in Europa. 4

12. *Hypnum sylvaticum* Linn. Waldbliebendes Astmoos.

Stengel gestreckt, fast ästig. Blätter zweireihig, lanzettförmig, ganzrandig, fast 2rippig. Borste seitenständig. Kapsel übergebogen. Deckel kurz geschnäbelt. Wächst im nördlichen und mittleren Europa in Wäldern. 4 (*H. Donniana* Engl. bot. et *H. obtusatum* Wahlenb. sind Varietäten.)

†† Blätter ohne Rippen.

13. *Hypnum elegans* Hook.

Stengel liegend, ästig. Blätter zweireihig, abstehend, länglich, an der Spitze gezähnt, fast gekrümmt. Kapsel eiförmig, übergebogen. Deckel langgespitzt. Nordamerika an der Mündung des Meeres.

14. *Hypnum subsimplex* Schwägr. in Hedw. Spec. musc. t. LXIX.

Wächst in Südamerika.

15. *Hypnum Auberti* Schwägr. (*Leskea nicens* Brid.)

Stengel liegend, zweitheilig = ästig. Blätter zweireihig, wie Dachziegeln über einander liegend, eiförmig, mucronenspizig, die Mucronen gekrümmt, ganzrandig. Kapsel walzenrund, fast übergebogen. Ins. Mascaren.

16. *Hypnum splachnifolium* Bridel.

Stengel kriechend, fast ästig. Blätter wie bei N. 15. gestellt, aber lanzettförmig = pfriemenspizig, zart, nehradrig. Kapsel länglich. Deckel schnabelförmig. Ins. Mascaren. 4

17. *Hypnum denticulatum* Linn. Gezähneltes Astmoos.

Stengel gestreckt, fast kriechend. Blätter zweireihig, gezähnt oder ganzrandig. Kapsel fast übergebogen. Deckel kegelförmig. Europa. 4

18. *Hypnum planum* Bridel.

Stengel kriechend, ästig. Blätter zweireihig, wie Dachziegeln gelagert, eiförmig, gespizt, fast ganzrandig, scharf. Kapsel eiförmig, horizontal abstehend. Domingo

19. *Hypnum Richardi* Schwägr.

Stengel niederliegend, scheidig = ästig. Blätter zweireihig, abstehend, lanzettförmig, gespizt, ganzrandig. Kapsel kreiselförmig. Deckel schnabelförmig. Guiana.

20. *Hypnum serratum* P. Brown.

Stengel aufsteigend, scheidig = ästig. Blätter zweireihig, abstehend, dreieckig = lanzettförmig, sägerandig. Kapselstiel sehr lang. Ins. Mascaren.

II. *Foliiis secundis*. Blätter einseitig, einreihig.

+ Blätter gerippt.

21. *Hypnum filicinum* Hedw. Spec. muscor. frond. ed. Schwägr. t. LXXVI.22. *Hypnum aduncum* Linn.

Stengel aufrecht, ästig, die Aeste abstehend. Blätter eiförmig = lanzettförmig, langgespizt, ganzrandig, gekrümmt, die oberen sichelförmig = einseitig. Kapsel gekrümmt, übergebogen. Wächst in Sümpfen in Europa und Nordamerika, und hat einige Varietäten.

23. *Hypnum uncinatum* Hedwig. Hakenförmiges Astmoos.

Stengel niedertiegend, ästig. Blätter alle sichelförmig = einseitig, linien = pfriemensförmig, mit zwei Streifen versehen. Kapsel walzenrund, übergebogen. Wächst an Bergen in Europa. 4

24. *Hypnum fluitans* Linn. (*H. scoparium* Bridel.)
Stengel hart, ästig, verlängert. Blätter etwas entfernt stehend, linien-
spriemenspizig, sichelförmig-einseitig. Kapsel walzenrund, übergebogen. Wächst in Wässern in Europa und Nordamerika.
25. *Hypnum falcatum* Bridel.
Stengel lang, schwimmend, ästig. Blätter herzförmig, langgespitzt, ganzrandig, sichelförmig-einseitig. Kapsel walzenrund, aufsteigend. Wächst in Quellen und Alpenbächen in Europa. 4
26. *Hypnum crispifolium* Hook. Krausblättriges Astmoos.
Stengel kriechend, ästig. Blätter herz-lanzettförmig, langgespitzt, sägerandig, in trockenem Zustande gedreht. Kapselstiel (Borste) scharf. Kapsel übergebogen. Nordamerika in der Nähe des Meeres.
27. *Hypnum robustum* Hook.
Stengel aufrecht, ästig. Blätter dicht stehend, wie Dachziegel über einander liegend, sichelförmig-einseitig, eiförmig, langgespitzt, fast ganzrandig, gestreift. Kapsel länglich-eiförmig, übergebogen. Vaterl. und Standort wie vorige Art. 4
28. *Hypnum tenuifolium* Hedw. musc. frond. ed. Schwägg. t. LXXV.
†† Foliis secundis. enervis. Blätter einseitig, ohne Rippen.
29. *Hypnum palustre* Linn. Sumpfliebendes Astmoos.
Stengel kriechend, scheibig-ästig. Blätter einseitig, lanzettförmig, ganzrandig, die Rippen meist fehlend. Kapsel länglich-eiförmig, übergebogen. Europa auf Gebirgen in Sümpfen. *H. luridum* Hedwig. *H. fluviatile et adnatum* Turner gehören hierher.
30. *Hypnum scorpioides* Linn.
Stengel aufsteigend, ästig, oben verdickt. Blätter einseitig, länglich, stumpflich, ganzrandig. Kapsel gekrümmt. Europa in Sümpfen und an feuchten Stellen. 4
31. *Hypnum cupressiforme* Linn. (*H. polyanthes* Smith. *H. nigro-viride* Dicks.)
Stengel sehr ästig. Aeste rundlich. Blätter einseitig, wie Dachziegel über einander liegend, lanzettförmig, langgespitzt, fast ganzrandig. Kapsel rundlich. Europa, Asien und Afrika. 4

32. *Hypnum imponens* Hedw. musc. t. LXXVII.

Stengel liegend, ästig. Aeste zweireihig, gekrümmt. Blätter lanzettförmig, langgespitzt, sichel = hakenförmig. Kapsel länglich, aufrecht. Nordamerika. 4

33. *Hypnum curvifolium* Hedw. musc. t. LXXV. (H. circinalis Hook.)

Stengel fast aufrecht, ästig. Blätter sichel = hakenförmig, linienförmig, langgespitzt. Kapsel übergebogen, gekrümmt. Nordamerika in Sümpfen. 4

34. *Hypnum amoenum* Hedw. musc. t. LXXVII.

Stengel liegend, scheidig = ästig. Blätter linienförmig, langgespitzt, sichelförmig, zart, fast gezähnt. Kapsel krugförmig, übergebogen. Neuseeland. 4

35. *Hypnum recurvans* Schwägr. (*Leskea recurvans* et *squarrosa* Michx.)

Stengel kriechend; ästig. Blätter fast in zwei Reihen gestellt, linien = lanzettförmig, langgespitzt, ganzrandig, sichelförmig, aufrecht. Kapsel eiförmig, übergebogen. Deckel krenzförmig. Nordamerika. 4

36. *Hypnum silesiacum* P. Br. (*Leskea Seligeri* Brid.)

Stengel kriechend. Aeste aufsteigend. Blätter schlaff, einseitig, wie Dachziegel über einander liegend, linien = lanzettförmig, langgespitzt, undeutlich zweirippig, gezähnt. Kapsel gekrümmt, übergebogen. Deckel kegelförmig. Wächst in Europa. 4

37. *Hypnum incurvatum* Schrader. (H. *leskeoides* Bridel.)

Stengel kriechend. Aeste zart, aufsteigend, gekrümmt. Blätter nach einer Seite gerichtet, lanzettförmig, langgespitzt, ganzrandig. Kapsel horizontal stehend. Deckel schnabelförmig. Deutschland, die Schweiz und Frankreich. 4

38. *Hypnum reptile* Michx.

Stengel kriechend. Aeste abgekürzt, niedertiegend. Blätter sichelförmig gebogen, lanzettförmig, langgespitzt, ganzrandig. Kapsel walzenrund, horizontal stehend. Deckel mucronenspitzig. Wächst in Carolina. 4

39. *Hypnum molluscum* Hedw.

Stengel liegend, sehr ästig. Aeste einfach, gekrümmt. Blätter einseitig, wie Dachziegel über einander liegend, eiförmig, fast gezähnt, der Rand flach. Kapsel übergebogen, gekrümmt. Deckel kegelförmig. Auf Wiesen in Europa. 4

40. *Hypnum Crista castrensis* Linn.

Stengel ästig. Aeste doppelt gefiedert = lammsförmig. Blätter sichel- oder einseitig, ey = lanzettförmig, gezähnt, gefaltet = gestreift. Kapseln übergebogen, gekrümmt. Deckel kegelförmig. Vaterl. das mittlere Europa, besonders Deutschland, in Thüringen u. a. Gegenden. 4

41. *Hypnum leptorrhynchon* Schwägr. (*H. cyparioides* Brid. *tenuirostra* Hook.)

Stengel liegend, sehr ästig. Blätter linien = sichel- förmig, langgespitzt, an der Spitze gezähnt. Kapsel länglich, horizontal. Deckel verlängert, sehr dünn, schnabelförmig. Neuholland. 4

42. *Hypnum laeptochaeton* Schwägr.

Stengel kriechend. Aeste niedergebückt. Blätter ey = sichel- förmig, langgespitzt, ganzrandig. Kapsel hängend, frugförmig. Deckel langschnabelig. Martinique, Capenne. 4

III. Foliis directione variis.

Blätter verschieden gerichtet und gestellt.

+ Blätter sparrig.

43. *Hypnum squarrosum* Linn. Sparriges Astmoos.

Stengel rundlich, scheidig = ästig. Blätter fast herz = lanzett- förmig, langgespitzt, gezähnt, zurückgekrümmt, an der Basis mit zwei undeutlichen Rippen. Kapsel eyförmig, übergebogen. Deckel kegelförmig. Europa, vornehmlich Deutschland. 4

44. *Hypnum triquetrum* Linn. Dreiseitiges Astmoos.

Stengel ästig. Aeste abstehend, fast gekrümmt. Blätter dreiseitig = lanzettförmig, langgespitzt, gezähnt, fast gestreift. Kapsel eyförmig, übergebogen. Deckel kegelförmig. Europa. 4

45. *Hypnum brevirostre* Ehrh. Kurzgeschnabeltes Astmoos.

Stengel aufsteigend, ästig. Blätter herz = eyförmig, lang- gespitzt, gezähnt, an der Basis mit zwei Streifen versehen, die untern sparrig. Kapsel länglich, horizontal. Deckel sehr kurz geschnabelt, mucronenspitzig. Europa. 4

46. *Hypnum loreum* Linn. Riemenförmiges Astmoos.

Stengel ästig. Aeste lang, gekrümmt. Blätter fadenförmig, gebogen = sparrig, fast einseitig, ey = lanzettförmig, pfriemen- spitzig, ganzrandig, gestreift. Kapsel kugelförmig. Deckel fast kugelförmig, übergebogen. Europa. 4

47. *Hypnum stellatum* Schreber. (*H. polymorphum* Hedw. musc. frond. ed. Schwägr. t. LXVI.)

Europa in Sümpfen. 4

48. *Hypnum chrysophyllum* Bridel. (*H. polymorphum* Hooker.)

Stengel liegend, ästig. Blätter abstehend, fast zurückgekrümmt, eilanzettförmig, langgespitzt, ganzrandig. Kapsel länglich, gekrümmt. Deckel kegelförmig. Wächst in England, der Schweiz und in Deutschland, z. B. in Schlessen u. a. G. 24

49. *Hypnum chrysostomum* Michx.

Stengel liegend, scheidig-ästig. Blätter abstehend, fast zurückgekrümmt, dreieckig, an der langen Spitze gezähnt. Borste scharf. Kapsel eiförmig, übergebogen. Deckel mucronispizig. Wächst in Carolina. 24

50. *Hypnum hians* Hedw. musc. frond. ed. Schwägr. t. LXX.

Waterl. Pennsylvanien.

51. *Hypnum aticulare* Brid. (*H. cuculifolium* P. Br. *H. densifolium* Brid.)

Stengel aufsteigend, scheidig-ästig. Blätter breit, eiförmig, langgespitzt, wellenrandig, an der Spitze fast gezähnt. Kapsel länglich, gekrümmt. Deckel mit einem langen pfriemenspizigen Schnabel versehen. Waterl. Neuholland; van Diemenland. 24

52. *Hypnum taxarion* Schwägr.

Stengel kriechend. Aeste aufrecht, gekrümmt, an der Spitze fadenförmig verdünnt. Stengelblätter sparrig. Aestblätter aufrecht, herzförmig, langgespitzt, ganzrandig, gerippt. Domingo. 24

53. *Hypnum Halleri* Linn. fil. (*H. dimorphum* Brid. *H. squarrosum* Voit.)

Stengel kriechend. Aeste aufrecht. Blätter gedrängt stehend, wie Dachziegel über einander liegend, lanzettförmig, gespitzt, fast gezähnt. Kapsel übergebogen. Deckel kegelförmig. Wächst in der Schweiz und im südlichen Deutschland. 24

†† Blätter ganzrandig, gerippt, aufrecht-abstehend.

54. *Hypnum nitens* Schreb.

Stengel aufrecht. Aeste kurz, abstehend. Blätter lanzettförmig, langgespitzt, gestreift, glänzend. Borste (Kapselstiel) glatt. Kapsel länglich, gekrümmt. Deckel kegelförmig. Wächst in Sümpfen in Europa und Nordamerika. 24

55. *Hypnum fluviatile* Hedw. musc. ed. Schwägr. p. 27. t. LXXI. f. 4.

Wächst in Wässern in Schweden, Frankreich. 24 Hierher

H. fallax, Selig-ri, Vallisclusae et flagelliforme
Bridel. *H. ortocladon* P. Br.

56. *Hypnum microphyllum* Hedw. musc. ed. Schwägr.
p. 269. t. LXXIX. f. 1—4.

Kleinblättriges Astmoos. Wächst in Pensylvanien und
Jamaica.

57. *Hypnum tenax* Hedw. musc. frond. ed. Schw. p.
277. t. LXXII.

58. *Hypnum gratum* P. Brown.

Stengel kriechend, doppelt gefiedert. Blätter herzförmig-
langgespitzt, ganzrandig, getrocknet, an der Spitze eingebogen.
Kapselstiel scharf. Kapsel länglich, horizontal. Deckel mit
einem Schnabel versehen. Guinea und Domingo. 4

59. *Hypnum cordifolium* Hedw. Stirp. crypt. IV. p.
97. t. 37.

Wächst in Schweden und Deutschland, an Wassergräben in
Wäldern. 2c. 4

+++ Blätter sägerandig oder gezähnt.

60. *Hypnum pompuleum* Hedw. musc. frond. ed. Schw.
p. 270. t. LXX. f. 1.

Wächst in Europa an Pappelfstämmen, z. B. *P. tremu-
lans* L. u. a. 4

61. *Hypnum reflexum* Stark. (*H. saxicola* Voit.)

Stengel kriechend. Nester abgekürzt, gekrümmt. Blätter
absteigend, ey-lanzettförmig, gespitzt, gezähnt, am Rande
zurückgeschlagen. Kapselstiel scharf. Kapsel bauchig, überge-
bogen. Deckel mucronenspitzig. Wächst auf den Endeten und
Alpen in Schottland. 4

62. *Hypnum bavaricum* Voit.

Stengel aufsteigend, ästig. Nester aufrecht. Blätter abste-
hend, ey-lanzettförmig, langgespitzt, auf dem Rücken scharf.
Kapselstiel glatt. Kapsel überhängend. Deckel mucronenspitzig.
Wächst in Baiern. 4

63. *Hypnum inflectens* Bridel.

Stengel aufrecht, oben ästig. Nester büschelförmig, meist
eingebogen. Blätter ey-lanzettförmig, gezähnt. Kapsel wal-
zenrund, gefurcht. Deckel kreuzschnabelig. Brasilien.

64. *Hypnum alopecurum* Linn.

Stengel aufrecht, unten nackt, oben büschelförmig-ästig.
Blätter zerstreut stehend, gespitzt, ausgehöhlt, sägerandig.
Kap:

Kapsel eiförmig, übergebogen. Deckel schnabelförmig. Waterl. Europa. 4

55. *Hypnum comosum* Labill. (*Bryum dendroides* L. fil. Schopfiges Astmoos.

Stengel aufrecht, ästig. Nester oben quirlförmig = gebüschelt. Blätter gedrängt stehend, ausgebreitet, lanzettförmig, feinspizig, gezähnt. Kapsel hängend, gesurcht. Deckel kreuzschnäbelig. Waterl. Neuholand. 4

56. *Hypnum Menziesii* Hook.

Stengel aufrecht, unten nackt. Die obere Nester gebüschelt, niederhängend. Blätter wie Dachziegeln über einander liegend, an der Spitze gezähnt. Kapselstiel lang, knieartig gebogen. Kapsel keulenförmig, verlängert. Deckel kegelförmig, Neuseeland. 4

57. *Hypnum mnioides* Hook.

Stengel ästig, aufrecht. Blätter wie Dachziegeln über einander liegend, knieartig gebogen, linien = lanzettförmig, sägerandig, weit gedreht. Kapsel walzenrund, überhängend.

†† Nervo evanido.

α. Blätter ganzrandig.

58. *Hypnum abietinum* Linn.

Stengel aufsteigend. Nester gefiedert. Blätter wie Dachziegeln über einander liegend, blässig, eiförmig, langgespitzt, gefaltet = gestreift, am Rande fast zurückgerollt. Kapselstiel glatt. Kapsel walzenrund, gekrümmt, übergebogen. Waterl. Europa. 4

59. *Hypnum proliferum* Linn. Sprossendes Astmoos.

Stengel aufrecht. Nester doppelt zusammengesetzt, absteigend, die obere eingerollt. Blätter eiförmig, langgespitzt, die obere ohne Rippen. Kapselstiel glatt. Kapsel übergebogen. Deckel schnabelförmig. Hierher gehören: *H. delicatulum* Schrad. *H. recognitum* et *tamariscinum* Hedw. Waterl. Europa, Nordamerika und Nepal. 4

70. *Hypnum catenulatum* Schwägr. (*Pterigynandrum* Bridel. *Grimmia* Mohr.)

Stengel niederliegend. Nester gekrümmt. Blätter wie Dachziegeln über einander liegend, sehr klein, eiförmig, gespitzt, am Rande gefaltet. Kapsel länglich, gekrümmt. Deckel schnabelförmig. Wächst auf Alpen in Deutschland und der Schweiz. 4

Diatr. Ter. 2r. Nachtr. 1V. Bb.

M m

71. *Hypnum minutulum* Hedw. Stirp. Crypt. IV. p. 90. t. 34.
Wasserl. Pensylvanien. 24
72. *Hypnum Blandovii* Mohr.
Stengel aufrecht, ästig. Aeste abstehend = zurückgeschlagen, mit kleinen Wurzeln dicht besetzt. Blätter wie Dachziegeln über einander liegend, herzförmig, langgespißt. Kapsel gekrümmt, horizontal stehend. Deckel kegelförmig.
73. *Hypnum curvatum* Swartz. *H. myosuroides* Hedw. Stirp. Crypt. p. 20. t. 8. (*Leskea curvata* Voit.)
Europa in Wäldern und Nordamerika. 24
74. *Hypnum murale* Necker. *H. abbreviatum* Hedw. musc. frond. ed. Schwägr. p. 249. t. LXV. f. 1-4.
75. *Hypnum molle* Dickson fasc. 11. p. 11. t. 5. f. 8. Hedw. musc. frond. ed. Schw. p. 273. t. LXX. f. 7-10.
Wasserl. Schottland an und in Alpen-Bächen. 24
76. *Hypnum praecox* Hedwig musc. frond. ed. Schw. t. LXIV. f. 11.
Wächst in Schweden auf der Erde. 24
77. *Hypnum purum* Linn. *H. illecebrum* Hedw. musc. frond. p. 252. t. LXVI. f. 1-3.
Wächst in Wäldern in Europa und Nordamerika. 24
78. *Hypnum firamineum* Dicks.
Stengel aufrecht. Aeste fadenförmig. Blätter wie Dachziegeln über einander liegend, länglich = eiförmig, glänzend. Kapsel gekrümmt, übergebogen. Deckel kegelförmig. Wächst in Europa in Sümpfen. 24
79. *Hypnum albicans* Necker. Weißliches Astmoos. (*H. oxycladon* Brid.)
Stengel aufsteigend, fast ästig. Blätter aufrecht = abstehend, ey = lanzettförmig, langgespißt, gestreift, glänzend. Kapsel länglich = eiförmig, übergebogen. Deckel kegelförmig. Wächst auf Sandböden in Europa und Nordamerika. 24
80. *Hypnum neglectum* Bridel.
Stengel kriechend, wurzelnd. Blätter abstehend, eiförmig, gespißt, ausgehöhlt. Kapsel eiförmig, übergebogen. Deckel kegelförmig.
81. *Hypnum serpens* Hedwig. Stirp. Crypt. IV. p. 45.

- t. 18. Hierher *H. tenue* Schrad. *H. contextum* et *spinulosum* Hedw. musc. p. 269. t. LXIX. f. 8—10.
82. *Hypnum tenellum* Dicks.
Stengel kriechend. Blätter büschelförmig stehend, aufrecht, lanzett = pfriemensförmig. Kapsel übergebogen. Deckel schnabelförmig. Wächst in England.
83. *Hypnum nudicaule* P. Br. (*H. debile* Bridel.)
Stengel kriechend, fast ästig. Blätter entfernt stehend, ausgebreitet, herz = lanzettförmig, mit einer langen Endborste. Kapsel fast walzenrund, übergebogen. Deckel pfriemensspizig. Nordamerika.
β. Blätter sägerandig oder gezähnt.
84. *Hypnum salebrosum* Hofm. ist *H. plumosum* Hedw. Stirp. Crypt. IV. p. 37. t. 23. (*H. fasciculatum* Lam.)
85. *Hypnum confertum* Dicks. ist *H. serrulatum* Hedw. musc. frond. p. 238. t. LX.
Wächst in England und Pennsylvanien. 4
86. *Hypnum megapolitanum* Mohr. (*H. algirianum* Brid.)
Stengel niederliegend, scheidig, ästig. Aeste fadenförmig, gebogen. Blätter ey = lanzettförmig, langgespitzt, an der Spitze gezähnt. Kapsel länglich. Deckel schnabelförmig. Wächst in Deutschland, der Schweiz und im nördlichen Afrika. 4
87. *Hypnum polyrhizon* Brid.
Stengel liegend. Aeste wurzelnd. Blätter aufrecht, strass, ey = lanzettförmig, an der Spitze gezähnt. Kapsel eyrund. Deckel schnabelförmig. Nordamerika. 4
88. *Hypnum capillaceum* Brid.
Stengel kriechend, ästig. Blätter zerstreut stehend, aufrecht, lanzettförmig, sägerandig, durchscheinend weißlich. Kapsel eyrund, angeschwollen. Deckel kegelförmig. Schlesien. 4
89. *Hypnum firigosum* Hofm. (*H. thuringicum* Brid.)
Stengel kriechend. Aeste büschelförmig stehend, gekrümmt. Blätter wie Dachziegelu über einander liegend.
90. *Hypnum Buchanani* Hook.
Stengel ästig. Aeste aufrecht, fadenförmig. Blätter eyförmig, langgespitzt, wie Dachziegelu über einander liegend, an der Basis gestreift. Kapsel länglich, übergebogen. Deckel stumpf. Nepal. 4
91. *Hypnum firiatum* Schreb. spicileg. p. 92. Hedw.
M m 2

Stirp. Crypt. IV. p. 32. t. 13. Dill. hist. muse. t. 38. f. 30. (*H. longirostris* Ehrh.) Nordamerika.

92. *Hypnum myosuroides* Linn.

Stengel kriechend. Nester büschelförmig stehend, an der Spitze eingebogen. Blätter aufrecht = abstehend, lanzettförmig, sägerandig, der Rand an der Basis und Spitze zurückgeschlagen. Kapsel überhängend, eiförmig = walzenrund. Deckel schneibelförmig. Wächst in Schweden und England. 4

93. *Hypnum ruscifolium* Necker. (*H. riparioides* Hedw. Stirp. Crypt. IV. p. 10. t. 4. *H. prolixum* Dicks. *H. atlanticum* Desf.)

Wächst in Europa und Nordafrika an Flüssen. 4

94. *Hypnum stoloniferum* Hook.

Stengel kriechend, oben ästig. Nester aufrecht, gestiebt, ästig. Blätter aufrecht, länglich = eiförmig, an der Spitze gezähnt, wie Dachziegeln über einander liegend. Kapselstiel kurz. Kapsel eiförmig. Nordamerika. 4

95. *Hypnum praelongum* Linn. Hedw. Stirp. Crypt. IV. p. 76. t. 29. (*H. Stockesii* et *Swartzii* Turn. *H. atrovirens* Swartz.)

Wächst in Europa in Wäldern an schattigen niedern Orten, an Baumstämmen.

96. *Hypnum rutabulum* Linn. Hedw. Stirp. Cr. IV. p. 29. t. 12. (*H. brevirostre* et *crenulatum* Smith.)

Wächst in Europa an Stämmen. 4

97. *Hypnum flagellare* Dicks. Hedw. musc. frond. ed. Schwägr. p. 282. t. LXXIII. f. 1—3. (*H. umbraculum* Smith.)

98. *Hypnum illecebrum* Linn. Hedw. musc. frond. p. 52. t. LXVI. f. 1. 2. (*H. Tourrettii* Brid.)

Wächst in der Schweiz und Frankreich. 4

99. *Hypnum intricatum* Hedw. Stirp. Cr. IV. p. 73. t. 28. Vill. Par. t. 28. f. 6. 7. (*H. velutinum* Linn.)

Wächst auf der Erde und an Baumstämmen in Europa und Nordamerika. 4

100. *Hypnum piliferum* Schreb. Spicil. Hedw. Stirp. Cr. IV. p. 33. t. 14.

101. *Hypnum Schreberi* Willd. (*H. compressum* Schreb. *H. muticum* Sw.)

Stengel aufrecht, ästig. Nester zusammengedrückt. Blätter

wie Dachziegeln über einander liegend, eysförmig, ausgehöhlt. Kapselstiel glatt. Kapsel übergebogen. Deckel kegelförmig. Vaterl. Europa. 2

+++ Blätter ohne Rippen, ganzrandig oder gezähnt.

102. *Hypnum cuspidatum* Linn.

Stengel aufrecht, ästig. Aeste walzenrund, feingespitzt. Blätter länglich-eysförmig, gespitzt, ganzrandig, untere abstehend, obere eingerollt. Kapsel gekrümmt, Deckel mucronenspizig. Europa. 2

103. *Hypnum splendens* Hedw. musc. frond. p. 262. t. LXVII. f. 6. 9. Dill. hist. musc. t. 55. f. 1. 3. (H. parietinum Swartz.) Europa.

104. *Hypnum adnatum* Hedw. musc. frond. p. 249. t. LXIV. f. 5. Nordamerika.

105. *Hypnum cochlearifolium* Schwägr.

Stengel kriechend. Aeste aufsteigend, an der Spitze wurzelnd. Blätter angedrückt, rundlich-ausgehöhlt. Kapsel länglich, horizontal stehend. Vaterl. Neuhoolland und Südamerika.

106. *Hypnum crassiculum* Schwägr.

Stengel kriechend. Aeste abgekürzt. Blätter zerstreut stehend, lanzettförmig, langgespitzt, glänzend. Kapsel länglich. Deckel langsnabelig. Neugranada. 2

107. *Hypnum Arbuscula* Hooker. (Hookeria Arbuscula Smith.)

Stengel aufrecht, unten nackt, oben ästig, baumartig. Blätter eysförmig, ausgehöhlt, an der Basis fast zweirippig. Kapsel kurzgestielt, länglich, aufrecht. Neuzeeland. 2

108. *Hypnum umbrosum* Hoffm. fl. germ. Hedw. musc. frond. p. 263. t. LXVII. f. 10—12.

Wächst in Deutschland in Wäldern. 2

109. *Hypnum reptans* Swartz. Prodr. p. 140. Hedw. musc. fr. p. 265. t. LXVIII.

Vaterl. Westindien. 2

110. *Hypnum intortum* P. Br.

Stengel kriechend. Aeste einfach, aufrecht. Blätter zerstreut stehend, linien-lanzettförmig, entfernt gezähnt. Kapsel überhängend, trugförmig. Deckel kreuzsnabelig. Mascaren-Insel.

111. *Hypnum elegantulum* Hook. (H. pallidum Kunth.)

Stengel kriechend, ästig. Blätter abstehend, eysförmig,

langgespitzt, gezähnt. Kapsel übergebogen. Deckel kegelförmig. Neugranada. 4

Einige Arten dieser reichen Laubmoosgattung habe ich deswegen nicht aufgenommen und beschrieben, weil sie noch einer nähern Untersuchung und Vergleichung bedürfen, und daher nur als Varietäten zu betrachten sind. *B. B. Hypnum taxiforme*, *nigricaula* Brid. *H. rugosum* Linn. *H. tenuifolium* Hedw. *H. sphaerocarpon* Spr. *H. aquatile* Mart. *H. andicola* Hook. u. a.

Hypoealyptus calyptratus Thunb. ist *Podalyria calyptrata* Willd. f. Lexic. B. 7

— *glaucus* Thunb. ist *Podalyria buxifolia* Willd. f. Lexic. B. 7.

— *obcordatus* Thunb. ist *Virgilia intrusa* R. Br. f. 1. Nachtr. B. 9.

— *pedunculatus* Thunb. ist *Podalyria biflora* Willd. Lam. f. Lexic. B. 7.

Hypochnus coerulea Fr. ist *Telephora septimenta*.

Hypochnus fuscus Fr. ist *Telephora vinosa* Pers.

Hypochoeris Linn. Ferkelkraut f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 54.

Blumendecke (Kelch) schuppig, die Schuppen wie Dachziegel über einander liegend. Fruchtboden mit Spreublättchen besetzt. Saamentrone gefiedert; auf den äußeren randständigen Saamen stiellos, auf den innern gestielt. (Abbild. Schumbrs Handb. t. 225.)

Syngenesia 1. Ordn. (Familie Compositae; Eichoraceen.)

1. *Hypochoeris radicata* Linn. f. Lexic. 1. Aufl. B. 4. *Achyrophorus radicans* Scopol.

Wurzel meist spindelförmig, sehr lang. Wurzelblätter länglich, stumpf, schrotsägeförmig, behaart, auf der Erde ausgebreitet. Stengel ästig, fast nackt, walzenrund, glatt, grün, 1—2 Fuß hoch. Blumen einzeln, gipfelständig, gestielt, die Stiele oben verdickt. Blümchen gelb. Kelche borstig. Spreublättchen an der Basis meist häutig, langgespitzt, die Spitze borstenförmig, gelb. Vaterl. Europa, besonders Deutschland, z. B. Thüringen u. a. G. 4 Blühz. Sommer.

2. *Hypochoeris macrorrhiza* Gunth. Großwurzliches Ferkelkraut.

Wurzel ziemlich groß, mehr oder weniger getheilt. Stengel fast nackt, fast einfach, glatt. Blätter scharfborstig. Wur-

gelbblätter lanzettförmig, gespitzt, wenig gezähnt. Stengelblätter linien-fadenförmig. Kelch glatt. Vaterl. Calabrien. 4

3. *Hypochoeris arenaria* Gaudich. Sandliebendes Ferkelkraut.

Stengel ästig, aufrecht. Blätter fiederspaltig, feinborstig. Kelche behaart. Vaterl. Ins. Gallland. 4 ?

4. *Hypochoeris maculata* Linn.

Wurzelblätter stiellos, elliptisch-länglich, gezähnt, gefleckt, wie der Stengel borstig-zottenhaarig. Stengel aufrecht, straff, meist nackt, einfach oder mit 1—2 Seitenästen versehen. Blumenstiele oben verdickt. Uebrigens s. Verikon 1. Aufl.

5. *Hypochoeris sonchioides* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. IV. p. 2. t. 301. Conchusartiges Ferkelkraut.

H. sessiliflora Kunth J. c. variet. ?

H. acaulis, foliis lanceolatis acutis in petiolum decurrentibus superne dentatis glabris, pedunculo solitario unifloro superne incrassato bracteato, involucrio glabro. Humb. et Bonpl. IV. p. 2. t. 301.

Die Blätter, welche an der perennirenden Wurzel stehen sind gestielt, lanzettförmig, gespitzt, an der Basis schmal, am Blattstiele herablaufend, ganzrandig, nach oben zu entfernt gezähnt, geadert, glatt, ungefähr $\frac{1}{2}$ Fuß lang. Der Blumenstiel erhebt sich unmittelbar aus der Wurzel, ist einblüsig, oben stärker als unten, 3—4 Zoll lang, kürzer als die Blätter, mit etlichen (4—6) linienförmigen, röthlichen Bracteen besetzt, die an der Spitze gefranzt sind. Der Blumenkopf ist groß, fast halbkugelig, ungefähr $2\frac{1}{2}$ Zoll im Durchmesser breit, der gemeinschaftliche Kelch vielblättrig, glatt. Blümchen gelb, zungenförmig, an der Spitze fünfzählig. Spreublättchen linienförmig, an der Spitze mit drei grannenartigen Zähnen versehen, davon der mittlere länger ist als die seitenständigen. Saamentrone federartig, kürzer als die Grannen der Spreublättchen. Vaterl. Quito, an dem feuerspeienden Berge Pichincha. 4 Blühz. April, Mai.

Die Ferkelkräuter tragen alle gelbe Blumen, die im Sommer sich entwickeln. Man zieht sie aus Saamen, der von einigen in warmen Ländern wildwachsenden Arten in ein warmes Beet, von den übrigen ins freie Land gesät wird. Manche lassen sich auch durch Wurzeltheilung vermehren. Die übrigen hierher gehörenden Arten siehe Verikon und 1. Nachtrag.

H. fallax, Selig-ri, Vallisclusausae et flagelliforme
Bridel. *H. ortocladon* P. Br.

56. *Hypnum microphyllum* Hedw. musc. ed. Schwägr.
p. 269. t. LXXIX. f. 1—4.

Steinblättriges Astmoos. Wächst in Pensylvanien und
Jamaica.

57. *Hypnum tenax* Hedw. musc. frond. ed. Schw. p.
277. t. LXXII.

58. *Hypnum gratum* P. Brown.

Stengel kriechend, doppelt gefiedert. Blätter herzförmig-
langgespitzt, ganzrandig, getrocknet, an der Spitze eingebogen.
Kapselstiel scharf. Kapsel länglich, horizontal. Deckel mit
einem Schnabel versehen. Guinea und Domingo. 4

59. *Hypnum cordifolium* Hedw. Stirp. crypt. IV. p.
97. t. 37.

Wächst in Schweden und Deutschland, an Wassergräben in
Wäldern. 2c. 4

+++ Blätter sägerandig oder gezähnt.

60. *Hypnum pompuleum* Hedw. musc. frond. ed. Schw.
p. 270. t. LXX. f. 1.

Wächst in Europa an Pappelfstämmen, z. B. *P. tremu-*
lans L. u. a. 4

61. *Hypnum reflexum* Stark. (*H. saxicola* Voit.)

Stengel kriechend. Aeste abgekürzt, gekrümmt. Blätter
abstehend, ey-lanzettförmig, gespitzt, gezähnt, am Rande
zurückgeschlagen. Kapselstiel scharf. Kapsel bauchig, überge-
bogen. Deckel mucronenspizig. Wächst auf den Endeten und
Alpen in Schottland. 4

62. *Hypnum bavaricum* Voit.

Stengel aufsteigend, ästig. Aeste aufrecht. Blätter abste-
hend, ey-lanzettförmig, langgespitzt, auf dem Rücken scharf.
Kapselstiel glatt. Kapsel überhängend. Deckel mucronenspizig.
Wächst in Baiern. 4

63. *Hypnum inflectens* Bridel.

Stengel aufrecht, oben ästig. Aeste büschelförmig, meist
eingebogen. Blätter ey-lanzettförmig, gezähnt. Kapsel wal-
zenrund, gefurcht. Deckel kreuzschnabelig. Brasilien.

64. *Hypnum alopecurum* Linn.

Stengel aufrecht, unten nackt, oben büschelförmig-ästig.
Blätter zerstreut stehend, gespitzt, ausgehöhlt, sägerandig.
Kap:

Kapsel eiförmig, übergebogen. Deckel schnabelförmig. Waterl. Europa. 2

65. *Hypnum comosum* Labill. (*Bryum dendroides* L. fil. Schopfiges Astmoos.

Stengel aufrecht, ästig. Nester oben quirlförmig = gebüschelt. Blätter gedrängt stehend, ausgebreitet, lanzettförmig, feinspizig, gezähnt. Kapsel hängend, gefurcht. Deckel kreuzschnäbelig. Waterl. Neuholland. 2

66. *Hypnum Menziesii* Hook.

Stengel aufrecht, unten nackt. Die obere Nester gebüschelt, niederhängend. Blätter wie Dachziegel über einander liegend, an der Spitze gezähnt. Kapselstiel lang, knieartig gebogen. Kapsel keulenförmig, verlängert. Deckel kegelförmig, Neuseeland. 2

67. *Hypnum mnioides* Hook.

Stengel ästig, aufrecht. Blätter wie Dachziegel über einander liegend, knieartig gebogen, linien = lanzettförmig, sägerandig, weit gedreht. Kapsel walzenrund, überhängend.

†† Nervo evanido.

α. Blätter ganzrandig.

68. *Hypnum abietinum* Linn.

Stengel aufsteigend. Nester gefiedert. Blätter wie Dachziegel über einander liegend, bläsig, eiförmig, langgespitzt, gefaltet = gestreift, am Rande fast zurückgerollt. Kapselstiel glatt. Kapsel walzenrund, gekrümmt, übergebogen. Waterl. Europa. 2

69. *Hypnum proliferum* Linn. Sprossendes Astmoos.

Stengel aufrecht. Nester doppelt zusammengesetzt, absteigend, die obere eingerollt. Blätter eiförmig, langgespitzt, die obere ohne Rippen. Kapselstiel glatt. Kapsel übergebogen. Deckel schnabelförmig. Hierher gehören: *H. delicatulum* Schrad. *H. recognitum* et *tamariscinum* Hedw. Waterl. Europa, Nordamerika und Nepal. 2

70. *Hypnum catenulatum* Schwägr. (*Pterigynandrum* Bridel. *Grimmia* Mohr.)

Stengel niederliegend. Nester gekrümmt. Blätter wie Dachziegel über einander liegend, sehr klein, eiförmig, gespitzt, am Rande gefaltet. Kapsel länglich, gekrümmt. Deckel schnabelförmig. Wächst auf Alpen in Deutschland und der Schweiz. 2

71. *Hypnum minutulum* Hedw. Stirp. Crypt. IV. p. 90. t. 34.
Wasserl. Pensylvanien. 4
72. *Hypnum Blandovii* Mohr.
Stengel aufrecht, ästig. Aeste abstehend = zurückgeschlagen, mit kleinen Wurzeln dicht besetzt. Blätter wie Dachziegeln über einander liegend, herzförmig, langgespitzt. Kapsel gekrümmt, horizontal stehend. Deckel kegelförmig.
73. *Hypnum curvatum* Swartz. H. myosuroides Hedw. Stirp. Crypt. p. 20. t. 8. (Leskea curvata Voit.)
Europa in Wäldern und Nordamerika. 4
74. *Hypnum murale* Necker. H. abbreviatum Hedw. musc. frond. ed. Schwägr. p. 249. t. LXV. f. 1-4.
75. *Hypnum molle* Dickson fasc. 11. p. 11. t. 5. f. 8. Hedw. musc. frond. ed. Schw. p. 273. t. LXX. f. 7-10.
Wasserl. Schottland an und in Alpen-Bächen. 4
76. *Hypnum praecox* Hedwig musc. frond. ed. Schw. t. LXIV. f. 11.
Wächst in Schweden auf der Erde. 4
77. *Hypnum purum* Linn. H. illecebrum Hedw. musc. frond. p. 252. t. LXVI. f. 1-3.
Wächst in Wäldern in Europa und Nordamerika. 4
78. *Hypnum stramineum* Dicks.
Stengel aufrecht. Aeste fadenförmig. Blätter wie Dachziegeln über einander liegend, länglich = eiförmig, glänzend. Kapsel gekrümmt, übergebogen. Deckel kegelförmig. Wächst in Europa in Sümpfen. 4
79. *Hypnum albicans* Necker. Weißliches Astmoos. (H. oxycladon Brid.)
Stengel aufsteigend, fast ästig. Blätter aufrecht = abstehend, eif. = lanzettförmig, langgespitzt, gestreift, glänzend. Kapsel länglich = eiförmig, übergebogen. Deckel kegelförmig. Wächst auf Sandböden in Europa und Nordamerika. 4
80. *Hypnum neglectum* Bridel.
Stengel kriechend, wurzelnd. Blätter abstehend, eiförmig, gespitzt, ausgehöhlt. Kapsel eiförmig, übergebogen. Deckel kegelförmig.
81. *Hypnum serpens* Hedwig. Stirp. Crypt. IV. p. 45.

t. 18. Hierher *H. tenue* Schrad. *H. contextum et spinulosum* Hedw. musc. p. 269. t. LXIX. f. 8—10.

82. *Hypnum tenellum* Dicks.

Stengel kriechend. Blätter büschelförmig stehend, aufrecht, lanzett = pfriemenförmig. Kapsel übergebogen. Deckel schnabelförmig. Wächst in England.

83. *Hypnum nudicaule* P. Br. (*H. debile* Bridel.)

Stengel kriechend, fast ästig. Blätter entfernt stehend, ausgebreitet, herz = lanzettförmig, mit einer langen Endborste. Kapsel fast walzenrund, übergebogen. Deckel pfriemenspizig. Nordamerika.

β. Blätter sägerandig oder gezähnt.

84. *Hypnum salebrosum* Hofm. ist *H. plumosum* Hedw. Stirp. Crypt. IV. p. 37. t. 23. (*H. fasciculatum* Lam.)

85. *Hypnum confertum* Dicks. ist *H. serrulatum* Hedw. musc. frond. p. 238. t. LX.

Wächst in England und Pennsylvania. 2

86. *Hypnum megapolitanum* Mohr. (*H. algerianum* Brid.)

Stengel niederliegend, scheidig, ästig. Aeste fadenförmig, gebogen. Blätter ey = lanzettförmig, langgespitzt, an der Spitze gezähnt. Kapsel länglich. Deckel schnabelförmig. Wächst in Deutschland, der Schweiz und im nördlichen Afrika. 2

87. *Hypnum polyrrhizon* Brid.

Stengel liegend. Aeste wurzelnd. Blätter aufrecht, straff, ey = lanzettförmig, an der Spitze gezähnt. Kapsel eyrund. Deckel schnabelförmig. Nordamerika. 2

88. *Hypnum capillaceum* Brid.

Stengel kriechend, ästig. Blätter zerstreut stehend, aufrecht, lanzettförmig, sägerandig, durchscheinend weißlich. Kapsel eyrund, angeschwollen. Deckel kegelförmig. Schlessen. 2

89. *Hypnum strigosum* Hofm. (*H. thuringicum* Brid.)

Stengel kriechend. Aeste büschelförmig stehend, gekrümmt. Blätter wie Dachziegelu über einander liegend.

90. *Hypnum Buchanani* Hook.

Stengel ästig. Aeste aufrecht, fadenförmig. Blätter eyförmig, langgespitzt, wie Dachziegelu über einander liegend, an der Basis gestreift. Kapsel länglich, übergebogen. Deckel stumpf. Nepal. 2

91. *Hypnum striatum* Schreb. spicileg. p. 92. Hedw.

M m 2

Stirp. Crypt. IV. p. 32. t. 13. Dill. hist. muse. t. 38. f. 30. (*H. longirostris* Ehrh.) Nordamerika.

92. *Hypnum myosuroides* Linn.

Stengel kriechend. Aeste büschelförmig stehend, an der Spitze eingebogen. Blätter aufrecht = abstehend, lanzettförmig, sägerandig, der Rand an der Basis und Spitze zurückgeschlagen. Kapsel überhängend, eiförmig = walzenrund. Deckel schüsselförmig. Wächst in Schweden und England. 4

93. *Hypnum ruscifolium* Necker. (*H. riparioides* Hedw. Stirp. Crypt. IV. p. 10. t. 4. *H. prolixum* Dicks. *H. atlanticum* Desf.)

Wächst in Europa und Nordafrika an Flüssen. 4

94. *Hypnum stoloniferum* Hook.

Stengel kriechend, oben ästig. Aeste aufrecht, gekiebt, ästig. Blätter aufrecht, länglich = eiförmig, an der Spitze gezähnt, wie Dachziegel über einander liegend. Kapselstiel kurz. Kapsel eiförmig. Nordamerika. 4

95. *Hypnum praelongum* Linn. Hedw. Stirp. Crypt. IV. p. 76. t. 29. (*H. Stockesii* et *Swartzii* Turn. *H. atrovirens* Swartz.)

Wächst in Europa in Wäldern an schattigen niedern Orten, an Baumstämmen.

96. *Hypnum rutabulum* Linn. Hedw. Stirp. Cr. IV. p. 29. t. 12. (*H. brevirostre* et *crenulatum* Smith.)

Wächst in Europa an Stämmen. 4

97. *Hypnum flagellare* Dicks. Hedw. musc. frond. ed. Schwägr. p. 282. t. LXXII. f. 1—3. (*H. umbraculum* Smith.)

98. *Hypnum illecebrum* Linn. Hedw. musc. frond. p. 52. t. LXVI. f. 1. 2. (*H. Tourretii* Brid.)

Wächst in der Schweiz und Frankreich. 4

99. *Hypnum intricatum* Hedw. Stirp. Cr. IV. p. 73. t. 28. Vill. Par. t. 28. f. 6. 7. (*H. velutinum* Linn.)

Wächst auf der Erde und an Baumstämmen in Europa und Nordamerika. 4

100. *Hypnum piliferum* Schreb. Spicil. Hedw. Stirp. Cr. IV. p. 33. t. 14.

101. *Hypnum Schreberi* Willd. (*H. compressum* Schreb. *H. muticum* Sw.)

Stengel aufrecht, ästig. Aeste zusammengedrückt. Blätter

wie Dachziegeln über einander liegend, eiförmig, ausgehöhlt. Kapselstiel glatt. Kapsel übergebogen. Deckel kegelförmig. Vaterl. Europa. 2

+++ Blätter ohne Rippen, ganzrandig oder gezähnt.

102. *Hypnum cuspidatum* Linn.

Stengel aufrecht, ästig. Nester walzenrund, feingespitzt. Blätter länglich-eiförmig, gespitzt, ganzrandig, untere abstehend, obere eingerollt. Kapsel gekrümmt. Deckel mucronenspizig. Europa. 2

103. *Hypnum splendens* Hedw. musc. frond. p. 262. t. LXVII. f. 6. 9. Dill. hist. musc. t. 55. f. 1. 3. (*H. parietinum* Swartz.) Europa.

104. *Hypnum adnatum* Hedw. musc. frond. p. 249. t. LXIV. f. 5. Nordamerika.

105. *Hypnum cochlearifolium* Schwägr.

Stengel kriechend. Nester aufsteigend, an der Spitze wurzelnd. Blätter angebrückt, rundlich-ausgehöhlt. Kapsel länglich, horizontal stehend. Vaterl. Neuholland und Südamerika.

106. *Hypnum crassiculum* Schwägr.

Stengel kriechend. Nester abgekürzt. Blätter zerstreut stehend, lanzettförmig, langgespitzt, glänzend. Kapsel länglich. Deckel langschabelig. Neugranada. 2

107. *Hypnum Arbuscula* Hook. (*Hookeria Arbuscula* Smith.)

Stengel aufrecht, unten nackt, oben ästig, baumartig. Blätter eiförmig, ausgehöhlt, an der Basis fast zweirippig. Kapsel kurzgestielt, länglich, aufrecht. Neuseeland. 2

108. *Hypnum umbrosum* Hoffm. fl. germ. Hedw. musc. frond. p. 263. t. LXVII. f. 10—12.

Wächst in Deutschland in Wäldern. 2

109. *Hypnum reptans* Swartz. Prodr. p. 140. Hedw. musc. fr. p. 265. t. LXVII.

Vaterl. Westindien. 2

110. *Hypnum intortum* P. Br.

Stengel kriechend. Nester einfach, aufrecht. Blätter zerstreut stehend, linien-lanzettförmig, entfernt gezähnt. Kapsel überhängend, trugförmig. Deckel kreuzschabelig. Mascaren-Insel.

111. *Hypnum elegantulum* Hook. (*H. pallidum* Kunth.)

Stengel kriechend, ästig. Blätter abstehend, eiförmig,

langgespitzt, gezähnt. Kapsel übergebogen. Deckel kegelförmig. Neugranada. 24

Einige Arten dieser reichen Laubmoosgattung habe ich deswegen nicht aufgenommen und beschrieben, weil sie noch einer nähern Untersuchung und Vergleichung bedürfen, und daher nur als Varietäten zu betrachten sind. *B. B. Hypnum taxiforme*, *nigricaula* Brid. *H. rugosum* Linn. *H. tenuifolium* Hedw. *H. sphaerocarpon* Spr. *H. aquatile* Mart. *H. andicola* Hook. u. a.

Hypoealypus calyptratus Thunb. ist *Podalyria calyptrata* Willd. f. Lexic. B. 7

— *glaucus* Thunb. ist *Podalyria buxifolia* Willd. f. Lexic. B. 7.

— *obcordatus* Thunb. ist *Virgilia intrusa* R. Br. f. 1. Nachtr. B. 9.

— *pedunculatus* Thunb. ist *Podalyria biflora* Willd. Lam. f. Lexic. B. 7.

Hypochnus coerulea Fr. ist *Telephora septimenta*.

Hypochnus fuscus Fr. ist *Telephora vinosa* Pers.

Hypochoeris Linn. Ferkelstrauch f. Lexic. B. 4.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. C. 54.

Blumendecke (Kelch) schuppig, die Schuppen wie Dachziegel über einander liegend. Fruchtboden mit Spreublättchen besetzt. Saamentrone gefiedert; auf den äußeren randständigen Saamen stiellos, auf den innern gestielt. (Abbild. Schumbrs Handb. t. 225.)

Syngenesia 1. Ordn. (Familie Compositae; Eichoraceen.)

1. *Hypochoeris radicata* Linn. f. Lexic. 1. Aufl. B. 4. *Achyrophorus radicans* Scopol.

Wurzel meist spindelförmig, sehr lang. Wurzelblätter länglich, stumpf, schrotsägeförmig, behaart, auf der Erde ausgebreitet. Stengel ästig, fast nackt, walzenrund, glatt, grün,

1—2 Fuß hoch. Blumen einzeln, gipfelständig, gestielt, die Stiele oben verdickt. Blümchen gelb. Kelche borstig. Spreublättchen an der Basis meist häutig, langgespitzt, die Spitze borstenförmig, gelb. Vaterl. Europa, besonders Deutschland, z. B. Thüringen u. a. G. 24 Blühz. Sommer.

2. *Hypochoeris macrorrhiza* Gunth. Großwurzliches Ferkelstrauch.

Wurzel ziemlich groß, mehr oder weniger getheilt. Stengel fast nackt, fast einfach, glatt. Blätter scharfborstig. Wur-

gelbblätter lanzettförmig, gespitzt, wenig gezähnt. Stengelblätter linien-fadenförmig. Kelch glatt. Vaterl. Calabrien. 4

3. *Hypochoeris arenaria* Gaudich. Sandliebendes Ferkelkraut.

Stengel ästig, aufrecht. Blätter fiederspaltig, feinborstig. Kelche behaart. Vaterl. Ins. Gallland. 4 ?

4. *Hypochoeris maculata* Linn.

Wurzelblätter stiellos, elliptisch-länglich, gezähnt, gefleckt, wie der Stengel borstig-zottenhaarig. Stengel aufrecht, straff, meist nackt, einfach oder mit 1—2 Seitenästen versehen. Blumenstiele oben verdickt. Uebrigens s. Lexikon I. Aufl.

5. *Hypochoeris sonchioides* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. IV. p. 2. t. 301. Conchusartiges Ferkelkraut.

H. sessiliflora Kunth J. c. variet. ?

H. acaulis, foliis lanceolatis acutis in petiolum decurrentibus superne dentatis glabris, pedunculo solitario unifloro superne incrassato bracteato, involucrio glabro. Humb. et Bonpl. IV. p. 2. t. 301.

Die Blätter, welche an der perennirenden Wurzel stehen sind gestielt, lanzettförmig, gespitzt, an der Basis schmal, am Blattstiele herablaufend, ganzrandig, nach oben zu entfernt gezähnt, geadert, glatt, ungefähr $\frac{1}{2}$ Fuß lang. Der Blumenstiel erhebt sich unmittelbar aus der Wurzel, ist einblüsig, oben stärker als unten, 3—4 Zoll lang, kürzer als die Blätter, mit etlichen (4—6) linienförmigen, röthlichen Bracteen besetzt, die an der Spitze gefranzt sind. Der Blumenkopf ist groß, fast halbkugelig, ungefähr $2\frac{1}{2}$ Zoll im Durchmesser breit, der gemeinschaftliche Kelch vielblättrig, glatt. Blümchen gelb, zungenförmig, an der Spitze fünfzählig. Spreublättchen linienförmig, an der Spitze mit drei grannenartigen Zähnen versehen, davon der mittlere länger ist als die seitenständigen. Saamentrone federartig, kürzer als die Grannen der Spreublättchen. Vaterl. Quito, an dem feuer-speisenden Berge Pichincha. 4 Blühz. April, Mai.

Die Ferkelkräuter tragen alle gelbe Blumen, die im Sommer sich entwickeln. Man zieht sie aus Saamen, der von einigen in warmen Ländern wildwachsenden Arten in ein warmes Beet, von den übrigen ins freie Land gesät wird. Manche lassen sich auch durch Wurzeltheilung vermehren. Die übrigen hierher gehörenden Arten siehe Lexikon und I. Nachtrag.

Synonymen.

Hypochoeris ascendens Brot. ist **Hypochoeris arachnites** var. f. 1. Nachtr.

— **glauca** Presl. ist **Seriola albicans** Tin.

— **hispida** Roth. (nec Willd.) ist **Hypochoeris arachnites** Desf. Biv. f. Lexic.

— **minima** Hornem. Desf. (f. 1. Nachtr.) ist **Hypochoeris arachnites**.

— **pinnatifida** Cyrill. Tenor. ist **Boeberia pinnatifida** Spr.

— **pontana** Linn. ist **Hieracium montanum** Jacq.

— **uniflora** Vill. ist **Hypochoeris helvetica** f. Lexic.

Hypoderma arundinaceum Cand. ist **Hysterium arundinaceum** Schrad.

— **scirpium** Cand. ist **Hysterium scirpium** Fr.

— **virgultorum** Cand. ist **Hysterium Rubi** Pers. Fr.

— **xyломoides** Pers. ist **Hyster. soliicolon**, Fr.

Hypodermium sphaerioides Cand. ist **Sphaeria Empe- tri** Fr.

Hypocalytus Kiracifolius Nees et Sinning Sammlung schönblühender Gewächse, Heft 3. t. 23. Blumen rosenroth.

Hypocyrtia Martius Nova gen. et spec. plant. brasil. Vol. 3.

Reich frei, tief, 5theilig. Corolle röhrig, die Röhre hohlerig-bauchig; der Rand schlappig oder 5zählig, fast gleich. Staubfäden 4 ungleich lang, mit paarweise zusammenhängenden Antheren gekrönt; der fünfte Faden festschlagend. Beere kugelförmig, ausgetrocknet, gefärbt, einsächerig, vielsaamig.

Didynamia Angiospermia (Familie der Personaten.)

Diese neue Gattung enthält fünf Arten, welche im gedachten Werke beschrieben und davon drei abgebildet sind.

1. **Hypocyrtia gracilis** Mart. t. 220. 2. **H. aggregata** Mart. t. 221. 3. **H. hirsuta** Mart. t. 222. 4. **H. trigilosa** Mart. 5. **H. ciliosa** Mart.

Sie kommen aus Brasilien und verlangen in unsern Gärten eine Stelle im warmen Hause. Der Saame wird in warmen Beeten ausgesät.

Hypoëtes Solander. Jamaic. XL. Roem. et Schult. Syst. Veg. 1. p. 55.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 56.

Hülle vierspaltig, 1—3 Blumen einschließend, davon oft nur eine sich vollkommen ausbildet. Kelch vierspaltig. Corolle zweilippig. Zwei Staubfäden. Äntheren einfächerig. Kapsel und Saamen wie bei *Justicia*.

Diandria Monogynia.

1. *Hypoëtes fastuosa* R. Brown. Hierher gehört *Justicia fastuosa* Linn. f. Lexic. 1. Aufl. B. 5.

Stengel sträuchig, Blätter oval-länglich, an beiden Enden verdünnt, 3—4 Zoll lang. Die Blumen bilden gipfelständige traussförmige Trauben, die 6—10 Zoll lang und zusammengesetzt sind. Blumen meist einseitig. Hülle gewöhnlich zweiblümig, die Einschnitte rundlich, mucronenspizig. Bracteen sehr klein. Vaterl. Ostindien. h

2. *Hypoëtes Forskali* R. Br. Hierher *Justicia Forskali* Vahl. f. Lexic. 1. Aufl. J. paniculata Forsk. f. Lexic.

Stengel strauchig, ästig; die untern Aeste un deutlich eckig, purpurrothlich, knotig. Blätter entfernt stehend, gestielt, eiförmig, lang, gespitzt, ganzrandig, unten und am Rande mehr oder weniger behaart, 2 Zoll lang. Blumen gedrängt stehend, wie Dachziegel über einander liegend; sie bilden winkel- und gipfelständige traubartige Trauben. Hülle meist einblümig. Einschnitte linienförmig. Bracteen an der Basis der Hülle sitzend, sehr klein. Vaterl. das glückliche Arabien. h

3. *Hypoëtes purpurea* R. Br. Hierher *Justicia purpurea* Linn. f. Lexic. 1. Aufl. B. 5.

Stengel krautartig, wurzelnd. Aeste fast eckig, zottenhaarig. Blätter eiförmig, an beiden Enden gespitzt, ganzrandig, 1 Zoll lang, fast glatt. Die Blumen in winkel- und gipfelständige Aehren gesammelt. Einschnitte der Hülle mucronenspizig. Kelch fünfspaltig, zottenhaarig, trocken, die Einschnitte linienförmig, borstenspizig. Corolle purpurroth, Oberlippe länglich, ausgesandelt, größer als die dreispaltige Unterlippe. Vaterl. China und Ostindien. O 4

4. *Hypoëtes aristata* R. Br. Hierher *Justicia aristata* Vahl. f. Lexic. 1. Aufl. B. 5.

Stengel holzig, knotig, wie alle Theile der Pflanze zottenhaarig. Blätter gestielt, eiförmig, gespitzt, ganzrandig,

1 Zoll lang. Blumen zahlreich, fast stiellos, winkelschraubig. Die Einschnitte der Hülle linien-pfriemensförmig. Kelch fünfstheilig. Corolle zottenhaarig. Oberlippe gerade, ungetheilt. Unterlippe dreitheilig, die Einschnitte länglich. Waterl. Kap d. g. Hoffn. 4

5. *Hypoëstes verticillaris* R. Br. Hierher *Justicia verticillaris* Linn. f. Lexic. 1. Aufl. B. 5.

Stengel aufrecht, ästig, 1—1½ Fuß hoch. Aeste gegenüber stehend, einfach, selten getheilt-ästig. Blätter gegenüberstehend, gestielt, eiförmig, auf beiden Seiten zottenhaarig, aufstehend, etwa 1 Zoll lang. Blumen zahlreich, winkelschraubig. Corolle fleischroth. Waterl. Kap d. g. Hoffn.

6. *Hypoëstes serpens* R. Br. *Justicia* Vahl. f. Lexic. 1. Aufl. B. 5.

Stengel krautartig, fadenförmig, kriechend, glatt. Blätter länglich, stumpf, ganzrandig, geadert, glatt, nicht länger als die Stiele. Blumen stiellos, die winkelschraubigen einzeln, wechselnd, die obern einander gegenüber stehend, fast ährenförmig. Hülle ½ Zoll lang. Kelch kurz, die Einschnitte pfriemenspizig. Waterl. St. Mauritius. (Ins. Mascaren.)

7. *Hypoëstes triflora* Roem. et Schult. *Justicia triflora* Forsk. Vahl. f. Lexic. 1. Aufl. B. 5.

Stengel krautartig, gegliedert, wie die Aeste zottenhaarig, fast vierfurchig. Blätter gestielt, entfernt stehend, eiförmig, ganzrandig, selten unendlich gezähnt, behaart. Blumenstiele winkelschraubig, einzeln, zuweilen einander gegenüberstehend, zwei bis dreimal länger als die Blätter, an der Spitze 3—4 blüthig, die obern Blätter neben den Blumen linien-lanzettförmig. Waterl. das glückliche Arabien. 4 Blüth. Sommer.

8. *Hypoëstes Cephalotes* Link Jahrbücher 1. B. 3. Heft S. 46.

Justicia Cephalotes Willd. Herb. Erinus bilabiatum Roxb. in Litt.

Stengel viereckig, knotig, an den Knoten füllig. Blätter gestielt, länglich, gesägt, fast ganzrandig, am Rande und Rippen scharf. Die Blumen bilden eiförmige, gipfelschraubige Köpfehen. Bracteen und Kelchtheile pfriemenspizig, gewimpert. Corolle klein, die Lippen fast gleich. Waterl. Ostindien.

Hypoëstes floribunda R. Br. H. involucrata Spr. H. umbellata Dietr. f. 1. Nachtr. B. 4.

Diese Gewächse behandelt man in unsern Gärten wie die Justicien, mit denen sie zunächst verwandt sind. s. Lexic.

Hypolaena Rob. Brown. Prodr. Fl. Nov. Holl. *Hypoläna*.

Blumen diöcisch. Hülle sechsclappig. Die männlichen Blumen bilden Räschen; sie enthalten drei Staubfäden mit schiffsförmigen Antheren gekrönt. Weibliche Blume mit einem nieder gebogenen 2—3 theiligen Griffel versehen. Ruß einsamig, von der stehen bleibenden Hülle umschlossen.

Triandria Monogynia (Familie Restiaceen.)

1. *Hypolaena fastigiata* R. Br. Gleichhohe *Hypoläna*.

Stamm ästig, rund, gestreift. Aeste gleich hoch. Hüllentlappen oval. Wächst in Neuhollland.

2. *Hypolaena exsulca* R. Br.

Stamm walzenrund, ohne Furchen, ästig. Aeste wechselnd stehend, sehr einfach. Kelchklappen (Hülle) fast rund. Wächst in Neuhollland, auf der Insel van Diemen.

Hypolepis sanguinea Pers. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 58.

—— *Pal. de Beauv.* ist *Schoenus* Thunb.

—— *scariosa* de Beauv. ist *Melanranis* Vahl.

—— *nigrescens* Schlechtend. Linn. ist *Melaenacranis* Schlecht. (*Melanranis*?) Schrad.

—— *Capitellum* Schlechtend. Linn. ist *Schoenus Capitellum* Thunb.

Hypolythrum Richard. f. *Hypaelyptum*.

Hypophialium capillifolium Schlechtend. Linn. B. 8. S. 90.

Hypoxis Linn. Hörtling f. Lex. B. 4 (Abbild. Gaertn. Sem. t. 11.)

Scheiden klein, den Bracteen gleichend. Corolle auf dem Fruchtknoten stehend, sechs theilig, flach, stehen bleibend, auswendig fetschartig. Eine Nectarscheibe auf der sechs Staubfäden stehen. Narben 3. Kapsel dreifächerig, viel-samig, nicht aufspringend. Saamen kugelförmig, mit schnabelförmiger Keimwarze.

Hexandria Monogynia (Familie Coronarien.)

Die Hörtlinge sind krautartige Pflanzen mit knolligen Wurzeln und meist grasartigen Blättern. Schaft ein- oder wenigblüthig. Blumen mit Bracteen versehen. Im System sind sie in folgender Ordnung aufgeführt.

I. Uniflora. Schaft einblüthig.

† Pilosa. Behaart.

1. *Hypoxis aurea* Loureiro Fl. Cochinchin. Goldfarbener Hörtling.

Blätter rinnig, pfriemenspizig, zurückgeschlagen, so lang als der einblümige Schaft. Blume goldgelb. Wächst in Cochinchina. 4

2. *Hypoxis minor* Don. Kleiner Hörtling.

Blätter liniensförmig, gespizt, zottenhaarig, dreimal länger als der haarförmige, einblümige Schaft. Blume zottenhaarig, länger als die Staubfäden. Waterl. Nepal. 4

3. *Hypoxis marginata* R. Br. Gerändeter Hörtling.

Blätter sehr lang, liniensförmig, am Rande verdickt. Schaft mit zwei Bracteen versehen. Kapsel walzenrund, zottenhaarig. Waterl. Neuhoiland. 4

4. *Hypoxis hygrometrica* Labillard. Hygrometrischer Hörtling.

Blätter liniensförmig - pfriemenspizig, behaart, die Haare hygrometrisch (gedreht). Schaft dünn, zart, so lang als die Blätter. Kapsel kreiselförmig, glatt. Waterl. Neuhoiland; van Diemenland. 4

†† Glabra. Glatt.

Hypoxis alba, *stellata*, *serrata* Linn. *H. ovata* Thunb. *H. veratrifolia* Willd. f. Lexic. gehören hierher und folgende Arten.

5. *Hypoxis glabella* R. Br. Blattlicher Hörtling.

Blätter linien - pfriemensförmig, rinnig. Schaft mit zwei Bracteen besetzt, kürzer als die Blätter. Blume gelb. Griffel sehr kurz. Waterl. Neuhoiland. 4

6. *Hypoxis linearis* Andrew. Repos. Liniensförmiger Hörtling.

Blätter lanzett - liniensförmig, rinnig, länger als der einblümige Schaft. Waterl. das Kap d. g. Hoffn. 4

7. *Hypoxis breviscapa* Kunth in H. et B. Nov. gen. et Sp. pl. 1. p. 286. Kurzschäftiger Hörtling f. 1. Nacht. B. 10. Anhang. C. 94.

II. Pauciflora. Schaft wenigblümig.

Hierher gehören die im Verikon beschriebenen Arten: *H. decumbens*, *villosa*, *erecta* Linn. *H. obliqua*, *sobolifera* Jacq. und folgende.

† Pilosa. Behaart.

8. *Hypoxis carolinensis* Michx. Carolinischer Hörtling.
H. filifolia Elliott. amer.
 Blätter fast dreiseitig = fadenförmig, behaart. Schaft zweiblümig. Waterl. Georgien und Carolina. 4
9. *Hypoxis stellipilis* Ker. Bot. mag. Sternhaarig = flzigger Hörtling.
 Blätter lanzettförmig, rinnig, gerippt, unten sternhaarig flzig. Schaft behaart, zweiblümig, kürzer als die Blätter. Waterl. Kap d. g. Hoffn. 4
10. *Hypoxis humilis* Kunth J. c. 1. p. 287. Niedriger Hörtling f. I. Nachtr. B. 10. Anhang. S. 94.
11. *Hypoxis elongata* Kunth J. c. 1. p. 287. Langblättriger Hörtling f. I. Nachtr. B. 10. Anhang. S. 95.
12. *Hypoxis pratensis* R. Br. Wiesenliebender Hörtling.
 Blätter liniensförmig, verlängert, am Rande behaart. Schaft dreiblümig, behaart. Kapsel kugelig = kreiselförmig. Waterl. Neuholland auf Wiesen. 4
13. *Hypoxis obtusa* Burch. Stumpfer Hörtling.
 Blätter aufrecht, lanzettförmig, fast gedreht, gerändert. Schaft meist vierblümig, kürzer als die Blätter. Blumen traubensändig. Corollentheile stumpf. Waterl. das südliche Afrika. 4
 †† Glabra. Alle Theile glatt (nur eine Art.)
14. *Hypoxis aquatica* Linn. f. Lexic. B. 4.
 Blumen polygamisch. ♀ Einzeln. ♂ Doldensändig.
 Kultur. Diese Gewächse pflanzt man in gute lockere Damm- oder Mistbeeterde und überwintert sie im Glashause oder in einem ähnlichen frostfreien Behälter. N. 7, 10 und 11. im warmen Hause. Fortpflanzung durch Saamen und Wurzeln.

Synonymen.

- Hypoxis elegans* Andr. ist *Hypoxis stellata* Linn. f. Lex.
 — *fascicularis* Linn. f. Lexic. ist *Curculigo fascicularis* Spr.
 — *filifolia* Ell. f. *Hypoxis carolinensis* N. 8.
 — *plicata* Jacq. ist *Hypoxis veratrifolia* Willd. f. Lexic.
 — *sessilis* Linn. f. Lexic. ist *Hypoxis erecta* Linn. f. Lexic.

Hyptis Jacq. f. Lexic. Einsblume.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 59.

Kelch fünfspaltig. Corolle zweilippig, rachenförmig. Oberlippe gespalten. Unterlippe dreilappig, der mittlere Lappen lappenförmig, anfänglich die Geschlechtstheile einschließend, dann zurückgeschlagen. Staubfäden und Griffel niedergebogen.

Didynamia Gymnospermia (Familie Lippenblumen.)

Die Arten dieser Gattung sind Staudensträucher oder krautartige Pflanzen mit ungetheilten ganzrandigen oder sägezahnigen Blättern. Corollen weiß, blau oder violett. Im System sind sie nach dem Blütenstande folgendermaßen geordnet.

I. Capitellis pedunculatis axillaribus.

Blumen in gestielte winkelfständige Köpfehen gesammelt.

zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Verikon und ersten Nachtrage beschriebenen Arten: *H. Chamaedrys*, *radiata* Willd. *H. Pseudo-Chamaedrys*, *lantanaefolia*; *atrorubens*, *recurvata* Poit. *H. capitata* Jacq. und folgende.

1. *Hyptis ebracteata* Rob. Brown. Prodr. Fl. Nov. Holl. ist *H. suaveolens* Poit. *Ballota suaveolens* Jacq. f. *Bytropogon suaveolens* Herit. f. Lexic. B. 2.

2. *Hyptis lurida* Spr. (*Bytropogon*?)

Blätter eiförmig, sägerandig, drüsig-klebrig. Blumenköpfehen sehr kurzgestielt. Hüllen abgekürzt. Kelchtheile langgespitzt, drüsig-klebrig. Vaterl. Brasilien.

3. *Hyptis microcephala* Berter. Kleinköpfige Hyptis.

Blätter länglich-eiförmig, gekerbt, glattlich. Blumenköpfehen gestielt, klein, kugelförmig. Hüllen borstenförmig, viel länger als die Kelche. Vaterl. Südamerika, am Magdalena-Flusse. 4

4. *Hyptis polyanthos* Poit. (*H. lamiifolia* Weinm.)

Blätter oval, sägerandig, fast stizig. Blumenstiele frei, kürzer als die Knoten der Aeste. Blumenköpfehen etwas schlaff. Hüllen borstig. Vaterl. Quito, Peru, Brasilien. ☉ Blühz. August.

5. *Hyptis globifera* Meyer Fl. Essequib. p. 207. Kugelförmige Hyptis.

H. brevipes Poit. monogr. p. 465. ?

Stengel staudenstrauchig, ästig, viereckig, scharf, etwa 3 Fuß hoch. Blätter gegenüber stehend, oval, langgespitzt, an der Basis verdünnt, 5–6 Zoll lang, 1½ Zoll breit, ungleich

sägezählig, auf beiden Seiten scharf. Blumenstiele winkelförmig, 1 Zoll lang, aber 3—4mal kürzer als die Knoten der Aeste. Blumen in kugelförmigen Köpfchen gesammelt. Hüllblättchen lanzettförmig, ganzrandig, wenig länger als der röhrige aufrechte Fruchtkelch. Corolle weiß. Oberlippe stumpf, ausgekerbt. Unterlippe dreilappig, die Seitenlappen zurückgeschlagen. Saamen länglich, stumpf, schwarz. Vaterl. Südamerika; Guiana in Wäldern. ♀ Blüht daselbst vom Januar bis März.

6. *Hyptis inflata* Spr. (Marsypianthus hyptoides Mart.)

Blätter länglich-eiförmig, gezähnt, behaart. Blumenköpfchen meist vielblüthig, gestielt, wechselnd stehend. Fruchtkelche aufgeblasen. Brasilien.

7. *Hyptis urticoides* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. II. p. 320.

Stengel krautartig, ästig, scharfborstig. Blätter länglich, gespitzt, sägerandig, oben scharfborstig, unten filzig. Blumenköpfchen winkelförmig, gestielt, die Stiele fast so lang als die Knoten der Aeste. Hüllen borstig, kürzer als das Köpfchen. Vaterl. Mexico in temperirten Gegenden, bei Xalapa. ☉ Blüht daselbst im Februar.

8. *Hyptis lanceolata* Poit. Lanzettblättrige Hyptis; Einkblume.

Blätter lanzettförmig, sägerandig, glatt. Blumenköpfchen wechselnd stehend, stiellos, kugelförmig. Hüllblättchen lanzettförmig, so lang als die Kelche. Südamerika. ?

II. Floribus cymosis. Blumen in Aesterdolben gesammelt.

9. *Hyptis polystachya* Kunth J. c. II. p. 321. Vieläh-rige Hyptis.

Stengel krautartig, ästig, behaart. Blätter eiförmig, lang-gespitzt, doppelt, sägezählig, oben feinborstig, unten grau-filzig. Blumen trauben-ähren-büschelförmig, gipfelständig, die Ähren kurzstielig. Hüllblättchen lanzettförmig, kürzer als die Kelche. Vaterl. Mexico, zwischen Pazcuaro et Arrio. ☉ Blüthz. Septemb.

10. *Hyptis canescens* Kunth J. c. II. p. 321. Graufilzige Hyptis.

Teucrium rhombifolium Willd. herbar.

Stengel krautartig, ästig, wie die Blätter grau-filzig. Blätter rauten-eiförmig; gespitzt, doppelt sägezählig. Aesterdolben ähren-kopfförmig, traubig, gestielt. Hüllblättchen

lanzettförmig, fast so lang als die Blumenköpfchen. Waterl. Caracas. ☉ Blüht daselbst im Februar.

11. *Hyptis tomentosa* Poit. J. c. 7. p. 469. Filziges Hyptis.

Stengel fast staudenstrauchig, einfach, wie die Blätter weißfilzig. Blätter länglich-eyförmig, gespitzt, gekerbt. Astersolden winkelförmig, gestielt, die Stiele kürzer als die Knoten. Hüllen fast fehlend. Waterl. Mexiko, bei Acapulco. ♀ ? Blüht. März — April.

12. *Hyptis albida* Kunth J. c. II. p. 319. Weißliche Hyptis.

Stengel ästig, wie die Blätter mit weißlichem Filze bekleidet. Blätter länglich-lanzettförmig, gespitzt, sägerandig. Astersolden winkelförmig, stiellos, viel kürzer als die Knoten der Aeste, weiß-wollig. Hüllen fehlend. Waterl. Mexico im Thal Sancti Jacobi und bei Valladolid. ♀ ? Blüht. September.

13. *Hyptis nepetoides* Dr. Gischer ist *H. persica* Willd. Poit. Pers. f. 1. Nachtr. B. 4.

III. Floribus verticillatis. Blumen quirlständig.

Hyptis verticillata Jacq. f. Lexic. gehört hierher und folgende Arten.

14. *Hyptis Plumerii* Poiteau Ann. du Mus. 7. p. 473. (*H. Plumierii* Kunth Synops. 2. p. 95.)

Ballota foliis cordatis Plum. Jcon. t. 163. f. 1.

Stengel krautartig, ästig, wie die Blätter filzig-behaart. Blätter eckig-sägerandig, unten grau-filzig, untere herzförmig, obere neben den Blumen eyförmig. Blumen in dichten Quirlen, die untern Quirle (Wirtel) entfernt stehend, die obersten sehr genähert-zusammenfließend. Waterl. Westindien; Caracas. ☉ Blüht daselbst im Februar.

15. *Hyptis hirsuta* Kunth J. c. II. p. 318. t. 161.

Stengel krautartig, ästig, rauchhaarig. Blätter stiellos, länglich, stumpf, an der Basis eckig, gekerbt. Blumenquirle winkelförmig, etwas schlaff, fast stiellos. Hüllblättchen lanzettförmig, fast so lang als die Kelche. Waterl. Neuandalusien, an Bergen und trockenen Orten. ☉ Blüht. Septemb.

16. *Hyptis Pohliana* Jacq. Pohlische Hyptis.

Stengel krautartig. Blätter gestielt, länglich-eyförmig, sägerandig, glattlich. Blumen in gedrängten Quirlen. Hüllblätt-

blättchen pfriemenspizig, kürzer als die Kelche. Waterl. Brasilien. ☉ ?

17. *Hyptis stachyoides* Link. Stachysartige Hyptis.

Blätter rauten-eiförmig, sägerandig, stzig. Blumenquirse unterschieden, blattlos, ährenförmig. Hüllblättchen borstentförmig, absteheud, länger als die Kelche. Waterl. Brasilien.

IV. Floribus spicatis. Blumen ährenständig.

18. *Hyptis spigera* Lamarck. Ährenblüthige Hyptis.

Aeste fast stachlich-scharf. Blätter länglich, sägerandig. Blumen in langgestielte, dichte verlängerte Ähren gesammelt. Kelchtheile graunenspizig. Waterl. Ostindien.

19. *Hyptis pectinata* Poit. (*Nepeta* Linn.) Hierher gehört *Bystopogon pectinatum* Herit. f. Lexic. B. 2.

Kultur. Diese Gewächse zieht man aus Saamen in warmen Beeten, setzt hernach die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe, die minder zärtlichen einjährigen Arten an einer schattlichen Stelle in das freie Land. Außerdem vermehrt man die Staudensträucher auch noch durch Stecklinge in warmen Beeten.

Synonymen.

Hyptis brevipes Poit. f. *Hyptis globifera* Meyer. N. 5.
— *melissoides* Kunth ist *Hyptis lantanaefolia* Poit.

f. 1. Nachtr.

— *racemosa* Zuccang ist *Hyptis atrorubens* Poit.

f. 1. Nachtr.

— *suaveolens* Poit. f. *Hyptis ebracteata* N. 1.

Hyssopus Linn. f. Lexic. B. 4.

— *angustifolius* M. a Bieb. ist *Hyssopus orientalis* Adam Willd. f. 1. Nachtr. B. 4.

— *cristatus* Lam. ist *Elsholtzia paniculata* Willd.

— *ocimifolius* Lam. ist *Elsholtzia cristata* Willd.

Hysterium Tod.

Eine Schwammgattung, die zur Familie Sphaeribidei gehört und 29 Arten enthält, die im Syst. Veg. ed. Spr. in zwei Abtheilungen aufgeführt sind. Die meisten finden wir in Europa an Baumrinden, manche an Blättern.

Dietr. Ser. 2r Nachtr. IV. Bd. N n

I.

Iabrosa Jussieu. f. Lexic. B. 5. Uraun.

Kelch fünfspaltig, kurz. Corolle röhrig, fast glockenförmig, fünfspaltig. Staubfäden 5, sehr kurz, im Schlunde der Corolle eingefügt. Narbe kopfförmig. Beere dreifächerig. ?

Pentandria Monogynia (Familie Solaneen.)

1. **Iabrosa integrifolia** Lam. f. Lexic. Ganzblättriger Uraun.

Wurzelblätter eiförmig, meist ganzrandig, glatt. Schaft einblümig. Corollenröhre sehr lang. Vaterl. Buenos-Ayres. 4

2. **Iabrosa runcinata** Lam.

Wurzelblätter buchtig = schrotsägeförmig, glatt, länger als der einblümige Schaft. Corolle glockenförmig. Vaterl. Südamerika. Rio de la Plata. 4

Beide Arten gedeihen am besten im warmen Hause, denn sie kommen aus Tropenländern. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und Wurzeltheilung.

Iacaranda Jussieu. Iacaranda. (Icaranda Pers. Synops. 2. p. 173.)

Character generic. f. I. Nachtr. B. 4. C. 63.

Kelch und Corolle glockenförmig, wie bei Bignonia. Fünf Staubfäden, davon einer unvollkommen kleiner als die übrigen und unfruchtbar ist. Narbe zweilappig, Kapsel fast freierund, holzig, zusammengebrückt, zweifächerig, zweilappig. Saamen häutig geflügelt, wie Dachziegeln über einander liegend, auf zwei verdickten Rücken.

Didynamia Angiospermia (Familie Bignonien.)

1. **Iacaranda rhombifolia** Meyer. Fl. Essequib. p. 213.

Ein Baum, mit rissiger Rinde, dessen Aestchen geringelt sind. Blätter zu 2 einander gegenüber, doppelt gefiedert, die Fiedern gegenüber stehend; sie bestehen aus vielen Blättchen und einem einzelnen Endblättchen. Diese sind rautenförmig, an beiden Enden gespißt, ganzrandig, am Rande zurückgerollt, oben mit weißlichen angebrückten Härchen bekleidet, unten glatt; das Endblättchen doppelt länger als die untern, lanzettförmig, langgespißt. Blattstiele glatt. Blumeuripen gipfelförmig, aufrecht, zweitheilig, sehr ästig, vielblümig. Kelch sehr kurz, vierzählig. Corolle blau, $1\frac{1}{2}$ Zoll lang, an der Basis kuglich, oben zusammengezogen, dann erweitert,

Regel = glockenförmig, aufgeblasen, der Rand zweilappig, die Oberlippe gespalten, die untere dreilappig. Staubfäden dreimal kürzer als die Corolle, gekrümmt, der unfruchtbare Faden dreimal länger als die fruchtbaren, hervorragend. Griffel fadenförmig. Narbe länglich, an der Spitze zweilappig. Vaterl. Guiana; Surinam in schattigen Wäldern. ♀ Blüth. Dezenber, Januar.

2. *Iacaranda caroliniana* Pers. Hierher gehört *Bignonia coerulea* Linn. f. Lexic. B. 2. und *Iac. mimosaeifolia* Don. Ker.

3. *Iacaranda brasiliana* Pers. Hierher *Bignonia brasiliana* Lam. f. Lexic. erste Aufl. B. 2. S. 227.

Ein Baum, dessen Aeste absteilen. Blätter doppelt gefiedert, glatt. Blättchen länglich, gespitzt. Die Blumen bilden winkelförmige Rispen. Corolle gelb. Kapsel an beiden Enden ausgeschweift, buchtig = hornförmig. Vaterl. Brasilien. ♀ Blüth. Sommer.

Iac. acutifolia et *obtusifolia* Humb. siehe 1. Nachtrag B. 4.

Zu dieser Gattung hat Kurt Sprengel (Syst. Veg. 2. p. 834.) noch vier Arten gezogen, welche ich im Lexikon und Nachtrage unter *Bignonia* aufgeführt und beschrieben habe. Es sind folgende.

4. *Iacaranda alba* Spr. (*Bignonia alba* Aubl.) f. Lex. erste Auflage B. 2. Die Diagnose vollständiger im zweiten Nachtrage B. 1. S. 573.

5. *Iacaranda echinata* Spr. (*Bignonia echinata* Jacq. Aubl.) f. Lexic. und 1. Nachtr. B. 4. S. 496.

6. *Iacaranda orbiculata* Spr. (*Bignonia orbiculata* Jacq. f. Lexic. erste Aufl. B. 2. S. 219. und 2. Nachtr. B. 1. S. 572)

7. *Iacaranda procera* Spr. (*Bignonia procera* Willd. B. Copia Aubl.) f. Lexic. 2. Aufl. B. 2. S. 290.

Die Arten der Gattung *Iacaranda* behandelt man in unsern Gärten, in Hinsicht auf Standort, Erdreich und Fortpflanzung wie die *Bignonien*, die aus Tropenländern kommen. N. 2. wird im Glashause überwintert.

Iacaranda mimosaeifolia Don. Ker. ist *Iacaranda caroliniana* N. 2.

Iackia Spreng. Syst. V. 3. p. 8. (*Wallichia* Cand.)

N n 2

Kelch viertheilig, von einer kleinen vierblättrigen Hülfe unterstützt. Vier verdickte Corollenblätter. Staubfadenröhre verlängert, die Anthere tragend. Narben 8. Fruchtknoten achtzählig.

Monadelphia Icosandria (Familie Malvaceen.)

1. *Iackia spectabilis* Spr. Unsehnliche Iackia.

Wallichia spectabilis Candolle.

Ein Baum, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter fast herzförmig, sägerandig, unten zottenhaarig. Blumenstiele lang, vielblümig, rispenartig getheilt. Vaterl. Nepal. h. Blüth. Sommer.

Synonymen.

Iackia excelsa Blum. ist *Monnina excelsa* Spr.

— *longifolia* Blum. ist *Monnina longifolia* Spr.

— *ornata* Wallich. ist *Zuccaricia ornata* Spr.

— *vitellina* Blum. ist *Monnina vitellina* Spr.

Iacksonia Rob. Brown. Jacksonia.

Character generic. f. I. Nachtr. B. 4. S. 64.

Kelch fünftheilig. Corolle schmetterlingsförmig. Staubfäden niedergebogen. Hülfe einsamig, zweiflappig, die Klappen inwendig filzig.

Decandria Monogynia (Familie Hülsenpflanzen.)

Im ersten Nachtrage B. 4. S. 65. habe ich schon bemerkt, daß Rob. Brown diese Gattung dem Herrn Jackson zu Ehren *Iacksonia* genannt hat und füge hier nur noch die Bemerkung bei, daß Thomas Jackson, geboren in Selby in Yorkshir, ein Werk: *Gerards herball*. (Th. 1. S. 335.) herausgegeben hat. Im Jahr 1632. gab er *Descriptio itineris in agrum Cantianum* heraus, dann *Mercurius britannicus* London 1634—1641. Dieser Jackson war erst Apotheker, dann Offizier in Königlichem Diensten und erhielt von der Universität zu Oxford die Doktorwürde. Er starb im Jahr 1617.

Iacksonia scoparia et spinosa R. Br. f. I. Nachtrag B. 4.

1. *Iacksonia furcellata* Cand. (*Gompholobium furcellatum* Bonpl. plant. Navarr. t. 11.)

Stengel strauchig, ästig. Aeste walzenrund. Aestchen klein, spitzig, zusammengedrückt, gestreift. Blätter länglich-lanzettförmig. Blumen in gipfelständigen Trauben gesammelt.

Blumenstielschen an der Spitze mit Bracteen versehen. Waterl. Neuholland. h

2. *Jacksonia horrida* Cand. Feindornige Jacksonia.

Stengel strauchig. Aeste eckig. Aestchen Blumen tragend, zusammengedrückt, dornig. Blumentrauben gipfelständig. Blumenstielschen in der Mitte mit Bracteen besetzt. Waterl. Neuholland. h

3. *Jacksonia reticulata* Cand, ist *Daviesia reticulata* Smith. f. 2. Nachtr. B. 3. S. 337.

Kultur. Die Jacksonien behandelt man wie andere hülfentragende Sträucher, die aus Neuholland kommen, z. B. Gompholobien, Acacien u. a. f. Lexic. und 1. Nachtr.

Iacobaea angustifolia Thunb. f. *Senecio angustifolius*.

— *anthoraefolia* Presl. f. *Senecio vernalis* Kit.

— *bidentata* Thunb. f. *Senecio bidentatus* Willd.

— *carnosa* Presl. f. *Senecio crassifolius* Willd.

— *incisa* Presl. f. *Senecio trilobus* Willd.

— *mucronata* Thunb. f. *Senecio mucronatus* Willd.

— *nivea* Thunb. f. *Senecio niveus* Willd.

— *peucedanifolia* Thunb. f. *Senecio peucedanifolius* Willd.

— *scabra* Thunb. f. *Senecio scaber* Willd.

— *tomentosa* Thunb. ? ist *Senecio virgatus* Linn. ?

— *vestita* Thunb. f. *Senecio vestitus* Willd.

Jacquinia Jussieu, *Jacquinia* f. Lexic. B. 5.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 66. (Abbild. Gaertn. Sem. t. 201.)

Kelch fünftheilig, stehen bleibend. Corolle fast glockenförmig; der Rand hat 10 Einschnitte, davon die innern kleiner sind und mit den äußern größeren abwechseln. Staubfäden 5, an dem Boden der Corolle eingefügt. Antheren hinten an den Fäden angeheftet. Griffel 1, sehr kurz. Narbe stumpf. Beere kugelförmig, 1—6 saamig.

Pentandria Monogynia (Familie Myrsineen.)

Die Arten der Gattung *Jacquinia* sind kleine Bäume oder Sträucher, deren Blätter theils zerstreut, theils gegenüber oder quirlförmig stehen und ganzrandig sind. Blumen gipfelständig = traubig oder einzeln.

1. *Jacquinia pubescens* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. III. p. 251. t. 246.

Iacq. mucronata Willd. herb. Roem. et Schult. Syst. veg. 4. p. 82.

Stengel strachig, ästig. Aestchen eckig, wenig blüthig. Blätter umgekehrtenförmig = länglich, an der gerundeten Spitze mit einem stehenden Mucrone versehen, unten blüthig, 1 Zoll lang und länger; die untern stehen zerstreut, die obern quirlförmig, alle ganzrandig. Blumen traubenständig. Kelchtheile häutig, gerundet, fast abgestutzt. Corollenröhre ein wenig länger als der Kelch, die Einschnitte gerundet, so lang als die Röhre. Vaterl. Südamerika, am Amazonenflusse. ♀ Blüthz. August.

2. *Iacquinia Berterii* Sprengel Syst. Veg. 1. p. 668.

Blätter zerstreut stehend, fast spatelförmig, spitzlich, lederartig, glattlich. Die Blumen bilden gipfelständige, wenigblümige Doldentrauben. Vaterl. St. Domingo. ♀

3. *Iacquinia macrocarpa* Cavan. f. 1. Nachtr. B. 4.

Bonelia Cavanillesii Bert. Iacq.

Iacq. caracasana Kunth. *Iacq. aurantiaca* Ait. var. gehört hierher f. 1. Nachtr.

Dieser Strauch ist jetzt im hiesigen bot. Garten 3—4 Fuß hoch, fast baumartig und wird im warmen Hause überwintert. Blätter zerstreut stehend, länglich = lanzett = fast spatelförmig, stachelspitzig, ganzrandig, glatt, 2—3 Zoll lang, lederartig. Blumen in gipfel- und winkelförmigen, wenigblümigen Doldentrauben. Kelch fast kuglich, lederartig. Corolle bauchig, dreimal länger als der Kelch. Beere pomeranzfarbig. Vaterl. Südamerika. ♀ Blüthz. Sommer.

4. *Iacquinia ferruginea* Spr. Rostfarbige *Iacquinia*.

Blätter wechselnd stehend, linienförmig, straff, feinspitzig, fast lederartig, unten rostfarbig, geadert. Blumenstiele winkelförmig, fast traubig, wenigblümig. Diese Art bedarf noch einer genauern Untersuchung und Bestimmung. Vaterl. St. Domingo. ♀

Kultur der *Iacquinien* im Allgemeinen f. Lexic. B. 5.

Synonymen.

Iacquinia aurantiaca Ait. (1. Nachtr. B. 4.) f. *Iacquinia macrocarpa* N. 3.

— *caracasana* Kunth. f. *Iacquinia macrocarpa* N. 3.

— *linearis* Iacq. f. Lexic. B. 5. ist *Iacquinia ruscifolia* Iacq. f. Lexic.

Iacquinia mucronata Willd. f. *Iacquinia pubescens* N. 1.

Iaegeria Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et Sp. pl. IV. p. 278. *Jägeria*.

Blumendecke (Kelch) fünfblättrig, fast gleich. Fruchtknoten kegelförmig, sprengig. Die inneren scheibenständigen Zwitтерblümchen sind röhrig, die Randblümchen (Strahlblümchen) weiblich, zungenförmig. Saamen an der Spitze keulensförmig, ohne Krone.

Syngenesia 1. Ordn. (Familie Compositä.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn Georg Friedr. Jaeger, Arzt und Professor in Stuttgart, der die Mißbildungen der Pflanzentheile genau beobachtet und die Ursache ihrer Entstehung erforscht hat. (s. „Ueber die Mißbildungen der Gewächse“ Stuttgart 1814. 8.)

1. *Iaegeria mnioides* Kunth J. c. IV. p. 278. t. 400.

Eine kleine krautartige Pflanze, mit aufrechtem sehr einfachem Stengel. Blätter kurzgestielt, eiförmig, sägerandig, sitzig. Blumenstiele gipfelständig. Blumen gelb. Vaterl. Mexiko. ☉ Blühz. September.

2. *Iaegeria urticaefolia* Spr. Nesselblättrige *Jägeria*.
Viborgia urticaefolia Kunth.

Stengel ästig. Blätter gestielt, eiförmig, gespißt, sägerandig, wie die Nessel scharfborstig. Blumenstiele winkelförmig, kürzer als die Blätter. Vaterl. Quito. ☉

3. *Iaegeria uliginosa* Spr. Hierher gehört *Spilantus uliginosa* Swartz. f. Lexic. B. 9. S. 421.

4. *Iaegeria calendulacea* Spr. Hierher *Verbesina calendulacea* Linn. f. Lexic. B. 10. S. 405.

5. *Iaegeria abyssinica* Spr. Hierher *Polymnia abyssinica* Linn. Suppl. f. Lexic. B. 7. S. 420.

6. *Iaegeria bellidioides* Spr. Nasstiehanartige *Jägeria*.

Stengel krautartig. Blätter gestielt, elliptisch, ganzrandig, am Stiele herablaufend, stielig-borstig. Blumenstiele gipfelständig. Vaterl. Monte Video. ☉

Kultur. Diese Gewächse zieht man aus Saamen in warmen Beeten, setzt hernach die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe oder an einer schützlichen Stelle ins freie Land.

Lambolifera Linn. *Jambolane* f. Lexic. B. 5.

Kelch viertheilig. Corolle vierblättrig, trichterförmig. Acht

Staubfäden, davon 4 abwechselnd am Boden der Corolle, die übrigen auf dem Fruchtboden stehen. Beere vierfächerig, vierfaamig.

Octandria Monogynia (Familie Rutaceen.)

1. *Iambolifera chinensis* Spr. Chinesische Jambolane.
Iamb. pedunculata Lour. (nec Linn.)

Aeste wechselnd stehend, ausgebreitet. Blätter eiförmig, ausgekerbt. Blumen gestielt, in Trauben gesammelt, die Doldentrauben bilden. Vaterl. das südliche China. ♀

2. *Iambolifera odorata* Lour. Wohlriechende Jambolane.

Blätter eiförmig, an der Basis schief abgestutzt, unten punktiert. Blumen wohlriechend, in ästige Doldentrauben gesammelt. Vaterl. Cochinchina. ♀

3. *Iambolifera resinosa* Lour. Harzige Jambolane.

Blätter länglich. Blumenstiele winkelförmig, vielblütig. Vaterl. Cochinchina. ♀

Kultur. Die Jambolanen lieben ein gutes lockeres Erdreich und warme Standörter. Fortpflanzung und Vermehrung durch Saamen und Stecklinge in warmen Beeten.

Zu *Iambolifera pedunculata* Linn. s. Lexic. B. 5. sehe man das Synonym; *Cyminosma* Gaertn. Candolle.

Iambosa vulgaris Cand. ist *Eugenia Iambos* Linn. s. Lexic. B. 4. (Abbild. Curt. Bot. Mag. t. 3356.)

Myrtus Iambos Kunth Nov. gen. et sp. VI. p. 114.

Ein Baum oder hoher Strauch aus Ostindien, der sich durch die Schönheit seiner lieblichen weißen meist büschelförmig stehenden Blumen, der Blätter und der Früchte empfiehlt und daher auch in unsern Gärten längst bekannt ist. Im hohen Sommer steht er im Freien und wird dann in Gewächshäusern überwintert. Blühz. Frühling — Jul. August.

Ianipha Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. II. p. 106. *Ianipha*.

Blumen monöisch. Kelch glockenförmig, fünfstheilig. Keine Corolle. ♂ (Männliche Blumen.) Staubfäden 10, frei stehend, am Rande einer fleischigen Scheibe eingefügt; 5 sind abwechselnd kürzer als die übrigen. ♀ Griffel 3, zweifaltig. Narben groß, irregulär, lappig-kammförmig. Kapsel dreiknöpfig, die Knöpfe einsaamig, zweiflappig.

Monöcia Monadelphia (Monadelphia Decandria Spr. Syst. veg.) Familie Ericaceen.

Die *Ianiphen* sind Bäume oder Sträucher, die Mischkast

enthalten. Blätter wechselnd stehend, handförmig. Blumen trauben- = rispenständig. Wurzeln meist knollig, bei einigen Arten essbar.

1. *Ianipha foetida* Kunth J. c. II. p. 106. Stinkende Ianipha.

Blätter herzförmig, dreispaltig, glatt, die Einschnitte langgespitzt, ganzrandig. Blumen traubenständig. Vaterl. Mexico in temperirten Regionen. ♀ Blüht daselbst im April und ist unter dem Namen Mercymarona, auch Ayotequeli bekannt.

2. *Ianipha Loeslingii* Kunth J. c. II. p. 107. Hierher *Iatropa frutescens* Loefl. lat. *Ianipha* Linn. f. Lex. B. 5. Auch Ian. Yuquilla Kunth scheint nur eine Varietät zu seyn.

Blätter herzförmig, fünflappig. Die Lappen langgespitzt, der mittlere buchtig-geigenförmig, die übrigen ungetheilt. Blumen traubenständig. Wächst in Südamerika in Wäldern und wird daselbst Dula genannt. ♀ Blühz. Mai.

3. *Ianipha Manihot* Kunth J. c. II. p. 108, ist *Iatropa Manihot* Linn. f. Lexic. B. 5. Zimmermann bemerkt im zweiten Theile seiner Reise, daß die Manihotwurzel aus mehreren Knollen bestehe. Uebrigens f. Lexic.

Blätter handförmig, 5—7 lappig, glatt, unten bläulich-grün. Blumen traubenständig. Vaterl. Westindien und Südamerika. ♀ Blühz. Junius.

4. *Ianipha aesculifolia* Kunth J. c. II. p. 107. t. 109. Rosskastanienblättrige Ianipha.

Blätter siebentheilig, oder 5—7 theilig, glattlich, einfarbig. Einschnitte (Theile) länglich-umgekehrteyförmig, langgespitzt, ganzrandig; die zwei äußeren seitenständigen kleiner als die übrigen. Blumen in einseitige hängende Trauben gesammelt. Vaterl. Neuspanien, in der Nähe des Meeres. ♀ Blühz. Juli.

Die Ianiphen kommen aus Tropenländern und verlangen in unsern Gärten eine Stelle im warmen Hause, wie die Arten der Gattung *Iatropa* mit denen sie zunächst verwandt sind. Man vermehrt sie theils durch Wurzelknollen, theils durch Saamen und Stecklinge.

Iantha pallidiflora Hooker ist *Cybelion pallidiflorum* Spr.

Iasione Linn. Jassone. (Abbild. Schuhr's Panth. t. 266. Gaertn. Sem. t. 30.)

Kennzeichen der Gattung siehe Lexikon B. 5. S. 4.

Pentandria Monogynia (Familie Campanulaceen; Glockenblumen.)

1. *Iasione foliosa* Cavan. Vielblättrige Iasione.

Wurzel dick, spindelförmig. Blätter länglich-linienförmig, glattlich. Wurzelblätter sägerandig. Stengelblätter ganzrandig. Stengel aufsteigend, blättrig. Blumenköpfschen gipfelständig, fast stiellos. Vaterl. das südliche Spanien. 4 Blühz. Sommer.

2. *Iasione supina* Sieber. Niedrige Iasione.

Stengel kriechend, ästig, weitschweifig. Blätter spatelförmig, meist gefeibt. Blumenköpfschen gipfelständig. Bracteen eiförmig, gefeibt, so lang als die Blümchen. Vaterl. Griechenland und Kleinasien. 4

Beide Arten überwintert man in unsern Gärten, in frostfreien Behältern oder im freien Lande unter einer zweckmäßigen Bedeckung.

Synonymen.

Iasione capensis Berg. ist *Astrantia ciliaris* Linn.

— *corymbosa* Poir. ist *Iasione montana* var. Linn. f. Lexic.

— *montana* Engl. bot. ist *Iasione montana* var. Linn. f. Lexic.

Iasminum Linn. Jasmin f. Lexic. B. 5. (Abbild. Gaertn. Sem. t. 42.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 68.

Kelch fünfzählig oder fünftheilig. Corolle röhrig, der Rand ausgebreitet, 5—8 spaltig. Staubfäden 2. Griffel 1. Narbe kopfförmig oder zweilappig. Beere zweisaamig, davon ein Saame oft fehlschlägt, d. h. sich nicht vollkommen entwickelt. Diandria Monogynia (Familie Jasmineen.)

Diese Gattung enthält jetzt 51 Arten. Es sind Sträucher von verschiedener Größe und Höhe (selten Bäume). Die Blätter stehen wechselseitig oder zu zweien einander gegenüber, sind theils einfach, theils dreizählig oder gefeibt. Blumen weiß oder gelb, oft wohlriechend. Im System sind sie nach der Gestalt und Stellung der Blätter eingetheilt und geordnet.

I. *Foliis simplicibus*. Blätter einfach.

Hierher gehören die im Lexikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Iasm. Sambac*, *cuspidatum*, *hirsutum*

Linn. *J. scandens*, *dichotomum*, *trinerve*, *sessiliflorum* Vahl. *J. undulatum*, *angustifolium* Willd. *J. aemulum* R. Br. *J. lanceolatum* R. et P. *J. glaucum* Ait. Th.

† Calycibus quinquefidis. Kelche fünfspaltig.

1. *Jasminum trichotomum* Heyne. Dreitheiliger Jasmin.

Blätter gegenüberstehend, ey-lanzettförmig, unten rostfarbig = filzig. Blumen in dreitheilige gipfelständige Doldentrauben gesammelt, deren Stiele filzig sind. Kelche glockenförmig fünfspaltig. Vaterl. Ostindien. ♀ Blühz. Sommer.

2. *Jasminum stenopetalum* Lindl. (*J. trinerve* Roxb. non Vahl.)

Stengel kletternd, glatt. Blätter ey-lanzettförmig, langgespitzt, dreirippig. Die Einschnitte des Kelches pfriemenspizig. Corollenröhre fadenförmig, viel länger als der Kelch, weiß. Vaterl. Ostindien. ♀

3. *Jasminum coarctatum* Roxb. Corom. Gedrängtblumiger Jasmin.

Blätter länglich, gespitzt, glatt. Die Blumen stehen zu 3 beisammen und bilden gipfelständige gestielte gedrängte Doldentrauben, die mit Bracteen besetzt sind. Vaterl. Ostindien. ♀ Blühz. Juni August.

4. *Jasminum nepalense* Spr. • (*J. dichotomum* Don. (nec Vahl.)

Blätter gegenüberstehend, elliptisch, langgespitzt, ganzrandig, glatt, glänzend. Blumenstiele dreitheilig, dreiblümig. Die Einschnitte des Kelches pfriemenspizig, abgekürzt, die der Corolle linienförmig, stumpf. Nepal. ♀

5. *Jasminum bracteatum* Roxb. Jasmin mit Bracteen (Deckblättern.)

Stengel strauchig, gewunden. Blätter gegenüberstehend, elliptisch-länglich, stumpflich, zottenhaarig. Blumen büschelförmig, gipfelständig, mit Bracteen versehen. Die Einschnitte des Kelches pfriemenspizig. Corolle radförmig. Vaterl. Sumatra. ♀

6. *Jasminum latifolium* Roxb. Breitblättriger Jasmin.

Blätter breit, fast herzförmig, gespitzt, durchaus glatt. Doldentrauben gipfelständig, dreitheilig. Kelch oft 6—7 spaltig. Einschnitte pfriemenspizig. Die Einschnitte der Corolle (6—12) linienförmig = feinspizig. Beere nierenförmig. Was

terf. Ostindien an Bergen, Klündern und in Wäldern. ♀
Blühz. Spimper.

7. *Jasminum arborescens* Roxb. Baumartiger Jasmin.

Nyctanthes grandiflora Lour. Fl. cochinchin.

Ein Baum 10—14 Fuß hoch, dessen Aeste rund, aschgrau und in der Jugend filzig sind. Blätter kurzgestielt, herzförmig, langgespitzt, fast filzig, 3 Zoll lang, 1 Zoll breit. Blumenstiele dreitheilig, vielblümig, doldentraubig. Bracteen pfriemenspizig, zottenhaarig. Kelch kurz, nur 2 Linien lang, die Einschnitte pfriemenspizig. Corolle weiß, die Röhre etwa 6 Linien lang. Einschnitte gespitzt, 8 Linien lang. Vaterl. Bengalen an Bergen. ♀

8. *Jasminum tubiflorum* Roxb. Röhrenblumiger Jasmin.

Blätter fast stiellos, länglich-eiförmig, glatt. Blumen sehr kurzgestielt, zu 3 gipfelständig. Die Einschnitte des Kelches kurz, pfriemenspizig. Corollenröhre dünn, sehr lang. Beere eiförmig. Vaterl. Archipel, malacc. ♀

† Calycibus quinquedentatis. Kelche fünfzählig.

Hierher gehören sechs Arten; *Jasm. simplicifolium* Forst. I. *oblongum* Burm. I. *elongatum* Vahl. I. *gracile* Andr. I. *acuminatum*, *molle* R. Br. f. Lexic. und 1. Nachtrag.

II. *Foliis ternatis*. Blätter dreizählig.

† *Foliis oppositis*. Blätter gegenüberstehend.

Zu dieser zweiten Abtheilung gehören die im Verikon und 1. Nachtr. beschriebenen Arten; I. *azoricum* Linn. I. *flexile*, *auriculatum* Vahl. I. *tortuosum* Willd. I. *didymum* Forst. I. *lineare*, *divaricatum* R. Br. und folgende,

9. *Jasminum noctiflorum* Afzel.

Blätter dreizählig, einander gegenüber stehend. Blättchen länglich-eiförmig, langgespitzt, dreirippig, glatt. Blumenstiele meist zu 3, gipfelständig, dreiblümig. Kelche gezähnt. Die Corollen entfalten sich gewöhnlich gegen Abend. Vaterl. Sierra Leona. ♀

10. *Jasminum campanulatum* Link Enum. pl. hort. Berol. 1. p. 32.

Stengel strauchig, ästig, weitschweifig, kletternd, gestreift, 4—5 Fuß hoch. Aeste walzenrund, oben filzig. Blätter und Blättchen gestielt, die Stiele filzig. Blättchen oval, langgespitzt, glattlich, an der Basis schief. Blumen rispen

ständig, mit Bracteen versehen. Kelch kloßenförmig. Die Einschnitte sehr kurz. Vaterl. Ostindien. ? h

11. *Jasminum dispernum* Wallich. Zweisaamiger Jasmin.

Blätter gestielt. Blättchen länglich-eyförmig, langgespitzt, dreirippig, das Endblättchen größer als die seitenständigen. Blumen in gipfelfständige Doldentrauben gesammelt, deren Aeste armförmig sich ausbreiten. Die Einschnitte des Kelches pfriemenspizig. Corolle länglich, stumpf. Beere zweisaamig. Vaterl. Nepal. h Blühz. Frühling und Sommer.

12. *Jasminum paniculatum* Roxb. Rispenförmiger Jasmin.

Stengel strauchig, aufrecht. Blättchen oval, fast lederartig, glatt, glänzend. Die Blumen bilden gipfelfständige armförmige Rispen. Vaterl. das südliche China. h

13. *Jasminum Lanceolaria* Roxb.

Stengel strauchig, aufrecht. Blättchen lanzettförmig. Blumen in gipfelfständige Doldentrauben gesammelt. Diesen Jasmin hat Roxburgh von andern Arten, die aus Ostindien kommen, nicht hinreichend unterschieden. Wahrscheinlich nur eine Varietät von der vorhergehenden Art. ?

14. *Jasminum heterophyllum* Roxb. Verschiedenblättriger Jasmin.

Blättchen glatt, theils rundlich-eyförmig, langgespitzt, theils länglich. Blumenrispen doldentraubig, filzig. Kelchzähne undeutlich. Nepal. h

III. Foliis pinnatis. Blätter gefiedert.

Hierher *Jasm. officinale*, *grandiflorum* Linn. I. nervosum Lour. s. Lex. und I. Nachtr. und folgende Arten.

15. *Jasminum pubigerum* Don. Filziger Jasmin.

Blätter gefiedert, filzig. Blättchen stiellos, länglich-eyförmig, gespitzt. Blumenstiele lang, einblüthig. Aeste vierseitig, scharfborstig. Nepal. h

16. *Jasminum aureum* Don. Goldgelber Jasmin.

Aeste fünfseitig, glatt. Blättchen eyförmig, gespitzt, glatt, dreirippig. Blumenrispen seitenständig, wenigblüthig. Vaterl. Nepal. h

17. *Jasminum revolutum* Sims. in Curt. bot. Magaz. Reichenb. Magaz. der Garten-Botanik. Heft 13. p. 5. Tab. LXXV. Umgerollter Jasmin.

Jasm. chrysanthemum Roxb. Fl. ind. 1. p. 98.

I. triumphans Hortulan.

Stengel holzig, walzenrund, kletternd, fast windend, 6—8 Fuß hoch. Aeste dünn, gedreht, eckig, glatt. Blätter wechselnd stehend, gestielt, 2—3 paarig, ungleich gefiedert. Blättchen (5—7) ey-lanzettförmig, ganzrandig, glatt, glänzend, das Endblättchen etwas größer als die seitenständigen. Blumen sehr wohlriechend, gestielt, in schlaffen fast dreitheiligen gipfelständigen Aesterbüscheln, ohne Bracteen. Kelch glatt, fünfzählig. Corolle schön goldgelb, die Röhre 3—4 mal länger als der Kelch, der Rand tief fünftheilig. Die Theile fast so lang als die Röhre, abstehend, länglich, abgestutzt, am Rande zurückgerollt.

Im hiesigen bot. Garten steht dieser in Ostindien einheimische Strauch den Sommer über unter freiem Himmel und wird dann im Glashause überwintert; seine lieblichen wohlriechenden Blumen entwickeln sich zu verschiedenen Zeiten im Jahr; im Frühlinge und Sommer zc.

Die Kultur der Jasminarten, in Hinsicht auf Boden, Fortpflanzung und Vermehrung ist bekannt. Auch habe ich schon im Lexikon B. 5. S. 13. eine Anleitung zur Kultur dieser Biersträucher gegeben und auf dieselbe Art und Weise können auch die neuen Arten behandelt werden.

Zu den Synonymen welche ich im ersten Nachtrage S. 75. angezeigt habe, gehören noch folgende

Synonymen.

- Iasminum chrysanthemum* Roxb. f. *Iasminum revolutum* N. 17.
 — *dichotomum* Don. f. *Iasminum nepalense* N. 4.
 — *flexile* Jacq. (nec Vahl) f. *Iasminum tortuosum* l. Nachtr.
 — *laurifolium* Roxb. ist *Iasminum angustifolium* Willd. f. Lexic.
 — *pubescens* Willd. f. Lexic. ist *Iasminum hirsutum* Linn. f. Lexic.
 — *trinerve* Roxb. f. *Iasminum stenopetalum* N. 2.

Iatropa Linn. *Iatropa* f. Lexic. (Gaertn. Sem. t. 108.)

Character generic. f. I. Nachtr. B. 4. S. 76.

Blumen mondsich. Corolle fast trichterförmig, tief fünftheilig, nackt, oder mit einem fünftheiligen Rande versehen.

Staubfäden 10, an der Basis vermaehen; die fünf äußern oft kürzer als die innern. Fünf Nectardrüsen ringsum am Boden stehend. Griffel 3, zweispaltig. Kapsel dreiknöpfig, dreisaamig.

Monoecia Monadelphia (Monadelphia Decandria Spr. Syst. Veg.) (Familie Trifolien.)

Die Iatropen kommen aus Tropenländern. Es sind Bäume und Sträucher (selten krautartig) und enthalten Milchsaft, wie die Janiphen. Die Blätter stehen wechselseitig. Austerblätter handförmig oder lappig. Blumen in winkelförmigen oder gipfelständigen Doldentrauben.

I. Floribus calyculatis. Blumen mit Kelchen versehen.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Iat. divaricata* Sw. *I. variegata*, *glauca*, *glandulosa* Vahl. *I. aculeata* Dietr. (*spinosa* Vahl.) *I. gossypifolia*, *Curcas*, *multifida* Linn. *I. integerrima* Jacq. *I. panduraefolia* Andr. und folgende Arten.

1. *Iatropa Berterii* Spr. Bertero's Iatrophe.

Blätter an der Basis fast abgestutzt, gerundet, langgespitzt, ganzrandig, geadert, auf beiden Seiten mit weichen Zottenhaaren bekleidet. Blumen traubenständig. Vaterl. Südamerika, am Magdalena-Flusse. h

2. *Iatropa tripartita* Spr. Dreitheilige Iatrophe.

Blätter dreitheilig, unten zottenhaarig, die Theile lanzettförmig, gespitzt, ganzrandig. Blumen ährenständig, mit Bracteen versehen. Vaterl. Brasilien. h

3. *Iatropa peltata* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. II. p. 104. Schildblättrige Iatrophe.

Blätter schildförmig, 6—7 lappig, glatt, drüsig = gewimpert. Austerblätter vielspaltig = borstig, drüsig. Blumen in Doldentrauben, mit scharlachrothen Kelchen.

II. Floribus ecalyculatis. Blumen ohne Kelche.

Iat. urens Linn. *I. montana* Willd. *I. napaeae-folia* Desrouss. Lam. f. Lexic. und 1. Nachtr. gehören hieher und folgende Arten.

4. *Iatropa herbacea* Linn. Krautartige Iatrophe.

Iat. urens Walt. (non Linn.) *I. stimulosa* Michx.

Stengel krautartig, ästig, wie die Blätter mit brennenden Borsten (wie die Brennnessel) dicht besetzt. Blätter fast handförmig = gelappt, die Lappen stumpflich, fast buchtig = einges-

schnitten. Die Blumen sind mit drei Griffeln versehen und bilden Asterspindeln. Früchte dornig. Waterl. Neuspanien und Carolina. 4

5. *Iatropa fragrans* Kunth J. c. II. p. 105. Wohlriechende Iatrophe.

Stamm baumartig. Blätter undeutlich fünfklappig, grob gezähnt, buchtig, glattlich. Blumen weiß, in Doldentrauben gesammelt. Waterl. die Insel Cuba, bei Regla. h Blüh. Julius.

Kultur der Iatropen siehe Verilon und I. Nachtr. B.

4. S. 80. Zu den daselbst angezeigten Synonymen gehören noch folgende,

Synonymen.

Iatropa frutescens Löffl. f. *Ianipha* Loeßlingii N. 2.

— *Ianipha* Linn. f. Lexic. f. *Ianipha* Loeßlingii N. 2.

— *Manihot* Linn. f. Lexic. f. *Ianipha* Manihot N. 3.

— *moluccana* Linn. f. Lexic. ist *Alurites triloba* Forst.

— *pungens* Forsk. ist *Targia cordata* Vahl.

— *stimulosa* Michx. f. *Iatropa herbacea* N. 4.

— *urens* Walt. f. *Iatropa herbacea* N. 4.

Iaumea linearis Pers. f. I. Nachtr. B. 4. hat Kurt Sprengel zur Gattung *Kuhnia* gezogen.

Iberis Linn. Schleifenblume; Bauernseuf f. Lexic. B. 5. (Schluhr's Handb. t. 179.)

Character generic. f. I. Nachtr. B. 4. S. 81.

Kelch und Corolle vierblättrig; die zwei äußeren Corollenblätter größer als die innern. Schötchen ausgerandet, die Klappen kahnförmig, geflügelt, einsamig.

Tetradynamia Siliculosa (Familie Kreuzblumen.)

+ *Frutescens*. Strauchartige, oder Staudenstrauchig

1. *Iberis Tenorii* Cand. Tenorischer Bauernseuf.

Stengel staudenstrauchig, gestreckt. Aeste filzig. Blätter länglich-eiförmig, fast fleischig, gezähnt-gewimpert. Blumen in gipfelständige Doldentrauben gesammelt. Schötchen länglich, an beiden Enden verdünnt, an der Spitze kaum ausgerandet. (*Iber. cepaeefolia* Tenor. gehört hierzu.) Waterl. Neapel, an Bergen und Mäandern. h

2. *Iberis*

1. *Iberis Pruiti* Tin. Sicilischer Bauernsenf.

Stengel standenstrauchig, ästig, glatt. Blätter fast fleischig, spatel-liniensförmig, ganzrandig. Blumen in Doldentrauben. Schötchen rundlich, gespitzt, ausgekerbt. Sicilien. h

2. *Iberis conferta* Lagasc. Bauernsenf; dessen Blätter gehäuft stehen.

Stengel standenstrauchig, niedrig. Blätter gehäuft, meist wurzelständig, linien-lanzettförmig, gespitzt, glatt. Blumen traubenständig. Schötchen eiförmig, kaum ausgekerbt. Vaterl. Spanien. h

3. *Iberis pubescens* Willd. Stütziger Bauernsenf. (I. Lagasana Cand.)

Stengel standenstrauchig, gestreckt, filzig. Blätter spatelförmig, stumpf, gezähnt, fast buchtig, gewimpert. Blumen in Doldentrauben. Schötchen rundlich, gespitzt, ausgekerbt, mit dem verlängerten bleibenden Griffel gekrönt. Vaterl. Spanien auf Tristen. h

4. *Iberis subvelutina* Cand. (I. sempervirens Lag. nec Linn.)

Stengel strauchig, ästig. Blätter liniensförmig, gespitzt, ganzrandig, zottenhaarig. Blumen traubenständig. Schötchen gespitzt, ausgekerbt. Spanien. h

Die übrigen Arten, welche zu dieser Abtheilung gehören, habe ich im Lexikon und ersten Nachtrage beschrieben. Desgleichen die Krautartigen, zu denen nur noch folgende Art gehört.

†† Herbaceae. Krautartige.

5. *Iberis pyrenaica* Lagasc. Pyrenäischer Bauernsenf.

Stengel krautartig, ästig. Blätter elliptisch, ganzrandig, glatt, fast fleischig; die untern stehen einander gegenüber, die obern wechselnd. Blumen doldentraubig. Vaterl. die Pyrenäen. ☉ ?

Die Kultur dieser Gewächse ist leicht und noch überdies unsern Gärtnern allgemein bekannt s. Lexic. B. 5.

Synonymen.

Iberis arabica Linn. ist *Aethionema cappadocicum* Spr.

— *campestris* Wallr. ist *Lepidium campestre* R. Br.

— *cepeaefolia* Tenor. s. *Iberis Tenorii* N. 1.

— *cepeaefolia* Pourr. ist *Iberis carnosa* Willd. s. Lexic.

Dict. Lex. 2r. Nachtr. IV. Bd.

D o

- Iberis chloræfolia** Sibth. f. *Lepidium chloræfolium* Spr.
 — **crenata** Lam. ist *Iberis pinnata* Lexic.
 — **Garraxiana** All. ist *Iberis sempervirens* var. f. Lexic.
 — **humilis** Presl. ist *Iberis semperflorens* var. f. Lexic.
 — **intermedia** Guers. f. 1. Nachtr. ist *Iberis amara* Var.
 — **Lagascana** Cand. f. *Iberis pubescens* N. 4.
 — **nudicaulis** L. f. Lex. 1. Aufl. f. *Teesdalia Iberis*.
 — **oppositifolia** Pers. f. 1. Nachtr. ist *Lepidium oppositifolium*.
 — **pumila** Stev. ist *Hutchinsia pumila* Cand.
 — **rotundifolia** Lam. ist *Iberis carnosa* Lexic.
 — **semperflorens** Lag. f. *Iberis subvelutina* N. 5.
 — **stylosa** Tenor. ist *Hutchinsia stylosa* Cand.
 — **taurica** Cand. ist *Iberis ciliata* f. Lexic.
 — **tenuifolia** Presl. ist *Iberis linifolia* f. Lexic.
 — **vermiculata** Willd. f. Lexic. ist *Iberis saxatilis*.

Icacina Andr. Jussieu. *Scacina*.

Reich unten stehend, fünfspaltig. Corolle fünfblättrig. Staubfäden 5, mit den Corollenblättern wechselnd stehend. Antheren herzförmig, zweifächerig. Narbe abgestutzt. Frucht einsamig.

Pentandria Monogynia (Familie Rhamneen.?)

1. ***Ikacina senegalensis*** Andr. Juss. Senegalische *Scacina*.

Ein Baum, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter wechselnd stehend, länglich-eyförmig, ganzrandig, glatt. Blumen in gipfelförmige Rispen gesammelt. Wächst in Senegambien und verlangt in unsern Gärten eine Stelle im warmen Hause.

Iacorea gujanensis Aubl. ist *Ardisia acuminata* Willd.

Ichnocarpus Rob. Brown. *Ichnocarpus*.

Corolle präsentirtellerförmig, fünfspaltig, die Einschnitte schiffelförmig. Fünf pfelförmige, freistehende Antheren. Fünf unfruchtbare Fäden. Fruchtbälge dünn.

Pentandria Monogynia (Familie Contorten.)

1. ***Ichnocarpus frutescens*** R. Br. Hierher *Apocynum frutescens* Linn. f. Lexic. B. 1.

2. ***Ichnocarpus Afzelii*** Roem. et Schult. Syst. Veg. 4. p. 399.

Stengel strauchig, windend. Blätter glatt, untere oval,

gespitzt, obere länglich-lanzettförmig, langgespitzt. Blumenwinkel- und gipfelständig. Einschnitte der Corolle stumpf. Der Schlund nackt. Vaterl. Guinea. H

3. *Ichnocarpus Loureiri* Spr. (*Apocynum africanum* Lour.)

Stengel strauchig, ästig, meist aufrecht. Blätter länglich-eyförmig, stumpf, fast lederartig. Blumenstiele meist dreiblättrig, winkelförmig. Vaterl. das östliche Afrika. H

Kultur. Alle drei Arten verlangen eine Stelle im warmen Hause. Man vermehrt sie durch die Aussaat des Saamens, durch Ableger und Stedklinge.

Icia Aubl. 6 Arten s. *Amyris* Lexic. B. 5.

— *Carana* Kunth ist *Amyris Carana* Humb.

— *macrophylla* Kunth ist *Amyris altissima* Willd.

— *Tacamara* Kunth ist *Amyris ambrosiaca* Linn.

Ichthyosma Wehdemanni Ecklon Reisebericht ist *Zamia*?
Ienkinsonia quinata Sweet. ist *Pelargonium quinatum* Curt.

Ienkinsonia tetragona Sweet. ist *Pelargonium tetragonum* L.

Ignatiana philippinica Lour. ist *Strychnos Ignati* Berg.

Ilex Linn. Hülsen; Stechpalme s. Lexic. B. 5. (Schubers Handb. t. 28)

Charakter generic. s. 1. Nachtr. B. 4. S. 83.

Kelch klein, vierzählig, stehen bleibend. Corolle vierspaltig, oder 4—5—6 blättrig. Staubfäden 4, am Boden der Corolle eingefügt. Vier Narben. Beere viersamig.

Tetrandria Tetragynia (Familie Rhamneen.)

Die Arten der Gattung *Ilex* sind zierliche Bäume oder Sträucher, deren Blätter meist wechselnd oder zerstreut stehen. Diese sind meist steif, lederartig, ausdauernd, gezähnt oder sägezählig-dornig, oder ganzrandig. Die Blumen sind gegen die Blätter sehr klein, meist weiß, und die Geschlechter zuweisen getrennt; sie entwickeln sich im Frühlinge und Sommer. Die Beere zur Zeit der Reife meist schwarzroth, oder gelb.

† *Folius dentato-aut serrato-spinosis sive crenatis* Spr.

Blätter gezähnt- oder sägerandig-dornig oder geferb.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Verikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Ilex Aquifolium* Linn. II. la-

tifolia, crocea, serrata, crenata, emarginata Thunb. I. opaca, vomitoria, prinoidea, Parado Ait. I. angustifolia Willd. I. salicifolia Jacq. I. canadensis Michx. und folgende.

1. *Ilex balearica* Desfont. (I. maderensis Willd.)

Blätter eiförmig, gespitzt, ungetheilt, dornig = gezähnt, glatt, glänzend. Blumen winkelfständig, doldenartig. Vaterl. die balearischen und canarischen Inseln. ♀

2. *Ilex madagascariensis* Lamarck. (I. madagascariensis R. et Schult. Syst. veg.)

Blätter eiförmig, gespitzt, dornig, geädert. Blumenstiele seitenwinkelfständig, einzeln, auch zu 3 beisammen stehend, 3—5 Linien lang, einblüthig. Beere eiförmig, zweisaamig. Vaterl. Madagascar. ♀

3. *Ilex Dahoon* Walt.

Blätter länglich, an beiden Enden verbünnt, spizig gezähnt oder ganzrandig, an der Mittelrippe wie die Aestchen zottenhaarig. Blumenstiele winkelfständig, doldentraubig. Vaterl. Carolina. ♀

4. *Ilex laxiflora* Lam. Schlaßblumige Ilex; Hülsen.

Ein Baum, 16—20 Fuß hoch, dessen Aeste pergarn und mehr oder weniger übergebogen, fest schlaff sind. Blätter gestielt, flach, eiförmig, buchtig = gezähnt, fast dornig, oben glänzend, 2 Zoll und drüber lang, 12—15 Linien breit. Winterblätter pfriemensförmig. Blumenstiele winkelfständig, traubig, schlaff. Beere gelblich = roth. Vaterl. Carolina in schattigen Wäldern. ♀

5. *Ilex dipyrrena* Wallich. Zweisaamige Hülsen.

Blätter länglich, langgespitzt, entfernt sägezähnt = dornig. Blumen in winkelfständige Büschel gesammelt. Beere zweisaamig. Vaterl. Nepal. ♀

6. *Ilex chinensis* Ker. Chinesische Hülsen.

Aeste filzig. Blätter länglich, an beiden Enden gespitzt, punkirt, gezähnt. Blumenstiele winkelfständig, doldentraubig. Vaterl. China. ♀

†† Foliis integerrimis. Blätter ganzrandig, oder gekerbt = gezähnt.

Hierher *I. myrtifolia* Lam. f. 1. Nachtr. *I. rotunda* Thunb. *I. obcordata* Swartz. f. Lexic. und folgende Arten.

7. *Ilex asiatica* Linn. ist *Ilex integra* Thunb. f. Lex. B. 5. S. 31.

Ostindien und Japan. h

8. *Ilex Othera* Spr. ist *Othera japonica* Thunb. f. Lexic. B. 6.

9. *Ilex Oriza* Spr. ist *Oriza japonica* Thunb. f. Lex. B. 6.

10. *Ilex Lepta* Spr. (*Lepta triphylla* Lour.)

Blätter dreizählig. Blättchen lanzettförmig, wellenrandig. Blumentrauben winkelförmig. Vaterl. Cochinchina. h

11. *Ilex Scopulorum* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. pl. VII. p. 70.

Blätter rundlich-eiförmig, stumpf, un deutlich gekerbt, lederartig, glatt, oben glänzend. Blumenstiele traubig (5—7 blüthig), borstig-filzig, klebrig. Corolle 4—5 blüthig, weiß. Vaterl. Quito. h Blüth. August.

12. *Ilex rupicola* Kunth J. c. VII. p. 71.

Nestchen glatt. Blätter rundlich-ekliptisch, stumpf, gekerbt-gezähnt, dick, lederartig, glatt, auf beiden Seiten. Blumenstiele meist dreiblüthig, glatt. Corolle vierblüthig. Vaterl. Peru, bei Lora. h Blüth. August.

13. *Ilex odorata* Don. Wohlriechende Hülfsen.

Blätter länglich, feingekerbt, glatt. Blumen in geknauten stiellosen Dolden, die so lang als die Blattstiele sind. Nepal. h

14. *Ilex paraguayensis* Hilan. (*Cassine Goungonha* Mart. Syst. 1. p. 939.)

Blätter länglich-spatselförmig, stumpflich, entfernt gezähnt, glatt. Blumenstiele winkelförmig, vielblüthig. Narben viertappig. Vaterl. Brasilien; Paraguay. h

15. *Ilex myricoides* Kunth J. c. VII. p. 72. Myricaartige Hülfsen.

Neste und Blätter glatt. Blätter länglich, gespitzt, an der Basis keilförmig, fast lederartig, gestielt. Blumenstiele dreiblüthig, glatt, winkelförmig, dreimal länger als die Blattstiele. Corolle vierblüthig. Vaterl. Neugranada an Bergen. h Blüth. daselbst im December.

16. *Ilex bumelioides* Kunth J. c. VII. p. 71. Bumeliaartige Hülfsen.

Nestchen glatt. Blätter umgekehrt, mucronenspitzig, an der Basis am Stiele herablaufend, meist ganzrandig, lederartig,

oben glänzend. Blumenstiel einklümpig, zu 3—4 beisammen stehend. Vaterl. Quito, bei Córdo. h Blühz. August.

17. *Ilex nepalensis* Spr. Nepalische Hülsen.

Ilex elliptica Don. (nec Kunth)

Blätter fast elliptisch, an beiden Enden verdünnt, ganz randig. Die Blumen bilden kugelförmige Dolden, deren Stiele sitzig und kürzer als die Blattstiele sind. Vaterl. Nepal. h

Im gedachten Werke: Nov. gener. etc. hat Dr. Dr. Kunth noch folgende als zweifelhafte Arten angezeigt: *Ilex hippocrateoides* et *laurina*; die vielleicht andern Gattungen angehören oder nur als Varietäten zu betrachten sind.?

Kultur der Hülsen im Allgemeinen, in Beziehung auf die Fortpflanzung derselben durch die Aussaat und Behandlung der Saamen siehe Lexikon B. 5. S. 33. Es versteht sich übrigens von selbst, daß alle Arten, die aus Tropenländern kommen, in warme Häuser gestellt werden.

Synonymen.

Ilex acutangula Nees, ist *Celastrus quadrangulata* Schrad.

— *aestivalis* Lam. ist *Ilex prinoides* Ait. s. Lexic.

— *caroliniana* Mill. s. *Ilex Cassine* Lexic. II. vomitoria, ?

— *Cassine* Michx. ist *Ilex vomitoria* Lexic.

— *cassinoides* Link. ist *Ilex angustifolia* Willd. s. 1. Nachtr.

— *decidua* Walt. s. *Ilex prinoides* Lexic.

— *elliptica* Don. s. *Ilex nepalensis* R. 17.

— *laurifolia* Hortul. ist *Ilex Cassine* Lexic.

— *ligustrina* Jacq. ist *Ilex vomitoria* Lexic.

— *Macoucoua* Pers. ist *Ilex acuminata* Lexic.

— *maderensis* Willd. s. *Ilex balearica* R. 1.

— *myrsinites* Pursh. ist *Myginda myrsinifolia* Nuttall.

— *recurva* Linn. ist *Ilex Aquifolium* var. s. Lexic.

— *rosmarinifolia* Lam. s. 1. Nachtr. ist *Ilex angustifolia* Willd. s. 1. Nachtr.

— *Skimmia* Spr. ist *Skimmia japonica* Thunb. s. Lexic. B. 9.

— *truncata* Nees ist *Celastrus quadrangulata* Schrad.

Illecebrum Linn. Knorpelblume; Knorpelstrauch s. Lexic. B. 5.

Reich fünftheilig, nackt, oder von Bracteen unterstützt. Keine Corolle. Staubfäden 5, unten trichterförmig verwachsen,

mit abwechselnden, zwischenstehenden, schuppenartigen Blüthen (unfruchtbare Staubfäden.) Antheren einsächerig. Narbe kopfförmig. Kapsel einsamig.

Pentandria Monogynia. (Familie Chenopodaceae)

Die Gattung *Alternanthera* Rob. Brown. Kunth hat Kurt Sprengel (Syst. veg. 1. p. 818) mit *Illecebrum* vereinigt (siehe meine Bemerkung im zweiten Nachtrage B. 1. S. 176.) Da die Arten, welche zu *Alternanthera* gehören, im Lexikon zweite Auflage B. 1. S. 329—337 genau und vollständig beschrieben sind, so will ich sie hier unter *Illecebrum* nur anzeigen. Es sind krautartige, aufrechte oder gestreckte Pflanzen, deren Blätter einander gegenüber stehen und ganzrandig sind. Blumen einzeln oder gepaart, auch zu 3 oder mehrere in gipfel- und winkelförmige Köpfchen gesammelt. Sprengel hat sie in zwei Abtheilungen aufgeführt.

† Erecta: squamae steriles inter stamina.

Stengel aufrecht. Schuppenartige und fruchtbare Fäden zwischen den Staubfäden.

1. *Illecebrum angustifolium* Spr. ist *Alternanthera angustifolia* R. Brown. f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 329.
2. *Illecebrum iresinoides* Spr. ist *Alternanthera iresinoides* Kunth f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 336.
3. *Illecebrum pulverulentum* Spr. (*Tromsdorfia* Mart.) B. 4. S. 134.

Stengel staudenstrauchig, weiß-klzig. Blätter länglich-ehrförmig, stumpf, oben pulverig, Blumen rispenständig. Kelch wollig. Brasilien. †

4. *Illecebrum dubium* Spr. (*Alternanthera dubia* Kunth. ist *Irisine canescens* Humb. et Bonpl. in Willd. Sp. pl. IV. p. 765, f. *Irisine* 1. Nachtr.
5. *Illecebrum villosus* Willd. herber. ist *Alternanthera villosa* Kunth f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 336.
6. *Illecebrum gomphrenoides* Willd. herb. *Alternanthera* Kunth f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 334.
7. *Illecebrum paniculatum* Spr. *Alternanthera* Kunth f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 335.
8. *Illecebrum flavescens* Spr. *Alternanthera* Kunth f. Lexic. 2. Aufl.
9. *Illecebrum sericeum* Spr. *Alternanthera* Kunth f. Lexic. 2. Aufl.

10. *Illecebrum truxilense* Spr. *Alternanthera truxilensis* Kunth f. Lexic. 2. Aufl.

†† Procumbentia. Stengel gestreckt.

Su dieser Abtheilung gehören die im Lexikon beschriebenen Arten: *Illec. verticillatum*, sessile, polygonoides Linn. I. *Achyrantha ficoideum* Willd. I. *frutescens* Herit. und folgende.

11. *Illecebrum echinatum* Poir. Weichstachelige Knorpelblume. *Paronychia echinata* Lamarck Encycl. (nec Reitz.) Stengel gestreckt, ästig, filzig. Blätter lanzettförmig. Blumen quersförmig stehend, mit behaarten Bracteen. Kelchtheile langgespitzt, begrünt. Vaterl. das südliche Frankreich, Italien und Sicilien.

12. *Illecebrum spinosum* Spr. (*Alternanthera spinosa* Cand. *Achyranthes spinosa* Hornem.) siehe *Achyranthes axillaris* Willd. im 1. Nachtrage B. 1. S. 91.

13. *Illecebrum nanum* Spr. ist *Alternanthera nana* R. Br. f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 329.

14. *Illecebrum denticulatum* Spr. *Alternanthera denticulata* R. Br. f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 329.

15. *Illecebrum diffusum* Willd. ist *Alternanthera pulchella* Kunth f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 332.

16. *Illecebrum canescens* Spr. ist *Alternanthera canescens* Kunth f. Lexic. a. a. O.

17. *Illecebrum pungens* Spr. ist *Alternanthera pungens* Kunth f. Lexic. a. a. O.

18. *Illecebrum lupulinum* Spr. ist *Alternanthera lupulina* Kunth f. Lexic. a. a. O.

19. *Illecebrum triandrum* Hamilt. Dreifädige Knorpelblume.

Alternanthera prostrata Don.

Stengel ästig, kriechend, viereckig, glatt, nur in den Theilungswinkeln bartig. Blätter lanzettförmig, stumpf, gezähnt, glatt. Blumen dreifädig. Vaterl. Nepes. 4

20. *Illecebrum maritimum* Spr. (*Bucholzia* Mart.)

Stengel weißweißig, ästig, wurzelnd. Blätter spatelförmig, macronenspitzig, glatt. Blumen seitenständig, gehäuft. Kelchtheile gespitzt, die Schüppchen neben den Staubfäden fast dreispaltig. Vaterl. Brasilien am Meerstrand. 4

Eine andere Pflanze dieses Namens, nämlich: *Illecebrum*

maritimum Villars, welche ich im 1. Nachtrage B. 4. S. 25. beschrieben habe, gehört zur Gattung Paronychia Tournef. f. 2. Nachtr.

Kultur der Knorpelblumen im Allgemeinen f. Lex. B. 5.

Synonymen.

Illecebrum alsinifolium Linn. f. Lexic. ist Paronychia alsinifolia.

— arabicum Linn. f. Lexic. ist Paronychia arabica.

— aristatum Ait. f. Lexic. ist Mollija aristata Ait.

— brachiatum Linn. f. Lexic. ist Achyranthes brachiata L.

— canariense Linn. f. Lexic. ist Paronychia canariensis.

— capitatum Linn. f. Lexic. ist Paronychia capitata.

— cephalotes M. a Bieberst. f. Paronychia hispanica.

— cymosum Villars. f. Lexic. ist Paronychia cymosa.

— dichotomum Pers. f. 1. Nachtr. ist Paronychia dichotoma.

— divaricatum Ait. f. Lexic. ist Mollija diffusa Willd.

— lanatum Linn. f. Lexic. ist Aërva lanata Juss.

— limense Jacq. ist Illecebrum frutescens Lex.

— maritimum Vill. f. Lexic. f. Paronychia hispanica Cand.

— Monsonii Linn. f. Achyranthes Monsoniae.

— narbonense Willd. f. 1. Nachtr. ist Paronychia hispanica Cand.

— niveum Pers. f. 1. Nachtr. ist Paronychia nivea Cand.

— Paronychia Linn. f. Lexic. ist Paronychia hispanica Cand.

— pubescens Willd. f. 1. Nachtr. ist Achyranthes pubescens Roth.

— vermiculare Linn. ist Gomphrena vermiculata Lexic.

Illosporium Mart. ist Achitonium acicola Kunz.

- Iberis chloraefolia** Sibth. f. *Lepidium chloraefolium* Spr.
 — *crenata* Lam. ist *Iberis pinnata* Lexic.
 — **Garraxiana** All. ist *Iberis sempervirens* var. f. Lexic.
 — **humilis** Presl. ist *Iberis semperflorens* var. f. Lexic.
 — **intermedia** Guers. f. 1. Nachtr. ist *Iberis amara* Var.
 — **Lagascana** Cand. f. *Iberis pubescens* N. 4.
 — **nudicaulis** L. f. Lex. 1. Aufl. f. *Teesdalia Iberis*.
 — **oppositifolia** Pers. f. 1. Nachtr. ist *Lepidium oppositifolium*.
 — **pumila** Stev. ist *Hutchinsia pumila* Cand.
 — **rotundifolia** Lam. ist *Iberis carnosa* Lexic.
 — **semperflorens** Lag. f. *Iberis subvelutina* N. 5.
 — **stylosa** Tenor. ist *Hutchinsia stylosa* Cand.
 — **taurica** Cand. ist *Iberis ciliata* f. Lexic.
 — **tenuifolia** Presl. ist *Iberis linifolia* f. Lexic.
 — **vermiculata** Willd. f. Lexic. ist *Iberis saxatilis*.

Icacina Andr. Jussieu. *Isacina*.

Kelch unten stehend, fünfspaltig. Corolle fünfblättrig. Staubfäden 5, mit den Corollenblättern wechselnd stehend. Antheren herzförmig, zweifächerig. Narbe abgestutzt. Fruchtkapsel einsamig.

Pentandria Monogynia (Familie Rhamneen.?)

1. ***Isacina senegalensis*** Andr. Juss. Senegalische *Isacina*.

Ein Baum, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter wechselnd stehend, länglich-eyförmig, ganzrandig, glatt. Blumen in gipfelförmige Rispen gesammelt. Wächst in Senegambien und verlangt in unsern Gärten eine Stelle im warmen Hause.

Iacorea gujanensis Aubl. ist *Ardisia acuminata* Willd.

Ichnocarpus Rob. Brown. *Ischnocarpus*.

Corolle präsentirtellerförmig, fünfspaltig, die Einschnitte fischelförmig. Fünf pfeilförmige, freistehende Antheren. Fünf unfruchtbare Fäden. Fruchtbälge dünn.

Pentandria Monogynia (Familie Contorten.)

1. ***Ischnocarpus frutescens*** R. Br. Hierher *Apocynum frutescens* Linn. f. Lexic. B. 1.

2. ***Ischnocarpus Afzelii*** Roem. et Schult. Syst. Veg. 4. p. 399.

Stängel strauchig, windend. Blätter glatt, untere oval,

gespitzt, obere länglich-lanzettförmig, langgespitzt. Blumen
winkel- und gipfelständig. Einschnitte der Corolle stumpf.
Der Schlund nackt. Waterl. Guinea. H

Ichnocarpus Loureiri Spr. (*Apocynum africanum*
Lour.)

Stengel sträuchig, ästig, meist aufrecht. Blätter länglich-
eiförmig, stumpf, fast lederartig. Blumenstiele meist dreiblät-
tig, winkelförmig. Waterl. das östliche Afrika. H

Kultur. Alle drei Arten verlangen eine Stelle im war-
men Hause. Man vermehrt sie durch die Aussaat des Saas-
mens, durch Ableger und Stedlinge.

Icia Aubl. 6 Arten s. *Amyris* Lexic. B. 5.

— *Carana* Kunth ist *Amyris Carana* Humb.

— *macrophylla* Kunth ist *Amyris altissima* Willd.

— *Tacamara* Kunth ist *Amyris ambrosiaca* Linn.

Ichthyosma Wehdemanni Ecklon Reisebericht ist *Zamia*?
Ienkinsonia quinata Sweet. ist *Pelargonium quinatum*
Curt.

Ienkinsonia tetragona Sweet. ist *Pelargonium tetrago-*
num L.

Ignatiana philippinica Lour. ist *Strychnos Ignati* Berg.

Ilex Linn. Hülsen; Stechpalme s. Lexic. B. 5. (Schubers
Handb. t. 28)

Character generic. s. 1. Nachtr. B. 4. S. 83.

Ketz klein, vierzählig, stehen bleibend. Corolle vierspal-
tig, oder 4—5—6 blättrig. Staubfäden 4, am Boden der
Corolle eingefügt. Vier Narben. Beere vierfaamig.

Tetrandria Tetragynia (Familie Rhamneen.)

Die Arten der Gattung *Ilex* sind zierliche Bäume oder
Sträucher, deren Blätter meist wechselnd oder zerstreut stehen.
Diese sind meist steif, lederartig, ausdauernd, gezähnt oder
sägezähnt-dornig, oder ganzrandig. Die Blumen sind gegen
die Blätter sehr klein, meist weiß, und die Geschlechter zus-
ammen getrennt; sie entwickeln sich im Frühlinge und Som-
mer. Die Beere zur Zeit der Reife meist schwarzroth,
oder gelb.

† *Foliis dentato-aut serrato-spinosis sive cre-*
natis Spr.

Blätter gezähnt- oder sägerandig-dornig oder gekerbt.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon und 1. Nach-
trage beschriebenen Arten: *Ilex Aquifolium* Linn. II. la-

tifolia, crocea, serrata, crenata, emarginata Thunb. I. opaca, vomitoria, prinoides, Parado Ait. I. angustifolia Willd. I. salicifolia Jacq. I. canadensis Michx. und folgende.

1. *Ilex balearica* Desfont. (I. maderensis Willd.)

Blätter eiförmig, gespitzt, ungetheilt, dornig = gezähnt, glatt, glänzend. Blumen winkelfständig, doldenartig. Vaterl. die balearischen und canarischen Inseln. h

2. *Ilex madagascarensis* Lamarck. (I. madagascariensis R. et Schult. Syst. veg.)

Blätter eiförmig, gespitzt, dornig, geadert. Blumenstiele seitenwinkelfständig, einzeln, auch zu 3 beisammen stehend, 3—5 Linien lang, einblüthig. Beere eiförmig, zweisaamig. Vaterl. Madagascar. h

3. *Ilex Dahoon* Walt.

Blätter länglich, an beiden Enden verbünnt, spizig gezähnt oder ganzrandig, an der Mittelrippe wie die Aestchen zottenhaarig. Blumenstiele winkelfständig, doldentraubig. Vaterl. Carolina. h

4. *Ilex laxiflora* Lam. Schraffblumige Ilex; Hülsen.

Ein Baum, 16—20 Fuß hoch, dessen Aeste pergau und mehr oder weniger übergebogen, fast schlaff sind. Blätter gestielt, flach, eiförmig, buchtig = gezähnt, fast dornig, oben glänzend, 2 Zoll und drüber lang, 12—15 Linien breit. Winterblätter pfriemensförmig. Blumenstiele winkelfständig, traubig, schlaff. Beere gelblich = roth. Vaterl. Carolina in schattigen Wäldern. h

5. *Ilex diphyrena* Wallich. Zweisaamige Hülsen.

Blätter länglich, langgespitzt, entfernt sägezähnt = dornig. Blumen in winkelfständige Büschel gesammelt. Beere zweisaamig. Vaterl. Nepal. h

6. *Ilex chinensis* Ker. Chinesische Hülsen.

Aeste filzig. Blätter länglich, an beiden Enden gespitzt, punkirt, gezähnt. Blumenstiele winkelfständig, doldentraubig. Vaterl. China. h

†† Foliis integerrimis. Blätter ganzrandig, ober gekerbt = gezähnt.

Hierher *I. myrtifolia* Lam. f. 1. Nachtr. *I. rotunda* Thunb. *I. obcordata* Swartz. f. Lexic. und folgende Arten.

7. *Ilex asiatica* Linn. ist *Ilex integra* Thunb. f. Lex.
B. 5. C. 31.

Ostindien und Japan. h

8. *Ilex Othera* Spr. ist *Othera japonica* Thunb. f.
Lexic. B. 6.

9. *Ilex Orixia* Spr. ist *Orixia japonica* Thunb. f. Lex.
B. 6.

10. *Ilex Lepta* Spr. (*Lepta triphylla* Lour.)

Blätter dreizählig. Blättchen lanzettförmig, wellenrandig.
Blumentrauben winkelförmig. Vaterl. Cochinchina. h

11. *Ilex Scopulorum* Kunth in Hamb. et Bonpl. Nov.
gen. pl. VII. p. 70.

Blätter rundlich: eiförmig, stumpf, un deutlich gekerbt, le-
derartig, glatt, oben glänzend. Blumenstiele traubig (5—7
blüthig), borstig: filzig, flebrig. Corolle 4—5 blättrig, weiß.
Vaterl. Duito. h Blüth. August.

12. *Ilex rupicola* Kunth J. c. VII. p. 71.

Aestchen glatt. Blätter rundlich: elliptisch, stumpf, gekerbt-
gezähnt, dick, lederartig, glatt, auf beiden Seiten. Blu-
menstiele meist dreiblüthig, glatt. Corolle vierblättrig. Was-
terl. Peru, bei Lora. h Blüth. August.

13. *Ilex odorata* Don. Wohlriechende Hülse.

Blätter länglich, feingekerbt, glatt. Blumen in geknauten
stiellosen Dolben, die so lang als die Blattstiele sind. Nepal. h

14. *Ilex paraguayensis* Hilari. (*Cassine Gongonha* Mart.
Syst. 1. p. 939.)

Blätter länglich: spatelförmig, stumpflich, entfernt gezäh-
nt, glatt. Blumenstiele winkelförmig, vielblüthig. Narben
vierlappig. Vaterl. Brasilien; Paraguay. h

15. *Ilex myricoides* Kunth J. c. VII. p. 72. Myricaar-
tige Hülse.

Aeste und Blätter glatt. Blätter länglich, gespitzt, an der
Basis keilförmig, fast lederartig, gestielt. Blumenstiele dreis-
blüthig, glatt, winkelförmig, dreimal länger als die Blatt-
stiele. Corolle vierblättrig. Vaterl. Neugranada an Bergen.
h Blüth: daselbst im Dezember.

16. *Ilex humelioides* Kunth J. c. VII. p. 71. Humelia-
artige Hülse.

Aestchen glatt. Blätter umgekehrt, mucronenspitzig, an der
Basis am Stiele herablaufend, meist ganzrandig, lederartig,

oben glänzend. Blumenstiele einklümpig, zu 3—4 beisammen stehend. Vaterl. Quito, bei Córdo. h. Blüth. August.

17. *Ilex nepalensis* Spr. Nepalische Hülsen.

Ilex elliptica Don. (nec Kunth)

Blätter fast elliptisch, an beiden Enden verdünnt, ganzrandig. Die Blumen bilden kugelförmige Dolden, deren Stiele sitzig und kürzer als die Blattstiele sind. Vaterl. Nepal. h.

Im gedachten Werke: Nov. gener. etc. hat Fr. Dr. Kunth noch folgende als zweifelhafte Arten angezeigt: *Ilex hippocrateoides* et *laurina*; die vielleicht andern Gattungen angehören oder nur als Varietäten zu betrachten sind.?

Kultur der Hülsen im Allgemeinen, in Beziehung auf die Fortpflanzung derselben durch die Aussaat und Behandlung der Saamen siehe Lexikon B. 5. S. 33. Es versteht sich übrigens von selbst, daß alle Arten, die aus Tropenländern kommen, in warme Häuser gestellt werden.

Synonymen.

Ilex acutangula Nees, ist *Celastrus quadrangulata* Schrad.

— *aestivalis* Lam. ist *Ilex prinoides* Ait. s. Lexic.

— *caroliniana* Mill. s. *Ilex Cassine* Lexic. II. vomitoria,?

— *Cassine* Michx. ist *Ilex vomitoria* Lexic.

— *cassinoides* Link. ist *Ilex angustifolia* Willd. s. 1. Nachtr.

— *decidua* Walt. s. *Ilex prinoides* Lexic.

— *elliptica* Don. s. *Ilex nepalensis* N. 17.

— *laurifolia* Hortul. ist *Ilex Cassine* Lexic.

— *ligustrina* Jacq. ist *Ilex vomitoria* Lexic.

— *Macoucoua* Pers. ist *Ilex acuminata* Lexic.

— *maderensis* Willd. s. *Ilex balearica* N. 1.

— *myrsinifolia* Pursh. ist *Myginda myrsinifolia* Nuttall.

— *recurva* Linn. ist *Ilex Aquifolium* var. s. Lexic.

— *rosmarinifolia* Lam. s. 1. Nachtr. ist *Ilex angustifolia* Willd. s. 1. Nachtr.

— *Skimmia* Spr. ist *Skimmia japonica* Thunb. s. Lexic. B. 9.

— *truncata* Nees ist *Celastrus quadrangulata* Schrad.

Illecebrum Linn. Korpelstume; Korpelstich s. Lexic. B. 5.

Reich fünftheilig, nackt, oder von Bracteen unterstützt. Keine Corolle. Staubfäden 5, unten trichterförmig verwachsen,

mit abwechselnden, zwischenstehenden, schuppenartigen Blüthen (unfruchtbare Staubfäden.) Autheren einsäuerig. Narbe kopfförmig. Kapsel einsamig.

Pentandria Monogynia. (Familie Ebenopodien)

Die Gattung *Alternanthera* Rob. Brown. Kunth hat Kurt Sprengel (Syst. veg. 1. p. 818) mit *Illecebrum* vereinigt (siehe meine Bemerkung im zweiten Nachtrage B. 1. S. 176.) Da die Arten, welche zu *Alternanthera* gehören, im Verikon zweite Auflage B. 1. S. 329—337 genau und vollständig beschrieben sind, so will ich sie hier unter *Illecebrum* nur anzeigen. Es sind krautartige, aufrechte oder gestreckte Pflanzen, deren Blätter einander gegenüber stehen und ganzrandig sind. Blumen einzeln oder gepaart, auch zu 3 oder mehrere in gipfel- und winkelförmige Köpfchen gesammelt. Sprengel hat sie in zwei Abtheilungen aufgeführt.

† *Erecta*; squamae steriles inter stamina.

Stengel aufrecht. Schuppenartige und fruchtbare Fäden zwischen den Staubfäden.

1. *Illecebrum angustifolium* Spr. ist *Alternanthera angustifolia* R. Brown. f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 329.
2. *Illecebrum iresinoides* Spr. ist *Alternanthera iresinoides* Kunth f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 336.
3. *Illecebrum pulverulentum* Spr. (*Tromsdorfia* Mart.) B. 4. S. 154.
Stengel standensträuchig, weiß = filzig. Blätter länglich = eiförmig, kumpf, oben pulverig. Blumen rispenständig. Rösche wollig. Brasilien. †
4. *Illecebrum dubium* Spr. (*Alternanthera dubia* Kunth. ist *Irisine canescens* Humb. et Bonpl. in Willd. Sp. pl. IV. p. 765, f. *Irisine* 1. Nachtr.
5. *Illecebrum villosus* Willd. herber. ist *Alternanthera villosa* Kunth f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 336.
6. *Illecebrum gomphrenoides* Willd. herb. *Alternanthera* Kunth f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 334.
7. *Illecebrum paniculatum* Spr. *Alternanthera* Kunth f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 335.
8. *Illecebrum flavescens* Spr. *Alternanthera* Kunth f. Lexic. 2. Aufl.
9. *Illecebrum sericeum* Spr. *Alternanthera* Kunth f. Lexic. 2. Aufl.

10. *Illecebrum truxilense* Spr. *Alternanthera truxilensis* Kunth f. Lexic. 2. Aufl.

†† Procumbentia. Stengel gestreckt.

Su dieser Abtheilung gehören die im Lexikon beschriebenen Arten: *Illec. verticillatum*, sessile, polygonoides Linn. I. *Achyrantha ficoideum* Willd. I. *frutescens* Herit. und folgende.

11. *Illecebrum echinatum* Poir. Weichstachelige Knorpelblume. *Paronychia echinata* Lamarck Encycl. (nec Retz.)

Stengel gestreckt, ästig, filzig. Blätter lanzettförmig. Blumen quersförmig stehend, mit behaarten Bracteen. Kelchtheile langgespitzt, begrünt. Vaterl. das südliche Frankreich, Italien und Sicilien.

12. *Illecebrum spinosum* Spr. (*Alternanthera spinosa* Cand. *Achyranthes spinosa* Hornem.) siehe *Achyranthes axillaris* Willd. im 1. Nachtrage B. 1. S. 91.

13. *Illecebrum nanum* Spr. ist *Alternanthera nana* R. Br. f. Lexic. 2. Aufl. B. I. S. 329.

14. *Illecebrum denticulatum* Spr. *Alternanthera denticulata* R. Br. f. Lexic. 2. Aufl. B. I. S. 329.

15. *Illecebrum diffusum* Willd. ist *Alternanthera pulchella* Kunth f. Lexic. 2. Aufl. B. I. S. 332.

16. *Illecebrum canescens* Spr. ist *Alternanthera canescens* Kunth f. Lexic. a. a. O.

17. *Illecebrum pungens* Spr. ist *Alternanthera pungens* Kunth f. Lexic. a. a. O.

18. *Illecebrum lupulinum* Spr. ist *Alternanthera lupulina* Kunth f. Lexic. a. a. O.

19. *Illecebrum triandrum* Hamilt. Dreifädige Knorpelblume.

Alternanthera prostrata Don.

Stengel ästig, kriechend, vieredig, glatt, nur in den Theilungswinkeln hartig. Blätter lanzettförmig, stumpf, gekantelt, glatt. Blumen dreifädig. Vaterl. Nepes. 4

20. *Illecebrum maritimum* Spr. (*Bucholzia* Mart.)

Stengel weitschweifig, ästig, wurzelnd, Blätter spatelförmig, macronenspitzig, glatt. Blumen seitenständig, gehängt. Kelchtheile gespitzt, die Schüppchen neben den Staubfäden fast dreispaltig. Vaterl. Brasilien am Meerstrand. 4

Eine andere Pflanze dieses Namens, nämlich: *Illecebrum*

maritimum Villars, welche ich im 1. Nachtrage S. 4. S. 25. beschrieben habe, gehört zur Gattung Paronychia Tournes. f. 2. Nachtr.

Kultur der Knorpelblumen im Allgemeinen f. Lex. S. 5.

Synonymen.

Illecebrum alsinifolium Linn. f. Lexic. ist Paronychia alsinifolia.

— arabicum Linn. f. Lexic. ist Paronychia arabica.

— aristatum Ait. f. Lexic. ist Mollia aristata Ait.

— brachiatum Linn. f. Lexic. ist Achyranthes brachiata L.

— canariense Linn. f. Lexic. ist Paronychia canariensis.

— capitatum Linn. f. Lexic. ist Paronychia capitata.

— cephalotes M. a Bieberst. f. Paronychia hispanica.

— cymosum Villars. f. Lexic. ist Paronychia cymosa.

— dichotomum Pers. f. 1. Nachtr. ist Paronychia dichotoma.

— divaricatum Ait. f. Lexic. ist Mollia diffusa Willd.

— lanatum Linn. f. Lexic. ist Aerva lanata Juss.

— limense Jacq. ist Illecebrum frutescens Lex.

— maritimum Vill. f. Lexic. f. Paronychia hispanica Cand.

— Monsonii Linn. f. Achyranthes Monsoniae.

— narbonense Willd. f. 1. Nachtr. ist Paronychia hispanica Cand.

— niveum Pers. f. 1. Nachtr. ist Paronychia nivea Cand.

— Paronychia Linn. f. Lexic. ist Paronychia hispanica Cand.

— pubescens Willd. f. 1. Nachtr. ist Achyranthes pubescens Roth.

— vermiculare Linn. ist Gomphrena vermiculata Lexic.

Illosporium Mart. ist Achitonium acicola Kunz.

- Iberis chloræfolia** Sibth. f. *Lepidium chloræfolium* Spr.
 — **crenata** Lam. ist *Iberis pinnata* Lexic.
 — **Garraxiana** All. ist *Iberis sempervirens* var. f. Lexic.
 — **humilis** Presl. ist *Iberis semperflorens* var. f. Lexic.
 — **intermedia** Guers. f. 1. Nachtr. ist *Iberis amara* Var.
 — **Lagascana** Cand. f. *Iberis pubescens* N. 4.
 — **nudicaulis** L. f. Lex. 1. Aufl. f. *Teesdalia Iberis*.
 — **oppositifolia** Pers. f. 1. Nachtr. ist *Lepidium oppositifolium*.
 — **pumila** Stev. ist *Hutchinsia pumila* Cand.
 — **rotundifolia** Lam. ist *Iberis carnosa* Lexic.
 — **semperflorens** Lag. f. *Iberis subvelutina* N. 5.
 — **stylosa** Tenor. ist *Hutchinsia stylosa* Cand.
 — **taurica** Cand. ist *Iberis ciliata* f. Lexic.
 — **tenuifolia** Presl. ist *Iberis linifolia* f. Lexic.
 — **vermiculata** Willd. f. Lexic. ist *Iberis saxatilis*.

Icacina Andr. Jussieu. *Isacina*.

Reich unten stehend, fünfspaltig. Corolle fünfblättrig. Staubfäden 5, mit den Corollenblättern wechselnd stehend. Antheren herzförmig, zweifächerig. Narbe abgestutzt. Frucht einsamig.

Pentandria Monogynia (Familie Rhamneen.?)

1. ***Isacina senegalensis*** Andr. Juss. Senegalische *Isacina*.

Ein Baum, dessen Aeste sich ausbreiten. Blätter wechselnd stehend, länglich-eyförmig, ganzrandig, glatt. Blumen in gipfelständige Rispen gesammelt. Wächst in Senegambien und verlangt in unsern Gärten eine Stelle im warmen Hause.

Iacorea gujanensis Aubl. ist *Ardisia acuminata* Willd.

Ichnocarpus Rob. Brown. *Ichnocarpus*.

Corolle präsentistellerförmig, fünfspaltig, die Einschnitte schiffelförmig. Fünf pfeilförmige, freistehende Antheren. Fünf unfruchtbare Fäden. Fruchtblänge dünn.

Pentandria Monogynia (Familie Contorten.)

1. ***Ichnocarpus frutescens*** R. Br. Hierher *Apocynum frutescens* Linn. f. Lexic. B. 1.

2. ***Ichnocarpus Afzelii*** Roem. et Schult. Syst. Veg. 4. p. 399.

Stengel strauchig, windend. Blätter glatt, untere oval,

gespitzt, obere länglich-lanzettförmig, langgespitzt. Blumen
winkel- und gipfelständig. Einschnitte der Corolle stumpf.
Der Schlund nackt. Vaterl. Guinea. h

3. *Ichnocarpus Loureiri* Spr. (*Apocynum africanum*
Lour.)

Stengel strauchig, ästig, meist aufrecht. Blätter länglich-
eyförmig, stumpf, fast lederartig. Blumenstiele meist dreiblät-
tig, winterständig. Vaterl. das östliche Afrika. h

Kultur. Alle drei Arten verlangen eine Stelle im wars-
men Hause. Man vermehrt sie durch die Aussaat des Saas-
mens, durch Ableger und Stedflinge.

Icia Aubl. 6 Arten s. *Amyris* Lexic. B. 5.

— *Carana* Kunth ist *Amyris Carana* Humb.

— *macrophylla* Kunth ist *Amyris altissima* Willd.

— *Tacamara* Kunth ist *Amyris ambrosiaca* Linn.

Ichthyosma Wehdemanni Ecklon Reisebericht ist *Zamia*?
Ienkinsonia quinata Sweet. ist *Pelargonium quinatum*
Curt.

Ienkinsonia tetragona Sweet. ist *Pelargonium tetrago-*
num L.

Ignatiana philippinica Lour. ist *Strychnos Ignati* Berg.

Ilex Linn. Hülsen; Stechpalme s. Lexic. B. 5. (Schubers
Handb. t. 28)

Character generic. s. 1. Nachtr. B. 4. S. 83.

Kelch klein, vierzählig, stehen bleibend. Corolle vierspalt-
tig, oder 4—5—6 blättrig. Staubfäden 4, am Boden der
Corolle eingefügt. Vier Narben. Beere viersamig.

Tetrandria Tetragynia (Familie Rhamneen.)

Die Arten der Gattung *Ilex* sind stiellose Bäume oder
Sträucher, deren Blätter meist wechselnd oder zerstreut stehen.
Diese sind meist steif, lederartig, ausdauernd, gezähnt oder
sägezahnig-dornig, oder ganzrandig. Die Blumen sind gegen
die Blätter sehr klein, meist weiß, und die Geschlechter zus-
ammen getrennt; sie entwickeln sich im Frühlinge und Som-
mer. Die Beere zur Zeit der Reife meist schwarzroth,
oder gelb.

+ *Folius dentato-aut serrato-spinosis sive cre-*
natis Spr.

Blätter gezähnt- oder sägerandig-dornig oder gefeibt.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon und 1. Nach-
trage beschriebenen Arten: *Ilex Aquifolium* Linn. II. la-

tifolia, crocea, serrata, crenata, emarginata Thunb. I. opaca, vomitoria, prinoides, Parado Ait. I. angustifolia Willd. I. salicifolia Jacq. I. canadensis Michx. und folgende.

1. *Ilex balearica* Desfont. (I. maderensis Willd.)

Blätter eiförmig, gespißt, ungetheilt, dornig = gezähnt, glatt, glänzend. Blumen winkelfständig, doldenartig. Vaterl. die balearischen und canarischen Inseln. h

2. *Ilex madagascariensis* Lamarck. (I. madagascariensis R. et Schult. Syst. veg.)

Blätter eiförmig, gespißt, dornig, geadert. Blumenstiele seiten = winkelfständig, einzeln, auch zu 3 beisammen stehend, 3—5 Linien lang, einblümig. Beere eyrund, zweisaamig. Vaterl. Madagascar. h

3. *Ilex Dahoon* Walt.

Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, spizig gezähnt oder ganzrandig, an der Mittelrippe wie die Nesselblätter zottenhaarig. Blumenstiele winkelfständig, doldentraubig. Vaterl. Carolina. h

4. *Ilex laxiflora* Lam. Schlaffblumige Ilex; Hülsen.

Ein Baum, 16—20 Fuß hoch, dessen Aeste pergarn und mehr oder weniger übergebogen, fast schlaff sind. Blätter gestielt, flach, eiförmig, buchtig = gezähnt, fast dornig, oben glänzend, 2 Zoll und drüber lang, 12—15 Linien breit. Unterblätter pfriemensförmig. Blumenstiele winkelfständig, traubig, schlaff. Beere gelblich = roth. Vaterl. Carolina in schattigen Wäldern. h

5. *Ilex dipyrrena* Wallich. Zweisaamige Hülsen.

Blätter länglich, langgespißt, entfernt sägezähmig = dornig. Blumen in winkelfständige Büschel gesammelt. Beere zweisaamig. Vaterl. Nepal. h

6. *Ilex chinensis* Ker. Chinesische Hülsen.

Aeste filzig. Blätter länglich, an beiden Enden gespißt, punkirt, gezähnt. Blumenstiele winkelfständig, doldentraubig. Vaterl. China. h

†† Foliis integerrimis. Blätter ganzrandig, oder gekerbt = gezähnt.

Hierher *I. myrtifolia* Lam. f. 1. Nachtr. *I. rotunda* Thunb. *I. obcordata* Swartz. f. Lexic. und folgende Arten.

7. *Ilex asiatica* Linn. ist *Ilex integra* Thunb. f. Lex. B. 5. S. 31.

Ostindien und Japan. ♀

8. *Ilex Othera* Spr. ist *Othera japonica* Thunb. f. Lexic. B. 6.

9. *Ilex Orixia* Spr. ist *Orixia japonica* Thunb. f. Lex. B. 6.

10. *Ilex Lepta* Spr. (*Lepta triphylla* Lour.)

Blätter dreizählig. Blättchen lanzettförmig, wellenrandig. Blumentrauben winkelförmig. Waterl. Cochinchina. ♀

11. *Ilex Scopulorum* Kunth in Hamb. et Bonpl. Nov. gen. pl. VII. p. 70.

Blätter rundlich: eiförmig, stumpf, un deutlich gegerbt, lederartig, glatt, oben glänzend. Blumenstiele traubig (5—7 blümlig), borstig: filzig, klebrig. Corolle 4—5 blättrig, weiß. Waterl. Quito. ♀ Blühz. August.

12. *Ilex rupicola* Kunth J. c. VII. p. 71.

Ästchen glatt. Blätter rundlich: elliptisch, stumpf, gegerbt: gezähnt, dick, lederartig, glatt, auf beiden Seiten. Blumenstiele meist dreiblümlig, glatt. Corolle vierblättrig. Waterl. Peru, bei Cora. ♀ Blühz. August.

13. *Ilex odorata* Don. Wohlriechende Hülse.

Blätter länglich, feingegerbt, glatt. Blumen in geknauten stiellosen Dolden, die so lang als die Blattstiele sind. Nepal. ♀

14. *Ilex paraguayensis* Hilan. (*Cassine Gongonha* Mart. Syst. 1. p. 939.)

Blätter länglich: spatelförmig, stumpflich, entfernt gezähnt, glatt. Blumenstiele winkelförmig, vielblümlig. Narben vierlappig. Waterl. Brasilien; Paraguay. ♀

15. *Ilex myricoides* Kunth J. c. VII. p. 72. Myricaartige Hülse.

Äste und Blätter glatt. Blätter länglich, gesägt, an der Basis keilförmig, fast lederartig, gestielt. Blumenstiele dreiblümlig, glatt, winkelförmig, dreimal länger als die Blattstiele. Corolle vierblättrig. Waterl. Neugranada an Bergen. ♀ Blüht daselbst im December.

16. *Ilex humelioides* Kunth J. c. VII. p. 71. Bumeliaartige Hülse.

Ästchen glatt. Blätter umgekehrt, mucronenispizig, an der Basis am Stiele herablaufend, meist ganzrandig, lederartig,

oben glänzend. Blumenstiele einblüthig, zu 3—4 beisammen stehend. Vaterl. Quito, bei Cota. h Blüth. August.

17. *Ilex nepalensis* Spr. Nepalische Hülse.

Ilex elliptica Don. (nec Kunth)

Blätter fast elliptisch, an beiden Enden verdünnt, ganz randig. Die Blumen bilden kugelförmige Dolden, deren Stiele sitzig und kürzer als die Blattstiele sind. Vaterl. Nepal. h

Im gedachten Werke; Nov. gener. etc. hat Fr. Dr. Kunth noch folgende als zweifelhafte Arten angezeigt: *Ilex hippocrateoides* et *laurina*; die vielleicht andern Gattungen angehören oder nur als Varietäten zu betrachten sind.?

Kultur der Hülse im Allgemeinen, in Beziehung auf die Fortpflanzung derselben durch die Aussaat und Behandlung der Saamen siehe Lexikon B. 5. S. 33. Es versteht sich übrigens von selbst, daß alle Arten, die aus Tropenländern kommen, in warme Häuser gestellt werden.

Synonymen.

Ilex acutangula Nees, ist *Celastrus quadrangulata* Schrad.

— *aestivalis* Lam. ist *Ilex prinoides* Ait. f. Lexic.

— *caroliniana* Mill. f. *Ilex Cassine* Lexic. II. vomitoria, ?

— *Cassine* Michx. ist *Ilex vomitoria* Lexic.

— *cassinoides* Link. ist *Ilex angustifolia* Willd. f. 1. Nachtr.

— *decidua* Walt. f. *Ilex prinoides* Lexic.

— *elliptica* Don. f. *Ilex nepalensis* R. 17.

— *laurifolia* Hortul. ist *Ilex Cassine* Lexic.

— *ligustrina* Jacq. ist *Ilex vomitoria* Lexic.

— *Macoucoua* Pers. ist *Ilex acuminata* Lexic.

— *maderensis* Willd. f. *Ilex balearica* R. 1.

— *myrsinites* Pursh. ist *Myrica myrsinifolia* Nuttall.

— *recurva* Linn. ist *Ilex Aquifolium* var. f. Lexic.

— *rosmarinifolia* Lam. f. 1. Nachtr. ist *Ilex angustifolia* Willd. f. 1. Nachtr.

— *Skimmia* Spr. ist *Skimmia japonica* Thunb. f. Lexic. B. 9.

— *truncata* Nees ist *Celastrus quadrangulata* Schrad.

Illecebrum Linn. Knorpelbaum; Knorpelstrauch f. Lexic. B. 5.

Reich fünftheilig, nackt, oder von Bracteen unterstützt. Keine Corolle. Staubfäden 5, unten trichterförmig verwachsen,

mit abwechselnden, zwischenstehenden, schuppenartigen Stöben (unfruchtbare Staubfäden.) Antheren einsäuerig. Narbe kopfförmig. Kapsel einsamig.

Pentandria Monogynia. (Familie Ebenopodeen.)

Die Gattung *Alternanthera* Rob. Brown. Kunth hat Kurt Sprengel (Syst. veg. 1. p. 818) mit *Illecebrum* vereinigt (siehe meine Bemerkung im zweiten Nachtrage B. 1. S. 176.) Da die Arten, welche zu *Alternanthera* gehören, im Verikon zweite Auflage B. 1. S. 329—337 genau und vollständig beschrieben sind, so will ich sie hier unter *Illecebrum* nur anzeigen. Es sind krautartige, aufrechte oder gestreckte Pflanzen, deren Blätter einander gegenüber stehen und ganzrandig sind. Blumen einzeln oder gepaart, auch zu 3 oder mehrere in gipfel- und winkelförmige Köpfchen gesammelt. Sprengel hat sie in zwei Abtheilungen aufgeführt.

† Erecta; squamae steriles inter stamina.

Stengel aufrecht. Schuppenartige und fruchtbare Stöben zwischen den Staubfäden.

1. *Illecebrum angustifolium* Spr. ist *Alternanthera angustifolia* R. Brown. f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 329.
2. *Illecebrum iresinoides* Spr. ist *Alternanthera iresinoides* Kunth f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 336.
3. *Illecebrum pulverulentum* Spr. (*Tromsdorfia* Mart.) B. 4. S. 154.

Stengel staudenstrauchig, weiß-klzig. Blätter länglich-ehrförmig, stumpf, oben pulverig. Blumen rispenständig. Kelch wollig. Brasilien. h

4. *Illecebrum dubium* Spr. (*Alternanthera dubia* Kunth, ist *Irisine canescens* Humb. et Bonpl. in Willd. Sp. pl. IV. p. 765, f. *Irisine* 1. Nachtr.
5. *Illecebrum villosum* Willd. herber. ist *Alternanthera villosa* Kunth f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 336.
6. *Illecebrum gomphrenoides* Willd. herb. *Alternanthera* Kunth f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 334.
7. *Illecebrum paniculatum* Spr. *Alternanthera* Kunth f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 335.
8. *Illecebrum flavescens* Spr. *Alternanthera* Kunth f. Lexic. 2. Aufl.
9. *Illecebrum sericeum* Spr. *Alternanthera* Kunth f. Lexic. 2. Aufl.

10. *Illecebrum truxillense* Spr. *Alternanthera truxillensis* Kunth f. Lexic. 2. Aufl.

†† Procumbentia. Stengel gestreckt.

Su dieser Abtheilung gehören die im Lexikon beschriebenen Arten: *Illec. verticillatum*, sessile, polygonoides Linn. I. *Achyrantha ficoideum* Willd. I. frutescens Herit. und folgende.

11. *Illecebrum echinatum* Poir. Weichstachelige Knorpelblume. *Paronychia echinata* Lamarck Encycl. (nec Retz.) Stengel gestreckt, ästig, filzig. Blätter lanzettförmig. Blumen quersförmig stehend, mit behaarten Bracteen. Kelchtheile langgespitzt, begrünt. Vaterl. das südliche Frankreich, Italien und Sicilien.
12. *Illecebrum spinosum* Spr. (*Alternanthera spinosa* Cand. *Achyranthes spinosa* Hornem.) siehe *Achyranthes axillaris* Willd. im 1. Nachtrage B. 1. S. 91.
13. *Illecebrum nanum* Spr. ist *Alternanthera nana* R. Br. f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 329.
14. *Illecebrum denticulatum* Spr. *Alternanthera denticulata* R. Br. f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 329.
15. *Illecebrum diffusum* Willd. ist *Alternanthera pulchella* Kunth f. Lexic. 2. Aufl. B. 1. S. 332.
16. *Illecebrum canescens* Spr. ist *Alternanthera canescens* Kunth f. Lexic. a. a. O.
17. *Illecebrum pungens* Spr. ist *Alternanthera pungens* Kunth f. Lexic. a. a. O.
18. *Illecebrum lupulinum* Spr. ist *Alternanthera lupulina* Kunth f. Lexic. a. a. O.
19. *Illecebrum triandrum* Hamilt. Dreifädige Knorpelblume.

Alternanthera prostrata Don.

Stengel ästig, kriechend, vieredig, glatt, nur in den Theilungswinkeln bartig. Blätter lanzettförmig, stumpf, gezähnt, glatt. Blumen dreifädig. Vaterl. Nepes. 4

20. *Illecebrum maritimum* Spr. (*Bucholzia* Mart.) Stengel weisschweißig, ästig, wurzelnd. Blätter spatelförmig, mircronenspitzig, glatt. Blumen seitenständig, gehäuft. Kelchtheile gespitzt, die Schüppchen neben den Staubfäden fast dreispaltig. Vaterl. Brasilien am Meerstrand. 4

Eine andere Pflanze dieses Namens, nämlich: *Illecebrum*

maritimum Villars, welche ich im 1. Nachtrage B. 4. S. 25. beschrieben habe, gehört zur Gattung Paronychia Tournes. f. 2. Nachtr.

Kultur der Knorpelblumen im Allgemeinen f. Lex. B. 5.

Synonymen.

Illecebrum alsinifolium Linn. f. Lexic. ist Paronychia alsinifolia.

— arabicum Linn. f. Lexic. ist Paronychia arabica.

— aristatum Ait. f. Lexic. ist Mollia aristata Ait.

— brachiatum Linn. f. Lexic. ist Achyranthes brachiata L.

— canariense Linn. f. Lexic. ist Paronychia canariensis.

— capitatum Linn. f. Lexic. ist Paronychia capitata.

— cephalotes M. a Bieberst. f. Paronychia hispanica.

— cymosum Villars. f. Lexic. ist Paronychia cymosa.

— dichotomum Pers. f. 1. Nachtr. ist Paronychia dichotoma.

— divaricatum Ait. f. Lexic. ist Mollia diffusa Willd.

— lanatum Linn. f. Lexic. ist Aerva lanata Juss.

— limense Jacq. ist Illecebrum frutescens Lex.

— maritimum Vill. f. Lexic. f. Paronychia hispanica Cand.

— Monsonii Linn. f. Achyranthes Monsoniae.

— narbonense Willd. f. 1. Nachtr. ist Paronychia hispanica Cand.

— niveum Pers. f. 1. Nachtr. ist Paronychia nivea Cand.

— Paronychia Linn. f. Lexic. ist Paronychia hispanica Cand.

— pubescens Willd. f. 1. Nachtr. ist Achyranthes pubescens Roth.

— vermiculare Linn. ist Gomphrena vermiculata Lexic.

Illosporium Mart. ist Achitonium acicola Kunz.

Imbricaria, Pers. gehört wahrscheinlich zu *Escalonia* Linn. und kann im I Nachtr. B. 4. S. 89. gestrichen werden.

Imbricaria maxima Poir. f. *Mimasops Imbricaria*.

Imbricaria convexiuscula Michx. ist *Parmelia aquila* Ach.

Imhoffia Herber. ist *Amaryllis marginata* Jacq.

Impatiens Linn. Balsamine; Springsaame f. Lexic. B. 5. (Schubers Handb. 1. 270.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 90.

Reich klein, zweiblättrig. Corolle vierblättrig, ungleich; das untere Corollenblatt ist gespornt und die zwei seitensitzenden sind gespalten. Staubfäden 5, nebst den Antheren zusammenhängend. Kapsel fünffächerig, fünflappig. Zur Zeit der Reife lösen sich die Klappen mit Schneckkraft, rollen spiralförmig zurück und der Saame springt heraus.

Pentandria Monogynia (Familie Geranien; Rutaceen.)

Die Balsaminen sind krautartige, meist saftreiche Pflanzen, deren Blätter wechselnd oder einander gegenüber stehen. Blumenstiele einz. oder dreiblümig, oder vielblümig, traubig. Die lieblichen Blumen entwickeln sich im Sommer und dienen zur Zierde der Gärten. Wir kennen jetzt einige 30 Arten, die größtentheils Tropenländern angehören.

I. *Pedunculis unifloris*, Blumenstiele einblümig.

† *Foliis alternis*, Blätter wechselnd stehend.

Zu dieser ersten Abtheilung gehören die im Lexikon beschriebenen Arten; *Imp. Balsamina*, *cornuta*, *chinensis*, *latifolia* Linn. I, *bifida* Thunb. und folgende.

1. *Impatiens mysorensis* Roth.

Stengel krautartig, einfach, fadenförmig. Blätter wechselnd stehend, länglich-lanzettförmig, entfernt gezähnt. Blumenstiele gepaart. Der Corollensporn gerade, kürzer als die Blume. Vaterl. Ostindien. ☉

†† *Foliis oppositis*, Blätter einander gegenüberstehend.

Imp. fasciculata Lam. I. *oppositifolia* Linn. f. Lex. gehören hierher und folgende Arten.

2. *Impatiens mutila* Loureiro. Cochinchinische Balsamine.

Stengel krautartig. Blätter gegenüberstehend, lanzettförmig, sägerandig. Blumenstiele meist einzeln stehend, Sporn der Corolle sackförmig. Vaterl. Cochinchina. ☉

3. *Impatiens cochleata* Lour. Rößelspornige Balsamine.

Wurzel kriechend. Stengel krautartig. Blätter länglich,

fast sägerandig. Blumenstiele lang. Corollensporn hakenförmig, zusammengedrückt. Vaterl. das südliche China. 4

4. *Impatiens rosmarinifolia* Retzius, Rosmarinblättrige Balsamine.

Blätter schmal, linien- lanzettförmig, sägezähmig = dornig, unten grau = oder blaulichgrün. Blumenstiele einzeln, winkelförmig. Corollensporn abgekürzt. Das Synonym *I. rosmarinifolia*? bei *I. oppositifolia* wird im Lexic. B. 5. C, 5. ausgetrichen. Vaterl. Ceylon.

II. *Pedunculis trifloris*. Blumenstiele dreiblümig.

Hierher die im Exilou beschriebenen Arten; *Imp. triflora*, *Nolitangere* Linn. *I. natans* Willd. und folgende.

5. *Impatiens fulva* Nuttall. Feuerrothe Balsamine.

Hierher *Imp. biflora* Walt. Willd. f. Lexic. B. 5.

Blätter rauten- eiförmig, stumpf, mucronenspizig = gezähnt. Blumenstiele 2—3. blümig. Corolle feuerroth, gefleckt, vertieft liegend. Sporn verlängert, ausgekerbt. Vaterl. Nordamerika, Carolina. ☉?

6. *Impatiens pallida* Nuttall. Blasse Balsamine.

Blätter rauten- eiförmig, spizig, mucronenspizig = gezähnt. Corolle blaß oder hochgelb, im Innern rothgefleckt, das gespornte Corollenblatt ausgebreitet, abgekürzt. Sporn gekrümmt, sehr kurz. Nordamerika. ☉ In Hinsicht auf Wuchs und Aussehen gleicht diese Art sehr unserer gemeinen Balsamine *I. Nolitangere*. (Abbild. Reichenb. hort. bot. t. 101.)

7. *Impatiens parviflora* Cand. Kleinblumige Balsamine.

Blätter eiförmig, langgespizt, sägerandig, die Cerratusren mucronenspizig. Blumen aufrecht. Sporn gerade. Vaterl. Mongolia.

8. *Impatiens tripetala* Roxb. Dreiblumenblättrige Balsamine.

Blätter länglich, langgespizt, mucronenspizig = gezähnt, an der Basis gefranzt. Blumenstiele sehr kurz. Vaterl. Ostindien.

9. *Impatiens trilobata* Colebr. Dreilappige Balsamine.

Blätter länglich- lanzettförmig, sägerandig, glatt. Blumenstiele meist vierblümig. Corollenblätter fast gleich. Sporn kegelförmig, langgespizt, gekrümmt. Vaterl. Sikkim, Provinz in Ostindien.

10. *Impatiens scabrida* Wallich. (*I. Hamiltoniana* Don.)

Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, sägerandig,

in der Jugend scharf (rauh). Corollensporn sehr lang. W. terl. Nepal. ☉

11. *Impatiens fruticosa* Lechen. Strauchige oder stauden-
strauchige Balsamine.

Stengel staudenstrauchig, ästig. Blätter länglich, an bei-
den Enden verdünnt, gezähnt, unten zottenhaarig. Nur
diese hat einen staudenstrauchigen Stengel, die übrigen sind
meist krautartig. W. terl. Ostindien. h

12. *Impatiens calycina* Wallich. Großkelchige Balsamine.

Blätter wechselnd stehend, eiförmig, langgestielt, spizig sä-
gezähnt, auf beiden Seiten filzig. Blumenstiele meist zwei-
blüthig. Kelch groß, zottenhaarig. Sporn aufsteigend, ke-
gelförmig, länger als die Blumenstiele. W. terl. Nepal.

13. *Impatiens cristata* Wallich. Kammförmige Balsamine.

Blätter lanzettförmig, langgestielt, borstig-sägerandig, fil-
zig. Blumenstiele meist dreiblüthig, so lang als die Blatt-
stiele. Sporn gekrümmt, so lang als die Blumenstiele. W. terl. Ad terminos Mongoliae. ☉ ?

14. *Impatiens urticaefolia* Wallich. Nesselfalttrige Bal-
samine.

Blätter eiförmig, langgestielt, drüsig-gelblich, mit zerstreut
stehenden Haaren besetzt, glänzend. Blumenstiele meist vier-
blüthig, fadenförmig, fast so lang als die Blätter. Sporn
groß, kegelförmig, so lang als die Blumen. W. terl. Kmodi
montes (Nepal.)

15. *Impatiens grandis* Heyne. Großblumige Balsamine.

Blätter langgestielt, eiförmig, gestielt, sägerandig. Blu-
menstiele dreiblüthig. Blumen groß. Sporn sehr lang. W. terl. Ostindien.

16. *Impatiens leptoceras* Wallich. Langspornige Balsamine.

- Imp. micrantha Don. I: longicornis Wallich. var.

Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, sägerandig,
die Serraturen mycromensspizig, glatt. Blumenstiele meist drei-
blüthig. Sporn dünn, gerade, sehr lang. W. terl. Nepal.

III. Pedunculis multifloris racemosis.

Blumenstiele vielblüthig. Blumen traubenständig.

17. *Impatiens sulcata* Wallich. Gefurchte Balsamine.

Stengel tief gefurcht, glatt. Blätter gegenüber stehend,
länglich-eiförmig, spizig-sägerandig. Blumenstiele gegenüber
stehend, kürzer als die Blätter. Sporn gekrümmt. Nepal.

18. *Impatiens racemosa* Wallich. Traubenblüthige Balsamine.

Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, gezähnt, glatt. Blumen traubenständig. Sporn gekrümmt, hart, kürzer als die Corolle. Vaterl. Nepal. ☉

19. *Impatiens insignis* Wallich.

Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, sägerandig, glatt, die Serraturen mitronenspitzig. Blumen traubenständig. Sporn dünn, gerade, sehr lang. Vaterl. Nepal. ☉

20. *Impatiens bicornuta* Wallich. Doppelspörnige Balsamine.

Blätter ey-lanzettförmig, langgespitzt, sägerandig, oben fl. zig. Blumenstiele lang, doldentraubig. Blumen gebüschelt, mit Bracteen versehen. Das Nectarium an der Basis mit hornförmigen Anhängen versehen. Sporn kegelförmig, an der Spitze fadenförmig. Vaterl. Nepal an feuchten Orten, auf Bergen und in Wäldern. ☉ ?

21. *Impatiens umbellata* Heyne. Doldenblumige Balsamine.

Blätter eyförmig, langgespitzt, stumpf, gekerbt. Blumenstiele an der Spitze doldenartig getheilt. Sporn sehr lang. Vaterl. Ostindien.

22. *Impatiens odorata* Don. Wohlriechende Balsamine.

Blätter linien-lanzettförmig, sägerandig, glatt. Blumen in Doldentrauben gesammelt, die kürzer als die Blätter sind. Sporn so lang als die Blumenstiele, die seitenständigen Corollenblätter mit zwei Anhängen versehen. Vaterl. Nepal. ☉

23. *Impatiens fimbriata* Hooker exot. fl. t. 146. Gefranzte Balsamine.

Imp. bracteata Colebr. in Roxburgh fl. ind. 2. p. 459.

Blätter länglich, langgespitzt, sägerandig, gewimpert. Blumentrauben gipfelständig, kopfförmig. Bracteen purpurroth gefranzt. Sporn pfriemenspitzig, gekrümmt, länger als die Corolle. Vaterl. Elthet, eine Provinz in Ostindien.

24. *Impatiens scapiflora* Heyne. Schaftblumige Balsamine.

Wurzelblätter rundlich-herzförmig, stumpf, vielrippig, ganzrandig. Blumenschaft wurzelständig, doldentraubig. Sporn sehr lang. Vaterl. Ostindien. 4

Kultur. Die Balsaminenarten zieht man aus Saamen, der von denen, die aus Tropenländern kommen, ins warme Bett gesät wird. Die jungen Pflanzen werden einzeln in

Köpfe gesetzt und an einen ihrem Vaterlande angemessenen Ort gestellt. Einige minder zärtliche gedeihen auch an schädlichen Stellen im freien Lande.

Synonymen.

- Impatiens biflora* Willd. f. *Impatiens fulva* N. 5.
 — *bracteata* Colebr. f. *Impatiens fimbriata* N. 23.
 — *Hamiltonia* f. *Impatiens scabrida* N. 10.
 — *heterophylla* Wall. ist *Impatiens fasciculata* Lam. f. Lexic.
 — *micrantha* Don. f. *Impatiens leptoceras* N. 16.
 — *mollis* Wallich. ist *Impatiens latifolia* Linn. f. Lexic.
 — *setacea* Colebr. ist *Impatiens fasciculata* f. Lexic.

Imperata Pers. f. 1. Nachtr. B. 4. ist *Saccharum*.

Imperata spontanea Pal. Beauv. ist *Saccharum spontaneum* Linn.

Imperatoria Linn. Meisterwurz. (Schubers Handb. t. 74.)

Dolde vielstrahlig, ausgebreitet. Die allgemeine Hülfe fehlt. Frucht zusammengedrückt, flach, hautrandig, auf dem Rücken mit drei stumpfen Rippen versehen, wodurch sich diese Gattung am meisten von *Angelica* unterscheidet; bei letzterer sind die Rippen scharf. Felderchen gefurcht.

Pentandria Digynia (Familie Doldenpflanzen.)

1. *Imperatoria Ostruthium* Linn. Gemeine Meisterwurz; officinelles *Ostruthium*.

Diese Art habe ich im Verikon erste Auflage unter *Angelica officinalis* Bernhardsi aufgeführt und beschrieben, aber in der zweiten Auflage weggelassen, denn sie gehört zu dieser Gattung. Für die Besitzer der zweiten Auflage folgende Beschreibung:

Imp. Ostruthium. Wurzel knollig, ästig. Stengel rund, glatt, fast einfach, 12—20 Zoll hoch. Wurzelblätter lang gestielt, doppelt dreizählig-gefiedert. Blättchen breit-eiförmig, lappig, eingeschnitten-gezähnt, die Stiele der obern Stengelblätter mit großen aufgeblasenen Scheiden versehen. Dolde vielstrahlig. Blümchen weiß, alle fruchtbar. Vaterl. Europa in gebirgigen Gegenden, vornehmlich in der Schweiz.

Oesterreich, Schlessen und andern Orten in Deutschland. 2
Blüßz. Jun. Jul.

2. *Imperatoria verticillaris* Cand. Hierher *Angelica verticillaris* Linn. f. Lexic.

Stengel walzenrund, glatt, bläulichgrün, 4—6 Fuß hoch. Aeste Blumen tragend, quirlförmigstehend. Blätter dreifach-doppelt zusammengesetzt. Blättchen ausgesperrt, eingeschnitten gezähnt. Blumen grün. Wächst auf Alpen in Kärnthen, Krain. ? Blüßz. Sommer. (Abbild. Jacquin. hort. t. 130.)

3. *Imperatoria angustifolia* Bellard. Schmalblättrige Meisterwurz.

Blätter doppelt dreizählig. Blättchen länglich, an der Basis schmal, die Einschnitte sägerandig. Wächst auf Alpen in Südeuropa. ?

4. *Imperatoria caucasica* Spr. Kaukasische Meisterwurz.
Selinum causicum M. a Bieb. Fl. Cauc.

Stengel gefurcht, ästig. Blätter doppelt dreizählig, glatt. Blättchen eiförmig, keilförmig, eingeschnitten-lappig, das mittlere fast dreilappig, gestielt. Die besondern Hüllen einseitig, dreiblättrig, herabhangend. Vaterl. Kaukasus.

5. *Imperatoria Chabraei* Spr. Hierher *Selinum Chabraei* Jacq. (f. Lexic. B. 9. S. 61.) *Sel. podolicum* Bess. *Peucedanum carvifolia* Vill. Koch.

Stengel rundlich, gestreift. Blattscheiden lang, schlaff, wellend. Blätter doppelt gefiedert. Blättchen linienförmig, langgespitzt, die untern fast kreuzweis stehend. Vaterl. Kaukasus, Oesterreich u. a. Gegenden. 2

6. *Imperatoria Seguerii* Spr. Hierher *Selinum Seguerii* Linn. f. Lexic. B. 9.

Stengel rund, gestreift. Blätter dreifach gefiedert. Blättchen fiederspaltig. Einschnitte entfernt stehend, gleichbreit, fast sichelförmig. Blumenstiele fast quirlständig. Uebrigens siehe. Lexikon B. 9. S. 64.

Kultur. Die Arten der Gattung *Imperatoria* gedeihen in unseren botanischen Gärten unter freiem Himmel und blühen im Sommer. Man zieht sie aus Saamen und vermehrt noch überdieß die perennirenden Arten durch Wurzelsheilung.

- Incarvillea* Jussieu. *Incarvillea* f. Lex. B. 5.

Kelch fünftheilig, von drei Bracteen unterstügt. Corolle röhrig = bauchig, der Rand fünklappig, ungleich. Vier Staubfäden mit länglichen Antheren gekrönt, davon 2 gegrannt und 2 nackt sind. Kapsel schotenförmig, wie bei Bignonia. Saamen mit Flügelhaut.

Didynamia Angiospermia (Familie Bignonieen.)

1. *Incarvillea chinensis* Lam. f. Lexic. B. 5.
2. *Incarvillea grandiflora* Spr. (Bignonia chinensis Thunb.) Hierher Bignonia grandiflora Thunb. Banks Lexic. 1. Aufl. B. 2. S. 222. 2. Aufl. B. 2. S. 287.
3. *Incarvillea tomentosa* Spr. Hierher Bignonia tomentosa Thunb. f. Lexic. 1. Aufl. B. 2. S. 211. 2. Aufl. B. 2. S. 277.
4. *Incarvillea parasitica* Roxburgh. Hierher Aeschynanthus grandiflorus Spr. Trichospermum grandiflorum Don.

Stengel krautig. Blätter lanzettförmig, fleischig, ohne Rippen. Blumen in reichen Dolden. Griffel hervorragend. Wächst auf Baumstämmen in Brasilien. h

Indigofera Linn. Indigo f. Lexic. B. 5. (Herit. Kirp. t. 79. Roxb. corom. t. 194.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 91.

Kelch fünfzählig. Corolle schmetterlingsförmig. Das Fahnenklein rundlich, zurückgeschlagen. Schiffehen an beiden Seiten mit pfriemenförmigem Sporn versehen oder höckerig. Staubfäden 10, in zwei Bündel verwachsen. Hülse linienförmig, rundlich oder fast vierkantig, gerade oder fast sichelförmig gekrümmt, 1—8 oder vielsaamig.

Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflanzen.)

Die Gattung Indigofera enthält jetzt etwa 110 Arten, die größtentheils in Tropenländern und auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung wild wachsen. Es sind theils Sträucher oder Staudensträucher, theils krautartige Pflanzen. Blumen weiß, rosa, purpurroth oder bläulich; einzeln oder gepaart oder in Trauben gesammelt. Im System sind die zahlreichen Arten nach der Gestalt und Beschaffenheit der Blätter eingetheilt und geordnet.

I. Foliis simplicibus. Blätter einfach.

Hierher die im Verikon beschriebenen Arten: Indig. filifolia, depressa, ovata Thunb. I. simplicifolia Lam.

I. II.

I. linifolia Retz. *I. oblongifolia* Forsk. *I. paniculata* Vahl. *I. echinata* Willd. und folgende.

1. *Indigofera cordifolia* Roth. Herzblättriger Indigo.

Stengel staudenstrauchig, sehr ästig. Blätter rundlich-herzförmig, mucronenspizig, grau = filzig. Blumen stiellos, winselständig. Waterl. Ostindien. ♀

2. *Indigofera monophylla* Cand. Einblättriger Indigo.

Blätter umgekehrteiförmig, mucronenspizig, geadert, grau, an der Basis mit Afterblättern versehen. Blumen in Trauben gesammelt, die länger als die Blätter sind. Corollenblätter und Hülsen braun, zottenhaarig. Waterl. Neuhoiland.

II. *Foliiis subternatis ternatisque.*

Blätter dreizählig, bei manchen Arten theils einfach, theils dreizählig.

Hierher die im Verison und ersten Nachtrage beschriebenen Arten: *Ind. candicans*, *amoena* Ait. *I. psoraloides*, *trifoliata*, *procumbens* Linn. *I. spinosa* Forsk. *I. rigida*, *prostrata* Willd. *I. denudata*, *incana*, *sarmentosa* Thunb. *I. diphylla* Vent. *I. bufalina* Lour. *I. glandulosa* Roxb. *I. mexicana* Linn. fil. *I. hedyaroides* *lotoides* Lam. und folgende.

† *Fruticosae.* Strauchartige.

3. *Indigofera biflora* Roth. Zweiblämiger Indigo.

Stengel strauchig, ästig. Blätter dreizählig. Blättchen länglich, langgespizt, dreirippig, scharf. Blumenstiele meist gepaart, zweiblämig. Hülsen eiförmig, zweisaamig. Waterl. Ostindien. ♀ Blühz. Sommer.

4. *Indigofera peregrina* Cand. (*Lotus peregrinus* N. L. Burm.)

Blättchen länglich = liniensförmig, gespizt, oben filzig, unten punktiert. Blumen fast stiellos, gepaart, winkelfständig. Hülsen vierkantig. Waterl. Ostindien. ♀ Blühz. Jun. August.

5. *Indigofera virgata* Cand. Ruthenförmiger Indigo.

Aeste ruthenförmig. Blättchen - umgekehrt = herzförmig, mucronenspizig, fast lederartig, oben glatt, unten filzig. Blumen in ährenförmige Trauben gesammelt, die kürzer als die Blätter sind. Kelche zottenhaarig. Waterl. Ostindien. ♀ Blühz. Sommer.

6. *Indigofera paucifolia* Delil. Wenigblättriger Indigo.

Blätter theils einfach, theils dreizählig, länglich = umgekehrteiförmig, weißlich, fast seidenhaarig. Blumentrauben fast

Diatr. Ber. ar. Nachtr. IV. Bd.

Y p

ährenförmig, länger als die Blätter. Hülsen walzenrund, sichelförmig. Vaterl. das obere Aegypten. ♀

7. *Indigofera nivea* Willd. herb. Hoffmannsegg. Schmutzweißer Indigo.

Stengel aufrecht, wie die Blätter schneeweiß = seidenhaarig. Blättchen umgekehrteiförmig, stumpf. Blumentrauben kürzer als die Blätter. Diese Art bedarf noch einer genauern Untersuchung und Bestimmung. Vaterl. das Kap der guten Hoffnung. ♀

†† Herbaceae. Krautartige.

8. *Indigofera subulata* Poir. Pfriemenspiziger Indigo.

Stengel krautartig, ästig. Aeste fast vierkantig. Blätter langgestielt, theils einfach, theils dreizählig. Blättchen elliptisch, flzig. Asterblätter pfriemenspizig. Blumen in langen aufrechten Trauben. Guiana. ? ☉

9. *Indigofera pilosa* Poir. Behaarter Indigo.

Aeste gestreift, behaart. Blätter theils einfach, theils dreizählig. Blättchen länglich = elliptisch, mucronenspizig, flzig. Blumenstiele einblümlig, winkelfständig. Kelchtheile behaart. Das Vaterland von dieser und der vorhergehenden Art ist noch nicht bekannt.

10. *Indigofera aristata* Spr. Begrannter Indigo.

Blätter dreizählig. Blättchen spatelförmig, mit einem grauenartigen Mucrone versehen, auf beiden Seiten grau behaart, borstig. Blumenstiele einblümlig, winkelfständig. Kelchtheile behaart = federig. Vaterl. das Kap d. g. Hoffn. ☉ ?

11. *Indigofera Leschenaultii* Cand. Leschenaultischer Indigo.

Blättchen oval, stumpf, das Endblättchen größer, als die seitenständigen. Blumentrauben fast stiellos, vielblümlig. Hülsen vierkantig. Vaterl. Bengalen. ☉

12. *Indigofera timorensis* Cand.

Blättchen länglich = umgekehrteiförmig, graulich. Blumentrauben winkelfständig, so lang als die Blattstiele. Hülsen vierkantig. Vielleicht nur eine Varietät von einer andern längst bekannten Art, Vaterl. die Insel Timore.

13. *Indigofera diversifolia* Cand. Verschiedenblättriger Indigo.

Blättchen länglich, graulich, das Endblättchen länger als die seitenständigen. Blumenstiele wenigblümlig, fast länger als die Blattstiele. Hülsen hängend, flzig. Vaterl. Insel Madag. ☉ Blüh. Jak. Septemb.

14. *Indigofera gracilis* Spr. Barter Indigo.

Stengel krautartig, sehr ästig, weissschweißig, glattlich. Blättchen elliptisch, mucronenspizig oben glattlich, unten strieglich. Ackerblätter pfriemensförmig. Blumentrauben wenigblümig. Hülsen behaart, zurückgeschlagen, nur mit wenigen Saamen versehen. Waterl. das Kap d. g. Hoffn. ☉

15. *Indigofera complanata* Reichenb.

Aeste zweischneidig. Blättchen lanzett-linienförmig, gespitzt, unten mit silberweißen angebrückten Haaren bedeckt (strieglich). Trauben vielblümig, gipfelständig. Kelche weiß. Waterl. Kap d. g. Hoffn. ☉

16. *Indigofera erecta* Thunb. Aufrechter Indigo.

Stengel krautartig, ästig, aufrecht, glattlich. Blättchen umgekehrteiförmig, gespitzt, oben glatt, unten fast filzig. Blumen in lachen gipfelständigen Trauben. Hülsen zurückgeschlagen. Waterl. Kap d. g. Hoffn.

17. *Indigofera rotundifolia* Lour. Rundblättriger Indigo.

Stengel krautartig, ästig, und windet sich. Blättchen rundlich, auf beiden Seiten. Ackerblätter pfriemenspizig. Blumentrauben kurz, winkelfständig. Hülsen zusammengebrückt, glatt, zweisaamig. Waterl. das südliche China.

III. Foliis digitatis. Blätter gefingert.

Hierher *Ind. coriacea* Ait. I. filiformis, digitata f. Lexic. B. 5.

IV. Foliis pinnatis. Blätter gefiedert.

† Fruticosa. Strauchartige.

Hierher die im Verikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Ind. semitrijuga* Forsk. I. argentea, cytisoides, hirsuta, angustifolia, Anil. tinctoria Linn. I. frutescens, stricta Thunb. I. australis Willd. I. macrostachya Vent. I. compressa Lam. und folgende.

18. *Indigofera strigosa* Spr. Strieglicher Indigo.

Ein Strauch, dessen Aeste dünn und fadenförmig sind. Blätter 2—3 paarig gefiedert. Blättchen linien-lanzettförmig, mucronenspizig, strieglich. Ackerblätter feinspizig. Blumen in gipfelständigen schlaffen Trauben. Waterl. das Kap d. g. Hoffn. h. Blühz. Jun. Jul.

19. *Indigofera Humboldtiana* Spr. Humboldtischer Indigo.

Ind. mucronata Willd. herb.

Ein aufrechter Strauch, dessen Aeste straff, glattlich, und die Blätter dreipaarig gefiedert sind. Blättchen spatelförmig,

P p 2

mucronenspizig, unten fast seidenhaartig. Blumentrauben länger als die Blätter. Hülsen hängend, fast walzenrund.

20. *Indigofera violacea* Roxb. Curt. bot. Mag. t. 3348. Violetter Indigo.

Ind. verrucosa Wallich. in hort. Bero'.

Stengel strauchig. Blättchen länglich. Blumen schön roth, in Trauben, die etwas länger als die Blätter sind. Vaterl. Kap d. g. Hoffu. ?

In der Berl. allg. Gartenzeitung 1834. N. 44. S. 352. schreibt Hr. Gartendirektor Otto diesen Strauch als eine der schönsten Arten dieser Gattung. Er bemerkt, daß dieser schöne Indigo seit mehreren Jahren in dem botanischen Garten bei Berlin unter dem Namen: Ind. verrucosa Wallich. kultivirt worden sey und die frühe oder späte Blühzeit des Strauches von dem Standorte desselben abhängt. In einem warmen Hause entwickeln sich die Blumen im Frühlinge, ehe die Blätter ihre völlige Ausbildung erhalten haben, wird aber die Pflanze im Glashause überwintert, dann den Sommer über ins Freie gebracht, so erscheinen die Blumen später, im Juni und Juli und gewähren neben den schönen grünen Blättern einen lieblichen Anblick. In Schottland z. B. in dem botanischen Garten zu Edinburg hat dieser Stierstrauch schon einige Jahre unter freiem Himmel ausgedauert und blüht daseibst im Mai, siehe Gartenzeitung a. a. D.

21. *Indigofera Lindleyana* Spr. Lindleyischer Indigo.

Ind. angulata Lindl. Bot. reg. t. 991.

Stengel strauchig. Aeste eckig, purpurroth, wie die Blätter glatt. Blätter meist vierpaarig gefiedert. Blättchen oval, ausgekerbt. Blumentrauben so lang als die Blätter. Vaterl. Neuholand. h Blühz. Sommer.

22. *Indigofera atropurpurea* Roxb. Schwarzpurpurröther Indigo.

Ind. Thibaudiana et leptostachya Candolle.

Blättchen oval, an der Spitze eingedrückt, wenig behaart. Blumen schwarz, purpurroth, in langen Trauben. Hülsen straff, mucronenspizig. Vaterl. Ostindien; Nepal. h

23. *Indigofera Dosua* Hamilt.

Aesten und Blättchen mit gelbrothen Haaren dicht bekleidet. Blättchen oval, an der Spitze eingedrückt. Aesterblätter liniensförmig, scharfborstig. Blumenähren winkelförmig, kürzer als die Blätter. Nepal. h

24. *Indigofera galeoides* Cand. Geisrautenartiger Indigo.

Blättchen elliptisch, mucronenspizig, auf beiden Seiten silzig. Blumen in Trauben, die kürzer als die Blätter sind. Hülsen aufrecht, straff, viel-saamig. Ceylon. ♀

25. *Indigofera tephrosioides* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et spec. pl. VI. t. 580.

Stengel strauchig, fast windend. Blätter 3—4 oder mehr paarig gefiedert. Blättchen länglich, mucronenspizig, fast graunig, oben glatt, unten silberfarbig, seidenhaarig, strieglich. Trauben sehr lang gestielt, winkelförmig. Corollen schön roth. Hülsen viereckig, hängend, gerade, meist fünfsaamig. Vaterl. Quito, bei Cuenca. ♀ Blühz. August.

26. *Indigofera truxillensis* Kunth J. c. VI. p. 456. Truxilloischer Indigo.

Ein zierlicher Strauch, dessen Aeste rostfarbig, strieglich sind. Blätter 5—6 paarig gefiedert. Blättchen länglich, stumpf, mucronenspizig, an der Basis keilsförmig, auf beiden Seiten, vornehmlich unten, strieglich. Blumen in reiche, fast stiellose Trauben gesammelt, die kürzer als die Blätter sind. Corollen rosenroth. Hülsen zurückgeschlagen, walzenrund, fast stichelförmig, 4—6 saamig. Vaterl. Peru, bei Truxillo. ♀ Blühz. August.

27. *Indigofera lespedezioides* Kunth J. c. VI. p. 457.

Blätter dreipaarig gefiedert. Blättchen fast keil-lanzettförmig, stumpf, mucronenspizig, auf beiden Seiten, wie die Aestchen strieglich, unten graugrün. Trauben kurzstielig, vielblümig, länger als die Blätter. Hülsen zurückgeschlagen, zusammengedrückt, gerade, meist achtsaamig. Vaterl. Mexiko, auf dem Berge Ixcullo. ♀ Blühz. Sept.

28. *Indigofera humilis* Kunth J. c. VI. p. 454. Niedriger Indigo.

Stengel strauchig, gestreckt, wie die Blätter strieglich, silberfarbig. Blätter 4—5 paarig gefiedert. Blättchen länglich, spizlich, steif. Trauben wenigblümig, länger als die Blätter. Hülsen zurückgeschlagen, fast walzenrund, gerade, meist zweisaamig. Vaterl. Peru, bei Caramarka. ♀ Blühz. August.

29. *Indigofera mysorensis* Rottler, Mysorensischer Indigo.

Stengel ästig, wie die Blätter mit grauen Haaren beledet. Blätter 4paarig gefiedert. Blättchen länglich-umgekehrt-eiförmig, auf beiden Seiten kottenhaarig. Blumen winkelförmig.

ständig. Hülsen walzenrund, fast stiellos, abstehend. Vaterl. Ostindien. ♀ Blühz. Jul. August.

30. *Indigofera cassioides* Rottl. Cassienartiger Indigo.

Aeste ausgesperret. Blätter 5—8 oder mehrpaarig gefiedert. Blättchen entfernt stehend, elliptisch, mucronenspitig, auf beiden Seiten seidenhaarig. Trauben so lang als die Blätter. Corollenblätter abstehend. Hülsen hängend, dick, abstehend. Vaterl. Ostindien. ♀ Blühz. Sommer.

31. *Indigofera divaricata* Jacq. Ausgesperreter Indigo.

Aeste ausgesperret. Blätter 4—6 paarig gefiedert. Blättchen länglich, glatt. Blumen in dichten, aufrechten, fast stiellosen Aehren. Hülsen ründlich, bogenförmig, glatt. Ostindien. ? ♀

32. *Indigofera polycarpa* Willd. herb. Vielhüftiger Indigo.

Stengel strauchig, aufrecht. Blätter fünfpaarig gefiedert. Blättchen länglich = umgekehrteiförmig, stielig. Trauben vielblüthig, so lang als die Blätter. Hülsen zahlreich, zur Reife geschlagen, viereckig. Vaterl. Südamerika. ♀ Blühzeit Sommer.

33. *Indigofera secundiflora* Poir. Einseitigblüthiger Indigo.

Stengel ästig, wie die Blätter flebrig = drüsig. Blätter 2—3 paarig gefiedert. Blättchen lanzettförmig. Blumen in einseitigen ährenförmigen Trauben, die kürzer als die Blätter sind. Hülsen fast walzenrund, mit dem mucronenartigen Griffel gekrönt. Vaterl. Guiana. ♀ Blühz. Juni, August.

34. *Indigofera Berteriana* Spr. Berteroischer Indigo.

Stengel staudenstrauchig, niederliegend. Blätter 3—4 paarig gefiedert. Blättchen länglich = spatelförmig, unten weißlich seidenhaarig. Blumenstiele winkelförmig, meist einblüthig. Hülsen linienförmig, straff. Vaterl. Guadalupe. ♀ Blühz. Jun. August.

†† Herbaceae. Krautartige. (Blätter gefiedert.)

Zu dieser Abtheilung gehören die im Vericon und r. Nachtrage beschriebenen Arten: *Ind. pentaphylla*, *enneaphylla*, *glabra* Linn. *I. nigricans* Vahl. *I. fragrans* Reiz. *I. senegalensis*, *viscosa* Lam. *I. endecaphylla*, *dendroides* Jacq. *I. caroliniana* Walt. *I. spicata* Forsk. *I. lateritia*, *inquinans*, *pulchra* Willd. *I. punctata*, *capillaris* Thunb. und folgende.

35. *Indigofera scabra* Roth. Scharfer Indigo.

Stengel krautartig, aufrecht, wie die Blätter grau. Blätter

meist dreipaarig gefiedert. Blättchen oval, mucronenspitzig. Trauben lang, schlaff, länger als die Blätter. Hülsen fast vierseitig, hängend, fast gebogen, strieglich-scharf. Ostindien.

36. *Indigofera jamaicensis* Spr. Jamaicher Indigo.

Stengel krautartig, aufrecht. Aeste eckig, wie die Blätter mit angegedrückten kleinen Borsten bekleidet. Blätter dreipaarig gefiedert. Blättchen länglich, mucronenspitzig. Trauben länger als die Blätter, straff. Hülsen zurückgeschlagen, fast walzenrund. Vaterl. Jamaica. ☉ ?

37. *Indigofera heterotricha* Cand.

Stengel krautartig, mit hakenförmigen Borsten besetzt. Blättchen umgekehrteiförmig, mucronenspitzig, strieglich. Trauben gestielt, länger als die Blätter. Hülsen zurückgeschlagen, doppelt behaart. Vaterl. das Kap d. g. Hoffn.

38. *Indigofera asragalina* Cand. Traganthartiger Indigo.

Stengel krautartig, aufrecht, scharfborstig. Blätter vierpaarig gefiedert. Blättchen umgekehrteiförmig, sehr stumpf, auf beiden Seiten zottenhaarig, unten weißlich. Trauben kürzer als die Blätter. Hülsen viereckig, zweisaamig, stark behaart. Vaterl. Senegambien. ☉ Blühz. Sommer.

39. *Indigofera sessiliflora* Cand. Indigo mit stiellosen Aehren.

Aeste und Blätter seidenhaarig. Blätter meist vierpaarig gefiedert. Blättchen umgekehrteiförmig. Die Blumen stehen sehr gedrängt und bilden winkelfständige stiellose Aehren, die kürzer als die Blätter sind. Hülsen walzenrund, 4—6 saamig. Vaterl. wie vorhergehende Art.

40. *Indigofera Perrottetii* Cand.

Stengel krautartig, gestreckt, wie die Blätter filzig. Blätter vierpaarig gefiedert. Blättchen länglich-umgekehrteiförmig, unten punktiert. Blumen gedrängt, in Trauben, die kürzer als die Blätter sind. Hülsen länglich-walzenrund. Vaterl. Senegambien. ☉ 4 Blühz. Sommer.

41. *Indigofera angulata* Rottl. Echter Indigo.

Stengel krautartig. Blätter theils dreizählig, theils 2—3 paarig gefiedert. Blättchen länglich, mucronenspitzig, auf beiden Seiten strieglich-borstig. Blumen in eckige aufrechte Trauben gesammelt, die länger als die Blätter sind. Hülsen linienförmig, zurückgeschlagen. Vaterl. Ostindien. ☉ Blühz. Juli — August.

42. *Indigofera miniata* Ortega. siehe 1. Nachtr. B. 4. S.

Reich fünftheilig, von drei Bracteen unterstützt. Corolle röhrig = bauchig, der Rand fünfkappig, ungleich. Vier Staubfäden mit länglichen Antheren gekrönt, davon 2 gegrannt und 2 nackt sind. Kapsel schotenförmig, wie bei Bignonia. Saamen mit Flügelhaut.

Didynamia Angiospermia (Familie Bignonieen.)

1. *Incarvillea chinensis* Lam. f. Lexic. B. 5.
2. *Incarvillea grandiflora* Spr. (*Bignonia chinensis* Thunb.) Hierher *Bignonia grandiflora* Thunb. Banks Lexic. 1. Aufl. B. 2. S. 222. 2. Aufl. B. 2. S. 287.
3. *Incarvillea tomentosa* Spr. Hierher *Bignonia tomentosa* Thunb. f. Lexic. 1. Aufl. B. 2. S. 211. 2. Aufl. B. 2. S. 277.
4. *Incarvillea parasitica* Roxburgh. Hierher *Aeschynanthus grandiflorus* Spr. *Trichospermum grandiflorum* Don.

Stengel krautig. Blätter lanzettförmig, fleischig, ohne Rippen. Blumen in reichen Dolden. Griffel hervorragend. Wächst auf Baumstämmen in Brasilien. h

Indigofera Linn. Indigo f. Lexic. B. 5. (Herit. Kirp. t. 79. Roxb. corom. t. 194.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 91.

Reich fünfzählig. Corolle schmetterlingsförmig. Das Fahnenklein rundlich, zurückgeschlagen. Schiffehen an beiden Seiten mit friemenförmigem Sporn versehen oder höckerig. Staubfäden 10, in zwei Bündel verwachsen. Hülse linienförmig, rundlich oder fast vierkantig, gerade oder fast sichelförmig gekrümmt, 1—8 oder viel-saamig.

Diadelphia Decandria (Familie Hülsenpflanzen.)

Die Gattung *Indigofera* enthält jetzt etwa 110 Arten, die größtentheils in Tropenländern und auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung wild wachsen. Es sind theils Sträucher oder Staudensträucher, theils krautartige Pflanzen. Blumen weiß, rosa, purpurroth oder bläulich, einzeln oder gepaart oder in Trauben gesammelt. Im System sind die zahlreichen Arten nach der Gestalt und Beschaffenheit der Blätter eingetheilt und geordnet.

I. *Foliis simplicibus*. Blätter einfach.

Hierher die im Verkon beschriebenen Arten: *Indig. filifolia*, *depressa*, *ovata* Thunb. I. *simplicifolia* Lam.

I. II.

I. linifolia Retz. *I. oblongifolia* Forsk. *I. paniculata* Vahl. *I. echinata* Willd. und folgende.

1. *Indigofera cordifolia* Roth. Herzblättriger Indigo.

Stengel staubenstrauchig, sehr ästig. Blätter rundlich-herzförmig, mucronenspizig, grau = filzig. Blumen stiellos, winselständig. Vaterl. Ostindien. ♀

2. *Indigofera monophylla* Cand. Einblättriger Indigo.

Blätter umgekehrteiförmig, mucronenspizig, geädert, grau, an der Basis mit Afterblättern versehen. Blumen in Trauben gesammelt, die länger als die Blätter sind. Corollenblätter und Hülsen braun, zottenhaarig. Vaterl. Neuholand.

II. Foliis subternatis ternatisque.

Blätter dreizählig, bei manchen Arten theils einfach, theils dreizählig.

Hierher die im Verison und ersten Nachtrage beschriebenen Arten: *Ind. candicans*, *amoena* Ait. *I. psoraloides*, *trifoliata*, *procumbens* Linn. *I. spinosa* Forsk. *I. rigida*, *prostrata* Willd. *I. denudata*, *incana*, *sarmetosa* Thunb. *I. diphylla* Vent. *I. bufalina* Lour. *I. glandulosa* Roxb. *I. mexicana* Linn. fil. *I. hedyaroides* *lotoides* Lam. und folgende.

† Fruticosae. Strauchartige.

3. *Indigofera biflora* Roth. Zweiblümiger Indigo.

Stengel strauchig, ästig. Blätter dreizählig. Blättchen länglich, langgespizt, dreirippig, scharf. Blumenstiele meist gepaart, zweiblümig. Hülsen eiförmig, zweisaamig. Vaterl. Ostindien. ♀ Blühz. Sommer.

4. *Indigofera peregrina* Cand. (*Lotus peregrinus* N. L. Burm.)

Blättchen länglich = linienförmig, gespizt, oben filzig, unten punktiert. Blumen fast stiellos, gepaart, winkeltständig. Hülsen vierkantig. Vaterl. Ostindien. ♀ Blühz. Jun. August.

5. *Indigofera virgata* Cand. Ruthenförmiger Indigo.

Aeste ruthenförmig. Blättchen umgekehrt = herzförmig, grannenspizig, fast lederartig, oben glatt, unten filzig. Blumen in ährenförmige Trauben gesammelt, die kürzer als die Blätter sind. Kelche zottenhaarig. Vaterl. Ostindien. ♀ Blühz. Sommer.

6. *Indigofera paucifolia* Delil. Wenigblättriger Indigo.

Blätter theils einfach, theils dreizählig, länglich = umgekehrteiförmig, weißlich, fast seidenhaarig. Blumentrauben fast

Dietr. Erz. 2r. Nachtr. IV. Bd.

pp

ährenförmig, länger als die Blätter. Hülzen walzenrund, schiefelförmig. Waterl. das obere Aegypten. h

7. *Indigofera nivea* Willd. herb. Hoffmannsegg. Schnee-weißer Indigo.

Stengel aufrecht, wie die Blätter schneeweiß-seidenhaarig. Blättchen umgekehrtepförmig, stumpf. Blumentrauben kürzer als die Blätter. Diese Art bedarf noch einer genauern Untersuchung und Bestimmung. Waterl. das Kap der guten Hoffnung. h

†† Herbaceae. Krautartige.

8. *Indigofera subulata* Poir. Pfriemenspiziger Indigo.

Stengel krautartig, ästig. Aeste fast vierkantig. Blätter langgestielt, theils einfach, theils dreizählig. Blättchen elliptisch, flzig. Asterblätter pfriemenspizig. Blumen in langen aufrechten Trauben. Guiana. ? ○

9. *Indigofera pilosa* Poir. Behaarter Indigo.

Aeste gestreift, behaart. Blätter theils einfach, theils dreizählig. Blättchen länglich-elliptisch, mucronenspizig, flzig. Blumenstiele einblümig, winkelfständig. Kelchtheile behaart. Das Waterland von dieser und der vorhergehenden Art ist noch nicht bekannt.

10. *Indigofera aristata* Spr. Begrannter Indigo.

Blätter dreizählig. Blättchen spatelförmig, mit einem granenartigen Mucrone versehen, auf beiden Seiten grau behaartborstig. Blumenstiele einblümig, winkelfständig. Kelchtheile behaart-seiderig. Waterl. das Kap d. g. Hoffn. ○ ?

11. *Indigofera Leschenaultii* Cand. Leschenaultischer Indigo.

Blättchen oval, stumpf, das Endblättchen größer, als die seitenständigen. Blumentrauben fast stiellos, vielblümig. Hülzen vierkantig. Waterl. Bengalen. ○

12. *Indigofera timorensis* Cand.

Blättchen länglich-umgekehrtepförmig, graulich. Blumentrauben winkelfständig, so lang als die Blattstiele. Hülzen vierkantig. Vielleicht nur eine Varietät von einer andern längst bekannten Art, Waterl. die Insel Timore.

13. *Indigofera diversifolia* Cand. Verschiedenblättriger Indigo.

Blättchen länglich, graulich, das Endblättchen länger als die seitenständigen. Blumenstiele wenigblümig, fast länger als die Blattstiele. Hülzen hängend, flzig. Waterl. Insel Mascarah. ○ Blühz. Jul. Septemb.

14. *Indigofera gracilis* Spr. Barter Indigo.

Stengel krautartig, sehr ästig, weitschweifig, glattlich. Blättchen elliptisch, mucronenspizig oben glattlich, unten strieglich. Austerblätter pfriemensförmig. Blumentrauben wenigblümig. Hülsen behaart, zurückgeschlagen, nur mit wenigen Samen versehen. Waterl. das Kap d. g. Hoffn. ☉

15. *Indigofera complanata* Reichenb.

Aeste zweischneidig. Blättchen lanzett-linienförmig, gespizt, unten mit silberweißen angedrückten Haaren bedeckt (strieglich). Trauben vielblümig, gipfelständig. Kelche weiß. Waterl. Kap d. g. Hoffn. ☉

16. *Indigofera erecta* Thunb. Aufrechter Indigo.

Stengel krautartig, ästig, aufrecht, glattlich. Blättchen umgekehrteiförmig, gespizt, oben glatt, unten fast sitzig. Blumen in lachen gipfelständigen Trauben. Hülsen zurückgeschlagen. Waterl. Kap d. g. Hoffn.

17. *Indigofera rotundifolia* Lour. Rundblättriger Indigo.

Stengel krautartig, ästig, und windet sich. Blättchen rundlich, auf beiden Seiten. Austerblätter pfriemenspizig. Blumentrauben kurz, winkelfständig. Hülsen zusammengebrückt, glatt, zweisaamig. Waterl. das südliche China.

III. Foliis digitalis. Blätter gefingert.

Hierher *Ind. coriacea* Ait. I. filiformis, digitata f. Lexic. B. 5.

IV. Foliis pinnatis. Blätter gefiedert.

† Fruticosa. Strauchartige.

Hierher die im Verikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Ind. semitrijuga* Forsk. I. argentea, cytisoides, hirsuta, angustifolia, Anil. tinctoria Linn. I. frutescens, stricta Thunb. I. australis Willd. I. macrostachya Vent. I. compressa Lam. und folgende.

18. *Indigofera strigosa* Spr. Strieglischer Indigo.

Ein Strauch, dessen Aeste dünn und fadenförmig sind. Blätter 2—3 paarig gefiedert. Blättchen linien-lanzettförmig, mucronenspizig, strieglich. Austerblätter feinspizig. Blumen in gipfelständigen schlaffen Trauben. Waterl. das Kap d. g. Hoffn. ♀ Blühz. Jun. Jul.

19. *Indigofera Humboldtiana* Spr. Humboldtischer Indigo.

Ind. mucronata Willd. herb.

Ein aufrechter Strauch, dessen Aeste straff, glattlich, und die Blätter dreipaarig gefiedert sind. Blättchen spatelförmig,

mucronenspizig, unten fast seidenhaartig. Blumentrauben länger als die Blätter. Hülsen hängend, fast walzenrund.

20. *Indigofera violacea* Roxb. Curt. bot. Mag. t. 3348.
Violetter Indigo.

Ind. verrucosa Wallich. in hort. Bero'.

Stengel strauchig. Blättchen länglich. Blumen schön roth, in Trauben, die etwas länger als die Blätter sind. Vaterl. Kap d. g. Hoffn. ?

In der Bevl. allg. Gartenzeitung 1834. N. 44. S. 352. schreibt Hr. Gartendirektor Otto diesen Strauch als eine der schönsten Arten dieser Gattung. Er bemerkt, daß dieser schöne Indigo seit mehreren Jahren in dem botanischen Garten bei Berlin unter dem Namen: Ind. verrucosa Wallich. kultivirt worden sey und die frühe oder späte Blühzeit des Strauches von dem Standorte desselben abhängt. In einem warmen Hause entwickeln sich die Blumen im Frühlinge, ehe die Blätter ihre völlige Ausbildung erhalten haben, wird aber die Pflanze im Glashause überwintert, dann den Sommer über ins Freie gebracht, so erscheinen die Blumen später, im Juni und Juli und gewähren neben den schönen grünen Blättern einen lieblichen Anblick. In Schottland z. B. in dem botanischen Garten zu Edinburg hat dieser Stierstrauch schon einige Jahre unter freiem Himmel ausgedauert und blüht daseibst im Mai, siehe Gartenzeitung a. a. D.

21. *Indigofera Lindleyana* Spr. Lindley'scher Indigo.

Ind. angulata Lindl. Bot. reg. t. 991.

Stengel strauchig. Aeste eckig, purpurroth, wie die Blätter glatt. Blätter meist vierpaarig gefiedert. Blättchen oval, ausgekerbt. Blumentrauben so lang als die Blätter. Vaterl. Neuholand. h Blühz. Sommer.

22. *Indigofera atropurpurea* Roxb. Schwarzpurpurrother Indigo.

Ind. Thibaudiana et leptostachya Candolle.

Blättchen oval, an der Spitze eingedrückt, wenig behaart. Blumen schwarz, purpurroth, in langen Trauben. Hülsen straff, mucronenspizig. Vaterl. Ostindien; Nepal. h

23. *Indigofera Dosua* Hamilt.

Aesten und Blättchen mit gelbrothen Haaren dicht bekleidet. Blättchen oval, an der Spitze eingedrückt. Ackerblätter lineenförmig, scharfborstig. Blumenähren winkelförmig, kürzer als die Blätter. Nepal. h

24. *Indigofera galegoides* Cand. Geisrautenartiger Indigo.

Blättchen elliptisch, mucronenspizig, auf beiden Seiten spizig. Blumen in Trauben, die kürzer als die Blätter sind. Hülsen aufrecht, straff, viel-saamig. Ceylon. ♀

25. *Indigofera tephrosioides* Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et spec. pl. VI. t. 580.

Stengel strauchig, fast windend. Blätter 3—4 oder mehr paarig gefiedert. Blättchen länglich, mucronenspizig, fast graunig, oben glatt, unten silberfarbig, seidenhaarig = strieglich. Trauben sehr lang gestielt, winkelförmig. Corollen schön roth. Hülsen viereckig, hängend, gerade, meist fünfsaamig. Vaterl. Quito, bei Cuenea. ♀ Blühz. August.

26. *Indigofera truxillensis* Kunth J. c. VI. p. 456. Truxilloischer Indigo.

Ein zierlicher Strauch, dessen Aeste rostfarbig = strieglich sind. Blätter 5—6 paarig gefiedert. Blättchen länglich, stumpf, mucronenspizig, an der Basis keilsförmig, auf beiden Seiten, vornehmlich unten, strieglich. Blumen in reiche, fast stiellose Trauben gesammelt, die kürzer als die Blätter sind. Corollen rosenroth. Hülsen zurückgeschlagen, walzenrund, fast sichelförmig, 4—6 saamig. Vaterl. Peru, bei Truxillo. ♀ Blühz. August.

27. *Indigofera lespedezioides* Kunth J. c. VI. p. 457.

Blätter dreipaarig gefiedert. Blättchen fast keil = lanzettförmig, stumpf, mucronenspizig, auf beiden Seiten, wie die Aestchen strieglich, unten graugrün. Trauben kurzstielig, vielblüthig, länger als die Blätter. Hülsen zurückgeschlagen, zusammengedrückt, gerade, meist achtsaamig. Vaterl. Mexiko, auf dem Berge Iznullo. ♀ Blühz. Sept.

28. *Indigofera humilis* Kunth J. c. VI. p. 454. Niedriger Indigo.

Stengel strauchig, gestreckt, wie die Blätter strieglich, silberfarbig. Blätter 4—5 paarig gefiedert. Blättchen länglich, spizig, steif. Trauben wenigblüthig, länger als die Blätter. Hülsen zurückgeschlagen, fast walzenrund, gerade, meist zweisaamig. Vaterl. Peru, bei Caxamarca. ♀ Blühz. August.

29. *Indigofera mysorensis* Rottler. Mysorensischer Indigo.

Stengel ästig, wie die Blätter mit grauen Haaren bekleidet. Blätter 6paarig gefiedert. Blättchen länglich = umgekehrt-eiförmig, auf beiden Seiten kottenhaarig. Blumen winkelförmig.

- ständig. Hülsen walzenrund, fast stiellos, abstehend. Vaterl. Ostindien. ♀ Blühz. Jul. August.
30. *Indigofera cassioides* Rottl. Cassienartiger Indigo.
Aeste ausgesperret. Blätter 5—8 oder mehrpaarig gefiedert. Blättchen entfernt stehend, elliptisch, mucronenspitig, auf beiden Seiten seidenhaarig. Trauben so lang als die Blätter. Corollenblätter abstehend. Hülsen hängend, dick, abstehend. Vaterl. Ostindien. ♀ Blühz. Sommer.
31. *Indigofera divaricata* Jacq. Ausgesperreter Indigo.
Aeste ausgesperret. Blätter 4—6 paarig gefiedert. Blättchen länglich, glatt. Blumen in dichten, aufrechten, fast stiellosen Ähren. Hülsen ründlich, bogenförmig, glatt. Ostindien. ? ♀
32. *Indigofera polycarpa* Willd. herb. Vielhüftiger Indigo.
Stengel strauchig, aufrecht. Blätter fünfpaarig gefiedert. Blättchen länglich = umgekehrteiförmig, stielig. Trauben vielblüthig, so lang als die Blätter. Hülsen zahlreich, zur Reife geschlagen, viereckig. Vaterl. Südamerika. ♀ Blühzeit Sommer.
33. *Indigofera secundiflora* Poir. Einseitigblüthiger Indigo.
Stengel ästig, wie die Blätter flebrig = drüsig. Blätter 2—3 paarig gefiedert. Blättchen lanzettförmig. Blumen in einseitigen ährenförmigen Trauben, die kürzer als die Blätter sind. Hülsen fast walzenrund, mit dem mucronenartigen Griffel gekrönt. Vaterl. Guiana. ♀ Blühz. Juni, August.
34. *Indigofera Berteriana* Spr. Berteroischer Indigo.
Stengel staudenstrauchig, niederliegend. Blätter 3—4 paarig gefiedert. Blättchen länglich = spatelförmig, unten weißlich seidenhaarig. Blumenstiele winkelförmig, meist einblüthig. Hülsen linienförmig, straff. Vaterl. Guadalupe. ♀ Blühz. Jun. August.
- †† Herbaceae. Krautartige. (Blätter gefiedert.)
Zu dieser Abtheilung gehören die im Verikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Ind. pentaphylla*, *enneaphylla*, *glabra* Linn. *I. nigricans* Vahl. *I. fragrans* Reiz. *I. senegalensis*, *viscosa* Lam. *I. endecaphylla*, *dendroides* Jacq. *I. caroliniana* Walt. *I. spicata* Forsk. *I. lateritia*, *inquinans*, *pulchra* Willd. *I. punctata*, *capillaris* Thunb. und folgende.
35. *Indigofera scabra* Roth. Scharfer Indigo.
Stengel krautartig, aufrecht, wie die Blätter grau. Blätter

meist dreipaarig gefiedert. Blättchen oval, mucronenspitzig. Trauben lang, schlaff, länger als die Blätter. Hülsen fast vierseitig, hängend, fast gebogen, strieglich-scharf. Ostindien.

36. *Indigofera jamaicensis* Spr. Jamaicher Indigo.

Stengel krautartig, aufrecht. Aeste eckig, wie die Blätter mit angedrückten kleinen Borsten bekleidet. Blätter dreipaarig gefiedert. Blättchen länglich, mucronenspitzig. Trauben länger als die Blätter, straff. Hülsen zurückgeschlagen, fast walzenrund. Vaterl. Jamaica. ☉ ?

37. *Indigofera heterotricha* Cand.

Stengel krautartig, mit hakenförmigen Borsten besetzt. Blättchen umgekehrteiförmig, mucronenspitzig, strieglich. Trauben gestielt, länger als die Blätter, Hülsen zurückgeschlagen, doppelt behaart. Vaterl. das Kap d. g. Hoffn.

38. *Indigofera asragalina* Cand. Tragantartiger Indigo.

Stengel krautartig, aufrecht, scharfborstig. Blätter vierpaarig gefiedert. Blättchen umgekehrteiförmig, sehr stumpf, auf beiden Seiten zottenhaarig, unten weißlich. Trauben kürzer als die Blätter. Hülsen vieredig, zweisaamig, stark behaart. Vaterl. Senegambien. ☉ Blühz. Sommer.

39. *Indigofera sessiliflora* Cand. Indigo mit stiellosen Aehren.

Aeste und Blätter seidenhaarig. Blätter meist vierpaarig gefiedert. Blättchen umgekehrteiförmig. Die Blumen stehen sehr gedrängt und bilden winkelförmige stiellose Aehren, die kürzer als die Blätter sind. Hülsen walzenrund, 4—6 saamig. Vaterl. wie vorhergehende Art.

40. *Indigofera Perrottetii* Cand.

Stengel krautartig, gestreckt, wie die Blätter stielig. Blätter vierpaarig gefiedert. Blättchen länglich-umgekehrteiförmig, unten punktiert. Blumen gedrängt, in Trauben, die kürzer als die Blätter sind. Hülsen länglich-walzenrund. Vaterl. Senegambien. ☉ 4 Blühz. Sommer.

41. *Indigofera angulata* Rottl. Echter Indigo.

Stengel krautartig. Blätter theils dreizählig, theils 2—3 paarig gefiedert. Blättchen länglich, mucronenspitzig, auf beiden Seiten strieglich-borstig. Blumen in eckige aufrechte Trauben gesammelt, die länger als die Blätter sind. Hülsen linienförmig, zurückgeschlagen. Vaterl. Ostindien. ☉ Blühz. Juli — August.

42. *Indigofera miniata* Ortega. siehe 1. Nachtr. B. 4. S.

94. Heß daselbst *minuta* statt *minuta*. Diese Art bedarf noch einer genauern Untersuchung und Vergleichung mit andern Arten.

43. *Indigofera aniceps* Poir. Zweifelschneidiger Indigo.

Aeste zusammengebrückt, fast geflügelt, zweifelschneidig. Blätter fünfpaarig gefiedert. Blättchen gestielt, länglich-ungekehrt-eiförmig, flzig. Blumen in verlängerten übergebogenen Trauben. Hülsen zurückgeschlagen. Vaterl. Guinea. ☉ Blüh. Juni — August.

44. *Indigofera microcarpa* Desv. Kleinfrüchtiger Indigo.

Blätter meist vierpaarig gefiedert, weißlich, behaart. Blumen in Aehren gesammelt, die kürzer als die Blätter sind. Hülsen sehr kurz, zweisaamig. Brasilien.

45. *Indigofera polyphylla* Cand. Vielblättriger Indigo.

Stengel aufrecht, stielig. Blätter vielpaarig gefiedert. Blättchen elliptisch, unten weiß-flzig. Trauben so lang als die Blätter. Hülsen hängend, gerade. Vaterl. Nepal. ☉ Blüh. Sommer.

46. *Indigofera plumosa* Spr.

Stengel gestreckt, zottenhaarig. Blätter 6—8 paarig gefiedert. Blättchen spatelförmig, ausgekerbt. Trauben wenigblümig, langgestielt. Kelchtheile sehr zottenhaarig = federartig. Ostindien. ?

47. *Indigofera sylvatica* Sieber. Waldlebender Indigo.

Stengel ästig, aufrecht, glattlich. Aeste eckig. Blätter achtpaarig gefiedert. Blättchen länglich, stumpf, unten punktiert. Trauben winkelförmig, aufrecht. Neuholland.

48. *Indigofera oligosperma* Cand. Wenigsaamiger Indigo.

Stengel aufrecht. Aeste eckig, scharf. Blätter 4—5 paarig gefiedert. Blättchen länglich = elliptisch, mucronenspitzig, auf beiden Seiten mit kleinen angedrückten Borsten bekleidet. Trauben so lang als die Blätter. Hülsen walzenrund, 2—3 saamig, sehr abstehend. Vaterl. Senegambien. ☉ Blüh. Juli: Septemb.

49. *Indigofera Perriniana* Spr. Perrinischer Indigo.

Stengel aufrecht, mit wenigen angedrückten Haaren besetzt. Blätter meist vierpaarig gefiedert. Blättchen linienförmig, stumpf, geädert, seidenhaarig. Blumenstiele traubig, lang. Hülsen linienförmig, rostfarbig = zottenhaarig. Südamerika. ?

Kultur. Fortpflanzung und Vermehrung der Indigoarten

am sichersten durch Saamen, der auch in unsern Gärten, wenn die Pflanzen gut behandelt werden, vollkommen reif wird. Es versteht sich übrigens von selbst, daß die Saamen von allen Arten, die aus warmen Ländern kommen, in warmen Beeten ausgesäet werden müssen. Uebrigens siehe meine Anleitung zur Kultur der Indigoarten im Allgemeinen im Lexikon B. 5. S. 67.

Zu den Synonymen, welche ich im 1. Nachtr. B. 4. S. 95. angezeigt habe, gehören noch folgende:

Synonymen.

- Indigofera angulata* Lindl. (nec Rottl.) f. *Indigofera*
Lindleyana N. 21.
- *colorata* Roth. ist *Indigofera argentea* Linn.
f. Lexic.
- *leptostachya* Cand. f. *Indigofera atropurpu-*
rea N. 22.
- *linearis* Cand. ist *Indigofera senegalensis*
Lexic.
- *macrostachya* Willd. herb. ist *Dalea Mutisii*
Kunth.
- *minuta* f. 1. Nachtr. B. 2. f. *Indigofera mi-*
niata N. 42.
- *mucronata* Willd. f. *Indigofera Humboldtii-*
ana N. 19.
- *rufescens* Poir. ist *Indigofera lateritia* Lex.
- *hipularis* Link. ist *Indigofera amoena* Lex.
- *tenuifolia* Lam. ist *Indigofera angustifolia*
Lexic.
- *Thibaudiana* Cand. f. *Indigofera atropurpu-*
rea N. 22.
- *verrucosa* Hortul. f. *Indigofera violacea*
N. 20.

Inga Marcgr. Willd. (*Mimosae Species* Linn.) *Inga*.
Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 96.

Blüthen polygamisch. Kelch fünfzählig, glockenförmig, stes-
sen bleibend. Corolla röhrig, trichterförmig, fünfspaltig.
Staubfäden zahlreich, an der Basis verbunden, haarförmig.
Antheren sehr klein, zweifächerig. Ein Griffel, Hülse breit,
linienförmig, zusammengedrückt, einfächerig, zweiklappig. Saa-
men fast linienförmig, in einer marligen Substanz liegend
oder mit einem Umschlage (Mantelhaut) versehen.

Polygamia Monoecia Willd. Sp. p. (*Monadelphina Polyandria* Spr. S. st. Veg.) Familie Hülsenpflanzen.

Die Arten dieser Gattung sind Bäume oder Sträucher, manche stachellos (unbewaffnet.) Blätter wechselnd stehend, doppelt gezweit, zusammengesetzt oder doppelt gefiedert zc. Blättchen ganzrandig. Die Blattstiele mit gepaarten Afterblättern versehen. Blumen in Köpfchen gesammelt, selten ährenständig. Im System sind die zahlreichen Arten nach der Gestalt der Blätter eingetheilt. Diese Ordnung habe ich im ersten Nachtrage B. 4. angenommen und daselbst 60 Arten vollständig beschrieben; die folgenden sind neu.

I. *Foliis bigeminis.*

Blätter doppelt getheilt, d. h. der gemeinschaftliche Blattstiel trägt an jeder Spitze zwei Blätter.

† *Spinosa*. Dornige; der Blattstiel ist an der Basis mit zwei Dornen (Stacheln) versehen.

1. *Inga pubescens* Spr. Filzige Inga.

Der gemeinschaftliche Blattstiel ist an der Basis mit zwei geraden Dornen (Afterblättern) versehen. Blättchen schief, länglich, stumpflich, unten, wie die Blattstiele, zottenhaarig. Blumenköpfchen rispenständig. Corollen glatt. Vaterl. Südamerika, am Magdalenenflusse. h

2. *Inga Berterii* Spr. Berterische Inga.

Afterblätter wie bei vorhergehender Art. Blättchen länglich, stumpf, lederartig, glatt. Blumenköpfchen traubenständig. Hülsen glatt, fast gerade. Vaterl. Südamerika. h

3. *Inga fulgens* Humb. Plant. legum. p. 36. t. II. Kunth Nov. gen. et Spec. pl. VI. p. 287.

Blätter 2—3 paarig. Blättchen elliptisch = umgekehrteiförmig, wellenrandig, lederartig, glatt, glänzend. Blattspindel geflügelt. Blumen in elliptisch = längliche Ähren gesammelt, die fast rispenartig stehen. Corollen seidenhaarig. Vaterl. Neugranada, bei Honda. h Blühz. Juni.

†† Blattstiel unbewaffnet.

4. *Inga Forfex* Humb. J. c. p. 59. t. 16. Kunth. J. c. VI.

Blätter zusammengesetzt = gezweit. Blättchen schief, länglich = lanzettförmig, gespitzt, häutig, glatt. Blumenköpfchen fast kugelförmig, einzeln, traubenständig. Corolle fünfspaltig. Vaterl. Neugranada. h Blühz. März, April.

Die übrigen Arten, welche dieser ersten Abtheilung angehören, s. 1. Nachtr. B. 4. S. 96—101.

II. Foliis tergeminis.

Blätter dreimal gezweit, d. h. der gemeinschaftliche Blattstiel theilt sich in zwei Aeste, die an der Basis mit zwei Blättchen versehen; an der Spitze jeden Astes sitzen gleichfalls zwei Blättchen, und auf diese Weise machen drei paar Blättchen ein ganzes Blatt aus.

† *Armatae*. Bewaffnete Arten.

5. *Inga excelsa* Humb. Pl. legum. t. 18. Kunth J. c. VI. p. 299. Höhe Inga.

Ein ziemlich hoher Baum, dessen Aeste mit Stacheln besetzt sind. Blätter dreipaarig oder zusammengesetzt = doppelpaarig gefiedert. Blättchen schief, elliptisch, stumpf, fast mucronenspitzig, häutig, filzig. Blumenköpfe kugelförmig, einzeln winkelförmig. Hülsen schneckenförmig aufgerollt. Vaterl. Südamerika, am Magdalenaflusse, bei Compenda. ♀ Blüht: August.

6. *Inga candida* Kunth J. c. VI. p. 299. Milchweiße Inga.

Stamm baumartig. Aeste stachelig. Blätter zusammengesetzt = gefiedert. Blättchen zweipaarig, schief, umgekehrteiförmig, an beiden Enden gerundet, fast mucronenspitzig, fast lederartig, glatt. Blumenköpfe kugelförmig, langgestielt, einzeln, winkelförmig. Hülsen schneckenförmig aufgerollt. Vaterl. Quito, bei Guayaquil. ♀ Blüht: März, April.

†† *Inermes*. Unbewaffnete

Hierher die im 1. Nachtrage beschriebenen Arten; I. longifolia, coriacea, caripensis emarginata Humb. l. tergemina Willd. und folgende.

7. *Inga Catarrhactae* Kunth. J. c. VI p. 297. (Cataractae Synops. IV. p. 28.)

Ein Schlingstrauch, dessen Aeste unbewaffnet sind. Blättchen schief, länglich = lanzettförmig, langgestielt, an der Basis halb = gerundet, häutig, glatt. Blumenstiele gepaart, winkelförmig. Hülsen schneckenförmig aufgerollt. Vaterl. Cataracta, bei Atures am Orinoco. ♀

III. Foliis pinnatis, inermis.

Blätter gefiedert; unbewaffnet.

† *Petiolo communi alato, glandula sessili inter singula paria foliolorum.*

Der gemeinschaftliche Blattstiel trägt frugiformige Drüsen, die zwischen den Blättchenpaaren sitzen,

8. *Inga reticulata* Spr. Nephadrig Inga.

Pacai Feuill. 2. t. 19.

Blätter meist vierpaarig gefiedert. Blättchen länglich-herzförmig, gespitzt, nephadrig, glatt. Blattstiel geflügelt. Blumen in einzelnstehende gestielte Aehren gesammelt. Hülsen gerade, sehr lang, am Rande verdickt. Vaterl. Peru. ♀ Blüh. Sommer.

9. *Inga insignis* Humb. legum. t. 13. Kunth J. c. VI. p. 290. Bierliche Inga.

Blätter meist fünfpaarig gefiedert. Blättchen länglich, lang-gespitzt, an der Basis gerundet, lederartig, oben glänzend. Spindel geflügelt. Blumen ährenständig, die Aehren gepaart, winkelförmig. Corollen seidenhaarig. Vaterl. Quito. ♀ Blüht daselbst im Januar.

10. *Inga ornata* Humb. legum. t. 14. Kunth J. c. VI. p. 292. Geschmückte Inga.

Blätter meist fünfpaarig gefiedert. Blättchen länglich, gespitzt, an der Basis gerundet, fast lederartig, oben flzig, unten graulich und borstig-flzig. Spindel geflügelt. Aehren gepaart, rispenständig. Corollen seidenhaarig. Vaterl. Neugranada in Thälern, an Flüssen, und ist daselbst unter dem Namen Guama bekannt. ♀ Blüh. Oktober.

11. *Inga sapida* Kunth J. c. VI. p. 286.

Blätter zweipaarig gefiedert. Blättchen länglich, an beiden Enden verdünnt, häutig, glatt, oben glänzend. Spindel (Blattstiel) geflügelt-drüsig. Hülsen fast bogenförmig. Vaterl. Südamerika, am Magdalenaenflusse. ♀

12. *Inga Bonplandiana* Kunth J. c. VI. p. 288. Bonplands Inga.

Blätter fünfpaarig gefiedert. Blättchen länglich-elliptisch, gespitzt, fast lederartig, glatt, oben glänzend. Spindel geflügelt. Blumen ährenständig. Corollen seidenhaarig. Hülsen glatt. Vaterl. Neugranada. ♀ Blüh. August.

Die übrigen Arten mit geflügelter Spindel (Blattstiel) s.

1. Nachtrag.

†† Petiolo communi nudo.

Der gemeinschaftliche Blattstiel nackt (nicht geflügelt)

Hierher gehören die im 1. Nachtrage beschriebenen Arten:
Inga coruscana, *nobilis*, *inaequalis* Humb. I. *fraxinea*, *heterophylla*, *juglandifolia*, *laurina*, *nodosa*, *punctata*, *spectabilis*, *splendens* Willd.

IV. Foliis conjugato-pinnatis.

Blätter zusammengesetzt = gefiedert.

13. *Inga taxifolia* Humb. Pl. legum. t. 20. Kunth J. c. p. 301. Larusblättrige Inga.

Stamm und Aeste unbewaffnet. Blätter zusammengesetzt = vielpaariggefiedert. Blättchen länglich, halb = herzförmig, glatt, oben glänzend. Blumenköpfchen wenigblüthig, einzeln, winzelsständig. Vaterl. Quito, zwischen Loxa et Paramo de Saraguru. ♀ Blüth. Aug. Septemb.

Die übrigen hierher gehörenden Arten s. 1. Nachtrag B.

4. S. 114.

V. Foliis bipinnatis.

Blätter doppelt gefiedert.

14. *Inga mertensioides* Martius. Mertensiaartige Inga.
Acacia asplenioides Nees a Esenb.

Blätter doppelt gefiedert, mit 2—3 paar Fiedern; jede Fieder besteht aus 12—15 Blättchenpaaren. Blättchen halblänglich, stumpf, fast wie Dachziegel über einander liegend. Der gemeinschaftliche Blattstiel behaart. Die Blumenköpfchen bilden langgestielte Doldentrauben. Vaterl. Brasilien. ♀

15. *Inga anomala* Kunth J. c. VI. p. 303. Humb. Pl. legum. t. 22. Mexikanische Inga.

Blätter vielpaarig gefiedert. Blättchen länglich, stumpf, glatt, gewimpert. Blumenstiele dreiblüthig, fast gehäuft, winzelsständig. Vaterl. Mexico. ♀ Blüth. Septemb.

Die übrigen Arten, welche zu dieser fünften Abtheilung gehören, siehe 1. Nachtrag B. 4. S. 117—122. wo ich auch bemerkt habe, daß die Ingaarten in unsern Gärten, in Hinsicht auf Standort, Boden und Fortpflanzung auf dieselbe Art und Weise behandelt werden, wie die Acacien, Mimosen, siehe diese Artikel im Verikon und 1. Nachtrage.

Synonymen.

- Inga adiantifolia* Kunth ist *Inga discolor* s. 1. Nachtr.
 — *biglandulosa* s. 1. Nachtr. ist *Parria africana* R. Br.
 — *Humboldtiana* Kunth ist *Inga nobilis* s. 1. Nachtr.
 — *lucida* Kunth ist *Inga quastiaefolia* s. 1. Nachtr.

Inga ornifolia Kunth ist *Inga rhoifolia* f. 1. Nachtr.

— *salutaris* Kunth ist *Inga Saman* f. 1. Nachtr.

— *senegalensis* Cand. ist *Parria africana* R. Br.

Inoderma lamellosum Kuntz ist *Aetate* Schlechtend.

Linnaea B. 8. S. 392.

Intsia Noron. Thuar. ist *Tamarindus Intsia* Spr.

Inula Linn. Mant. f. Lexic. B. 5. (Schuhr's Handb.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 122.

Blüthendecke (Kelch) dachziegelschuppig, die Schuppen sparrig, oft zurückgeschlagen. Fruchtboden nackt. Die Aetheren an der Basis mit zwei Borsten versehen. Saamenkrone einfach, selten doppelt.

Syngenesia 2. Ordn. (Familie Compositae.)

I. *Foliis latioribus, oblongis, lanceolatis.*

Blätter breit, länglich oder lanzettförmig.

† *Caule subunifloro.* Stengel fast einblümig.

Hierher die Arten, welche ich im Vericon beschrieben habe:

I. hirta, *montana* Linn. *I. dubia* Thunb. *I. grandiflora*, *glandulosa* Willd. und folgende Art.

1. *Inula calycina* Spr. (*I. montana* Bivon. nec Linn.)

Stengel krautartig, meist einblümig, wie die Blätter behaart-borstig. Blätter lanzettförmig, sägerandig, untere gestielt. Die äußeren Kelchschuppen länglich, stumpf, an der Spitze zurückgeschlagen. Vaterl. Sicilien an Bergen. 4?

† *Caule submultifloro, ramis pedunculisve, unifloris.*

Stengel meist vielblümig, jedoch Aeste und Blumenstiele einblümig.

Hierher: *I. arabica*, *odora*, *mariana*, *salicina*, *undulata*, *Pulicaria*, *indica* Linn. *I. japonica* Thunb.

I. Bubonium Jacq. *I. Vaillantii* Vill. f. Lexic. und

I. africana 1. Nachtr. und folgende Arten.

2. *Inula quadridentata* Lagasc. Vierzähni ger Mant.

Stengel krautartig, vielblümig, wie die Blätter zottenhaarig-klebrig. Blätter lanzettförmig, ganzrandig, die obersten neben den Blumen linienförmig. Blümchen vierzähni ger. Vaterl. das südliche Spanien. 4 Blüth. Sommer.

3. *Inula paludosa* Link. Sumpfliebender Mant.

I. dentata Smith Fl. graec.

Stengel sehr ästig, aufrecht. Blätter stiellos, umfassend,

gezähnt, grau = feinborstig, untere stumpf, obere gespitzt. Blumenstiele einblüthig. Strahlblümchen so lang als die Kelchschuppen. Vaterl. Portugal und Griechenland in Sümpfen.

4. *Inula capensis* Spr. Rapischer Alant.

Stengel aufrecht, einfach, wenigblüthig, zottenhaarig. Blätter umfassend, herz = lanzettförmig, mucronenspizig, sägeartig gezähnt, filzig. Kelch halbflugelig, ziegelschuppig, die Schuppen lang, linien = pfriemensförmig. Vaterl. das Kap d. g. Hoffnung.

5. *Inula aspera* Poir. Scharfblättriger Alant.

Stengel ästig, behaart. Aeste vierseitig, einblüthig. Blätter umfassend, herz = lanzettförmig, spizig gezähnt, scharf. Kelchschuppen glatt, lanzettförmig, pfriemensspizig. Vaterl. Südeuropa. ?

†† Floribus corymbosis. Blumen doldentraubig.

Zu dieser Abtheilung gehören 14 Arten, welche im Lexikon B. 5. und I. Nachtr. B. 4. beschrieben sind, und folgende.

6. *Inula campestris* Bess. Feld = Alant.

I. *Oculus Christi* M. & Bieb. (nec Linn.)

I. *helenioides* Candolle.

Stengel ästig, wie die Blätter fast filzig = feinborstig. Blätter länglich = lanzettförmig, ganzrandig. Kelchschuppen behaart, schlaff, pfriemensspizig. Fruchtboden nackt. Vaterl. das südliche Frankreich, Podolien und Laurien. 4

7. *Inula scabra* Pursh. Scharfborstiger Alant.

Stengel scharfborstig. Blätter stiellos, länglich, gespitzt, an der Spitze fast gezähnt, auf beiden Seiten scharf. Blumenstiele winkelförmig, doldentraubig. I. *subaxillaris* Lam. gehört hierher. Vaterl. Carolina. 4 ?

8. *Inula hybrida* Baumg. Bastard Alant.

Stengel straff, zottenhaarig. Blätter stiellos, länglich, glattlich, geädert, am Rande zottig = scharf. Doldentraube wenigblüthig. Kelchschuppen zottenhaarig, stumpf, mucronenspizig, mehr oder weniger abstehend. Vaterl. Siebenbürgen und Podolien.

9. *Inula verbascifolia* Pers. Königskerzenartiger Alant.

I. *thapsoides* Spr. pug.

Stengel und Blätter mit Filze dicht bekleidet. Blätter gerunzelt, fast ganzrandig, ausgeschweift. Wurzelblätter gestielt. Stengelblätter stiellos, lanzettförmig, halb herablaue-

tend. Blumen fast stiellos, doldentraubig. Vaterl. Kaschasus. ?

II. Folia angustioribus. Blätter schmal.

10. *Inula caspica* Ledeb. Caspischer Alant.

Stengel krautartig, aufrecht. Blätter umfassend, herzlanzettförmig, glatt, am Rande gezähnt-scharf. Blumenstiele rispenständig, zottenhaarig. Kelchschuppen liniensförmig, sparrig. Wächst an der Wolga.

11. *Inula falcata* Pursh. Sichelstförmiger Alant.

Stengel niedrig, ästig, fast wollig. Blätter stiellos, lineisichelstförmig, gespitzt, gerippt, auf beiden Seiten behaart. Blumen doldentraubig. Nordamerika.

12. *Inula divaricata* Nuttall. Ausgesperrter Alant.

Stengel fast scharfborstig. Blätter linien-lanzettförmig, fast sägerandig, an der Basis gewimpert. Die Blumen bilden eine rispenförmige Doldentraube, deren Aeste ausgesperrt und etwas klebrig sind. Vaterl. Nordamerika, vornehmlich Georgien.

Die oben beschriebenen Alantarten sind alle krautartige Pflanzen, die in unsern Gärten unter freiem Himmel fast in jedem Boden gedeihen. Man zieht sie aus Saamen und vermehrt noch überdies die perennirenden Arten durch Wurzeltheilung. Sie blühen im Sommer.

Synonymen.

Inula alpina Adam. ist *Inula grandiflora* Willd. f. Lexic.

— *aurantiaca* Spr. ist *Aster aurantiacus* f. 1. Nachtr. B. 1. S. 370.

— *chrysomoides* Poir. ist *Erigeron siculum* Lexic. B. 3.

— *cohyzoides* Desf. ist *Inula tuberosa* Lam. Lexic.

— *crithmoides* Linn. ist *Inula crithmifolia* Willd. Lexic.

— *dentata* Smith. f. *Inula paludosa* N. 3.

— *glandulosa* Lam. (non Willd.) ist *Inula mariana* Linn. f. Lexic.

— *glutinosa* Pers. ist *Grindelia glutinosa* Willd.

— *gnaphalioides* Vent. ist *Inula undulata* Linn. f. Lexic.

— *helenioides* M. a B. f. *Inula campestris* N. 6.

— *media* M. a B. ist *Inula germanica* Lexic.

Inula

***Inula montana* Bivon.** f. *Inula calycina* R. 1.

- *orientalis* Lam. ist *Inula germanica* a Lexic.
- *provincialis* Linn. ist *Senecio uniflorus* All.
- *Saturiae* Spr. ist *Inula satureioides* Mill. f. Lex.
- *subaxillaris* Lam. f. *Inula scabra* R. 7.
- *trichophylla* Nutt. ist *Inula mariana* Linn. f. Lexic.
- *thapsoides* Spr. pug. f. *Inula verbascifolia* R. 9.
- *verbascifolia* Vill. ist *Inula montana* Linn. var. f. Lexic.

***Iohannia* Willd.** (f. Lexic.) *Joannea* Spr. Syst. veg.

***Joannea brasiliensis* Spr.** ist *Plotovia glabra* Spr.

Iohannia microphylla Trattinn. (f. 1. Nachtr.) und *Chuquiria microphylla* et *Ch. lanceolata* Humb. sind nur als Varietäten von *Iohannia insignis* zu betrachten, welche sich durch die Größe und Gestalt der Blätter unterscheiden.

***Iohnia* Roxburgh. Corom. Iohnia.**

Kelch fünftheilig. Corolle fünfblättrig. Staubfäden 3. Ein Griffel. Fruchtboden kugelförmige Nectarien tragend. Beere meist einsamig.

Triandria Monogynia.

1. *Iohnia sulcioides* Roxb. Bengalische Iohnia.

Stengel strauchig, ästig, aufrecht. Blätter einander gegenüberstehend, breit-lanzettförmig, ganzrandig, fast lederartig, glatt, glänzend. Kelch fünfblättrig. Corollenblätter aufsteigend. Beere meist zweisamig. Vaterl. das östliche Bengalen. h

2. *Iohnia coromandelina* Roxb. Coromandelinische Iohnia.

Ein Schlingstrauch, dessen Blätter, wie die der vorhergehenden Art, einander gegenüberstehen. Diese sind elliptisch, fast gezähnt, glänzend. Kelch fünftheilig. Corollenblätter mit einem Knie versehen. Beere meist einsamig. Vaterl. Coromandel. h

Kultur. Beide Arten verlangen warme Standörter, denn sie kommen aus Tropenländern. Fortpflanzung und Vermehrung durch Samen und Stecklinge in warmen Beeten.

***Johnsonia* Rob. Brown. Johnsonia.**

Blumen in Aehren gesammelt, die mit dicht stehenden gefärbten Bracteen (Deckblättern) versehen sind. Corolle sechs- theilig, die Theile abwechselnd ausgehöhlt. Staubfäden 3, an der Basis ausgebreitet-verbunden. Ein fadenförmiger Griffel.

Dietr. Lex. 2r Nachtr. IV. Bb.

N q

fel. Narbe sehr einfach. Kapsel dreifächerig. Saamen mit einer Keimgrube, aus der ein kleiner warzenförmiger fleischiger Körper hervorgeht.

Triandria Monogynia (Familie Samentaceen.)

Diese Gattung widmete Rob. Brown dem Andenken eines alten Botanikers in England, Herrn Dr. Thom. Johnson, geboren in Selby in Yorkshire. Er war Apotheker in Snowhall, lieferte ein Werk: „*Descriptio itineris in agrum Cantianum* 1632. auch einige andere Schriften und starb 1647.

1. Johnsonia lupulina R. Br. Hopfenartige Johnsonie.

Blätter linienförmig, aufrecht, straff. Stengel (Schacht?) einfach. Blumen zapfenförmig, mit seitenständigen Bracteen. Vaterl. das südliche Neuholland.

Ioliffia Bojer. Delil. Ioliffia.

Blumen dioecisch. Männliche Blume: Kelch glockenförmig, fünftheilig. Corollenblätter 5, gefranzt. Staubfäden 5, davon 4 zu 2 verbunden, der fünfte frei steht. Antheren did, linienförmig. Weibliche Blume: Kelch auf dem Fruchtknoten stehend, klein, fünfzählig. Corollenblätter wie bei der männlichen Blume. Griffel kurz. Narbe 3—5 lappig. Beere groß, länglich, tief gefurcht, 5—6 fächerig, vielSaamig. Saamen horizontal liegend, mit einer nehradrigen Rinde bedeckt.

Dioecia Polyadelphia. (Familie Cucurbitaceen.)

1. Ioliffia africana Bojer. Delil. in mem. de la Soc. d'hist. nat. de Paris 3. p. 314. Afrikanische Ioliffia.

Telfairia pedata Hooker Bot. Mag. 2751. 2752.

Feuillaea pedata Smith. Bot. Mag. 2681.

Ein kletternder Strauch, der mit winkelfständigen Gabelranken versehen ist und in seinem Vaterlande an Bäumen hoch hinaufsteigt. Blätter wechselnd stehend?, fußförmig, 3—5—7 lappig, die Lappen langgespitzt, unten scharf. Blumen purpurroth, in winkelfständige Trauben gesammelt. Frucht groß, walzenrund, gefurcht, 10—12 Zoll lang, 6—8 Zoll im Durchmesser breit und enthält sehr viele Saamen.

Dieser Schlingstrauch scheint mit *Feuillaea javilla* Kunth (s. die Gattung) sehr nahe verwandt zu seyn, vielleicht nur eine Varietät oder eine und dieselbe Pflanze? Er wächst in Afrika auf den Inseln Pemba et Zanzibar, Mauritius u. a., wo er unter dem Namen Liane Ioliff allgemein bekannt ist.

Ionidium Venten. Solea Spr. Syst. veg. et pug. (f. 1. Nachtr. B 8. S. 315.) *Ionis* Persoon. Synops. sub. *Viola* 2. Abtheilung.

Calyx 5—phyllus foliolis basi vex productis eademque aequalibus. Cor. subbilabiata calcare nullo. Nectarium glandulae binae ad basin germinis. Antherae apice membranaceae plerisque distinctae. Stigma simplex uncinatum. Capsula trigona trivalvis medio seminiferis. Ventenat. lard. de Malmaison p. 27. Roem. et Schult. Syst. Veg. V. p. XXX.

Kelch fünfblättrig, an der Basis abgestutzt. Corolle unregelmäßig, fast zweilippig, ohne Sporn; das fünfte Corollensblatt (Lippe) größer als die übrigen, ausgehöhlt, fast kappenförmig. Zwei Nectardrüsen an der Basis des Fruchtknotens. Antheren (5) an der Spitze häutig, unterschieden. Narbe einfach, hakenförmig. Kapsel dreiseitig, dreilappig, die Klappen in der Mitte die Saamen tragend.

Pentandria Monogynia (Familie Jonidien; Violeu.)

Die Arten der Gattung *Ionidium* sind kleine Sträucher, Staudensträucher oder krautartige Pflanzen, deren Blätter wechselnd oder einander gegenüberstehen und an den Stielen mit gepaarten Aftcrblättern versehen sind. Blumenstiele winzfelständig, einzeln, sehr selten gipfelständig, einblümig, meist mit Bracteen besetzt, unter der Spitze meist gegliedert. Blumen verkehrt liegend, weiß blaulich, purpurröthlich oder violett.

Da diese Gattung zu Folge der vorstehenden Kennzeichen von *Viola* Linn. getrennt und unterschieden werden mußte, so ist nicht einzusehen warum Kurt Sprengel den Gattungsnamen *Ionidium* Vent. u. a. Auctoren mit *Solea* vertauscht hat, wahrscheinlich um seine beigelegten * und die Zahl der Synonymen zu vermehren. — Ich habe daher, bei der Beschreibung der folgenden Arten, welche hierher gehören *Solea* Spr. nicht erwähnt, dagegen die nöthigern Synonymen *J. V. Viola* gehörigen Orts angezeigt.

I. Stengel staudenstrauchig.

† Blätter wechselnd stehend.

1. *Ionidium lanatum* Hilar. Wolliges Jonidium.

Stengel staudenstrauchig, wollig. Blätter wechselnd stehend, elliptisch, stumpf, ganzrandig, mucronenspitig. Aftcrblätter trocken. Corollenslippe breit, umgekehrt-herzförmig. Waterl. Brasilien. h Blühz. Sommer.

2. *Ionidium sylvaticum* Hilar. Waldliebendes Ionidium.
Stengel staudenstrauchig, ästig, filzig. Blätter eysförmig, langgespitzt, gezähnt. Austerblätter linienförmig, ganzrandig. Blumenstiele einzeln, winkelförmig. Kelchblätter langgespitzt. Corollenlippe fast rautenförmig, mucronenspizig. Vaterl. Brasilien in Wäldern. h
3. *Ionidium bicolor* Hilar. Zweifarbiges Ionidium.
Stengel zottenhaarig. Blätter lanzettförmig, gezähnt. Austerblätter linienförmig, ganzrandig. Blumen zweifarbig, traubenständig. Corollenlippe gerundet, mucronenspizig. Vaterl. Brasilien. h
4. *Ionidium Poaya* Hilar. pl. us. brasil. t. 9.
Stengel sehr rauchhaarig, mehr oder weniger ästig. Blätter fast stiellos, fast herz-eysförmig, undeutlich gezähnt. Austerblätter trocken-rauschend. Corollenlippe groß, umgekehrt-eysförmig. Vaterl. Brasilien. h
5. *Ionidium scariosum* Hilar. (l. vilosissimum Hilar. Var.)
Stengel ästig, behaart. Blätter lanzettförmig, langgespitzt, sägerandig. Austerblätter lanzettförmig, trocken-rauschend. Kelchblätter fiederspaltig. Corollenlippe kreisrund. Vaterl. Brasilien. h
6. *Ionidium setigerum* Hilar. Borstiges Ionidium.
Stengel ästig. Blätter länglich-lanzettförmig, langgespitzt, gezähnt. Austerblätter vieltheilig, gewimpert-borstig. Kelchblätter fiederspaltig. Corollenlippe länglich, ausgehöhlt, dreisrippig. Vaterl. Brasilien. h
7. *Ionidium album* Hilar. Weißes Ionidium.
Stengel filzig. Blätter lanzettförmig, sägerandig-gewimpert. Austerblätter trocken-rauschend. Kelchblätter gewimpert-behaart. Corolle weiß. Lippe gerundet. Brasilien. h
8. *Ionidium nanum* Hilar. Zwerg-Ionidium.
Stengel niedrig, ästig, filzig. Blätter lanzettförmig gezähnt. Austerblätter linienförmig. Kelchblätter langgespitzt. Corollenlippe umgekehrt-herzförmig. Vaterl. Brasilien. h
9. *Ionidium guaraniticum* Hilar.
Stengel glatt. Blätter lanzettförmig, gezähnt. Austerblätter linienförmig. Blumen herabhängend. Kelchblätter langgespitzt. Corollenlippe kreisrund, seingekerbt. Brasilien. h
10. *Ionidium anomalum* Kunth in Humb. Nov. gen. V. t. 500.

Viola prunifolia Willd. herb.

Stengel ästig, filzig. Blätter länglich = lanzettförmig, langgespitzt, gezähnt, oben glatt, unten grau = filzig. Austerblätter breit, eiförmig, gespitzt. Corollenlippe lanzettförmig, verdünnt; zwei Antheren sind an der Basis mit hakenförmigen Anhängen versehen. Der Fruchtknoten dreisaamig. Vaterl. Neugranada. ♀ Blüthz. April.

11. Ionidium parietariaefolium Cand. Glastrautblättriges Ionidium.

Stengel ästig, filzig. Blätter ey = lanzettförmig, langgespitzt, gezähnt, fast filzig, zweifarbig. Austerblätter pfriemenspizig, wie die Kelchblätter gewimpert. Corollenlippe fast rautenförmig. Vaterl. Südamerika. ♀ Blüthz. Frühling und Sommer.

†† Foliis oppositis.

Blätter einander gegenüberstehend.

12. Ionidium atropurpureum Hilar. Schwarzpurpurrothes Ionidium.

Stengel standenstrauchig. Blätter zu 2 einander gegenüberstehend, ey = lanzettförmig, gespitzt, undeutlich sägezähnt. Austerblätter abfallend. Blumen traubenständig. Corollenlippe umgekehrthertzförmig. Vaterl. Brasilien. ♀

13. Ionidium bigibbosum Hilar. Zweihöckeriges Ionidium.

Stengel filzig. Blätter länglich = lanzettförmig, langgespitzt, undeutlich gezähnt. Kelchblätter langgespitzt, gewimpert. Corollenlippe spatelförmig, an der Basis mit zwei Höckern versehen. Vaterl. Brasilien. ♀

14. Ionidium microphyllum Kunth J. c. V. p. 374. t. 495. Kleinblättriges Ionidium.

Viola microphylla Willd. herb. Viola parvifolia Roem. et Schult. Syst. Veg.

Ein kleiner sehr ästiger Strauch, dessen Aeste mit zwei Reihen feinem Filze bekleidet sind. Blätter klein, elliptisch = länglich, gespitzt, sägerandig, wenig behaart = gewimpert. Kelch purpurrothlich. Corollenblätter purpurroth, das obere Blatt (Lippe) weiß, an der Spitze und auf dem Rücken purpurroth, inwendig roth punkirt. Vaterl. Quito, zwischen Felsen und Steinen bei Lactacunga. ♀ Blüthz. Juni.

15. Ionidium viscidulum Kunth J. c. V. p. 294. Klebriges Ionidium.

Stengel holzig, standenstrauchig, aufrecht, flebrig, 10—14

Boll hoch. Aeste und Blätter gegenüber stehend. Blätter kurzgestielt, lanzettförmig, langgespitzt, entfernt gezähnt, geadert, glatt, 18—20 Linien lang, 3—4 Linien breit. Asterblätter sehr klein, pfriemenspizig. Blumenstiele einzeln, winkelförmig, einblümig, fadenförmig, klebrig, nach der Spitze zu gegliedert, mit sehr kleinen Bracteen besetzt. Blumen 3 Linien lang, wohlriechend. Corolle weiß. Lippe eiförmig. Vaterl. Südamerika, am Orinoco, in Sandböden. h Blühzeit Juli.

II. Herbaceae. Stengel krautartig.

† Blätter wechselnd stehend.

16. *Ionidium verbenaceum* Kunth J. c. t. 497. Eisenkrautartiges Ionidium.

Stengel krautartig, aufrecht, einfach oder an der Basis ästig, 4—8 Zoll hoch, gefurcht-ästig, filzig. Die Blätter stehen wechselweise, sind kurz gestielt, eiförmig oder elliptisch, gespitzt, an der Basis herablaufend, gekerbt-gezähnt, geadert, 9—13 Linien lang, 6—7 Linien breit. Asterblätter gepaart, am Grunde der Blattstiele linien-pfriemensförmig. Blumenstiele einzeln, winkelförmig, einblümig, 2—3 Linien lang, fadenförmig, filzig, mit zwei gleichen Bracteen besetzt. Die Blumen verkehrt liegend, übergehogen, 4 Linien lang. Der Kelch fast gleich, grün, die Corolle ungleich, blaßblau. Vaterl. Mexiko in Gärten. ☉

17. *Ionidium Itubu* Kunth J. c. V. p. 380. t. 496. f. 2. Synops. 3. p. 392.

Viola Itoubou Aub. guj.

Viola Calceolaria Linn. var. ?

Stengel aufrecht, einfach oder ästig, wie die Blätter behaart-filzig. Blätter stiellos, länglich-lanzettförmig, an beiden Enden gespitzt, sägerandig. Asterblätter lanzettförmig, gezähnt. Blumenstiele winkelförmig, fadenförmig. Corollenlippe nierenförmig, gespitzt, lappenförmig. Kapsel viel-samig. Vaterl. Guiana. (Neu-Barcellona.) 4 Blühz. Juni.

†† Blätter gegenüberstehend.

18. *Ionidium urticaefolium* Mart. Nesselblättriges Ionidium.

Stengel krautartig, ästig, klebrig-filzig. Blätter gegenüberstehend, fast stiellos, fast herzförmig, gespitzt, sägerandig, glatt. Blumenstiele wenigblümig. Kelchblätter ganzrandig. Corollenlippe viereckig. Vaterl. Brasilien.

19. *Ionidium brevicaule* Mart. Kurzstengeliches Ionidium.

Stengel krautartig, einfach. Blätter gestielt, umgekehrt-eiförmig, wenig behaart. Afterblätter lanzettförmig, gerippt. Blumenstiele winkelförmig, aufrecht. Corollenlippe freistehend. Brasilien.

20. *Ionidium riparium* Kunth J. c. V. p. 378. Uferliebendes Ionidium.

Stengel krautartig, aufrecht, meist ästig, mit zweireihigem Filze bekleidet. Die untern Blätter gegenüberstehend, lanzettförmig, gefaltet-gefaltet, glatt, fast gewimpert. Afterblätter sehr klein, pfriemenspizig. Corollenlippe eiförmig, blau. Waterl. Neugranada, an Ufern der Bäche und Flüsse. ☉ Blühz. Mai — Juni.

Die übrigen Arten, welche der Gattung *Ionidium* angehören, habe ich unter *Viola* aufgeführt und vollständig beschrieben. Siehe I. Nachtrag B, 9, S. 615. *Viola* zweite Abtheilung.

Einige Arten, die Sprengel unter *Solea* angezeigt hat, z. B. *calycina*, *erecta* (*Viola* Roth.) u. a. scheinen noch einer nähern Untersuchung und Bestimmung zu bedürfen, desswegen habe ich sie nicht aufgenommen.

Kultur. Die oben beschriebenen Ionidien gedeihen am besten in warmen Häusern, denn sie kommen aus Tropenländern. Einige minder zärtliche Arten können den Sommer über im Freien stehen, dann nehmen sie auch mit Durchwinterung im Glashause vorlieb. Man zieht sie aus Saamen in warmen Beeten, und vermehrt noch außerdem die perennirenden durch Wurzeltheilung, die Staudensträucher auch durch Stecklinge.

Ionopsis pulchella Kunth f. 1. Nachtr. B, 10. Anhang S. 107. *Cybelion* Spr.!!

Iosephia rhachidifolia Salisb. ist *Drvandria nivea* R. Br. *Banksia* Labill.

Iosephinia Ventenat. Hort. malmaison. t. 67. *Iosephinie*.

Kelch fünfstheilig. Corolle glöckenförmig, die Röhre kurz, der Rand fünflappig, ungleich, fast zweilappig, der mittlere Lappen der Unterlippe länger als die übrigen. Staubfäden 4, ungleich. Narbe vierspaltig. Steinfrucht stachelig, 4—8 fächerig; in jedem Fache ein Saame.

Didynamia Angiospermia (Familie *Verbenaceae*.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren der ehemaligen französischen Kaiserin Josephine, die in Malmaison einen großen botanischen Garten anlegen ließ, der sehr viele neue und seltene Pflanzen enthielt, die Ventenat, damaliger Vorsteher des Gartens, größtentheils beschrieben und abgebildet hat s. Jard. de Malmaison etc.

1. *Josephinia Imperatricis* Vent.

Stengel mehr oder weniger ästig, wie die Blätter filzig. Blätter elliptisch = lanzettförmig, gespitzt. Kelchtheile abgekürzt. Fruchtknoten 4 — 5 fächerig. Vaterl. das südliche Neuhollland.

2. *Josephinia grandiflora* R. Brown. Großblumige Josephinie.

Stengel glatt. Blätter lanzettförmig, langgespitzt, unten filzig, die obere Kelchtheile abgekürzt. Fruchtknoten achtfächerig. Beide Arten kommen aus Neuhollland, blühen im Sommer und dienen zur Zierde der Gärten.

Iovellana Ruiz et Pav. s. Lexic. B. 5. ist *Calceolaria*.

Iovellana punctata Ruiz. s. *Calceolaria punctata* Vahl.

I. Nachtr.

Iovellana scapiflora Ruiz. Fl. per. 1. t. 18. f. 6. ist *Calceolaria plantaginea* Smith icon. ined. 1. t. 2. s.

Lexic.

Iovellana triandra Cav. ist *Calceolaria triandra* Vahl.

Ipo Rumph. 2. p. 87. Pers. Synops. 2. p. 566. s. *Mithridatea* 1. Nachtr. B. 5. S. 105.

Ipomeria Nuttall. ist *Gilia* Ruiz. et Pav.

Ipomoea Linn. Trichterwinde s. Lexic. B. 5.

Character generic. s. 1. Nachtr. B. 4. S. 127.

Ueber die Kennzeichen und Selbstständigkeit der Gattung

Ipomoea Linn. siehe meine Bemerkungen im zweiten Nachtrage B. 3. S. 89.

Pentandria Monogynia (Familie Convolvulaceen.)

Die Ipomöen sind meist krautartige Schlingpflanzen, manche auch aufrecht, strauchig oder staudenstrauchig, deren Blätter getheilt oder ungetheilt sind. Blumenstiele 1—3 oder vielblüthig. Corollentrichter fast glockenförmig, weiß, bläulich oder purpurroth. Im System sind die hierher gehörenden Arten, wie die Arten der Gattung *Convolvulus*, in folgenden Ordnungen aufgeführt.

1. *Caule volubili*. Stengel gewunden.

† *Foliis compositis*. Blätter zusammengesetzt.

Zu dieser Abtheilung gehören die im Lexikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *I. carolina*, *quamoclit*, *digitata*, *Pes tigridia*, *Nil*, *tuberosa*, *umbellata* Linn. *I. pentaphylla* Cav. *I. Papiria* R. et P. *I. heterophylla* Ort. Willd. und folgende.

1. *Ipomoea ternata* Jacq. Dreiblättrige Trichterwinde.

Convolvulus ternatus Spr. Syst. Veg. 1. p. 590.

Stengel gewunden, glatt. Blätter wechselnd stehend, gestielt, dreizählig. Blättchen eiförmig, ausgeschweift = gekerbt, glatt. Blumenstiele winkelförmig, einblüthig. Kelchtheile stumpf, flebrig. Corolle trichterförmig. Vaterl. Südamerika. ?
○ Blüthz. Sommer.

2. *Ipomoea pentaphylla* Cavanill. Fünfblättrige Trichterwinde.

Convolvulus Cavanillesii Spr.

Blätter fünfzählig = gefingert. Blättchen länglich, stumpf, ganzrandig, glatt. Blumenstiele meist dreiblüthig, kürzer als die Blätter. Corolle trichterförmig, der Rand feingekerbt. Vaterl. Indien. ?

3. *Ipomoea hirsuta* Rob. Brown. Rauhe Trichterwinde.

Convolvulus Brownei Spr. Syst. veg. 1. p. 590.

Blätter fünfzählig = gefingert, borstig = behaart. Blättchen länglich = lanzettförmig. Blumenstiele meist einblüthig, winkelförmig. Kelchtheile stumpf. Vaterl. Neuhollland. 24

4. *Ipomoea diversifolia* R. Brown. (*Convolvulus* Spr.)

Blätter meist siebenzählig, glatt. Lappen (Blättchen) linsenförmig, gezähnt = fiederspaltig, der mittlere fast ganzrandig, länger als die übrigen. Blumenstiele einblüthig. Kelchtheile gerippt, gerunzelt. Vaterl. Neuhollland. 24? Blüthz. Sommer.

†† *Foliis lobatis*. Blätter lappig.

Hierher die im Lexikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *I. triloba*, *hederaefolia*, *Nil*, *hepaticaefolia* Linn. *I. goëssypifolia* Willd. *I. villosa* (involucrata) Dietr. *parviflora*, *sanguinea* Vahl. *I. hederacea* Jacq. *I. cuspidata* R. et P. *I. scabra* Cav. und folgende.

5. *Ipomoea paniculata* R. Brown. Rispenblüthige Trichterwinde.

Convolvulus paniculatus Spr. *I. mauritiana* Jacq.

Stengel windend. Blätter herzförmig, tief siebenlappig, glatt, geadert, einfarbig. Blumenstiele rispenförmig, viel-

blüsig. Kelchtheile stumpf. Corolle trichterförmig. Watel.
Ostinden und Neuholand. 4

6. *Ipomoea trichocarpa* Elliott. (I. carolina Pursh. Convolulus trichocarpus Spr.)

Blätter herzförmig, dreilappig, zottenhaarig, die Lappen langgespitzt, an der Basis eckig, der Rand gefärbt. Blumenstiele winkelförmig, meist zweiblüsig. Kelchtheile gewimpert. Kapsel behaart, meist dreisaamig. Carolina.

7. *Ipomoea mutabilis* Ker. Bot. mag. Veränderliche Trichterwinde.

Blätter herzförmig, theils ungetheilt, theils dreilappig, oben strieglich, unten filzig. Blumenstiele vielblüsig, länger als die Blätter. Blumen doldentraubig = büschelförmig stehend. Kelchtheile linien = lanzettförmig, borstig = behaart. Corolle trichterförmig, und verändert in den verschiedenen Perioden der Entwicklung ihrer Farbe, der Rand groß, erweitert, fünfzählig. Watel. Südamerika.

8. *Ipomoea setosa* Ker. Bot. mag. Borstige Trichterwinde. Convolvulus setosus Spr. Syst. veg.

Neste, Blatt und Blumenstiele weichstachlig = borstig. Blätter herzförmig, dreilappig. Die Rippen buchtiggezähnt, unten gerippt. Blumenstiele winkelförmig, verdickt, dreitheilig = doldentraubig, länger als die Blätter. Kelchtheile verlängert, stumpf, weichstachlig. Corolle trichterförmig, der Rand fast fünflappig. Watel. Brasilien. 4 ?

9. *Ipomoea bignonioides* Ker. Bot. mag. 2645. Bignonienartige Trichterwinde.

Convolvulus bignonioides Spr.

Wurzel knollig. Stengel windend. Blätter dreilappig, die Lappen gezähnt, hinten ausliegend. Blumenstiele winkelförmig, meist dreiblüsig, herabhängend, kürzer als die Blätter. Kelchtheile fast gleich, stumpflich. Corolle trichterförmig, der Rand gekräuselt. Watel. Cayenne in Wäldern u. a. D. 4

10. *Ipomoea owariensis* Pal. Beauv. (Convolvulus Spr.)

Blätter herzförmig, fast lappig, gezähnt, scharfborstig. Blumenstiele gehäuft, winkelförmig, einblüsig, scharfborstig, kürzer als die Blätter. Kelchtheile sehr rauchhaarig. Watel. Guinea.

11. *Ipomoea Browniana* Dietr. (I. longiflora R. Br. neo Humb. f. s. Nachtr.)

Convolvulus longiflorus Spr. Syst. veg.

Blätter herzförmig, theils ungetheilt, theils dreilappig, glatt, die Lappen gespitzt. Die Blattstiele unter der Spitze mit zwei Drüsen versehen. Blumenstiele meist dreiblümig, verdickt. Kelchtheile stumpf. Corolle sehr lang, trichterförmig. Waterl. Neuholland.

††† Foliis cordatis integris.

Blätter herzförmig, ungetheilt.

Hierher die im Lexikon und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *I. lacunosa*, violacea, coccinea, bona nox, glaucifolia, hastata Linn. *I. verticillata* Forsk. Vahl. *I. leucantha*, repanda, carnosae Jacq. *I. muricata*, tricolor Cav. *I. solanifolia*, longiflora Humb. Willd. *I. acutangula*, cuspidata, glandulifer. R. et P. *I. filiformis* Desrouss. und folgende.

α. Blumenstiele 1—2—3 blümig.

12. *Ipomoea Schiedeana* Zuccar. f. Botan. Zeit. Pteris turber. 1832. p. 58.

Convolvulus Purga Wenderoth. f. Schlechtend. Linn. B. 8. p. 115.

Wurzel dick, knollig. Stengel krautartig, gewunden. Blätter herz-eiförmig, ganzrandig, auf beiden Seiten glatt. Blumenstiele 1—3 blümig, glatt. Kelchtheile ungleich, stumpf, glatt. Corolle präsentirtellerförmig, die Röhre cylindrisch, fast keulenförmig, der Rand horizontal ausgebreitet, fast fünfeckig. Staubfäden hervorragend. Waterl. Mexico, bei Chicanquiaco. 4 Blühz. Septemb.

13. *Ipomoea bengalensis* Roth. Bengalische Trichterwinde. *Convolvulus tiliaefolius* Spr.

Stengel holzig, staudenstrauchig, windend. Blätter rundlich, ganzrandig, in der Jugend filzig. Blumenstiele kürzer als die Blätter. Kelchtheile sehr stumpf. Corolle trichterförmig. Kapseln groß. Waterl. Ostindien, auch die Insel Mascaren und das Kap d. g. Hoffnung. h Blühz. Sommer.

14. *Ipomoea spicata* Kunth in Humb. Nov. gen. et sp. pl. III. p. 112.

Ipom. bracteata Cav. (nec Rudolph Willd. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 128.)

Convolvulus obvallatus Spr.

Stengel holzig, staudenstrauchig, windend. Blätter herzförmig, gespitzt, ganzrandig, glatt. Die Blumen bilden lange vielblümige Aehren, die mit ziemlich großen herz-nieren-

förmigen gefärbten Bracteen besetzt sind. Kelchtheile langgespitzt, glatt. Corolle trichterförmig, incarnatroth. Waterl. Mexiko, bei La Venta de Acaguisotta. h Blühz. April.

15. *Ipomoea alata* R. Brown. Geflügelte Trichterwinde.
Convolvulus alatus Spr.

Stengel windend. Blätter herzförmig, langgespitzt, glatt, ganzrandig. Blattstiele gerändert. Blumenstiele mit vier Fingern versehen. Bracteen abfallend. Corolle trichterförmig. Waterl. Neuhollland.

16. *Ipomoea nepalensis* Dietr. Nepalesische Trichterwinde.
Ipom. cuspidata Don. (nec Ruiz et Pav. f. 1 Nachtr.)
Convolvulus Hamiltonii Spr. Syst. veg. Cur. p. 61.

Blätter herzförmig, feingespitzt, filzig. Blumenstiele 2—4 oder vielblüthig, länger als die Blätter. Kelchtheile gespitzt, behaart. Waterl. Nepal.

17. *Ipomoea setifer* Poir. (*Convolvulus setifer* Spr.)

Blätter herzförmig, an der Basis mit Anhängen versehen, glatt, ganzrandig. Kelche groß, die Theile an der Spitze Borsten tragend. Waterl. Guiana.

18. *Ipomoea eriocarpa* R. Brown. (*Convolvulus eriocarpus* Spr.)

Blätter lanzettförmig, langgespitzt, ganzrandig, auf beiden Seiten filzig. Blumenstiele sehr kurz, winkelftändig. Kelchtheile langgespitzt, wie die Kapseln behaart. Waterl. Neuhollland. ☉

19. *Ipomoea sphaerocephala* Don. Kugelfrüchtige Trichterwinde.

Convolvulus sphaerocephalus Roxb. *C. atropurpureus* Wall.

Blätter pfeil-herzförmig, länglich, zottenhaarig. Blumen klein, purpurroth, in winkelftändige fast stiellose Köpfchen gesammelt. Kapseln kugelig. Waterl. Ostindien und Nepal. ☉

20. *Ipomoea abrupta* R. Brown. (*Convolvulus* Spr.)

Stengel und Blätter glatt. Blätter herzförmig, spitzlich, die Buchten an der Basis geschlossen. Blumenstiele einblüthig, kaum so lang als der Blattstiel. Kelchtheile gleich, oval, stumpf. Waterl. Neuhollland am Meerstrande.

β. Blumenstiele 4—5 oder vielblüthig.

21. *Ipomoea chrysoides* Ker. Bot. mag. (*Convolvulus chrysoides* Spr.)

Stengel windend. Blätter herzförmig, langgespitzt, fast

gezähnt = ausgeschweift, glatt. Blumenstiele dreiblümig, winkelfständig, kürzer als die Blätter. Kelch halbfluglich, die Lappen sehr stumpf, ausgekerbt. Corolle gelb. Vaterl. China.

22. *Ipomoea sessiliflora* Roth. (*Convolvulus sessiliflorus* Spr.)

Blätter herz = lanzettförmig, ganzrandig, behaart. Blumenstiele sehr kurz, winkelfständig. Kelchtheile pfriemenspizig, wenig kürzer als die trichterförmige Corolle, deren Einschnitte lanzettförmig sind. Kapsel behaart. Vaterl. Ostindien.

23. *Ipomoea cholulensis* Kunth Humb. Nov. gen. et sp. pl. 3. p. 112.

Blätter tief herz = eiförmig, lang und feingespitzt, oben sitzig, unten glatt. Blumenstiele winkelf- und gipfelständig, meist fünfbümig, länger als die Blätter. Corolle trichterförmig, fast scharlachroth. Vaterl. Mexiko, bei Cholula. ☉ ? Blüht daselbst im Januar.

24. *Ipomoea involucrata* Pal. Beauv. Eingehüllte Trichterwinde.

Convolvulus involucratus Spr.

Blätter herzförmig, feinspizig, ganzrandig, stängig. Blumenstiele vielblümig, winkelfständig, mit Hüllblättern versehen, die fast verbunden sind. Vaterl. Guinea. Der Speciesname *involucrata* D. wird im 1. Nachtrage B. 4. S. 130. gestrichen und statt dessen *villosa* geschrieben, dann das Synonym *Convolvulus Ruizii* Spr. beigelegt.

25. *Ipomoea dumetorum* Willd. herb. (*Convolvulus cymosus* Desrouss.)

Blätter länglich = herzförmig, gespitzt, wellenrandig, glatt. Blumenstiele verdickt, doldentraubig, winkelfständig, so lang als die Blätter. Kelchtheile stumpf, stachelspizig = gerunzelt. Vaterl. Ostindien in Hecken.

26. *Ipomoea cymosa* Meyer. Fl. essequib. p. 99. Asterdoldige Trichterwinde.

Convolvulus essequibensis Spr. Syst. veg. 1. p. 600.

Stengel windend, edig gestreift, wie die Blatt und Blumenstiele zuweilen mit einzelnen Haaren besetzt oder glatt. Blätter eiförmig, langgespitzt, ganzrandig, an der Basis tief herzförmig, glatt, 3 Zoll lang, 2½ Zoll breit. Blumenstiele winkelfständig, asterdoldentraubig, kürzer als die Blätter, nackt. Kelchtheile oval = länglich, glatt, trocken = rauschend. Corolle trichter = glockenförmig, inwendig weiß, im Grunde purpurroth,

der Rand rosenroth. Kapsel dreifächerig, dreisaamig. Waterl. Guiana, an Zäunen, blüht daselbst im December und Januar. ☉ ?

27. *Ipomoea strigosa* Roth. Striegliche Trichterwinde.
Convolvulus strigosus Spr.

Blätter herz- = lanzettförmig, ganzrandig, unten strieglich. Die Blumen bilden sehr ästige Astersolden, deren Aeste ausgesperret sind. Kelchtheile lederartig, stumpf, seidenhaarig. Corolle auswendig strieglich. Waterl. Ostindien.

28. *Ipomoea racemosa* Poir. Traubige Trichterwinde.
Convolvulus racemosus Spr.

Blätter herz- = eiförmig, stumpf, ganzrandig, unten seidenshaarig. Blumenstiele trauben- = rispenförmig. Blumenstielfchen scharfborstig. Bracteen und Kelchtheile langgespitzt. Waterl. St. Domingo. ☉

29. *Ipomoea luteola* Jacq. Gelbe Trichterwinde.

I. angulata R. et P. *Convolvulus luteolus* Spr.

Blätter herzförmig, eckig, spitzlich, glatt. Blumenstiele zweitheilig, traubig, vielblümig. Kelchtheile langgespitzt, glatt. Corolle trichterförmig, gelb, der Rand fünfeckig. Diese Art gleicht der *I. coccinea* Linn. unterscheidet sich aber durch die Blätter, Kelch und Corollen. Waterl. Südamerika und Ostindien. ☉

30. *Ipomoea congesta* R. Brown. (*Convolvulus congestus* Spr.)

Blätter herzförmig, langgespitzt, ganzrandig, stzig. Blumenstiele vielblümig, traubig- = rispenartig. Blumenstielfchen gehäuft- = gedrängt stehend. Kelchtheile pfriemenspitzig, ungleich. Waterl. Neuhoiland. Blühz. Sommer.

31. *Ipomoea urceolata* R. Brown. (*Convolvulus* Spr.)

Blätter fast nieren- = herzförmig, ganzrandig, stzig. Blumenstiele sehr kurz, astersoldentraubig. Kelchtheile stumpf, gleich, behaart. Corollenröhre krug- = fast eiförmig, der Rand trichter- = fast glockenförmig. Waterl. Neuhoiland.

+++ Foliis sagittatis hastatis.

Blätter pfeilsförmig oder spießförmig.

α. Blumenstiele 1—3 blümig.

32. *Ipomoea denticulata* R. Brown. Gezähnelte Trichterwinde.

Convolvulus denticulatus Spr.

Blätter sehr kurz gestielt, spießförmig, lanzett- = linienförmig.

mig, gespitzt, an der Basis gezähnt. Blumenstiele einblü-
mig, winkelförmig, so lang als die Blätter. Kelchtheile lang-
gespitzt, glatt. Vaterl. Ostindien und Neuholland. ○

33. *Ipomoea gracilis* R. Brown. (*Convolvulus gracilis* Spr.)

Stengel dünn, windend. Blätter spießförmig, an beiden
Enden gespitzt, an der Basis mit zwei Drüsen versehen. Kelch-
theile gespitzt, gerunzelt. Corolle trichterförmig. Kapsel meist
dreisaamig. Der Saame an der Keimwarze mit Haaren be-
setzt. Vaterl. Neuholland.

34. *Ipomoea plebeja* R. Brown. (*Convolvulus plebejus* Spr.)

Blätter spieß-herzförmig, langgespitzt, ganzrandig, filzig,
die Lappen hinten gerundet. Blumenstiele einblümig, kürzer
als die Blätter, an der Basis mit zwei Bracteen versehen.
Kelchtheile langgespitzt, behaart. Kapsel glatt. Saamen wol-
lig. Vaterl. Neuholland.

β. Blumenstiele vielblümig.

35. *Ipomoea hastigera* Kunth J. c. 3. p. III. (*Convol-
vulus* Spr.)

I. angularis Willd. herb. *I. Humboldtiana* R. et
Schult. Syst. veg. 4. p. 789.

Blätter spießförmig-dreispaltig, glatt, der mittlere Ein-
schnitt lanzettförmig, größer als die seitenständigen, die eckig
sind. Blumenstiele winkelförmig, vielblümig, viel länger als
die Blätter. Corolle trichterförmig, incarnatroth. Vaterl.
Mexiko. 4 Blüß. Sommer.

36. *Ipomoea breviflora* Meyer. Fl. essequib. p. 100.
Kurzblumige Trichterwinde.

Stengel knieartig gebogen, eckig, windend, scharfborstig.
Blätter pfeil-herzförmig, die Lappen an der Basis gerundet,
ganzrandig, auf beiden Seiten glatt. Blumenstiele winkelförmig,
doldentraubig, vielblümig, 3—4 mal kürzer als die
Blattstiele. Bracteen häutig, länglich-elliptisch, nebartig,
mucronenspitzig. Kelchtheile oval, mucronenspitzig. Corolle groß,
purpurroth. Antheren pfeilförmig, gelb. Narbe zweiknospig.
Vaterl. Guiana in Plantagen. Blüht daselbst vom November
bis Januar. ○ ?

+++ Blätter länglich, eiförmig oder linienförmig.

37. *Ipomoea Catesbaei* Meyer. J. c. p. 103. *Catesbaei-
sche* Trichterwinde.

Convolvulus esculentus Spr.

Wurzel knollig. Stengel windend. Blätter rundlich-eyförmig, gespitzt, an der Basis herzförmig, mit 10—12 parallelen Rippen versehen, ganzrandig. Blumenstiele winkelförmig, meist dreiblümig, fast doldentraubig, kürzer als die Blattsiele. Blumenstielchen purpurroth. Abbild. Catesb. Corol. 1. 1. 60. Plenk Pl. med. 1. 1. 16.

In Südamerika, wo diese perennirende Pflanze häufig wild wächst, auch in Gärten kultivirt wird, dienen die Wurzelknollen zur Speise, wie die Knollen der Batatenwinde (*Convolvulus Batatus* Linn.) s. Lexic. B. 3.

38. *Ipomoea tridentata* R. Br. Dreizählige Trichterwinde.
Convolvulus tridentatus Spr.

Blätter spatel- = lineenförmig, an der Spitze dreizählig, an der Basis ausgebreitet, gezähnt. Blumenstiele einblümig, fast kantig. Kelchtheile feinspitzig. Neuholland.

39. *Ipomoea graminea* R. Brown. Gräsartige Trichterwinde.

Stengel windend. Blätter lang- = linienförmig, mucronenspitzig, ganzrandig, glatt. Blumenstiele einblümig, winkelförmig. Kelchtheile stumpf. Corolle sehr lang. Waterland Neuholland.

II. *Caule decumbente, prostrato, repente.*

Stengel liegend, gestreckt oder kriechend.

40. *Ipomoea carnosa* R. Brown. Fleischige Trichterwinde.
Convolvulus carnosus Spr.

Stengel gestreckt. Blätter herzförmig, ungetheilt, an der Spitze ausgekerbt, fleischig, glatt. Blumenstiele meist einblümig. Kelchtheile gleichlang. Corolle trichterförmig. Waterl. Neuholland.

41. *Ipomoea incisa* R. Br. Eingeschnittene Trichterwinde.
Convolvulus incisus Spr.

Blätter fast herzförmig, eingeschnitten-gezähnt, die obern spießförmig, alle wenig behaart. Blumenstiele einblümig, winkelförmig, länger als die Blätter. Kelchtheile langgespitzt, gleich. Waterl. Neuholland.

42. *Ipomoea cinarescens* R. Brown. (*Convolvulus* Spr.)

Blätter fast herz- = eyförmig, länglich, eingeschnitten, fast seidenhaarig, graulich. Blumenstiele einblümig, zottenhaarig, länger als die Blätter. Kelchtheile gespitzt, glatt. Waterl. Neuholland.

43. *Ipo-*

43. *Ipomoea maritima* R. Brown ist *Convolvulus Pes caprae* Linn. f. Lexic. 8. 3. Hierher hat R. Brown in Prodr. Nov. Holl. auch Sprengel (Syst. veg. 1. p. 609.) folgende Synonymen gezogen: *Ipom. brasiliensis* Meyer. *I. orbicularis* Elliott. *I. crassifolia* Cav. *Convolvulus brasiliensis* Linn. und *C. maritimus* Desrouss.

44. *Ipomoea Clappertonia* R. Brown ad Denham it. p. 240.

Convolvulus Clappertonii Spr. Syst. veg. cur. p. 62.

Stengel krautartig, kriechend. Blätter pfeilsförmig, ganzrandig, glatt, die Lappen an der Basis spitzlich. Blumenstiele winkelförmig, einblümig. Vaterl. das mittlere Afrika. 24

III. Caule erecto, herbaceo vel suffruticoso.

Stengel aufrecht, krautartig oder staudenstrauchig.

45. *Ipomoea erecta* R. Brown. Aufrechte Trichterwinde.

Convolvulus erectus Spr. Syst. veg.

Stengel krautartig, aufrecht, ästig. Blätter länglich-linienförmig, stumpf, ganzrandig, filzig. Blumenstiele meist einblümig, winkelförmig. Kelchtheile gespitzt. Corolle trichterförmig. Kapsel sechsflappig. Vaterl. Neuholland. ☉

46. *Ipomoea flexuosa* Dietr. Knieartiggebogene Trichterswinde.

Convolvulus flexuosus Spr. (*Ipom. biflora* R. Br.)

Stengel an der Spitze knieartig gebogen, wie die Blätter filzig. Blätter lanzettförmig, gespitzt, ganzrandig, an der Basis stumpf. Blumenstiele meist zweiblümig. Kelchtheile eiförmig, langgespitzt. Vaterl. Neuholland. ☉ Blühzeit Sommer.

47. *Ipomoea pannosa* R. Br. (*Convolvulus pannosus* Spr.)

Stengel staudenstrauchig, ästig, fast aufrecht. Blätter länglich, stumpflich, ganzrandig, flockig (zerlumpt) filzig. Blumenstiele einblümig. Kelchtheile langgespitzt, die zwei innern doppelt kleiner als die äußern. Vaterl. Neuholland. 24 h

48. *Ipomoea semihastata* Dietr. Halbspießförmige Trichterwinde.

Ipom. heterophylla R. Br. (non Willd. f. 1 Nachtr.)

Convolvulus Brownii Spr. Syst. veg. 1. p. 612.

Stengel krautartig, aufsteigend, glattlich oder behaart. Blätter halbspießförmig, länglich, ungetheilt, stumpf, an der

Dietr. Ver. ar. Nachtr. IV. Bd.

R r

Wassr fiederspaltig, oben gezähnt. Blumenstiele einblüthig, sehr kurz. Kelchtheile lanzettförmig, langgespißt, gleich. Waterl. Neuholand. ☉ Blühz. Sommer.

49. *Ipomoea microphylla* Roth. Kleinblättrige Trichterwinde.

Stengel krautartig Blätter stiellos, klein, spatelförmig, fast lederartig, glatt. Blumenstiele fast doldentraubig. Kelchtheile pfriemenspizig. Ostindien. ☉

IV. Caule arboreo vel fruticoso.

Stengel baumartig oder strauchig.

50. *Ipomoea elliptica* Roth. Elliptische Trichterwinde.
Convolvulus ellipticus Spr.

Blätter elliptisch, oval, ganzrandig, unten filzig. Blumenstiele doldentraubig, schlaff, länger als die Blätter. Kelchtheile stumpflich, glatt. Waterl. Ostindien. h

51. *Ipomoea osyrensis* Roth. (*Convolvulus osyrensis* Heyne.)

Blätter herz-eiförmig, stumpf, oben scharf, unten mit Filze dicht bekleidet. Blumen stiellos, fast kopfförmig stehend. Bracteen länglich, länger als die filzigen Kelchtheile. Corolle trichterförmig, auswendig strieglich. Waterl. Ostindien. h

Kultur. Die Trichterwinden behandelt man in unsern Gärten eben so wie die Arten der Gattung *Convolvulus* s. Lexic. B. 3. und B. 5. S. 97. Man zieht sie aus Saamen, der von den ausländischen Arten, die in warmen Ländern wildwachsen, in warmen Beeten ausgesät wird.

Synonymen.

Ipomoea angularis Willd. herb. s. *Ipomoea setigera*

N. 35.

— *atrosanguinea* Bot. Mag. ist *Argyreia cuneata* Kunth.

— *bracteata* Cavan. s. *Ipomoea spicata* N. 14.

— *involucrata* Dietr. ist *Ipomoea villosa* s. 1. Nachtr.

— *longiflora* R. Br. s. *Ipomoea Browniana* N. 11.

— *mauritanica* Jacq. s. *Ipomoea paniculata* 1. Nachtr.

— *pandurata* Meyer. ist *Convolvulus panduratus* Lexic.

Ipomoea pentaphylla R. Br. f. *Ipomoea semihastata*

N. 48.

—— *phoenicea* R. Br. ist *Ipomoea coccinea* Linn.

f. Lexic.

—— *repens* Roth. ist *Convolvulus repens* Vahl. f.

Lexic. 2. Aufl.

—— *varia* Roth. ist *Convolvulus pubescens* Willd.

Die übrigen Synonymen, welche hierher gehören f. Lex. und 1. Nachtr.

Ipomopsis elegans Michx. f. *Gilia coronopifolia* 2.

Nachtr.

Ipomopsis inconspicua f. *Gilia parviflora* 2. Nachtr.

Iresine Linn. Jressue; Straußfeder f. Lexic. B. 5.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 134.

Blumen didisch. Kelch (Corolle Willd.) fünfblättrig, von zwei schuppenförmigen Bracteen unterstützt. ♂ Fünf Staubfäden, an der Basis krugförmig verwachsen, mit zweifächerigen Antheren gekrönt. ♀ Zwei Narben. Kapsel (Schlauchfrucht) einsamig, ringsum aufspringend.

Dioecia Pentandria Willd. Spec. pl. (Pentandria Monogynia Spr. Syst. veg.) Familie Chenopodeen.

1. *Iresine eriantha* Lam. Poiret. (*Celosia eriantha* Vahl.)

Stengel krautartig, aufrecht, wie die Aeste walzenrund, glatt. Blätter gegenüberstehend, oval, dicklich, an der Basis fast schief, glatt. Blumen geknaut und bilden eine lange sehr ästige Rispe. Kelche wollig-zottenhaarig, ohne Rippen. Vaterl. Westindien und Südamerika. ☉ ?

2. *Iresine obtusifolia* Kunth J. c. p. 198. Stumpfbältrige Iresine.

Stengel aufrecht, ästig. Aeste gefurcht = edig, wie die Blätter glatt. Blätter lanzettförmig, stumpf, fast fleischig. Blumen in verlängerte cylindrische Aehren gesammelt, die einfache ausgebreitete Rispen bilden. Kelchblätter dreirippig. Vaterl. die Insel Cuba und in Cayo Bonito.

3. *Iresine parvifolia* Kunth J. c. II. p. 159. Kleinblättrige Iresine; Straußfeder.

Eine kleine, nur 1—2 Zoll hohe Pflanze, mit ästigem, aufsteigendem Stengel, dessen Aeste und Blätter einander gegenüberstehen. Die Blätter sind eiförmig, an beiden Enden gespißt, ganzrandig, geadert, am Grunde gefranzt = flzig,

8—10 Linien lang, 6 Linien breit. Rispen einfach, gipfelförmig, fast 3 Zoll lang, ästig, ausgebreitet. Kelche, Bracteen und Stengel wie bei vorhergehender Art. Kapsel kugelförmig = zusammengebrückt, ringsum aufspringend und mit dem bleibenden Kelche umgeben. Vaterl. die Insel Cuba. ?

4. *Iresine havannensis* Kunth J. c. II. p. 99. Havannische Iresine.

Wurzel einfach, rundfaserig. Stengel ästig, kriechend. Aeste fast aufrecht, gefurcht = eckig, wie die Blätter glatt. Blätter gegenüberstehend, eiförmig, langgespitzt, gewimpert, an der Basis ganzrandig, 1 Zoll lang und drüber, 8 — 9 Linien breit. Blumen stiellos, in längliche Aehren gesammelt, die ästige, ausgebreitete, 4 — 6 Zoll lange Endrispen bilden. Bracteen eiförmig, gespitzt, wie die fast dreirippigen Kelchtheile glatt. Ein Griffel mit zwei Narben. Kapsel fast kugelförmig.

Diese Art ist mit der vorhergehenden *I. parvifolia* zunächst verwandt, und nur durch den kriechenden Stengel und durch einige andere geringe Merkmale zu unterscheiden. Vaterl. Südamerika, bei Havanna auf Schutthäufen und auf Mauern an schattigen Orten. ☉ April, Mai.

5. *Iresine verticillata* Spr. Quirsförmige Iresine.

Aeste eckig, wie die Blätter glatt. Blätter länglich-eiförmig, an beiden Enden verdünnt, fein gezähnt. Die Blumen bilden fadenförmige, quirsförmige Aehren. Kelchblätter ohne Rippen. Vaterl. Brasilien.

6. *Iresine paniculata* Spr. Rispenblüthige Iresine.

Hebanthe paniculata Mart. Nov. gen.

Stengel krautartig, sehr ästig, glatt, nur an den Knoten bartig. Blätter länglich, ganzrandig, an beiden Enden verdünnt, glatt. Blumen in Aehren gesammelt, die Rispen bilden. Kelchblätter dreirippig, lang = wollig. Brasilien. ☉ ?

7. *Iresine spicata* Spr. Aehrenförmige Iresine.

Hebanthe spicata Mart. J. c.

Stengel krautartig, ästig, oben rostfarbig = filzig. Blätter eiförmig-lanzettförmig, langgespitzt, unten scharfborstig. Die Blumen bilden gestielte Aehren, die meist zu 3 beisammen stehen. Kelchblätter fünfrippig, sehr lang, wollig. Vaterl. Brasilien.

8. *Iresine virgata* Spr. Ruthenförmige Iresine.

Hebanthe virgata Mart.

Stengel standenstreichig, ästig, aufrecht. Aeste ruthenformig. Blätter länglich = eiförmig, langgespitzt, unten rostfarbig = strieglich. Kelchblätter 3—5 rippig, wollig. Vaterl. Brasilien. h

9. *Iresine dysicha* Spr. (Trommsdorffia aurata Martius.)

Stengel krautartig, ästig, aufrecht. Blätter länglich, an beiden Enden verdünnt, unten filzig. Blumen ähren = rispensständig. Kelchblätter dreirippig, mit gelbrothen Zottenhaaren bekleidet. Vaterl. Brasilien.

Die übrigen Arten, welche dieser Gattung angehören, siehe I. Nachtrag B. 4. S. 136. eine kurze Anleitung zu ihrer Kultur.

Iresine glomerata Spr. Neue Entd. ist *Pfaffia glauca* Spr. Syst. veg. cur. p. 107.

Iresine persica et javanica Burm. ist *Aerva javanica* Juss. Illecebrum Lexic. 1. Aufl. B. 5. S. 39.

Iriarteia Ruiz. et Pav. Fl. per. *Iriarteia* = Palme.

Character generic. s. I. Nachtr. B. 4. S. 136.

Blumen polygamisch, aufgehend. Kelch und Corolle fünfblättrig. Staubfäden 12 oder mehrere, bodenständig, frei. Griffel 3. Steinfrucht (Beere) einsamig.

Polyandria Trigynia. (Familie Palmen.)

1. *Iriarteia ventricosa* Martius Nov. gen. et spec. Palm. 1. p. 37. t. 35—36.

Stoß (Stamm) aufrecht, walzenrund, über der Mitte bauchig, braun oder grau, geringelt. Die Ringe 3—4 Fuß von einander entfernt stehend. Laub (Wedel) zahlreich, glanzstän- dig, gefiedert, 8—12 Fuß lang, übergebogen, das untere abste- hend. Blättchen an der Spitze abgestutzt, schief, ausgeschweift = buchtig, anfänglich ganz, dann in kleine feil- förmige Theile gespalten. Laubstiele an der Basis scheiden- artig. Kolben dicht unter dem Laube, einzeln, selten ge- paart, 3—4 Fuß lang, vielblüthig, überhängend. Blumen- stiele 4—6 Zoll lang, dick, rundlich, geringelt, zwischen den Ringeln mit angedrückten glänzenden Haaren bekleidet. Aeste zahlreich, gleichhoch. Blumen in getrennten Geschlechtern an demselben Kolben. Die Kelchblätter der männlichen Blumen kreisrund = eiförmig, auf dem Rücken hohl und mit ausgedrück- ten Borsten besetzt. Corollenblätter viermal länger als die Kelchblätter, pergamentartig, länglich, stumpf, weiß, glatt. Staubfäden mit viereckigen, linienförmigen, ocherweißen An-

scheren gekrönt. ♀ (weibliche Blumen.) Kelchblätter freis-
rund, sehr ausgehöhlt, wie die Corollenblätter weiß. Frucht-
knoten klein, ey-fugelförmig, glatt. Steinfrucht (Beere) fast
kugelförmig. Vaterl. Brasilien in Wäldern und an Ufern der
Flüsse. Blüht daselbst im Januar. Fruchtreife October. h

2. *Iriarte exorrhiza* Mart. J. c. p. 36. t. 33—34.

Stoß (Stamm) walzenrund, gleich oder in der Mitte
verdickt, fast 1 Fuß im Durchmesser dick, braun = graulich,
mit eingedrückten Ringeln versehen, die etwa 4—6 Zoll von
einander entfernt und der Länge nach ein wenig rissig sind.
Das Laub gefiedert, ein wenig gebogen, fast horizontal ab-
stehend, 12—20 Fuß lang, die Stiele an der Basis schei-
denartig, wie bei Euterpe, in der Mitte bauchig, 5—6
Fuß lang, graulich = grün, oben ausgehöhlt. Die Blättchen
(etwa 20 Paar) abwechselnd, entferntstehend, fast horizontal
ausgebreitet, fast trapezförmig-länglich, $1\frac{1}{2}$ Fuß lang, 3—6
Zoll breit, entfernt = gezähnt, abgestutzt = abgebißen, dunkel-
grün, weiß gerippt. Kolben einzeln oder gepaart, unter den
Laubstielen von zahlreichen Scheiden umgeben, $\frac{1}{2}$ Fuß lang,
unten ästig, mit entfernt stehenden Bracteen besetzt. Blumen
ohne Bracteen, die männlichen größer als die weiblichen.
Kelch dreiblättrig, gelblich. Beere elliptisch = eiförmig. Vaterl.
Brasilien, in Wäldern und an andern Orten. h

3. *Iriarte setigera* Mart. J. c. p. 39. t. 37. Borstige
Iriarte = Palme.

Stoß (Stamm) geringelt, mehr oder weniger mit Borsten
besetzt. Das Laub 2—3 Fuß lang, gefiedert, die Stiele an
der Basis scheidenartig umfassend, 1 Spanne lang, mit Bor-
sten dicht besetzt, braun. Blättchen linien = keilsförmig, oben
abgestutzt, schief, ausgebißen = gezähnt, gestreift, nach der
Basis zu verdünnt, mit schwärzlichen Borsten besetzt, 8—12
Zoll lang, die obern länger als die untern. Der Kolben
dicht unter dem Laube, ungefähr 1 Fuß lang, zur Zeit der
Fruchtreife $1\frac{1}{2}$ Fuß lang und darüber, unten bis etwa über
die Mitte, einfach, mit häutiger Scheide bedeckt, oben ästig.
Die Nester oder Blumenstiele cylindrisch, fast 1 Fuß lang,
vielflümig, männliche und weibliche Blumen an derselben
Kolbe. Die Blumen fast wie bei voriger. Der Fruchtknoten ku-
gelrund, an der Basis mit drei Höckern versehen, dreifächer-
rig, davon 2 Fächer fehlschlagend. Die Steinfrucht (Beere)
elliptisch (in der Jugend) fast warzig, die Nuß so groß wie

eine Haselnuß. Vaterl. Cebatenses am Rande des Flusses Iapura. Blühz. Decemb. Fruchtreife März.

4. *Iriarteae andicola* Spr. ist *Ceroxylon* Humb. f. 1. Nachtr. B. 2. S. 184—187.

Kultur. Die Iriarten behandelt man in Hinsicht auf Standort, Boden und Fortpflanzung wie andere Palmen, die aus Tropenländern kommen, von denen wir jetzt viele Arten in großen Gärten in Deutschland finden, z. B. in Wien, Stuttgart, München, Berlin u. a.

- Iris* Linn. Iris; Schwertel; Schwertlilie. f. Lexic. B. 5. (Schubers Handb. t. 5. a. B. Gaertn. Sem. t. 13.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 137.

Blumenscheiden trocken, rauschend oder krautartig. Corolle sechstheilig, an der Basis röhrig, mit einem Nectarium. Die drei äußeren Theile zurückgebogen, gebartet oder glatt, die drei innern aufrecht. Griffel dreispaltig oder dreitheilig, die Theile den Corollenblättern gleichend, jeder an der Spitze mit einer Narbe versehen, die in einer Querspalte sich öffnet. Staubfäden 3, mit länglichen angedrückten Antheren gekrönt. Kapsel dreifächerig. Saamen eckig.

Triandria Monogynia (Familie Irideen.)

I. Barbatae foliis ensiformibus.

Corollen gebartet, d. h. die drei äußern Corollenblätter sind mit einer Reihe aufrechter dichtstehender Fäden besetzt, die man einen Bart nennt. Blätter schwerdtförmig.

† Scapo foliis altiori. Blätter länger als der Schaft.

In dieser ersten Abtheilung gehören die im Verikon und ersten Nachtrage B. 4. S. 137—144 beschriebenen Arten und folgende.

1. *Iris paradoxa* Steven. Sonderbarer Schwertel.

Blätter schwerdt-schelförmig, doppelt liegend, d. h. die beiden Hälften des Blattes liegen an einander. Stengel einblüthig. Corolle so groß wie bei *I. xiphioides*, die Röhre doppelt länger als der Fruchtknoten, von der Scheide eingeschlossen, die drei äußern Corollentheile abstehend, mit violettem Bart versehen, die innern aufrecht, breit. Griffeltheile violett, weiß gerändert. Vaterl. Iberien auf Hügeln, an sonnenreichen trockenen Orten. 4

2. *Iris scariosa* Willd. herb. Link. Jahrb. 1. 3. p. 71. Rauschender Schwertel.

Schaft nur 2—3 Zoll hoch, an der Spitze zweiblümig. Blätter linien-schwerdtförmig, länger als der Schaft, 3—4 Zoll lang, 3 Linien breit, langgespitzt. Blumen Scheide 2 Zoll lang, weiß, durchscheinend, trocken-rauschend, bauchig, zweiblümig. Corollentheile gleich. Vaterl. Sibirien. 24

3. *Iris nepalensis* Wallich. Bot. Reg. 818. Don. Prod. p. 54. Nepalischer Schwertel.

Wurzel gebüschelt, knollig. Blätter schiffelförmig, kürzer als der aufrechte, röhrlige, meist zweiblümige Schaft. Blumen Scheide zweiflappig, grün, so lang als die Corollenröhre. Corolle groß, sehr schön, die drei äußeren Corollentheile dunkelviolett, an der Basis weiß und gelbgestreift, der Bart weiß. Fruchtknoten stumpf, dreilantig. Diese prächtige Iris kommt aus Nepal, und perennirt auch in unsern Gärten im freien Lande; in kalten Wintern wird die Wurzel bedeckt.

4. *Iris aequiloba* Ledeb. Suppl. Sem. hort. Dorpat.

Diese Art ist der *Iris pumila* zunächst verwandt, aber unterschieden durch einen höhern Schaft, und durch die Corollentheile, welche alle gleich breit sind. Wächst in Taurien an salzigen Seen und Teichen. 24

5. *Iris tigridia* Bunge in Ledeb. Fl. aet. 1. p. 61. Getigelter Schwertel.

Wurzel gebüschelt. Blätter schwerdtförmig, dicklich, blausch-grün, länger als der einblümige, fast zusammengedrückte Schaft. Scheide zweiflappig, fast trocken. Corollenröhre 2 Zoll lang. Die drei äußeren Corollentheile länglich, an der Spitze gespalten, auswendig weiß, rosenroth gerändert, inwendig von der Mitte nach der Spitze zu violett, weiß und purpurroth gefleckt und gestreift, der Bart kammförmig, gesärbt; die innern Corollentheile blausch-rosenroth, wellenrandig. Vaterl. Altai-Gebirge. 24

6. *Iris decora* Wallich. Plant. asiat. rar. 1. p. 77. t. 86.

Wurzel knollig, fleischig, gebüschelt. Blätter lanzettförmig, langgespitzt, gerippt-gefaltet, 2—3 Fuß lang. Schaft dünn, blauschgrün, aufrecht, ein wenig länger als die Blätter, glatt, wenigblümig. Scheide zweiflappig, 3—4 Zoll lang, die Klappen linien-schiffelförmig, häutig, gerändert. Corollen dunkelblau, mit einem purpurrothen Adernetz geziert. Kapsel länglich, dreieckig. Vaterl. Nepal. 24

II. Corollis inherbibus. Corollen glatt, nicht gebartet.

Hierher die im Verikon und 1. Nachtrage B. 4. S. 145
—158. beschriebenen Arten und folgende.

† Blätter linienförmig, schmal, schelfförmig.

7. *Iris longispatha* Fischer. Bot. Mag. 2522. Langschei-
dige Iris.

Wurzel knollig. Blätter linien = lanzettförmig, schelfförmig,
lang und feingespitzt, 2—3 Fuß lang, $\frac{1}{2}$ Zoll breit. Schaft
rundlich, meist dreiblümig. Scheide dreiblättrig, die äußern
Blätter sehr lang (8—12 Zoll) sehr schmal. Corollenröhre
sehr kurz. Corollentheile glatt, (nicht gebartet) umgekehrt-
eyförmig, blau = violet, geädert, die äußern zurückgeschlagen.
Waterl. Rußland. 4

8. *Iris tenax* Douglas. Lindl. Bot. Reg. 1218. Zäh-
er Schwertel.

Blätter linien = schwertförmig, sehr zähe, steif, aufrecht,
fast so lang als der einblümige Stengel. Blumen so groß
wie die der *I. virginica* L. Corollenröhre sehr kurz, die
äußern Corollentheile eyförmig, langgespitzt, geädert. Waterl.
Californien. 4

9. *Iris bicolor* Lindl. Bot. Reg. 1404. Zweifarbig-
er Schwertel.

Stoßwurzel kurz, braun = grün, an der Spitze aufsteigend.
Blätter linien = schwertförmig, 2 Fuß lang. Schaft walzen-
rund, an der Spitze ästig, zweitheilig, vielblümig. Corolle
sehr schön, gelb, die drei äußeren Theile gerundet, schwarz,
gelbgefleckt, unten blutroth gegittert. Griffeltheile (Narben)
zweilappig. Waterl. Europa. ? h

10. *Iris caricifolia* Pall. in Willd. herb. Link. Jahrb.
1. 3. p. 72.

Blätter schelfförmig, 6 Zoll lang, 2—3 Linien breit.
Schaft nur 2 Zoll lang, zweiblümig. Scheide 2 Zoll lang,
grün. Die äußern Corollentheile länglich, an der Basis ver-
dünnt, so lang als die innern. Waterl. Sibirien. 4

11. *Iris triflora* Balbis Redout. Lili. Dreiblümiger
Schwertel.

Wurzel knollig. Blätter linien = schwertförmig, länger als
der dreiblümige Schaft. Corollentheile fast gleich, länger als
die Röhre. Griffeltheile eingeschnitten = sägerandig. Waterl.
Italien. 4

12. *Iris moraeoides* Ker. Hierher *Moraea iridioides*
Linn. f. Lexic. B. 6. M. odora Hooker. (Abbild.

Jacq. hort. Schoenbr. t. 196. Bot. mag. 693. Redout. 1. t. 45.)

13. *Iris mauritanica* Clus. Mauritanischer Schwertel.

Iris juncea Desfont. Fl. atl. 1. t. 4. (non Poir. f. Lexic.)

Zwiebel rundlich. Stengel aufrecht, 3—8 Zoll hoch, 1—3 blüthig. Blumen stiellos, gipfelständig. Blätter schmal, gestielt, pfriemenspizig, 8—12 Zoll lang. Blumenscheide 2—3 blättrig, gespitzt, ungleich. Corolle gelb, die Röhre 2 Zoll lang. Griffel so lang als die Röhre, die Theile gezähnt. Kapsel dünn, 1½ Zoll lang, dreieckig, dreiflappig. Samen klein, braun, gerunzelt. Vaterl. Mauritanien. 4

Das Synonym *I. mauritanica* wird im 1. Nachtr. B. 4. S. 155. bei *I. juncea* gestrichen.

† Blätter Schwerdtförmig.

14. *Iris notha* M. a Bieb. taur. cauc. Suppl. Gen. pl. rar. ross. t. 77.

Iris halophila Ker. Bot. mag. 875. (non Pall. f. Lexic.)

Schaft vielblüthig, so lang als die Blätter. Scheiden glattsich, sehr lang gespitzt, so lang als die Corollenröhre. Die drei äußeren Corollentheile ungebartet, niedergebogen, blau, die Platte groß, eiförmig; die innern lanzettförmig. Fruchtknoten sechseckig. Vaterl. Kaukasus. 4

15. *Iris Güldenstädtiana* Lepech. f. *I. Güldenstädtii* 1. Nachtr. B. 4. S. 149. Hierher zählt Sprengel u. A. folgende Synonymen.

I. spuria, *diluta* et *ochroleuca* M. a Bieberst. *I. desertorum* Güldenst. *I. halophila* Pall. *I. stenogyna* Cand. Die Blumen variiren mit ocherweißen, dunkeln und hochgelben, auch goldfarbenen Corollenblättern. *I. aurea* Link Enum. ist auch nur als Varietät zu betrachten. (Abbild. Bot. Mag. t. 61.)

16. *Iris lacustris* Nuttall. gen. p. 32. Teich- u. Schwertel.

Wurzel knollig. Blätter 3—5 Zoll lang, ¼ Zoll breit. Schaft nur 1—2 Zoll hoch, zusammengedrückt, einblüthig. Blumenscheide sehr kurz. Corolle blaßblau, die Theile stumpf, ausgekerbt, fast gleich, an der Basis verdünnt. Kapsel kugelförmig, dreiseitig, gerändert. Wächst an Teichen und in Sümpfen auf der Insel Huronum. 4

27 *Iris haematophylla* Fischer. Link Enum. I. p. 60.

Ledeb. alt. I. p. 58.

Iris biglumis Willd. Enum. Suppl. p. 4. (non Vahl. f. 1. Nachtr.

I. sibirica Falk. topogr. Beytr. 2. N. 61. (non Linn. Willd.)

Blätter linienförmig, viel länger als der aufrechte, meist zweiblümige Schaft. Blumen groß, langgestielt. Scheide grün, gespitzt. Corollenröhre sehr kurz, fast fehlend. Corollentheile violett, weiß-bunt. Fruchtknoten dreikantig. Diese Art ist der *I. sibirica* Linn. Willd. zunächst verwandt, unterscheidet sich aber durch einen kürzeren, soliden, nicht hohlen Schaft, durch die gegenüberstehenden Scheidenklappen und durch andere Merkmale. Vaterl. Sibirien und das Altai-Gebirge. 4

In Pflanzen-Verzeichnissen und neuen bot. Schriften sind noch einige Irisarten angezeigt, die vielleicht nur als Varietäten längst bekannter Arten zu betrachten sind, deswegen habe ich sie nicht aufgenommen.

Die Kultur der zahlreichen Arten dieser schönen Gattung habe ich schon im Lexikon angegeben und zugleich bemerkt, daß die lieblichen Blumen im Frühlinge und Sommer sich entwickeln und zur Zierde der Gärten dienen.

Zu den Synonymen, welche ich im 1. Nachtr. B. 4. S. 162. angezeigt habe, gehören noch folgende

Synonymen.

Iris amoena Redout. f. 1. Nachtr. ist *Iris aphylla* Vahl. var. f. Lexic.

— *biglumis* Willd. f. *Iris haematophylla* N. 17.

— *bohemica* Schmidt. ist *Iris aphylla* Vahl. f. Lex.

— *desertorum* Güldenst. f. *Iris Güldenstädtiana* N. 15.

— *diluta* M. a Bieb. f. *Iris Güldenstädtiana* N. 15.

— *flavescens* Red. f. 1. Nachtr. ist *Iris germanica* var.

— *gracilis* Bigel. ist *Iris prismatica* Pursh. f. 1. Nachtr.

— *halophila* Pall. f. Lexic. ist *Iris Güldenstädtiana* N. 15.

— *heterophylla* hor. par. ist *Iris Güldenstädtiana* var.

— *juncea* Brot. (non Poir.) f. Lexic. ist *Iris lusitana* Ker. f. 1. Nachtr.

— *juncea* Desf. f. *Iris mauritanica* N. 13.

- Iris lurida* Alt. f. Lexic. ist *Iris squalens* var. f. Lex.
 — *martinicensis* L. f. Lexic. ist *Moraea martinicensis* Ker.
 — *nudicaulis* Lam. f. *Iris aphylla* Vahl. f. Lexic.
 — *ochroleuca* M. B. f. *Iris Güldenstädtiana* N. 15.
 — *ochroleuca* Linn. (f. Lexic.) ist *Iris Güldenstädtiana*? N. 15.
 — *orientalis* Vahl. Thunb. Lexic. ist *Iris sibirica* L. Willd. f. Lexic.
 — *plumaria* Thunb. ist *Moraea plumaria* Ker.
 — *polystachya* Thunb. f. Lexic. ist *Moraea polystachya* Ker.
 — *ramosa* Thunb. f. Lexic. ist *Moraea ramosa* Ker.
 — *sanguinea* Don. Ker. Hornem. (f. 1 Nachtr.) ist *Iris sibirica* Linn. Willd.
 — *sibirica* Falk. (non Linn.) f. *Iris haematophylla* N. 17.
 — *Sisyrinchium* Linn. f. 1. Nachtr. ist *Moraea Sisyrinchium* Ker.
 — *spuria* M. & B. (non Linn.) f. *Iris Güldenstädtiana* N. 15.
 — *spuria* Pallas f. *Iris biglumis* 1. Nachtr.
Iribachia paniculata Mart. ist *Lisianthus paniculatus* Spr.
Iroucana gujanensis Aubl. ist *Casearia ramiflora* Vahl.
Irsiola P. Brown ist *Sicyos lacinatus* Linn.
Isachne australis Rob. Brown. ist *Panicum antipodum* Spr.
 — *meneritana* Poir. ist *Panicum meneritana* Spr.
 — *miliacea* Roth. ist *Panicum atrovirens* Trin.
 — *pulchella* Roth. ist *Panicum pulchellum* Spr.

Isaria Persoon Fung.

Die Unterlage faserig. Strunk fädig, behaart, die Sporen eingestreut. (Abbild. Ditmar in Sturm's Deutschl. Flora Abth. 3. Heft 1.)

Cryptogamia Sect. V. 4. Hyphomycetes (Fadenpilze; Keimpilze.)

1. *Isaria umbrina* Pers.

Haufen (Masse) fast gebüschelt. Haare einfach, straff. Wächst auf faulem Holze und andern Körpern.

2. *Isaria glauca* Ditmar in Sturm. fung. germ. t. 19. Wächst auf Buchenästen.

3. *Isaria clavaria* Ditmar.

Strunke keulensförmig, pulverig = flockig. Wächst auf Buchenholz. (Abbild. Sturm. fung. germ. t. 19.)

4. *Isaria calva* Link. (*Hydnum calvum* Alb. et Schw.)

Wächst auf faulem Fichtenholz.

5. *Isaria porioides* Spr. (*Ceratium porioides* Alb. et Schw. aureum Link.)

Wächst auf faulem Tannenholz.

6. *Isaria mucida* Pers.

Körper gallertartig, aufrecht, ästig, schneeweiß = graulich, die Hörnchen einfach oder ästig, gebüschelt, pulverig. (*Byssus fruticulosus* Müll. fl. dan. 718. f. 2. *Ceratium hydroides* Alb. et Schw.) Wächst auf faulem Holz.

7. *Isaria pyxidata* Spr. (*Ceratium pyxidatum* Alb. et Schw.)

Körper gallertartig, aufrecht, weiß = aschgrau, einfach, an der Spitze mit strahlenförmig stehenden Hörnern. Wächst auf faulem Holz.

8. *Isaria epiphylla* Pers.

Körper. (Strunke) keulensförmig, einfach, mehlig und bilden Rasen. Wächst auf Pappelblättern.

9. *Isaria carnea* Pers. obs. t. 2. f. 6. 7.

Wächst auf Blättern.

10. *Isaria agaricina* Pers. (*Clavaria brachiata* Batsch. fung. t. 28. f. 163.)

Körper aufrecht, steif, meist ästig, flockig. Nester horizontal abstehend.

11. *Isaria crassa* Pers.

Körper sehr einfach, dicklich, fast kegelförmig, weiß, an der Basis glatt, oben flockig. Wächst in Gräben.

12. *Isaria arachnophila* Ditmar in Sturm's fung. germ. t. 55. (*I. araneorum colore citrino* var. Schweinitz.)

Wächst auf todtten Spinnen.

13. *Isaria Sphecophila* Ditmar. (*Ceratonema Crabronis* Pers. Mycol.)14. *Isaria truncata* Pers. (*Ramaria farinosa* Holmsk.)

Isatis Linn. Waid f. Lexic. B. 5. (Gaertn. Sem. t. 142.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 164.

Kelch und Corolle vierblättrig. Kelchblätter abstehend. Schötchen (Frucht) abstehend, länglich-elliptisch, oder umgekehrt-eyherzförmig, flach, einsächerig, einsamig, zweiflügelig, die Klappen schiff- oder keilförmig, geschlossen oder aufspringend. Saamen hängend.

Tetradynamia Siliculosa (Familie Kreuzblumenpflanzen.)

† Schötchen gerändert = geflügelt, nicht aufspringend.

1. *Isatis latisiliqua* Steven, Breitschötiger Waid.

I. cappadocica Desv.

Stengel krautartig, aufrecht. Blätter herz = pfeilsförmig. Schötchen stiellös, breit, elliptisch, stumpf, mit aufstehender Narbe. Wächst in Kleinasien und am Kaukasus. 4

2. *Isatis garcinia* Cand. Hierher *Peltaria Garcini* Burm. Willd. f. Lexic. B. 7.

3. *Isatis leiocarpa* Cand.

Blätter pfeilsförmig, glatt. Schötchen stiellös, oval = länglich. Narbe aufstehend, fast abgestutzt. Vaterl. Libanon.

4. *Isatis lusitanica* Brot. (non Linn.) Portugiesischer Waid. (*I. glauca* Willd. herb.)

Blätter herz = pfeilsförmig, glatt, bläulich = grün. Schötchen umgekehrt-eyförmig, sehr stumpf, ausgekerbt. Vaterl. Portugal.

†† Schötchen gerändert = forkartig, meist aufspringend.

Hierher *I. alpina* All. *I. tinctoria* Linn. f. Lexic. B. 5. und folgende Arten.

5. *Isatis praecox* Kitaibel. pl. rar. hung. Frühblühender Waid.

Wurzel zweijährig. Stengel aufrecht. Blätter pfeilsförmig, umfassend, an der Basis mit langen gespitzten Lappen versehen. Schötchen elliptisch, an beiden Enden stumpf, am Rande lederartig = geflügelt, glatt, 6 Linien lang, 2 Linien breit. Vaterl. Ungarn. 5

6. *Isatis litoralis* Cand. Uferliebender Waid.

Stengel krautartig. Blätter pfeilsförmig. Schötchen länglich = keilsförmig, abgestutzt = ausgekerbt, glatt, die Sächer an beiden Seiten hervorstehend. Vaterl. Laurien. 5

7. *Isatis habecarpa* Cand.

Schötchen länglich = keilsförmig, an der Spitze gerundet, sehr stumpf, zottenhaarig. Laurien.

8. *Isatis canescens* Cand. Graulicher Waid, (*I. iberica* Steven.)

Corollenblätter länger als der Kelch. Schötchen spatel-
nienförmig, stumpf, am Rande und an der Basis grau-zot-
tenhaarig. Vaterl. das südliche Frankreich.

9. *Isatis oblongata* Cand. Länglicher Waid.

Schötchen elliptisch-länglich, an beiden Enden verdünnt,
glatt, fast dreirippig. Vaterl. Sibirien.

10. *Isatis orientalis* Willd. Enum. pl. p. 663. ist *Is.*
lusitanica Linn. f. Lexic.

Wurzelblätter gefurrt. Stengelblätter pfeilförmig. Schöt-
chen länglich-lanzettlinienförmig, am Rande zottenhaarig.
Wahrscheinlich gehören hierher: *Is. aleppica* Scopol. und
aegyptiaca Linn. als Varietäten. Vat. Kleinasien. ○)

Isatis campestris Stev. et banatica Link. Enum.
sind nur Varietäten von *Is. tinctoria* L.

Kultur. Die Waidarten gedeihen in unsern botanischen
Gärten unter freiem Himmel und werden aus Saamen gezo-
gen, auch pflanzen sich manche Arten durch den ausfallenden
Saamen selbst fort.

Synonymen.

Isatis alpina Vill. ist *Isatis tinctoria* f. Lexic. B. 5.

- *campestris* Stev. ist *Isatis tinctoria*.
- *cappadocica* Desv. f. *Isatis latisiliqua* N. 1.
- *glauca* Willd. herb. ist *Isatis lusitanica* Brot.

N. 4.

- *heterocarpa* Andr. ist *Isatis tinctoria* Var.
- *iberica* Stev. f. *Isatis canescens* N. 8.
- *macotica* Cand. f. *Isatis tinctoria*.
- *taurica* M. a B. f. *Isatis tinctoria*.

Isaura elliptica Commers. ist *Ceropegia Stephanotis*
R. et Sch.

Ischaemum Linn. Schuppengras.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 165.

Blüthen polygamisch, die Spindel der Aehre gegliedert.
Zwitterblüthen ungestielt. Kelch zweiblümig, lederartig. Co-
rolle zweiflappig (zweispelzig) gekranzt oder ohne Kränze.
Staubfäden 3. Saamen 1. Männliche Blüthe gestielt. Kelch
und Corolle wie bei der Zwitterblüthe, aber nur mit drei
Staubfäden versehen.

Polygamia Monoecia L. (Triandria Digynia R.
et Schult.) Familie Gräser.

† *Spica solitaria*. Aehre einzeln, einfach.

Hierher *Ischaem. melicoides* Koenig. Willd. f. 1.
Nachtr. und folgende Arten.

1. *Ischaemum fragile* Rob. Brown Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 205. Zerbrechliches Schuppengras.

Palm aufrecht, zerbrechlich. Blätter flzig, an den Gelenken bartig. Aehre einfach, einzeln stehend, walzenrund, die Spindel gegliedert, die Glieder umgekehrteiförmig, bauchig, mit häutigen trockenen Schuppen bedeckt. Die innere Kelchklappe sehr kurz. Die Corolle der Zwitterblume mit einer langen Granne versehen. Vaterl. das östliche Neuholland am Meerufer.

2. *Ischaemum laxum* R. Br. Schlaffes Schuppengras.

Die Spindel der Aehre mit Barthaaren besetzt. Kelche glatt, die Blumenstiele zweiblümig. Die Corolle der männlichen Blume ohne Granne. Vaterl. Neuholland.

3. *Ischaemum Schima* Spr. Syst. veg. (*Schima ischaemoides* Forsk.)

Blätter an der Basis zottenhaarig. Die Spindel der Aehre glatt. Kelch und Corolle der Zwitterblumen gegrannt, die Corollen der männlichen Blumen ohne Grannen.

4. *Ischaemum hirsutum* Spr. Behaartes Schuppengras.

Aehren einzeln, winkelfständig. Spindel und Blumenstiele behaart=bartig. Die Corollen der Zwitterblumen auf dem Rücken mit gegliederter Granne versehen. Vaterl. Brasilien.

†† *Spicis geminatis* s. *conjugatis*. Aehren gepaart.

Hierher die im Verisum und 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Isch. muticum*, *aristatum* Linn. *I. rugosum* Salisb. *I. harbatum*, *ciliare* Retz. *I. murinum* Forsk. und folgende.

5. *Ischaemum australe* R. Brown. Südliches Schuppengras.

Palm aufrecht, an den Knoten bartig. Blattscheiden glatt. Die Spindel der Aehre bartig. Corollenklappen glatt, mit sehr kurzen Grannen versehen. Vaterl. das südliche Neuholland.

6. *Ischaemum triticeum* R. Brown. Weizenartiges Schuppengras.

Die Knoten des Palmes bartig. Blattscheiden behaart. Die Spindel der Aehre bartig. Kelche glatt, die innere Klappe

Klappe tiefförmig, oben geflügelt. Die Corollen der Zwitterblumen gegrannt, die Granne hervorragend. Waterl. Neuholland.

7. *Ischaemum villosum* R. Br. Bottenhaariges Schuppengras.

Die Knoten des Stalks bartig. Blattstcheiden glatt. Die Spindel der Aehre bartig. Kelche glatt, die äußere Klappe an der Basis zottenhaarig. Die Corollenklappen der Zwitterblumen mit hervorstehenden Grannen versehen. Waterl. Neuholland.

8. *Ischaemum semisagittatum* Roxburgh Corom. Halbpfeilförmiges Schuppengras.

Stalk an der Basis wurzelnd. Blätter herz-lanzettförmig, scharfrandig. Die Spindel der Aehre knieartig gebogen, bartig. Die äußern Kelchklappen mit querlaufenden Runzeln versehen, am Rande punktiert, oben gewimpert. Die Corollen der Zwitterblumen gegrannt. Waterl. Bengalen. 4

9. *Ischaemum conjugatum* Roxb. Gepaartes Schuppengras.

Stalk an der Basis wurzelnd, kriechend. Blätter Schwerdtförmig. Die Spindeln der gepaarten Aehren glatt. Kelche glatt. Die Corollen der Zwitterblumen gegrannt. Waterl. Bengalen. 4

10. *Ischaemum geniculatum* Roxb. Gelenkiges, geknietes Schuppengras.

Stalk gekniet, wurzelnd. Blätter Schwerdtförmig. Die Spindel der Aehre, wie die Kelchklappen, glatt. Die Corollenklappen der Zwitterblume gegrannt. Waterl. Bengalen. 4

11. *Ischaemum tenellum* Roxb. Zartes Schuppengras.

Stalk kriechend, mit bartigen Knoten. Spindeln der Aehren gewimpert. Kelchklappen ansetzend, die äußere stumpf, fast angedrückt. Die Corolle der Zwitterblume gegrannt. Waterl. Ostindien. 4

12. *Ischaemum repens* Roxb. Kriechendes Schuppengras.

Stalk knieartig gebogen, kriechend, glatt. Blätter Schwerdtförmig, die Scheiden wenig behaart. Spindel dreiseitig, glatt. Kelchklappen gespitzt. Die Corolle der Zwitterblume unbegrannt. Waterl. die malaccensischen Inseln. 4

Synonymen.

Ischaemum Calladoa Spr. ist *Calladoa disticha* Cav. f.

1. Nachtr. B. 2.

Dietr. Lex. 2r Nachtr. IV. Bd.

S f

- Ischaemum hispidum** Kunth. ist **Andropogon virens** Spr.
 — **imberbe** Retz. f. **Ischaemum aristatum** f. Lexic.
 — **involuta** Forst. (f. 1. Nachtr.) ist **Thuarea involuta** R. Br.
 — **rothbölllioides** R. Br. ist **Andropogon**. ?
Isnardia hastata R. et Pav. ist **Ludwigia hastata** Spr.
Isnardia palustris Linn. f. Lexic. ist **Ludwigia nitida** Michx.
Insidium corallinum Ach. ist **Porophora pertusa** Spr.
 — **dactylinum** Ach. ist **Stereocaulon pileatum** Ach.
 — **laevigatum** Ach. ist **Parmelia glaucoma** Ach.
 — **phymatodes** Ach. ist **Porophora pertusa** Spr.
Ismene Amancaes Herber. ist **Pancratium Amancaes** Ker.
 — **calathinum** Herber. ist **Pancratium calathinum** Ker.
 — **nutans** Herber. ist **Pancratium nutans** Ker.
Isocarpa atriplicifolia R. Br. ist **Calydermos atriplicifolius** Spr.
Isocarpa oppositifolia R. Br. ist **Calydermos javanensis** Spr. **Calea oppositifolia** Linn. f. Lex. B. 2.
Isochilos Rob. Brown. **Isochilos**. (**Cymbidium Swartz.**)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 168.

Blumenblätter 5, meist gleich, gegen einander gebogen.
 Nectarlippe gleichförmig, an der Basis gefielt + ausgehöhlt.
 Griffelsäutchen ohne Flügel. Anthere gipfelständig.

Gynandria Monandria (Familie Orchideen.)

1. **Isochilos proliferum** R. Br. (**Cymbidium Swartz.**)
 Stengel krautartig, sprossend, wurzelnd. Blätter zweireihig, länglich + linienförmig, ausgekerbt. Blumen hiesig, winkelförmig. Bracteen meist gepaart. Vaterl. Westindien. 4
2. **Isochilos graminifolium** Kunth in Humb. et Bonpl. Nova gen. et sp. pl. 1. p. 340. t. 78.
 Stengel ästig. Blätter zweireihig, linienförmig, langgespitzt. Blumen einzeln, winkelförmig. Vaterl. Neugranada und Jamaica, blüht daselbst im November. 4
3. **Isochilos lineare** R. Brown. (**Cymbidium Swartz.**)

Stengel einfach. Blätter zweireihig, lineenförmig, ausgekerbt. Die Blumen in eine gipfelständige Aehre gesammelt. *Epidendrum lineare* Linn. gehört auch hierher. Vaterl. Westindien. 24

4. *Isochilos ramosum* Spr. ist *Epidendrum ramosum* Jacq. f. Lexic. B. 3.

Die Arten dieser Gattung sind krautartige schmarogende Pflanzen, die in ihrer Wildniß auf Baumstämmen vegetiren. Die Stengel sind mit lineenförmigen Blättern besetzt, die zwei Reihen bilden. In unsern Gärten behandelt man sie wie andere schmarogende Orchideen, die aus Tropenländern kommen. Siehe die Anleitung am Schlusse der Gattungen *Cymbidium* et *Dendrobium* 1 Nachtr. B. 2. S. 551. und S. 663.

- Isoëtes* Linn. f. Lexic. B. 5. S. 137.

Diese Gattung enthält nur eine Art: *Isoëtes lacustris* Linn. zu der folgende Varietäten gehören: *I. coromandelina* Linn. Suppl. *I. longifolia* Delil. und *I. setacea* Rosc. Sie wachsen wie die bekannte Art, in Teichen und an überschwemmten Orten in Europa, Asien und Nordamerika.

- Isolepis* Humb. R. Brown, Carmich u. a. haben die *Sp.* Sprengel und Schult. zu *Scirpus* Linn. und *Fimbristylis* Vahl. gezogen.

- *asperula* Humb. Kunth ist *Scirpus asperula* Spr. Syst. veg. I.
- *bicolor* Cramich. ist *Scirpus bicolor* Spr.
- *bufonia* Humb. Kunth ist *Scirpus bufonius* Spr.
- *capillaris* Don. ist *Scirpus Wallichianus* Spr.
- *cartilaginea* R. Br. ist *Scirpus cartilagineus* Spr.
- *cyperoides* R. Br. ist *Scirpus cyperoides* Spr.
- *exilis* Humb. f. *Fimbristylis exilis* R. et Sch. Syst. veg.
- *gracilis* Humb. f. *Fimbristylis tenuis* R. et Sch. Syst. veg.
- *hirta* Humb. f. *Fimbristylis hirta* R. et Sch. Syst. veg.
- *inundata* R. Br. ist *Scirpus inundatus* Spr.
- *junciformis* Humb. ist *Scirpus Humboldtii* Spr.

- Isolepis lanata* Humb. f. *Fimbristylis lanata* R. et Sch.
 — *lenticularis* R. Br. ist *Scirpus lenticularis* Spr.
 — *leucostachya* Humb. f. *Fimbristylis leucostachya* R. et Sch.
 — *nodosa* R. Br. ist *Scirpus nodosus* Rottb.
 — *prolifer* R. Br. ist *Scirpus prolifer* Rottb.
 — *propinqua* R. Br. ist *Scirpus inundatus* Spr.
 — *riparia* R. Br. ist *Scirpus riparius* Spr.
 — *sicula* Presl. ist *Scirpus Savii* Sebas.
 — *squarrosa* Cramich ist *Scirpus squarrosus* Spr.
 — *sulcata* Cramich ist *Scirpus Tharsii* Spr.
 — *tenuissima* Don. ist *Scirpus densus* Wallich.
 — *unioides* Delil. ist *Scirpus lateralis* Forsk.

Isopogon Rob. Brown in Linn. Soc. transact. 10. p. 71.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 168.

Kelch vierspaltig, die Röhre dünn, stehen bleibend. Vier Antheren in die ausgehöhlte Spize der Kelchtheile eingesenkt. Keine Nectardrüsen (oder Schuppen) am Fruchtboden. Narbe spindelförmig oder cylindrisch. Nuß aufsteigend, bauchig, überall mit Haaren besetzt.

Tetrandria Monogynia (Familie Protaceen; Silberfächern.)

Von dieser Gattung kennen wir jetzt 12 Arten. Es sind Sträucher aus Neu-holland, deren steife unbewaffnete Aeste mehr oder weniger sich ausbreiten. Blätter flach oder fadenförmig, einfach, ganz oder getheilt (fast doppelt dreizählig oder fiederspaltig). Blumen klein, auf einem allgemeinen Fruchtboden gesammelt, und bilden schuppige, meist kugelförmige, gipfelfständige Zapfen. In Prodr. Fl. Nov. Holl. sind die Arten in zwei Abtheilungen aufgeführt.

I. *Strobilus globosus*, squamis densissime imbricatis.

Zapfen kugelförmig. Schuppen sehr dicht stehend, wie Dachziegel über einander liegend.

Hierher die im 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Isop. anethifolius*, *formosus* *anemonifolius*, *trilobus* R. Br. und folgende.

1. *Isopogon teretifolius* R. Brown. Prodr. Nov. holl.

Ein Strauch, dessen Aeste stielig sind. Blätter meist doppelt dreizählig, fadenförmig, ohne Furchen. Blumenstiele (Zapfen) gipfelfständig. Kelchröhre seltenhaarig, die Ein-

schnitte der Länge nach mit Barthaaren besetzt. Vaterl. Neuholland. h

2. *Isopogon ceratophyllus* R. Br. Hornförmiger Isopogon.

Blätter dreispaltig oder doppeltfiederspaltig, die Einschnitte linienförmig, flach, ausgesperret = abstehend, mucronenspitig, auf beiden Seiten gestreift, die neben den Blumen stehenden an der Basis ausgebreitet. Rapsen gipfelständig, die Schuppen glatt. Neuholland auf Feldern und Hügeln, bei Port Philipp. h

3. *Isopogon longifolius* R. Br. in Linn. trans. 10. p.

73. Samtblättriger Isopogon.

Blätter linien = zungenförmig, obere ganzrandig, untere fast dreispaltig. Kelche fadenhaarig. Narbe glatt. Vaterl. das südliche Neuholland (in Lewins Land) an steinigten Orten. h

II. *Receptaculum commune planum v. convexiusculum, paleis deciduis.*

Der gemeinschaftliche Fruchtboden flach oder etwas erhaben. Spreublättchen abfallend.

4. *Isopogon cuneatus* R. Br. Keilsförmiger Isopogon.

Blätter länglich = keilsförmig, sehr stumpf. Bracteen sitzig. Kelche glatt. Narbe spindelförmig. Das südliche Neuholland. h

5. *Isopogon attenuatus* R. Br.

Neste glatt. Blätter länglich, mucronenspitig, an der Basis verdünnt. Bracteen und Hüllen glatt. Blumentöpschen einzeln stehend, die Platten des Kelches an der Spitze bartig. Vaterl. das südliche Neuholland auf Hügeln und an steinreichen Orten. h

6. *Isopogon polycephalus* R. Br. Vielköpfiger Isopogon.

Nestchen und Blätter sitzig. Blätter länglich = linienförmig, mucronenspitig. Blumentöpschen meist gehäuft stehend. Bracteen alle wollig. Narbe walzenrund. Vaterl. das südliche Neuholland, in der Nähe des Meeres, auf Hügeln und an Felsen. h

7. *Isopogon buxifolius* R. Br. Buxusblättriger Isopogon.

Stengel strauchig, sprossend. Blätter stiellos, eyförmig, gespitzt, die Spitze zurückgekrümmt. Blumentöpschen einzeln stehend, von den Blättern gleichsam verschauzt. Bracteen pfriemenspitig. Narbe spindelförmig. Vaterl. das südliche Neuholland, auf Haldeplätzen und an niedern feuchten Orten. h

8. *Isopogon axillaris* R. Br. Isopogon mit winkelfständigen Blumenköpfchen.

Blätter keil- zungenförmig, mucronenspitzlich. Blumenköpfchen winkelfständig, wenigblättrig. Bracteen eysförmig, wie Dachziegel über einander liegend. Die Platten (Einschnitte) des Kelches der Länge nach mit Barthaaren besetzt. Narbe spindelförmig. Vaterl. das südliche Neuholland, auf Hügel und an Felsen. h

Kultur der Isopogonarten, die wie die übrigen Proteaceen in unsern Glashäusern überwintert werden, s. 1. Nachtrag B. 4. S. 170. Dasselbst lese man bei jedem Speciesnamen us fl. um.

Isopyrum Linn. *Isopyrum* f. Lexic. B. 5. (Schluter Handb. t. 133.)

Kelch corollinisch, fünfblättrig. Corollenblätter (Nectarium Linn.) 5, röhrig, zweilappig. Staubfäden zahlreich, bodenständig. Balgkapseln zahlreich, gekrümmf, vielSaamig.

Polvandria Polygynia (Dodecandria Spr.) Familie Ranunculaceen.)

1. *Isopyrum adoxoides* Cand. Bisamkrautartiges Isopyrum.

Wurzel knollig, an der Basis der Blattstiele einfach. Blätter dreizählig. Blättchen dreispaltig, die Einschnitte stumpf, dreizählig. Blumen stumpflich. Kapseln meist zu dreien. Vaterl. das mittlere China und Japan. 24

2. *Isopyrum grandiflorum* Fisch. Cand. Großblumiges Isopyrum.

Wurzel ästig, knollig? Schaft einblüthig. Blume groß, stumpf. Vaterl. Imaus (Gebirge in der großen Tartarey.)

Isopyrum fumarioides et *thalictroides* Linn. f. Lexic. B. 5.

Isopyrum aquilegioides L. f. Lexic. ist *Isopyrum thalictroides* Var.

Iso stigma Schlechtend. Linn. B. 6. Heft 3. S. 513.

Es sind daselbst drei Arten aufgeführt: *Iso stigma simplicifolium*, *speciosum* et *peucedanifolium*. Die letztere hat Sprengel (Syst. veg.) unter *Tragoceros* Kunth aufgenommen und beschrieben. Da die von Kunth und Schlechtend. aufgestellten Charact. generic. nur wenig von einander abzuweichen scheinen, so können, nach meinem Dafürhalten, beide Gattungen verbunden werden f. *Tragoceros* im 2. Nachtrage.

Isotoma axillaris Lindl. in Bot. reg. 964. ist *Lobelia Senecionis* Spr.

Isotypus Kunth ist *Seris onoseroides* Willd.

Itea Linn. *Itea* f. Lexic. B. 5. (Gaertn. de fruct. t. 209.)

Kelch klein, fünfspaltig, gefärbt. Fünf lanzettförmige Corollenblätter, die mit den Staubfäden in die Wand des Kelches eingefügt sind. Kapsel eiförmig, zweiflappig. Samen klein.

Pentandria Monogynia (Familie Ericaceen.)

1. *Itea virginica* Linn. Virginische *Itea*, siehe die vollständige Beschreibung dieses Strauches im Lexikon B. 5. S. 139. Dasselbst lese man *I. virginica* f. *Cyrilla* S. denn *Itea Cyrilla* Swartz ist *Cyrilla antillana* Michx. f. 2. Nachtr. B. 3. S. 296. Zugleich kann auch das daselbst angeführte Synonym; *Cyrilla racemiflora* Jacq. die zur *Cyrilla caroliniana* gehört, gestrichen werden.

2. *Itea umbellata* Roxb. Doldenblüthige *Itea*.

Stengel strauchig. Blätter wechselnd stehend, länglich, ganzrandig, glatt. Blumen dolden = rispenständig. Vaterl. die Insel Malacca. h

3. *Itea macrophylla* Schlechtend. Großblättrige *Itea*.

Blätter wechselnd stehend, elliptisch = länglich, langgespitzt, sägeartig gezähnt, lederartig, glatt, glänzend. Blumen in winkelförmige büschelförmige Trauben gesammelt. Vaterl. Ostindien. ? h

Iubaea Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. 1. p. 308. Iubäapalme.

Blumen hermaphroditisch. Kelch doppelt, beide dreitheilig, der äußere klein. Staubfäden zahlreich, bodenständig. Griffel 3. Steinfrucht umgekehrteiförmig. Ruß mit drei Löchern versehen.

Polyandria Trigynia (Familie Palmen.)

1. *Iubaea spectabilis* Kunth J. c. t. 96. Aushuliche Iubäapalme.

Eine hohe und prächtige Palme, deren Stod (Stamm) ziemlich dick und unbewaffnet ist. Laub (Wedel) gefiedert. Blättchen linienförmig. Kössen ästig, vielblüthig. Scheide einblättrig. Blumen gestielt. Vaterl. Chili, bei Popayan, wird daselbst auch in Gärten kultivirt und ist unter dem Na-

men Coquito de Chili bekannt. h Blüth. Octob. und November.

In unsern Gärten behandelt man sie, in Hinsicht auf Standort und Boden wie andere Palmen, die aus warmen Ländern kommen.

Jürgensia anguifera Spr. Syst. veg. 3. p. 50. ist *Medusa anguifera* Lour. Pers. f. 1. Nachtrag. B. 4. S. 601.

Juglans Linn. Walnuß. (Schubers Handb. t. 30. Gaertn. Sem. t. 89.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 171.

Blüthen monöcisch. Männliche in cylindrischen Köpfen, deren Schuppen wie Dachziegeln über einander liegen und gezähnt sind; 4—8 sehr kurze Staubfäden, mit doppelten Antheren gekrönt. Weibliche einzeln, auch zu 2—3 oder mehrere beisammen stehend. Kelch vierzählig. Corolle vierspaltig. Griffel 2. Steinfrucht lederartig. Nuß gefurcht.

Monoecia Declinia (Familie Amentaceen.)

Die Arten, welche zu dieser Gattung gehören habe ich im Lexikon und im 1. Nachtr. nach Michx. hist. arb. amer. beschrieben, aber im Nachtrage auch einige aufgenommen, die nach einer genauern Untersuchung der Blüthen z. nur als Varietäten zu betrachten sind, obgleich die Abbildungen in Michx. hist. arb. einige Verschiedenheiten und Merkmale zu erkennen geben; sie sind unten angezeigt.

Die Gattung *Juglans* hat Nuttall getrennt und 9 Arten unter *Carya* aufgeführt. Den Gattungscharakter hat er so gestellt: Flores amentacei. ♂ Squamae 3partitae. Cor. o Stamina 4—6. ♀ Cal. superus 4fidus. Stigma 4lobum. Fructus 4valvis. Nux 4angula.

Blüthen (männliche) in Köpfen. Schuppen dreitheilig. Corolle fehlt. Staubfäden 4—6. ♀ (weibliche) Kelch oben 4spaltig. Narbe vierlappig. Frucht vierlappig. Nuß vierseitig.

Hierher gehören nun die Arten, deren Blüthen und Früchte den vorstehenden Charakter entsprechen. Es sind folgende:

- Juglans amara* Michx. Willd. f. Lexic. ist *Carya amara* Nutt.
 — *aquatica* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Carya aquatica* Nutt.
 — *cathartica* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Juglans cinerea* var. f. 1, Nachtr.

Iuglans compressa Willd. Gaertn. f. Lexic. ist *Carya* alba Nutt.

— *glabra* Willd. f. Lexic. ist *Carya porcina* Nutt.

— *lacinosa* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Carya sulcata* Nutt.

— *myristicaeformis* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Carya myristicaeformis* Nutt.

— *olivaeformis* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Carya olivaeformis* Nutt.

— *porcina* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Carya porcina* Nutt.

— *pyriforme* Mühlenb. ist *Carya porcina* Nutt.

— *squamosa* Poir. f. 1. Nachtr. ist *Carya alba* Nutt.

— *sulcata* Willd. ist *Carya sulcata* Nutt.

— *tomentosa* Michx. I, alba Linn. ist *Carya tomentosa* Nutt.

Die übrigen Synonymen f. 1. Nachtr. B. 4. S. 177.

Zur Gattung *Carya* Nuttall. gehören noch zwei neue Arten.

1. *Carya microcarpa* Nutt. Kleinfrüchtige *Carpanus*.

Blätter gefiedert. Blättchen länglich-lanzettförmig, lang-
gespitzt, sägerandig, auf beiden Seiten glatt, unten drüsig-
punktirt, an den Winkeln der Rippen mit zarten Barthaaren
besetzt. Früchte kugelförmig. Nüsse viereckig, abgestutzt. Wa-
terl. Pensylvanien. h

2. *Carya integrifolia* Spreng. (*Hicorius integrifolius* Rafin.)

Blätter meist fünfpaarig gefiedert. Blättchen lanzettförmig,
ganzrandig. Nesselchen und Blattstiele filzig. Nüsse viereckig.
Waterl. Louisiana.

Iuncus Linn. Simse f. Lexic. B. 5. 1. Nachtr. B. 4.

Kelch sechstheilig oder sechsblättrig, offen stehend, an der
Basis mit zwei Bracteen versehen. Staubfäden 3—6, kurz.
Griffel 3. Narben 3, gefiedert. Kapsel dreifächerig, dreis-
klappig, viel-saamig.

Hexandria Monogynia (Familie Juncen.)

Die Gattung *Iuncus* enthält jetzt über 50 Arten, welche
Dr. Dr. Meyer, (Professor der Botanik in Königsberg) in
einem besondern Werke: Monogr. Iunc. abgehandelt und
beschrieben hat. Es sind krautartige Pflanzen (Halbgräser),
deren Stämme nackt oder mit Blättern besetzt sind. Blumen
in Doldentrauben oder Rispen, seitens oder gipfelförmig. Im

- Ischaemum hispidum* Kunth. ist *Andropogon virens* Spr.
 — imberbe Retz. f. *Ischaemum aristatum* f. Lexic.
 — involuta Forst. (f. 1. Nachtr.) ist *Thuarea involuta* R. Br.
 — rotthöllioides R. Br. ist *Andropogon* ?
Isnardia hastata R. et Pav. ist *Ludwigia hastata* Spr.
Isnardia palustris Linn. f. Lexic. ist *Ludwigia nitida* Michx.
Insidium corallinum Ach. ist *Porophora pertusa* Spr.
 — dactylinum Ach. ist *Stereocaulon pileatum* Ach.
 — laevigatum Ach. ist *Parmelia glaucoma* Ach.
 — phymatodes Ach. ist *Porophora pertusa* Spr.
Ismene Amancaës Herber. ist *Pancratium Amancaës* Ker.
 — calathinum Herber. ist *Pancratium calathinum* Ker.
 — nutans Herber. ist *Pancratium nutans* Ker.
Isocarpa atriplicifolia R. Br. ist *Calydermos atriplicifolius* Spr.
Isocarpa oppositifolia R. Br. ist *Calydermos javanensis* Spr. *Calea oppositifolia* Linn. f. Lex. B. 2.
Isochilos Rob. Brown. *Isochilos*. (*Cymbidium* Swartz.)
 Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 168.
 Blumenblätter 5, meist gleich, gegen einander gebogen.
 Nectarlippe gleichförmig, an der Basis gefielt = ausgehöhlt.
 Griffelsäulchen ohne Flügel. Anthere gipfelständig.
 Gynandria Monandria (Familie Orchideen.)
 1. *Isochilos proliferum* R. Br. (*Cymbidium* Swartz.)
 Stengel krautartig, sprossend, wurzelnd. Blätter zweireihig, länglich = linienförmig, ausgekerbt. Blumen stiellos, winkelförmig. Bracteen meist gepaart. Waterl. Westindien. 4
 2. *Isochilos graminifolium* Kunth in Humb. et Bonpl. Nova gen. et sp. pl. 1. p. 340. t. 78.
 Stengel ästig. Blätter zweireihig, linienförmig, langgespißt. Blumen einzeln, winkelförmig. Waterl. Neugranada und Jamaica, blüht daselbst im November. 4
 3. *Isochilos lineare* R. Brown. (*Cymbidium lineare* Swartz.)

Stengel einfach. Blätter zweireihig, linienförmig, aus-
gekerbt. Die Blumen in eine gipfelsändige Aehre gesam-
melt. *Epidendrum lineare* Linn. gehört auch hierher.
Baterl. Westindien. 24

4. *Ischilos ramosum* Spr. ist *Epidendrum ramosum*
Jacq. f. Lexic. B. 3.

Die Arten dieser Gattung sind krautartige schmarogende
Pflanzen, die in ihrer Wildniß auf Baumstämmen vegetiren.
Die Stengel sind mit linienförmigen Blättern besetzt, die
zwei Reihen bilden. In unsern Gärten behandelt man sie
wie andere schmarogende Orchideen, die aus Tropenländern
kommen. Siehe die Anleitung am Schlusse der Gattungen
Cymbidium et *Dendrobium* 1 Nachtr. B. 2. S. 551.
und S. 663.

Isoëtes Linn. f. Lexic. B. 5. S. 137.

Diese Gattung enthält nur eine Art: *Isoëtes lacustris*
Linn. zu der folgende Varietäten gehören: *I. coroman-*
delina Linn. Suppl. *I. longifolia* Delil. und *I. seta-*
cea Rosc. Sie wachsen wie die bekannte Art, in Teichen
und an überschwemmten Orten in Europa, Asien und Nord-
amerika.

Isolepis Humb. R. Brown. Carmich u. a. haben die §§.
Sprengel und Schult. zu *Scirpus* Linn. und *Fim-*
bristylis Vahl. gezogen.

— *asperula* Humb. Kunth ist *Scirpus asperula*
Spr. Syst. veg. 1.

— *bicolor* Cramich. ist *Scirpus bicolor* Spr.

— *bufonia* Humb. Kunth ist *Scirpus bufonius*
Spr.

— *capillaris* Don. ist *Scirpus Wallichianus* Spr.

— *cartilaginea* R. Br. ist *Scirpus cartilagineus*
Spr.

— *cyperoides* R. Br. ist *Scirpus cyperoides* Spr.

— *exilis* Humb. f. *Fimbristylis exilis* R. et Sch.
Syst. veg.

— *gracilis* Humb. f. *Fimbristylis tenuis* R. et
Sch. Syst. veg.

— *hirta* Humb. f. *Fimbristylis hirta* R. et Sch.
Syst. veg.

— *inundata* R. Br. ist *Scirpus inundatus* Spr.

— *junciformis* Humb. ist *Scirpus Humboldtii* Spr.

- Isolepis lanata* Humb. f. *Fimbristylis lanata* R. et Sch.
 — *lenticularis* R. Br. ist *Scirpus lenticularis* Spr.
 — *leucostachya* Humb. f. *Fimbristylis leucostachya* R. et Sch.
 — *nodosa* R. Br. ist *Scirpus nodosus* Rottb.
 — *prolifer* R. Br. ist *Scirpus prolifer* Rottb.
 — *propinqua* R. Br. ist *Scirpus inundatus* Spr.
 — *riparia* R. Br. ist *Scirpus riparius* Spr.
 — *sicula* Presl. ist *Scirpus Savii* Sehaft.
 — *squarrosa* Cramich ist *Scirpus squarrosus* Spr.
 — *sulcata* Cramich ist *Scirpus Tharsii* Spr.
 — *tenuissima* Don. ist *Scirpus densus* Wallich.
 — *unioides* Delil. ist *Scirpus lateralis* Forsk.

Isopogon Rob. Brown in Linn. Soc. transact. 10. p. 71.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 168.

Kelch vierspaltig, die Röhre dünn, stehen bleibend. Vier Antheren in die ausgehöhlte Spize der Kelchtheile eingesenkt. Keine Nectardrüsen (oder Schuppen) am Fruchtboden. Narbe spindelförmig oder cylindrisch. Nuß auswendig, bauchig, überall mit Haaren bekleidet.

Tetrandria Monogynia (Familie Protaceen; Silberfischen.)

Von dieser Gattung kennen wir jetzt 12 Arten. Es sind Sträucher aus Neu-holland, deren steife unbewaffnete Aeste mehr oder weniger sich ausbreiten. Blätter flach oder fadenförmig, einfach, ganz oder getheilt (fast doppelt dreizählig oder fiederspaltig). Blumen klein, auf einem allgemeinen Fruchtboden gesammelt, und bilden schuppige, meist kugelförmige, gipfelfständige Zapfen. In Prodr. Fl. Nov. Holl. sind die Arten in zwei Abtheilungen aufgeführt.

I. *Strobilus globosus, squamis densissime imbricatis.*

Zapfen kugelförmig. Schuppen sehr dicht stehend, wie Dachziegeln über einander liegend.

Hierher die im 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Isop. anethifolius, formosus anemoneifolius, trilobus* R. Br. und folgende.

1. *Isopogon teretifolius* R. Brown. Prodr. Nov. holl.

Ein Strauch, dessen Aeste stielig sind. Blätter meist doppelt dreizählig, fadenförmig, ohne Furchen. Blumenköpfchen (Zapfen) gipfelfständig. Kelchröhre seltenhaarig, die Ein-

schnitte der Länge nach mit Barthaaren besetzt. Vaterl. Neuholland. h

2. *Isopogon teratophyllus* R. Br. Hornförmiger Isopogon.

Blätter dreispaltig oder doppeltfiederspaltig, die Einschnitte linienförmig, flach, ausgesperret = abstehend, mucronenspizig, auf beiden Seiten gestreift, die neben den Blumen stehenden an der Basis ausgebreitet. Hapsen gipfelständig, die Schuppen glatt. Neuholland auf Feldern und Hügeln, bei Port Philipp. h

3. *Isopogon longifolius* R. Br. in Linn. trans. 10. p.

73. Langblättriger Isopogon.

Blätter linien = zungenförmig, obere ganzrandig, untere fast dreispaltig. Kelche feidenhaarig. Narbe glatt. Vaterl. das südliche Neuholland (in Lewins Land) an steinigten Orten. h

II. *Receptaculum commune planum v. convexiusculum, paleis deciduis.*

Der gemeinschaftliche Fruchtboden flach oder etwas erhaben. Spreublättchen abfallend.

4. *Isopogon cuneatus* R. Br. Keilsförmiger Isopogon.

Blätter länglich = keilsförmig, sehr stumpf. Bracteen filzig. Kelche glatt. Narbe spindelförmig. Das südliche Neuholland. h

5. *Isopogon attenuatus* R. Br.

Neste glatt. Blätter länglich, mucronenspizig, an der Basis verdünnt. Bracteen und Hüllen glatt. Blumentöpfchen einzeln stehend, die Platten des Kelches an der Spitze bartig. Vaterl. das südliche Neuholland auf Hügeln und an steinreichen Orten. h

6. *Isopogon polycephalus* R. Br. Vielköpfiger Isopogon.

Nestchen und Blätter filzig. Blätter länglich = linienförmig, mucronenspizig. Blumentöpfchen meist gehäuft stehend. Bracteen alle wollig. Narbe walzenrund. Vaterl. das südliche Neuholland, in der Nähe des Meeres, auf Hügeln und auf Felsen. h

7. *Isopogon buxifolius* R. Br. Buxusblättriger Isopogon.

Stengel strauchig, sprossend. Blätter stiellos, eiförmig, gespitzt, die Spitze zurückgekrümmt. Blumentöpfchen einzeln stehend, von den Blättern gleichsam verschauelt. Bracteen pfriemenspizig. Narbe spindelförmig. Vaterl. das südliche Neuholland, auf Haldeplätzen und an niedrigen feuchten Orten. h

8. *Isopogon axillaris* R. Br. Isopogon mit winkelfständigen Blütenköpfchen.

Blätter keil-zungenförmig, mucronenspizlich. Blütenköpfchen winkelfständig, wenigblättrig. Bracteen eysförmig, wie Dachziegeln über einander liegend. Die Platten (Einschnitte) des Kelches der Länge nach mit Warthaaren besetzt. Narbe spindelförmig. Waterl. das südliche Neuholland, auf Felsen und an Felsen. h

Kultur der Isopogonarten, die wie die übrigen Proteaceen in unsern Glashäusern überwintert werden, s. 1. Nachtrag B. 4. S. 170. Dasselbst lese man bei jedem Speciesnamen us R. um.

Isopyrum Linn. Isopyrum f. Lexic. B. 5. (Schubert Handb. t. 153.)

Kelch corollinisch, fünfblättrig. Corollenblätter (Nectarien Linn.) 5, röhrig, zweilippig. Staubfäden zahlreich, bodenständig. Balgkapseln zahlreich, gekrümmt, viel-saamig.

Pol-andria Polygynia (Dodecandria Spr.) Familie Ranunculaceen.)

1. *Isopyrum adoxoides* Cand. Bisamkranzartiges Isopyrum.

Wurzel knollig, an der Basis der Blattstiele einfach. Blätter dreizählig. Blättchen dreispaltig, die Einschnitte stumpf, dreizähnia. Blumen stumpflich. Kapseln meist zu dreien. Waterl. das mittlere China und Japan. 24

2. *Isopyrum grandiflorum* Fisch. Cand. Großblumiges Isopyrum.

Wurzel ästig, knollig? Schaft einblümig. Blume groß, stumpf. Waterl. Imaus (Gebirge in der großen Tartarey.)

Isopyrum fumarioides et *thalictroides* Linn. f. Lexic. B. 5.

Isopyrum aquilegioides L. f. Lexic. ist *Isopyrum thalictroides* Var.

Iso stigma Schlechtend. Linn. B. 6. Heft 3. S. 513.

Es sind daselbst drei Arten aufgeführt: *Iso stigma simplicifolium*, *speciosum* et *peucedanifolium*. Die letztere hat Sprengel (Syst. veg.) unter *Tragoceros* Kunth aufgenommen und beschrieben. Da die von Kunth und Schlechtend. aufgestellten Charact. generic. nur wenig von einander abzuweichen scheinen, so können, nach meinem Dafürhalten, beide Gattungen verbunden werden s. *Tragoceros* im 2. Nachtrage.

Isotoma axillaris Lindl. in Bot. reg. 964. ist *Lobelia Senecionis* Spr.

Isotypus Kunth ist *Seris onoseroides* Willd.

Itea Linn. *Itea* f. Lexic. B. 5. (Caertn. de fruct. t. 209.)

Kelch klein, fünfspaltig, gefärbt. Fünf lanzettförmige Corollenblätter, die mit den Staubfäden in die Wand des Kelches eingefügt sind. Kapsel eiförmig, zweiflappig. Saamen klein.

Pentandria Monogynia (Familie Ericceen.)

1. *Itea virginica* Linn. Virginische *Itea*, siehe die vollständige Beschreibung dieses Strauches im Lexikon B. 5. S. 139. Dasselbst lese man *I. virginica* f. *Cyrilla* S. denn *Itea Cyrilla* Swartz ist *Cyrilla antillana* Michx. f. 2. Nachtr. B. 3. S. 296. Zugleich kann auch das daselbst angeführte Synonym; *Cyrilla racemiflora* Jacq. die zur *Cyrilla caroliniana* gehört, ausgestrichen werden.

2. *Itea umbellata* Roxb. Doldenblüthige *Itea*.

Stengel strauchig. Blätter wechselnd stehend, länglich, ganzrandig, glatt. Blumen dolden = rispenständig. Waterl. die Insel Malacca. ♀

3. *Itea macrophylla* Schlechtend. Großblättrige *Itea*.

Blätter wechselnd stehend, elliptisch = länglich, langgespitzt, sägeartig gezähnt, lederartig, glatt, glänzend. Blumen in winkelförmige büschelförmige Trauben gesammelt, Waterl. Ostindien. ? ♀

Iubaea Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. 1. p. 308. Iubaapalme.

Blumen herznaphroditisch. Kelch doppelt, beide dreitheilig, der äußere klein. Staubfäden zahlreich, bodenständig. Griffel 3. Steinfrucht umgekehrteiförmig. Nuß mit drei Höchern versehen.

Polyandria Trigynia (Familie Palmen.)

1. *Iubaea spectabilis* Kunth J. c. t. 96. Ansehnliche Iubaapalme.

Eine hohe und prächtige Palme, deren Stod (Stamm) ziemlich dick und unbewaffnet ist. Laub (Wedel) gefiedert. Blättchen lineenförmig. Kolben ästig, vielblümig. Scheide eibläutrig. Blumen gestielt. Waterl. Chili, bei Popayan, wird daselbst auch in Gärten kultivirt und ist unter dem Na-

men Coquito de Chili bekannt. h Blühz. Oktob. und November.

In unsern Gärten behandelt man sie, in Hinsicht auf Standort und Boden wie andere Palmen, die aus warmen Ländern kommen.

Iürgensia anguifera Spr. Syst. veg. 3. p. 90. ist *Medusa anguifera* Lour. Pers. f. 1. Nachtrag. B. 4. S. 601.

Juglans Linn. Wallnuß. (Schubers Handb. t. 30. Gaertn. Sem. t. 89.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 171.

Blüthen monöcisch. Männliche in cylindrischen Köpfen, deren Schuppen wie Dachziegeln über einander liegen und gezähnt sind; 4—8 sehr kurze Staubfäden, mit doppelten Antheren gekrönt. Weibliche einzeln, auch zu 2—3 oder mehrere beisammen stehend. Kelch vierzählig. Corolle vierspaltig. Griffel 2. Steinfrucht lederartig. Nuß gefurcht.

Monoecia Declinia (Familie Amentaceen.)

Die Arten, welche zu dieser Gattung gehören habe ich im Lexikon und im I. Nachtr. nach Michx. hist. arb. amer. beschrieben, aber im Nachtrage auch einige aufgenommen, die nach einer genauern Untersuchung der Blüthen z. nur als Varietäten zu betrachten sind, obgleich die Abbildungen in Michx. hist. arb. einige Verschiedenheiten und Merkmale zu erkennen geben; sie sind unten angezeigt.

Die Gattung *Juglans* hat Nuttall getrennt und 9 Arten unter *Carya* aufgeführt. Den Gattungscharakter hat er so gestellt: Flores amentacei. ♂ Squamae 3partitae. Cor. o Stamina 4—6. ♀ Cal. superus 4fidus. Stigma globum. Fructus 4valvis. Nux 4angula.

Blüthen (männliche) in Köpfen. Schuppen dreitheilig. Corolle fehlt. Staubfäden 4—6. ♀ (weibliche) Kelch oben 4spaltig. Narbe vierlappig. Frucht vierlappig. Nuß vierseitig.

Hierher gehören nun die Arten, deren Blüthen und Früchte den vorstehenden Charakter entsprechen. Es sind folgende:

- Juglans amara* Michx. Willd. f. Lexic. ist *Carya amara* Nutt.
 — *aquatica* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Carya aquatica* Nutt.
 — *cathartica* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Juglans cinerea* var. f. 1. Nachtr.

Iuglans compressa Willd. Gaertn. f. Lexic. ist *Carya*
alba Nutt.

— *glabra* Willd. f. Lexic. ist *Carya porcina* Nutt.

— *lacinosa* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Carya sulcata*
Nutt.

— *myristicaeformis* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Carya*
myristicaeformis Nutt.

— *olivaeformis* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Carya oli-*
vaeformis Nutt.

— *porcina* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Carya porcina*
Nutt.

— *pyriforme* Mühlenb. ist *Carya porcina* Nutt.

— *squamosa* Poir. f. 1. Nachtr. ist *Carya alba* Nutt.

— *sulcata* Willd. ist *Carya sulcata* Nutt.

— *tomentosa* Michx. I, alba Linn. ist *Carya to-*
tomentosa Nutt.

Die übrigen Synonymen f. 1. Nachtr. B. 4. S. 177.

Zur Gattung *Carya* Nuttall. gehören noch zwei neue
Arten.

1. *Carya microcarpa* Nutt. Kleinfrüchtige *Carpanus*.

Blätter gefiedert. Blättchen länglich-lanzettförmig, lang-
gespitzt, sägerandig, auf beiden Seiten glatt, unten drüsig-
punktirt, an den Winkeln der Rippen mit zarten Barthaaren
besetzt. Früchte kugelförmig. Nüsse viereckig, abgestutzt. Was-
terl. Pensylvanien. h

2. *Carya integrifolia* Spreng. (*Hicorius integrifolius*
Rafin.)

Blätter meist fünfpaarig gefiedert. Blättchen lanzettförmig,
ganzrandig. Nesselchen und Blattstiele filzig. Nüsse viereckig.
Waterl. Louisiana.

Iuncus Linn. Simse f. Lexic. B. 5. 1. Nachtr. B. 4.

Kelch sechsheitig oder sechsblättrig, offen stehend, an der
Basis mit zwei Bracteen versehen. Staubfäden 3—6, kurz.
Griffel 3. Narben 3, gefiedert. Kapsel dreifächerig, drei-
klappig, viel-samig.

Hexandria Monogynia (Familie Juncaceen.)

Die Gattung *Iuncus* enthält jetzt über 50 Arten, welche
Dr. Dr. Meyer, (Professor der Botanik in Königsberg) in
einem besondern Werke: Monogr. Iunc. abgehandelt und
beschrieben hat. Es sind krautartige Pflanzen (Halbgräser),
deren Stämme nackt oder mit Blättern besetzt sind. Blüthen
in Doldentrauben oder Rispen, seitens- oder gipfelförmig. Im

- Isolepis lanata** Humb. f. *Fimbristylis lanata* R. et Sch.
 — *lenticularis* R. Br. ist *Scirpus lenticularis* Spr.
 — *leucostachya* Humb. f. *Fimbristylis leucostachya* R. et Sch.
 — *nodosa* R. Br. ist *Scirpus nodosus* Rottb.
 — *prolifer* R. Br. ist *Scirpus prolifer* Rottb.
 — *propinqua* R. Br. ist *Scirpus inundatus* Spr.
 — *riparia* R. Br. ist *Scirpus riparius* Spr.
 — *sicula* Presl. ist *Scirpus Savii* Sehalt.
 — *squarrosa* Cramich ist *Scirpus squarrosus* Spr.
 — *sulcata* Cramich ist *Scirpus Tharsii* Spr.
 — *tenuissima* Don. ist *Scirpus densus* Wallich.
 — *unioides* Delil. ist *Scirpus lateralis* Forsk.

Isopogon Rob. Brown in Linn. Soc. transact. 10. p. 71.

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 168.

Kelch vierspaltig, die Röhre dünn, stehen bleibend. Vier Antheren in die ausgehöhlte Spitze der Kelchtheile eingesenkt. Keine Nectardrüsen (oder Schuppen) am Fruchtboden. Narbe spindelförmig oder cylindrisch. Nuß ansetzend, bauchig, überall mit Haaren besleidet.

Tetrandria Monogynia (Familie Protaceen; Silberfichten.)

Von dieser Gattung kennen wir jetzt 12 Arten. Es sind Sträucher aus Neuhollland, deren steife unbewaffnete Aeste mehr oder weniger sich ausbreiten. Blätter flach oder fadenförmig, einfach, ganz oder getheilt (fast doppelt dreizählig oder fiederspaltig). Blumen klein, auf einem allgemeinen Fruchtboden gesammelt, und bilden schuppige, meist kugelförmige, gipfelständige Zapfen. In Prodr. Fl. Nov. Holl. sind die Arten in zwei Abtheilungen aufgeführt.

I. Strobilus globosus, squamis densissime imbricatis.

Zapfen kugelförmig. Schuppen sehr dicht stehend, wie Dachziegeln über einander liegend.

Hierher die im 1. Nachtrage beschriebenen Arten: *Isop. anethifolius*, *formosus* *anemonifolius*, *trilobus* R. Br. und folgende.

1. ***Isopogon teretifolius*** R. Brown. Prodr. Nov. holl.

Ein Strauch, dessen Aestchen starr sind. Blätter meist doppelt dreizählig, fadenförmig, ohne Furchen. Blumentbüschchen (Zapfen) gipfelständig. Kelchröhre fadenhaarig, die Ein-

schnitte der Länge nach mit Barthhaaren besetzt. Waterl. Neuholland. h

2. *Isopogon teratophyllus* R. Br. Hornförmiger Isopogon.

Blätter dreispaltig oder doppeltfiederspaltig, die Einschnitte linienförmig, flach, ausgesperret-abstehend, mucronenspizig, auf beiden Seiten gestreift, die neben den Blumen stehenden an der Basis ausgebreitet. Haysen gipfelständig, die Schuppen glatt. Neuholland auf Feldern und Hügeln, bei Port Philipp. h

3. *Isopogon longifolius* R. Br. in Linn. trans. 10. p. 73. Langblättriger Isopogon.

Blätter linien-zungenförmig, obere ganzrandig, untere fast dreispaltig. Kelche feidenhaarig. Narbe glatt. Waterl. das südliche Neuholland (in Lewins Land) an steinigten Orten. h

II. *Receptaculum commune planum v. convexiusculum, paleis deciduis.*

Der gemeinschaftliche Fruchthoden flach oder etwas erhaben. Spreublättchen abfallend.

4. *Isopogon cuneatus* R. Br. Keilsförmiger Isopogon.

Blätter länglich-keilsförmig, sehr stumpf. Bracteen sitzig. Kelche glatt. Narbe spindelförmig. Das südliche Neuholland. h

5. *Isopogon attenuatus* R. Br.

Neste glatt. Blätter länglich, mucronenspizig, an der Basis verdünnt. Bracteen und Hüllen glatt. Blumentöpschen einzeln stehend, die Platten des Kelches an der Spitze bartig. Waterl. das südliche Neuholland auf Hügeln und an steinreichen Orten. h

6. *Isopogon polycephalus* R. Br. Vielsköpfiger Isopogon.

Nestchen und Blätter sitzig. Blätter länglich-linienförmig, mucronenspizig. Blumentöpschen meist gehäuft stehend. Bracteen alle wollig. Narbe walzenrund. Waterl. das südliche Neuholland, in der Nähe des Meeres, auf Hügeln und auf Felsen. h

7. *Isopogon buxifolius* R. Br. Buxusblättriger Isopogon.

Stengel strauchig, sprossend. Blätter stiellos, eyförmig, gelappt, die Spitze zurückgekrümmt. Blumentöpschen einzeln stehend, von den Blättern gleichsam verschänzt. Bracteen pfriemenspizig. Narbe spindelförmig. Waterl. das südliche Neuholland, auf Sandeplätzen und an niedern feuchten Orten. h

8. *Isopogon axillaris* R. Br. Isopogon mit winkelfständigen Blumenköpfchen.

Blätter leilzungenförmig, mucronenspizlich. Blumenköpfchen winkelfständig, wenigblättrig. Bracteen eysförmig, wie Dachziegeln über einander liegend. Die Platten (Einschnitte) des Kelches der Länge nach mit Barthaaren besetzt. Narbe spindelförmig. Waterl. das südliche Neuholland, auf Fügeln und an Felsen. h

Kultur der Isopogonarten, die wie die übrigen Proteaceen in unsern Glashäusern überwintert werden, s. 1. Nachtrag B. 4. S. 170. Dasselbst lese man bei jedem Speciesnamen us R. um.

Isopyrum Linn. *Isopyrum* f. Lexic. B. 5. (Schubert Handb. 1. 133.)

Kelch corollinisch, fünfblättrig. Corollenblätter (Nectarium Linn.) 5, röhrig, zweilippig. Staubfäden zahlreich, bodenständig. Balgkapseln zahlreich, gekrümmt, vielSaamig.

Polvandria Polygynia (Dodecandria Spr.) Familie Ranunculaceen.)

1. *Isopyrum adoxoides* Cand. Bisamkrautartiges Isopyrum.

Wurzel knollig, an der Basis der Blattstiele einfach. Blätter dreizählig. Blättchen dreispaltig, die Einschnitte stumpf, dreizählig. Blumen stumpflich. Kapseln meist zu dreien. Waterl. das mittlere China und Japan. 4

2. *Isopyrum grandiflorum* Fisch. Cand. Großblumiges Isopyrum.

Wurzel ästig, knollig? Schaft einblumig. Blume groß, stumpf. Waterl. Imaus (Gebirge in der großen Tartarey.)

Isopyrum fumarioides et *thalictroides* Linn. f. Lexic. B. 5.

Isopyrum aquilegioides L. f. Lexic. ist *Isopyrum thalictroides* Var.

Iso stigma Schlechtend. Linn. B. 6. Heft 3. S. 513.

Es sind daselbst drei Arten aufgeführt: *Iso stigma simplicifolium*, *speciosum* et *peucedanifolium*. Die letztere hat Sprengel (Syst. veg.) unter *Tragoceros* Kunth aufgenommen und beschrieben. Da die von Kunth und Schlechtend. aufgestellten Charact. generic. nur wenig von einander abzuweichen scheinen, so können, nach meinem Dafürhalten, beide Gattungen verbunden werden s. *Tragoceros* im 2. Nachtrage.

Isotoma axillaris Lindl. in Bot. reg. 964. ist *Lobelia Senecionis* Spr.

Isotypus Kunth ist *Seris onoseroides* Willd.

Itea Linn. *Itea* f. Lexic. B. 5. (Gaertn. de fruct. t. 209.)

Kelch klein, fünfspaltig, gefärbt. Fünf lanzettförmige Corollenblätter, die mit den Staubfäden in die Wand des Kelches eingefügt sind. Kapsel eiförmig, zweiflappig. Samen klein.

Pentandria Monogynia (Familie Ericaceen.)

1. *Itea virginica* Linn. Virginische *Itea*, siehe die vollständige Beschreibung dieses Strauches im Lexikon B. 5. S. 139. Dasselbst lese man *I. virginica* f. *Cyrilla* S. denn *Itea Cyrilla* Swartz ist *Cyrilla antillana* Michx. f. 2. Nachtr. B. 3. S. 296. Ingleich kann auch das daselbst angeführte Synonym; *Cyrilla racemiflora* Jacq. die zur *Cyrilla caroliniana* gehört, ausgestrichen werden.

2. *Itea umbellata* Roxb. Doldenblüthige *Itea*.

Stengel strauchig. Blätter wechselnd stehend, länglich, ganzrandig, glatt. Blumen dolden = rispenständig. Vaterl. die Insel Malacca. h

3. *Itea macrophylla* Schlechtend. Großblättrige *Itea*.

Blätter wechselnd stehend, elliptisch = länglich, langgespitzt, sägeartig gezähnt, lederartig, glatt, glänzend. Blumen in winkelförmige büschelförmige Trauben gesammelt. Vaterl. Ostindien. ? h

Iubaea Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. pl. 1. p. 308. Iubäapalme.

Blumen hermaphroditisch. Kelch doppelt, beide dreitheilig, der äußere klein. Staubfäden zahlreich, hodenständig. Griffel 3. Steinfrucht umgekehrtkegelförmig. Nuß mit drei Höchern versehen.

Polyandria Trigynia (Familie Palmen.)

1. *Iubaea spectabilis* Kunth J. c. t. 96. Ansehnliche Iubäapalme.

Eine hohe und prächtige Palme, deren Stoc (Stamm) ziemlich dick und unbewaffnet ist. Laub (Wedel) gefiedert. Blättchen linienförmig. Kössen ästig, vielblüthig. Scheide einklättrig. Blumen gestielt. Vaterl. Chili, bei Popayan, wird daselbst auch in Gärten kultivirt und ist unter dem Na-

men Coquito de Chili bekannt. h Blühz. Oktob. und November.

In unsern Gärten behandelt man sie, in Hinsicht auf Standort und Boden wie andere Palmen, die aus warmen Ländern kommen.

Jürgensia anguifera Spr. Syst. veg. 3. p. 90. ist *Medusa anguifera* Lour. Pers. f. 1. Nachtrag. B. 4. S. 601.

Juglans Linn. Walnuß. (Schubers Handb. t. 30. Gaertn. Sem. t. 89.)

Character generic. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 171.

Blüthen monöcisch. Männliche in cylindrischen Köpfen, deren Schuppen wie Dachziegel über einander liegen und gezähnt sind; 4—8 sehr kurze Staubfäden, mit doppelten Antheren gekrönt. Weibliche einzeln, auch zu 2—3 oder mehrere beisammen stehend. Kelch vierzählig. Corolle vierspaltig. Griffel 2. Steinfrucht lederartig. Nuß gefurcht.

Monoecia Declinia (Familie Amentaceen.)

Die Arten, welche zu dieser Gattung gehören habe ich im Lexikon und im 1. Nachtr. nach Michx. hist. arb. amer. beschrieben, aber im Nachtrage auch einige aufgenommen, die nach einer genauern Untersuchung der Blüthen z. nur als Varietäten zu betrachten sind, obgleich die Abbildungen in Michx. hist. arb. einige Verschiedenheiten und Merkmale zu erkennen geben; sie sind unten angezeigt.

Die Gattung *Juglans* hat Nuttall getrennt und 9 Arten unter *Carya* aufgeführt. Den Gattungsscharakter hat er so gestellt: Flores amentacei. ♂ Squamae 3partitae. Cor. o Stamina 4—6. ♀ Cal. superus 4fidus. Stigma 4lobum. Fructus 4valvis. Nux 4angula.

Blüthen (männliche) in Köpfen. Schuppen dreitheilig. Corolle fehlst. Staubfäden 4—6. ♀ (weibliche) Kelch oben 4spaltig. Narbe vierlappig. Frucht vierlappig. Nuß vieredrig.

Hierher gehören nun die Arten, deren Blüthen und Früchte den vorstehenden Charakter entsprechen. Es sind folgende:

- Juglans amara* Michx. Willd. f. Lexic. ist *Carya amara* Nutt.
 — *aquatica* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Carya aquatica* Nutt.
 — *cathartica* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Juglans cinerea* var. f. 1, Nachtr.

Iuglans compressa Willd. Gaertn. f. Lexic. ist *Carya* alba Nutt.

— *glabra* Willd. f. Lexic. ist *Carya porcina* Nutt.

— *lacinosa* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Carya sulcata* Nutt.

— *myristicaeformis* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Carya myristicaeformis* Nutt.

— *olivaeformis* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Carya olivaeformis* Nutt.

— *porcina* Michx. f. 1. Nachtr. ist *Carya porcina* Nutt.

— *pyriforme* Mühlenb. ist *Carya porcina* Nutt.

— *squamosa* Poir. f. 1. Nachtr. ist *Carya alba* Nutt.

— *sulcata* Willd. ist *Carya sulcata* Nutt.

— *tomentosa* Michx. I, alba Linn. ist *Carya tomentosa* Nutt.

Die übrigen Synonymen f. 1. Nachtr. B. 4. S. 177.

Zur Gattung *Carya* Nuttall. gehören noch zwei neue Arten.

1. *Carya microcarpa* Nutt. Kleinfrüchtige *Caryanuss*.

Blätter gefiedert. Blättchen länglich-lanzettförmig, lang-
gespitzt, sägerandig, auf beiden Seiten glatt, unten drüsig-
punktirt, an den Winkeln der Rippen mit zarten Barthaaren
besetzt. Früchte kugelförmig. Nüsse viereckig, abgestutzt. Wa-
terl. Pensylvanien. h

2. *Carya integrifolia* Spreng. (*Hicorius integrifolius* Rafin.)

Blätter meist fünfpaarig gefiedert. Blättchen lanzettförmig,
ganzrandig. Nesselchen und Blattstiele filzig. Nüsse viereckig.
Waterl. Louisiana.

Iuncus Linn. Simse f. Lexic. B. 5. 1. Nachtr. B. 4.

Kelch sechstheilig oder sechsblättrig, offen stehend, an der
Basis mit zwei Bracteen versehen. Staubfäden 3—6, kurz.
Griffel 3. Narben 3, gefiedert. Kapsel dreifächerig, dreis-
klappig, viel-saamig.

Hexandria Monogynia (Familie Juncaceae.)

Die Gattung *Iuncus* enthält jetzt über 50 Arten, welche
Dr. Dr. Meyer, (Professor der Botanik in Königsberg) in
einem besondern Werke: Monogr. Iunc. abgehandelt und
beschrieben hat. Es sind krautartige Pflanzen (Halbgräser),
deren Stämme nackt oder mit Blättern besetzt sind. Blumen
in Doldentrauben oder Rispen, seitens oder gipfelförmig. Im

System nach der Gestalt und Beschaffenheit des Stalks, der Blätter und des Blütenstandes u. eingetheilt und geordnet.

I. Stalk einblüthig.

Hierher *Iuncus magellanicus* Lam. I. *grandiflorus* Forst. f. Lexic. 8, 5.

II. Stalk 2—3 blüthig. Saamen an beiden Enden mit Anhängen versehen.

Hierher die im Verikon beschriebenen Arten: *Iuncus trifidus*, *tygius*, *biglumis*, *triclumis* Linn. und folgende.

1. *Iuncus subtilis* Meyer. Sarte Simse; Binsse. (I. *fluitans* Michx.)

Stalk haarförmig, knotig, knieartig gebogen, kriechend. Blätter haarförmig, fast knotig, mit Scheiden versehen. Blumen meist zu 3, gipfelständig, überhängend. Kelchblätter stumpflich. Vaterl. Nordamerika, an Flüssen und in Quellen und Gräben. 2.

III. *Glomeruli capitati*. Blumenköpfe kopfförmig.

+ Saamen an beiden Enden mit Anhängen versehen.

Hierher die im Verikon und I. Nachtrage beschriebenen Arten: I. *Iacquinii* Linn. I. *castaneus* Smith; bei letzter wird das beigelegte Synonym gestrichen.

++ Saamen ohne Anhänge.

a. Drei Staubfäden.

Hierher *Iunc. capitatus* Weig. f. Lexic. I. *pygmaeus* Thunb. I. *marginatus* Willd. Rostc. f. I. Nachtr. und folgende Arten.

2. *Iuncus repens* Michx. Kriechende Simse. (*Cephaloxys flabellata* Desv.)

Stalk beblättert, kriechend. Blätter linienförmig. Blumenköpfe wenigblüthig, meist zu 3 stehend, stiellos oder gestielt. Kelchtheile linienförmig, verlängert, fast pfriemenspizig. Kapsel prismatisch. Rücken in der Mitte mit drei Flügeln versehen. Vaterl. Nordamerika, besonders Carolina. 2.

3. *Iuncus prismatocarpus* Rob. Brown. Prodr. Fl. Nov. Holl.

Stalk zusammengedrückt. Blätter wechselnd, vertical stehend. Blumenköpfe vielblüthig, doldentraubig, nackt. Kapsel prismatisch, länger als die pfriemenspizigen Kelchblätter. Neuholland. h

4. *Juncus planifolius* R. Br. Flachblättrige Simse.

Wurzelblätter linienförmig, flach. Stalm fast blattlos. Blumenknäule doldentraubig, eingehüllt. Kapsel dreiseitig, mucronenspizig, fast so lang als die gespizten Kelchtheile. Neuholland. 4

5. *Juncus valvatus* Link. (I. echinuloides Brot.)

Stalm beblättert, aufsteigend. Blätter fast zusammengedrückt. Knäule vielblümig, dicht, mit gegraunten Bracteen versehen. Kelchtheile steif, pfriemenspizig, so lang als die gespizte Kapsel. Wabert. Portugal auf Tristen. 4

6. *Juncus polycephalus* Michx. Vielköpfige Simse. (I. echinatus Mühl.)

Stalm beblättert, walzenrund, kraff. Blätter fast cylindrisch, feinknotig. Knäule meist zu 3 stehend, gestielt, 9blümig. Kelchtheile gegraunt. Kapsel mucronenspizig, so lang als der Kelch. Wabert. Nordamerika. 4

7. *Juncus uliginosus* Roth. Sumpfliebende Simse; Bruch oder Morastbinse.

Stalm beblättert, fadenförmig, an der Basis wurzelnd. Blätter linien- borstenförmig, meist feinknotig. Knäule wenigblümig, fast doldentraubig. Blumen mit drei Staubfäden versehen. Kelchblätter gespizt. Kapsel stumpf, hervorragend. Hierher zählt Sprengel (Syst. veg.) folgende, die in andern frühern Schriften als selbstständige Arten aufgeführt sind: I. verticillatus Pers. subverticillatus Wulff. f. Lexic. I. stoloniferus Wobl. I. supinus Moench. I. fluitans Lam. I. setifolius Ehrh. I. bulbosus Linn. unrichtig, denn dieser kommt auch N. 54. als Art vor. Wab. Nordamerika und Europa, besonders in Deutschland in Frähen, Sümpfen, Gräben, und auf nassen Wiesen und Grasplätzen. 4 Blühz. Juni — Juli.

8. *Juncus scheuchzerioides* Laharp.

Stalm sehr kurz. Blätter fadenförmig. Aehren meist gepaart, 3—4 blümig. Kelchblätter ey-lanzettförmig, mucronenspizig. Kapsel fast kugelförmig, so lang als der Kelch. Wabert. die Fastland-Inseln.

9. *Juncus densiflorus* Kunth in Humb. Nov. gen. 1. p. 238.

I. cyperinus Willd. herb.

Stalm beblättert, aufrecht, wie die Blätter walzenrund, gegliedert. Blumen dreisädig. Knäulchen vielköpfig; sie bilden

eine gipfelftändige, zusammengezogene Doldentraube, mit einer Hülle versehen. Kelchtheile langgespitzt, fast pfriemensförmig, so lang als die umgekehrtepförmige Kapsel. Vaterl. Südamerika. 4 Blühz. Mai.

β. Blumen mit sechs Staubfäden.

* Stalm nackt, (blattlos).

Hierher die im Lexikon beschriebenen Arten: *I. filiformis* Linn. *I. arcticus* Willd.

a. Blätter walzenrund.

Hierher die im Lexikon beschriebenen Arten: *I. punctatus* Thunb. *I. nodosus* Mühlenb. und folgende.

10. *Iuncus Holoschoenus* R. Br. Prod. Nov. Holl.

Stalm mit einem walzenrunden Blatte besetzt. Doldentraube gipfelftändig. Blumenköpfchen vielblümig. Kelchtheile gespitzt. Kapsel prismatisch, so lang als der Kelch. Saamen gestreift. Neuhoolland. 4

11. *Iuncus striatus* Schousb. Gestreifte Simse. (*I. scellatus* Willd. herb.)

Stalm einblättrig. Scheide gestreift. Blumenknäule kopfförmig, fast doldentraubig. Kelchtheile langgespitzt. Kapsel dreiseitig, langgespitzt, hervorstehend. In Schousboe's Beobachtungen über das Gewächreich in Marokko sind zwar sechs Simsenarten aufgeführt, aber diese und die folgende Art nicht. Sprengel hat Numidia als Vaterland angezeigt.

12. *Iuncus fasciculatus* Schousb. Büschelblüthige Simse.

Stalm aufrecht, gestreift, wie das eine Blatt, welches er trägt, zusammengedrückt, straff. Knäule kopfförmig. Kelchtheile pfriemensspitzig, über die Kapsel lang hervorstehend.

13. *Iuncus ebracteatus* Meyer.

Stalm fadenförmig. Knäule ohne Bracteen, fast doldentraubig. Kelchtheile feinspitzig. Kapsel langgespitzt, länger als der Kelch. Vaterl. Mexiko. ?

14. *Iuncus concinnus* Don.

Stalm walzenrund, wenigblättrig, gestreift. Blätter walzenrund, gegliedert. Blumenbüschel vielblümig, gipfelftändig. Hülle vielblättrig, abgekürzt, trocken. Kelchtheile stumpf. Kapsel dreiseitig, mit dem langen bleibenden Griffel gestutzt. Vaterl. Emodi monte. 4

b. Blätter flach.

Hierher *Iunc. cephalotes* et *capensis* Thunb. s. Lexic. B. 6.

IV. Flores oymoso-paniculati.

Blumen in Doldentrauben, die Rispen bilden.

+ Blumen mit drei Staubfäden versehen.

15. *Iuncus pallescens* Lamarck. Blasse Simse. (*I. sylvaticus* Mühlenb.)

Stamm beblättert, aufrecht. Blätter fast walzenrund, knos-
tig. Rispe aufrecht, verlängert. Blumenstiele an der Basis
mit Bracteen besetzt. Blumen stiellos, gehäuftstehend. Kelch-
theile langgespißt, kürzer als die gespißte Kapsel. Vaterl.
Nordamerika in Wäldern und Gebüsch. 4

16. *Iuncus Mühlenbergii* Spr. Mühlenbergische Simse.

Stamm beblättert, wie die linien-zusammengedrückten Blät-
ter, knotig. Die Aeste der Rispe ausgesperret. Blumen drei-
fädig, gepaart, stiellos. Kelchtheile lanzettförmig, stumpflich,
Kapsel dreiseitig, mucronenspißig, länger als der Kelch. Nord-
amerika. ?

17. *Iuncus biflorus* Elliott. Zweiblümige Simse.

Wurzel fast knollig. Stamm beblättert, walzenrund. Blät-
ter linienförmig, flach, steif. Rispe schlaff. Blumen gepaart.
Kelchtheile lanzettförmig, länger als die umgekehrteiförmige
Kapsel. Diese Simse scheint noch einer nähern Untersuchung
und Vergleichung mit andern zunächst verwandten Arten zu
bedürfen. Vaterl. das südliche Carolina. 4

18. *Iuncus aristulatus* Michx. Gegraunte Simse.

I. aristatus Pers. *I. marginatus* Mühlenb.

Wurzel fast knollig. Stamm zusammengedrückt, blättrig,
aufrecht. Blätter linienförmig, die untern rinnig. Blumen
gehäuft, rispenständig. Kelchtheile gegraunt, so lang als die
stumpfen Kapseln. Vaterl. Nordamerika. 4 Blühz. Sommer.

** Culmo aphylo. Stamm nackt (blattlos.)

+ Blumen mit drei Staubfäden.

Hierher *I. effusus* et *conglomeratus* Linn. f. Lexic.

++ Blumen mit sechs Staubfäden.

Hierher *I. glaucus* Ehrh. f. Lexic. und folgende Arten.

**19. *Iuncus balticus* Dethard. Willd. Berol. Mag. 1809.
Baltische Simse.**

I. helodes Link. Enum. hort. Berol. 1. p. 305.

Stamm blattlos, walzenrund, straff. Rispe seitenständig,
weißschweißig, fast dreispaltig. Kelchblätter lanzettförmig, ge-
spißt. Kapsel stumpf, mucronenspißig, so lang als die Kelch-
theile. Wächst am baltischen Meerufer, so wie in andern

Ländern von Europa, nach Link auch in Deutschland an Ufern. 4. Blühz. Sommer.

20. *Iuncus diffusus* Hopp. Ausgebreitete Simse.

Stamm blattlos, fein gefurcht. Die wurzelständigen Scheiden schwarzpurpurroth. Rispe seitenständig, ausgebreitet weitschweifig. Kelchtheile langgespitzt. Kapsel umgekehrt-trichterförmig, mit dem bleibenden Griffel gekrönt. Wächst am Danubium. 4

21. *Iuncus compressus* Humb. Kunth J. c. I. p. 235. Zusammengedrückte Simse.

Stamm blattlos, zusammengedrückt, aufrecht. Doldentraube seitenständig. Blumen fast stiellos. Kelchtheile langgespitzt, länger als die Kapsel. Vaterl. Neuspanien, bei Chapultepec. Blüht daselbst im Februar. 4

22. *Iuncus vaginatus* R. Br. Scheidentragende Simse.

Stamm walzenrund, blattlos, nur an der Basis mit Scheiden besetzt. Rispe fast doldenartig, seitenständig, die Dolden zusammengesetzt. Blumen gehäuftstehend. Kelchblätter gespitzt, so lang als die Kapsel. Neuholland. 4

23. *Iuncus Brownii* Dietr. (*I. pallidus* R. Br.) Brownsche Simse.

Stamm walzenrund. Rispe seitenständig, die Aeste ungleich getheilt. Aestchen gehäuft. Blumen wechselnd stehend, wie Dachziegeln über einander liegend. Kelchblätter gespitzt. Kapsel oval, länger als der Kelch. Neuholland. 4

24. *Iuncus canariensis* Willd. herb. Canarische Simse.

Stamm walzenrund, straff. Rispe seitenständig, vielfach zusammengesetzt. Doldentraube schlaff. Blumenstiele haarspinnig. Kelchblätter langgespitzt. Kapsel umgekehrtenförmig, kürzer als der Kelch. Vaterl. die canarischen Inseln. 4

25. *Iuncus pauciflorus* R. Br. Wenigblümige Simse.

Stamm fadenförmig, nackt, nur an der Basis mit Scheiden besetzt. Rispe seitenständig, wenigblümig. Kelchblätter gespitzt, über die stumpfe Kapsel hervorragend. Vaterl. Neuholland; van Diemenland. 4

26. *Iuncus rubens* Lamarek. Röhrlische Simse; rothe Simse s. Lexic. B. 5.

Stamm walzenrund, an der Basis mit Scheiden besetzt. Blumen gepaart, in gipfelständigen Doldentrauben, mit Hüllblättern versehen. Diese Art bedarf noch einer nähern Unter-

suchung und Bestimmung, vielleicht nur eine Varietät von einem andern längst bekannten Iuncus? Waterl. Monte Video. 4?

α. Foliis teretibus. Blätter walzenrund.

Hierher die im Lexikon beschriebenen Arten: *I. capillaceus* Lam. *I. setaceus* Willd.

*** Culmo folioso. Stalm beblättert.

Hierher *I. multiflorus* Desf. *I. acutus* Linn. f. Lexic. *I. lampocarpus* Ehrh. Duv. Hot. Kew. f. 1. Nachtr. und folgende.

27. *Iuncus acutiflorus* Ehrh. Spitzblüthige Sims.

Stalm beblättert, fast aufsteigend. Blätter walzenrund-zusammengedrückt, fast knotig, straff. Rispe doppelt zusammengesetzt. Blumen meist gehäuft stehend. Kelchblätter gespißt, so lang als die Kapsel.

Zu dieser Art hat Sprengel (Sylt. veg.) folgende gezogen: *I. articulatus* Linn. *I. aquaticus et sylvaticus* Roth. f. Lexic. *I. ascendens* Host. *I. atratus* Bess. Waterl. Europa, besonders Deutschland, in Wäldern und an feuchten Stellen. 4 Blühz. Sommer.

28. *Iuncus obtusiflorus* Ehrh. Stumpfblüthige Sims.

I. articulatus β. Linn. *I. retroflexus* Rafin.

Stalm beblättert, straff, wie die Blätter fast knotig. Rispe doppelt zusammengesetzt, die Aeste ausgesperrt. Blumen gehäuft. Kelchblätter stumpf. Kapsel gespißt, so lang als der Kelch. Waterl. Europa, vornehmlich Deutschland. 4

29. *Iuncus fusco-ater* Schreb. Schwarzbraune Sims.

I. ustulatus Hoppe.

Stalm beblättert, wie die Blätter rund-zusammengedrückt, feinknotig. Rispe aufrecht-abstehend. Kelchblätter und Kapsel stumpf, die letztere macronenspißig, kürzer als der Kelch. Waterl. Deutschland. 4 Blühz. Sommer.

30. *Iuncus microcephalus* Humb. Kunth. J. c. 1. p.

237. Kleinföpfige Sims.

I. floribundus Kunth J. c. Variet. ?

Stalm beblättert, rundlich, aufrecht. Blätter fast walzenrund, knotig-gegliedert, glatt. Doldentrauben gipfelsändig, mit einer Hülle versehen. Blumenthähle stiellos, vielblüthig. Kelchblätter lang und feingespißt. Kapsel umgekehrtepförmig, dreiseitig, stumpf, kürzer als der Kelch. Waterl. Neugranda. 4 Blühz. Mai — Juli.

31. *Iuncus maritimus* Lamarck. f. Lex. B. 5. C. 155.
und die beigefügten Bemerkungen.

Palm beblättert, aufrecht. Blätter walzenrund, ohne Knoten, die obersten, neben den Blumen, stehend. Rippe vielfach, zusammengesetzt, aufrecht, ausgebreitet. Kelchblätter gespißt. Kapsel stumpf, mucronenspißig, so lang als der Kelch. Saamen mit Anhängen versehen. Vaterl. Südeurop. und England, in salzigen Sümpfen in Esser, Lancashire f. Smith Fl. brit. 4 Blühz. August.

Zu dieser Art hat Sprengel *I. rigidus* Desf. gezogen, die im Lexic. B. 5. C. 157. ausgestrichen wird.

β. Blätter rinnensförmig oder flachlich.

Hierher die im Lexikon beschriebenen Arten: *I. bulbosus*, *squarrosus*, *bufonius* Linn. *I. Tenageia* Ehrh. *I. foliosus* Desf. *I. tenuis* Willd. *I. serratus* Thunb. und folgende.

32. *Iuncus botnicus* Wahlenb. (*I. coenosus* Bicheno.)

Palm blättrig, walzenrund. Blätter liniensförmig, rinnig. Rippe doppelt zusammengesetzt, aufrecht. Kelchblätter stumpflich. Kapsel länglich, mucronenspißig, so lang als der Kelch. Vaterl. das nördliche Europa und Deutschland an salzigen Orten. 4

33. *Iuncus gracilis* R. Brown. Dünnhalmige Simse.

Palm beblättert, dünn, kriechend. Blätter fast borstenförmig. Blumen gehäuft, und bilden eine fast einfache Endbolde. Neuholland. 4

34. *Iuncus revolutus* R. Brown. Zurückgerollte Simse.

Wurzel kriechend. Palm fast zusammengedrückt, an der Basis mit sehr schmalen Blättern besetzt, die am Rande zurückgerollt sind. Doldentraube gipfelständig, wenigblümig. Kelchblätter gespißt. Kapsel niedergedrückt, länglich, so lang als der Kelch. Vaterl. Neuholland; van Diemenland. 4

35. *Iuncus Gesneri* Smith. Gesnerische Simse.

I. gracilis Engl. bot. *I. tenuis* Hooker.

Palm beblättert, oben dreiseitig. Blätter linealisch, rinnensförmig, die obern neben den Blumen kürzer als die unteren, und länger als die rippen-traubenständigen Blumen. Kelchblätter lanzettförmig, dreirippig. Kapsel oval, hervorstehend. Vaterl. Schottland in Wäldern u. a. a. Orten. 4

36. *Iuncus platycaulos* Kunth J. c. 1. p. 236. (*I. coarctatus* Willd. herb.)

Palm

Palm beblättert, zusammengedrückt, aufrecht. Blätter linealisch, flach, fast rinnenförmig, glatt. Akerdolde gedrängt, gipfelständig, mit einer Hülle versehen. Kelchblätter langgespißt, pfriemenspißig. Kapsel umgekehrteiförmig, dreiseitig, stumpf, kürzer als die Kelchblätter. Vaterl. Südamerika, am Orinoco-Flusse, bei Atures et Carichana. Blüht daselbst im September. 4

37. *Iuncus proliſer* Kunth J. c. I. p. 263. hat Sprengel (Syst. veg.) zu *I. bufonius* Linn. (Lexic. B. 5.) gezogen, nebst *I. parviflorus* Poir. und *I. plebejus* R. Brown.

38. *Iuncus xiphioides* E. Meyer. Scheidentulienartige Simse.

I. ensifolius Wikström. *I. iridifolius* Willd. herb.

Palm beblättert, zusammengedrückt-zweischneidig, knotig. Blätter schwertförmig, mit Scheiden. Rispe vielfach zusammengeſetzt. Blumen gehäuft, mit Bracteen versehen. Kelchblätter langgespißt. Kapsel gespißt, so lang als der Kelch. Vaterl. Neuspanien. 4 Blühz. Sommer.

Synonymen.

Iuncus albidus Hofm. (f. Lexic.) ist *Luzula alba* Cand.

- *aquaticus* Roth. f. *Iuncus acutiflorus* N. 27.
- *arcuatus* Wahlenb. ist *Luzula arcuata*.
- *aristatus* Link ist *Iuncus tenuis* Willd. f. Lex.
- *aristatus* Pers. f. *Iuncus aristulatus* N. 18.
- *articulatus* Linn. (f. Lexic.) ist *Iuncus lampocarpus* Ehrh. Dav. Hort. Kew. f. 1. Nachtr. B. 4. S. 182.
- *ascendens* Host. f. *Iuncus acutiflorus* N. 27.
- *atratus* Bess. f. *Iuncus acutiflorus* N. 27.
- *atratus* Lam. ist *Iuncus Jacquini* f. Lexic.
- *bicornis* Michx. ist *Iuncus tenuis* Willd. f. Lexic.
- *bogotensis* Humb. ist *Iuncus conglomeratus* Linn. Lexic.
- *brevifolius* Link. ist *Luzula brevifolia* Desv.
- *coenosus* Richeno. f. *Iuncus botnicus* N. 32.
- *communis* α Meyer. ist *Iuncus conglomeratus* Lexic.

Dietr. Erz. 2r. Nachtr. IV. Bd.

X t

- Iuncus communis** β Meyer. ist **Iuncus conglomeratus** Lexic.
- **diaph marius** Brot. ist **Iuncus glaucus** Lexic.
 - **dichotomus** Ell. ist **Iuncus tenuis** Lexic.
 - **echinatus** Mühlenb. f. **Iuncus polycephalus** N. 6.
 - **echinuloides** Brot. f. **Iuncus valvatus** N. 5.
 - **ensifolius** Wikstr. f. **Iuncus xiphioides** N. 38.
 - **flavescens** Host. ist **Luzula flavescens** Cand.
 - **floribundus** Kunth f. **Iuncus microcephalus** N. 30.
 - **fluitans** Lam. f. **Iuncus uliginosus** N. 7.
 - **fluitans** Michx. f. **Iuncus subtilis** N. 1.
 - **Forsteri** Smith f. 1. Nachtr. ist **Luzula Forsteri** Cand.
 - **glabratus** Hopp. ist **Luzula glabrata** Cand.
 - **gracilis** Engl. bot. f. **Iuncus Gesneri** N. 35.
 - **gracilis** Roth. ist **Iuncus capitatus** f. Lexic.
 - **helodes** Link Willd. f. **Iuncus balticus** N. 19.
 - **intermedius** Host. ist **Luzula glabrata** Cand.
 - **iridifolius** Willd. f. **Iuncus xiphioides** N. 38.
 - **lacteus** Link ist **Luzula brevifolia** Cand.
 - **leucophobus** Ehr. ist **Luzula albida** Cand.
 - **luteus** All. Vill. ist **Luzula lutea** Cand.
 - **luzuloides** Lam. ist **Luzula albida** Cand.
 - **marginatus** Mühlenb. f. **Iuncus aristulatus** N. 18.
 - **maximus** Retz. ist **Luzula maxima** Cand.
 - **multiflorus** Hofm. ist **Luzula multiflora** Lejenu.
 - **mutabilis** Cav. ist **Iuncus capitatus** Weig. f. Lexic.
 - **nemorosus** Host. ist **Luzula campestris** Cand.
 - **nemorosus** Pollich. ist **Luzula albida** Cand.
 - **niveus** Linn. f. Lexic. ist **Luzula nivea** Cand.
 - **pallescent** Wahlenb. ist **Luzula multiflora** Lejenu.
 - **pallidus** R. Br. f. **Iuncus Browni** N. 23.
 - **parviflorus** Ehr. f. Lexic. ist **Luzula parviflora** Desv.
 - **parviflorus** Poir. ist **Iuncus bufonius** Lexic.
 - **pediformis** Vill. f. 1. Nachtr. ist **Luzula pediformis** Cand.

juncus pilosus Linn. f. Lexic. ist **Luzula vernalis** Cand.

- **plebejus** R. Br. ist **Juncus bufonius** Lexic.
- **prolifer** Kunth ist **Juncus bufonius** Lexic.
- **retroflexus** Rafin. f. **Juncus obtusiflorus** N. 28.
- **rigidus** Desf. f. **Juncus maritimus** N. 31.
- **scirpoides** Lam. ist **Juncus nodosus** Mühlb. f. Lexic.
- **setifolius** Ehrh. f. Lexic. f. **Juncus uliginosus** N. 7.
- **spadiceus** Vill. f. Lexic. ist **Luzula spadicea** Cand.
- **spicatus** All. f. Lexic. ist **Luzula spicata** Cand.
- **stechadanthus** Brot. ist **Luzula brevifolia** Desv.
- **solonifer** Wöhlb. f. **Juncus uliginosus** N. 7.
- **subverticillatus** f. Lexic. f. **Juncus uliginosus** N. 7.
- **sudeticus** Willd. f. Lexic. ist **Luzula sudetica** Cand.
- **sylvaticus** Curt. ist **Luzula maxima** Cand.
- **sylvaticus** Mühlb. f. **Juncus pallescens** N. 15.
- **sylvaticus** Roth. f. **Juncus acutiflorus** N. 27.
- **tenuis** Hook. f. **Juncus Gesneri** N. 35.
- **triceps** Willd. Rost. f. 1. Nachtr. ist **Juncus castaneus** Sm. f. 1. Nachtr.
- **ustulatus** Hopp. f. **Juncus fusco-ater** N. 29.

Hierher gehören auch die zahlreichen Synonymen, welche ich im 1. Nachtrage B. 4. S. 183—185 angezeigt habe, davon einige in der obigen Liste zu andern Arten gezogen sind. Der geneigte Leser wird sie leicht auffinden und gehörigen Orts einschalten.

Die Kultur der Simsen ist in botanischen Gärten hinreichend bekannt.

Jungermannia Linn. **Jungermannie** f. Lexic. B. 5.

Kapsel in vier Klappen, aufspringend. Klappen abstehend. Saamen zellig-punktirt, an spiralförmige Ketten geheftet.

Eine vollständige Charakteristik der Gattung **Jungermannia** finden wir in Kurt Sprengels Anleitung zur Kenntniß der Gewächse, zweite Ausgabe, zweiter Theil, erste Abtheilung 1817. S. 71. t. 4.

Cryptogamia Sect. II. (Familie Lebermoose, Hepatici.)

Diese Gattung führt ihren Namen zu Ehren des Herrn

Andwig Jungermann, geboren in Leipzig (?) 1572 † 1653. Jungermann war Professor in Gießen, dann zu Altorf, wo er ein Verzeichniß der Gewächse, welche damals in dem akademischen Garten vegetirten, herausgab, welches sein Nachfolger Moritz Hofman verbesserte und ein vollständigeres Werk lieferte: *Florae altorfinae deliciae hortenses*. Altorf. 1660—1677. 4.

Von dieser Lebermoosgattung sind jetzt 200 und einige 20 Arten angezeigt, welche größtentheils in andern Welttheilen sich finden, daher habe ich von manchen Arten nur den Namen und das Vaterland angegeben, siehe meine Bemerkung hierüber am Schlusse dieses Artikels Jungerm. Im System sind sie in gestengelte und laubige Arten abgetheilt, dann nach der Gestalt und Stellung der Blätter, sowie der Aftersblätter eingetheilt und geordnet.

I. *Caulescens*. Gestengelte Arten.

† *Foliis auriculatis s. complicato-bilobis*.

Blätter mit Ohrläppchen versehen oder zusammengefaltet = zweilappig.

* *Stipulatae*. Mit Aftersblättern.

a. Aftersblätter ungetheilt.

1. *Jungermannia obscura* Swartz.

Moosstengel liegend, gefiedert. Blätter rundlich = herzförmig, convex, ganzrandig, wie Dachziegeln über einander liegend, die Ohrläppchen gewölbt. Aftersblätter rundlich, fast gezähnt, dachziegelförmig gelagert. Jamaica.

2. *I. moniliata* Nees a Esenb.

Stengel gefiedert. Blätter rundlich, mucronenspitzig, ganzrandig. Aftersblätter rund ausgekerbt. Vaterl. Java.

3. *I. nigricaulis* Nees. Schwarzstengelige Jungermannie.

Die Aeste des Moosstengels verlängert. Blätter wechselnd stehend, gehäuft, kreisrund = herzförmig, ganzrandig, horizontal ausgebreitet. Ohrläppchen keulen = sackförmig, an der Basis abgestutzt. Aftersblätter groß, nieren = kreisrund, ausgekerbt. Java.

4. *I. Arecae* Spr.

Stengel ästig, dicht mit kreisrunden ganzrandigen Blättern besetzt, die wie Dachziegeln über einander liegen. Ohrläppchen länglich, an der Spitze gewölbt, hinten ausgeschnitten. Aftersblätter fast nierenförmig, leicht ausgekerbt. Vaterl. Portoriko an den Stämmen der Palmen, vorzüglich an *Areca oleracea*. Jacq.

b. Afterblätter zweispaltig.

Hierher *I. dilatata* Linn. (*I. tamariscifolia* Web.)
f. Lexic. B. 5. und folgende Arten.

5. *I. atrata* Swartz. Rabenschwarze Jungermannie.

Stengel sehr ästig. Blätter schief, eiförmig, langgespitzt, ganzrandig, wie Dachziegeln über einander liegend. Ohrläppchen keulenförmig, mit Anhängen versehen. Afterblätter länglich, gespalten, fast sägerandig. Vaterl. Westindien, Südamerika und die Mascaren = Insel. 4

6. *I. Teneriffae* Weber.

Stengel gefiedert. Blätter fast dachziegelförmig gelagert, eiförmig, langgespitzt, ganzrandig. Ohrläppchen keulenförmig, mit Anhängen. Afterblätter groß, gespalten, ganzrandig. Wächst in Teneriffa.

7. *I. vaginatus* Swartz.

Stengel doppelt gefiedert. Aeste ausgesperrt. Blätter dicht stehend, sparrig, schief, eiförmig, gespitzt, fast ganzrandig. Ohrläppchen sehr klein, länglich, sackförmig. Afterblätter länglich, gespalten. Vaterl. West- und Ostindien.

8. *I. lobulata* Hooker. (*I. cyparoides* Schwägr.)

Stengel abgekürzt, fast ästig. Blätter schlaff, durchscheinend, zweireihig, rundlich, ganzrandig. Ohrläppchen sackförmig. Afterblätter länglich, gespalten, ganzrandig.

9. *I. galeatus* Nees. Helmformige Jungermannie.

Stengel doppelt gefiedert. Blätter wie Dachziegeln über einander liegend, freisrund, ganzrandig. Ohrläppchen helmförmig, an der Basis mit Anhängen versehen. Afterblätter freisrund, gespalten, fast ohne Rippen. Java.

10. *I. ornithocephala* R. Nees.

Stengel zweitheilig, ästig. Blätter dicht stehend, freisrund, ganzrandig, wie Dachziegeln über einander liegend. Ohrläppchen gewölbt, pfriemenspizig, an der Basis sackförmig. Afterblätter rundlich, gespalten, gezähnt. Vaterl. Java.

11. *I. squarrosa* Nees. Sparrige Jungermannie.

Stengel gefiedert. Blätter schief, abstehend, freisrund, ganzrandig. Ohrläppchen gewölbt, umgekehrtenförmig. Afterblätter wie Dachziegeln über einander liegend, gespalten, die Einschnitte gegen einander geneigt, buchtig-gezähnt.

12. *I. brunea* Spr.

Stengel gefiedert, tiefbraun. Blätter dichtstehend, zwei-

reihig, ausgebreitet, kreisrund, ganzrandig. Ohrläppchen leulensförmig, an der Basis abgestutzt. Afterblätter gespalten, die Einschnitte keilsförmig, abstehend, eingeschnitten = gezähnt. Wächst auf dem Kap d. g. Hoffn. am Tafelberge. Blüh. Junius.

13. *I. trifaria* Nees.

Stengel zweitheilig, ästig. Blätter herzförmig = kreisrund, ganzrandig; sie liegen wie Dachziegeln über einander und bilden drei Reihen. Ohrläppchen borstförmig. Afterblätter rundlich, gespißt, gespalten. Java.

14. *I. magellanica* Lam.

Stengel kriechend, sehr ästig. Blätter zweireihig, wie Dachziegeln über einander liegend, rund, gefranzt = gewimpert. Ohrläppchen und Afterblätter zweispaltig, leulensförmig. Vaterl. die Magellanische Meerenge.

15. *I. tenuis* Nees.

Stengel kriechenddünn. Blätter lanzettförmig, an der Spitze gekerbt. Ohrläppchen gewölbt. Afterblätter entfernt, sehr klein, gespalten. Java.

16. *I. Hutchinsiae* Hooker.

Stengel gefiedert. Aeste ausgesperrt. Blätter horizontal stehend, länglich = eiförmig, gezähnt. Afterblätter länglich-eiförmig, gespalten, fast gezähnt.

17. *I. denticulata* Weber.

Stengel kriechend, ästig. Blätter wechselnd stehend, durchscheinend, eiförmig, gespißt, gezähnt. Ohrläppchen lappenförmig. Afterblätter rundlich, gespißt, zweilappig.

c. Afterblätter vierspaltig.

18. *I. palpebrifolia* Hooker.

Stengel kriechend, sehr ästig. Blätter zweireihig, horizontal abstehend, eiförmig, gezähnt = gewimpert. Lappchen gespalten, die Einschnitte abwechselnd, leulensförmig. Afterblätter vierspaltig. Wächst in Neuzeeland.

19. *I. clavigera* Hook.

Stengel kriechend, ästig. Blätter wie Dachziegeln über einander liegend, horizontal, eiförmig, schief, ganzrandig. Lappchen zweispaltig, die Einschnitte abwechselnd leulensförmig. Afterblätter vierspaltig, die inneren Einschnitte leulensförmig. Neuzeeland.

20. *I. Menziesii* Hook.

Stengel liegend. Aeste kammförmig gestellt. Blätter zweireihig, horizontal ausgebreitet, eiförmig, gefranzt. Lappchen an den Aesten keulenförmig, an den Stengelblättern lanzettförmig, eingeschnitten = gefranzt. Aesterblätter vierspaltig, die innern Einschnitte keulenförmig.

A. Auriculis planis. Die Ohrlappchen oder Anhänge sind flach, nicht gewölbt oder keulenförmig, wie bei den vorhergehenden Arten.

d. Aesterblätter ungetheilt.

Hierher I. platyphylla Linn. f. Lexic. B. 5. und folgende Arten.

21. *I. laevigata* Schrad.

Stengel sehr ästig. Blätter rundlich = eiförmig, dachziegelförmig gelagert, zwei Reihen bildend, wie die zungenförmigen Ohrlappchen gezähnt. Aesterblätter fast viereckig = länglich, feindornig = gezähnt. Vaterl. Europa.

22. *I. nobilis* Hooker.

Stengel fast aufrecht, knieartig gebogen. Blätter zweireihig, wie Dachziegeln über einander liegend, ungleich, zweilappig, die Lappen gegen einander liegend, gefranzt. Aesterblätter eiförmig, ausgekerbt, gewimpert. Neuseeland.

23. *I. Thuarsii* Hooker.

Stengel aufsteigend, fast ungetheilt. Blätter zweireihig, wie Dachziegeln über einander liegend. Diese Art fand Perist-Thouars auf der Mascaren = Insel.

24. *I. Porella* Dicks. ist *Porella pinnata* Linn.

Vaterl. Nordamerika.

25. *I. Swartziana* Weber.

Vaterl. Westindien.

26. *I. nodulosa* Nees.

Vaterl. Java.

27. *I. cordistipula* Nees.

Aesterblätter umgekehrt = herzförmig. Java.

28. *I. filicina* Swartz.

Vaterl. Westindien, Südamerika und Java.

29. *I. crispata* Hook. Musc. Exot. t. 143.

Diese Art sammelte H. v. Humboldt an Bergen in Quito an schattigen Orten, an den Wurzeln der Eichen.

30. *I. fertilis* Nees.

Neste kählschelförmig. Blätter und Afterblätter ganzrandig, wie Dachziegeln über einander liegend. Java.

31. *I. Blumi* Nees.

Stengel einfach. Afterblätter fast abgestutzt, gewimpert. Java.

e. Afterblätter zweispaltig oder zweitheilig.

32. *I. flagellifera* Hook. Musc. Exot.

Stengel aufrecht. Neste an der Spitze faden = geißelförmig. Blätter zweireihig. Afterblätter zweitheilig, an der Basis mit Anhängen versehen. Neuseeland.

33. *I. gracilis* Nees.

Stengel kriechend, doppelt gefiedert. Afterblätter gespalten, ganzrandig. Java. Brasilien.

34. *I. appendiculata* Hook. Musc. exot.

Stengel aufrecht, fast einfach. Afterblätter zweitheilig, eingeschnitten = gezähnt. Neuseeland.

35. *I. glaucescens* Hook. Musc. exot.

Neuseeland.

36. *I. lamellata* Hook. Musc. exot.

Stengel aufrecht. Blätter zweireihig, ungleich zweilappig, die Lappen länglich, auf dem Rücken mit feindornig = gezähnelten Lamellen versehen. Afterblätter zweitheilig, gezähnt.

B. Blätter und Afterblätter ohne Ohrklappchen.

a. Afterblätter ungetheilt. Blätter ganzrandig.

37. *I. anomala* Hook. Brit. Iung.

Stengel einfach, wurzelnd. Blätter zweireihig, kreisrund. Afterblätter pfriemenspizig. Waterl. Schottland und Irland.

38. *I. compressa* Hook. J. c.

Stengel aufrecht. Blätter zweireihig, aufrecht = angedrückt, kreisrund, flach. Wächst in Irland.

39. *I. Taylora* Hook. J. c.

Stengel aufrecht. Blätter zweireihig, abstehend, aufrecht, fast einseitig, kreisrund. Afterblätter pfriemenspizig. Irland.

40. *I. viticulosa* Linn. f. Lexic. B. 5. (*Calypogeia* Radd.)

41. *I. scalaris* Schrad. (*I. lanceolata* Smith.)

Stengel kriechend. Blätter zweireihig, horizontal abstehend, rundlich, ganzrandig. Afterblätter lanzett-pfriemensförmig. Europa.

42. *I. horizontalis* Hook. Musc. exot.
Stengel lang. Blätter zweireihig. Afterblätter sehr klein, mondförmig.
43. *I. diffusa* Swartz.
Stengel sehr ästig. Aeste weitschweifig, sehr lang. Blätter zweireihig, schief. Afterblätter an der Spitze gezähnt. Westindien.
44. *I. filiformis* Swartz.
Stengel lang, fadenförmig. Blätter wechselnd stehend. Afterblätter groß, fast nierenförmig, ganzrandig. Jamaica.
45. *I. brachiata* Swartz.
Waterl. Jamaica und Guadalupe.
46. *I. transversalis* Swartz.
Waterl. Jamaica.
aa. Blätter gezähnt.
Hierher *I. deflexa* Mart. *I. mastigophora* Spr. *I. Billardieri* Schwaegr. *I. applanata* Nees. und folgenden Arten.
47. *I. scutata* Web. (*I. albescens* Hook. Brit. Iung.)
Stengel kriechend, ästig. Blätter wechselnd stehend, eiförmig, an der Spitze mit zwei Zähnen versehen. Afterblätter angebrückt. Schottland und Deutschland.
48. *I. stipulacea* Hook. Musc. exot.
Stengel aufsteigend, einfach. Blätter zweireihig, an der Spitze ausgekerbt-zweizählig. Afterblätter groß, eiförmig, fast gezähnt. Wächst in Schottland und Irland.
49. *I. cladorrhiza* Nees.
Java.
50. *I. deflexa* Mart. Alp. noric.
51. *I. aselliformis* Nees.
Stengel gestreckt, gabelästig, an der Spitze sprossend. Blätter kreisrund, schief, dicht stehend, wie Dachziegeln übereinander liegend. Waterl. Java.
52. *I. stolonifera* Swartz. (*I. tridens* Nees. *I. tridenticulata* Schwagr.)
Waterl. Java.
53. *I. praerupta* Nees.
Stengel gabelästig, horizontal ausgebreitet, unten geißelförmig. Blätter schief, eiförmig, pfriemenspitzig-dreizählig. Afterblätter fast kreisrund, nierenförmig, ganzrandig. Java.

54. *I. crosa* Nees.

Stengel aufsteigend. Blätter an der Spitze ausgebreitet dreizählig. Java.

55. *I. spiralis* Nees.

Fruchtknoten spiralförmig eingerollt. Java.

56. *I. laricata* Nees.

Stengel unten geiselförmig. Blätter eiförmig, zweireihig, wie die niereenförmigen Austerblätter, dachziegelförmig gelagert über einander liegend.

57. *I. serrulata* Swartz. (*I. Aubertii* Schwägr.)

Jamaika. Insel Mascaren.

58. *I. lunulata* Weber. (*I. Musae* Spr. Ann. Wetterav.

1. p. 25.)

Wächst in Westindien an Banmblättern.

59. *I. holorrhiza* Nees.

Stengel gestielt. Aesthen niederhängend, an der Spitze wurzelnd. Austerblätter niereenförmig, eingeschnitten = gewimpert. Java.

60. *I. spathulifolia* Nees.

Blätter eiförmig, zweireihig. Austerblätter spatelförmig, abgestutzt, an der Spitze gezähnt. Java.

b. Austerblätter mit den Stengeln und Aestblättern zusammenhängend (verbunden).

61. *I. coalita* Hook. Musc. exot.

Waterl. Neuseeland.

62. *I. connata* Swartz.

Westindien.

63. *I. decurrens* Nees.

Blätter zweireihig, eiförmig, stumpf, fast gezähnt. Austerblätter verbunden, feindornig = gezähnt. Java.

† Austerblätter zweilappig, gespalten oder zweitheilig.

a. Blätter ganzrandig.

Hierher *I. polyanthos* Linn. *I. barbata* Schreb. f. Lexic. B. 5. und folgende Arten.

64. *I. Trichomanis* Dicks. (*I. scalaris* Schmid, fissa Scop. *I. sphaerocephala* Wither. *Mnium Trichomanis* et fissum Linn. *Calypogeia* Radd.)

Stengel ästig, gestreckt. Blätter zweireihig, rundlich-eiförmig, angewachsen. Austerblätter zweilappig. Kelche in der Erde liegend, fleischig, behaart. Europa.

65. *I. tenera* Swartz.
Blätter wechselnd stehend, rundlich. Afterblätter zweilappig. Jamaica und Neuspanien.
66. *I. flava* Swartz.
Afterblätter rundlich-herzförmig, gespalten. Jamaica.
67. *I. cuneifolia* Hook. Musc. exot.
Blätter zweireihig, keilförmig. Afterblätter sehr klein, eiförmig, gespalten. Wächst in Irland.
b, Blätter gezähnt, getheilt.
68. *I. graveolens* Schrad.
Blätter spizig, gespalten. Afterblätter lanzettförmig, zweitheilig. Vaterl. Deutschland.
69. *I. Francisci* Hook. Brit. Iungerm.
Blätter wechselnd dichtstehend, eiförmig, wie die Afterblätter gespalten. Wächst in der Schweiz und in England.
70. *I. bidendula* Weber.
Wächst auf dem Kap d. g. Hoffn.
71. *I. uncinata* Web.
Blätter und Afterblätter abstehend, ausgesperrt, mit zweihakenförmig gekrümmten Zähnen. Vaterl. Insel Mascaren.
72. *I. scorpioides* Nees.
Stengel aufrecht. Aeste hängend, wurzelnd. Blätter dreitheilig, auf dem Rücken mit sehr kleinen Spren versehen. Java.
73. *I. calcarata* Nees.
Blätter und Afterblätter auf dem Rücken gespornt. Java.
74. *I. arguta* Nees.
Afterblätter auf dem Rücken gezähnt. Java.
75. *I. Woodsii* Hook. Brit. Iungerm.
Blätter zweireihig, gespalten. Afterblätter zweitheilig, gezähnt, an der Basis an beiden Seiten gespornt. Vaterl. Irland.
76. *I. Hookeri* Dietr. (*I. squarrosa* Hooker. Musc. exot.)
Blätter zweireihig, sparrig, wellenrandig, an der Basis gezähnt. Afterblätterchen zweitheilig. Neuseeland.
Zu dieser Abtheilung gehören noch folgende Arten: *I. diclados*, *hirtella* Web. *I. hexagona* Schwaeg. *I. fimbriata* Hook. Alle 4 wachsen auf d. Ins. Mascaren.

††. Aetherblätter drei oder vielspaltig.

Hierher gehören die im Verikon beschriebenen Arten: *I. bidentata*, *reptans*, *ciliaris* Linn. *I. Tomentella* Ehrh. und folgende.

77. *I. heterophylla* Schrad. (*I. bicuspidata* Smith.)

Blätter zweireihig, eiförmig, die untern zweizählig, obere ausgekerbt, auch gerundet. Aetherblätter meist vierspaltig. Europa.

78. *I. sinuosa* Hook. Musc. exot.

Aetherblätter sechstheilig. Neuseeland.

79. *I. uncigera* Nees.

Aetherblätter eiförmig, eingeschnitten: gezähnt, die Zähne hakenförmig. Java.

80. *I. hamensis* Nees.

Blätter zweireihig, eiförmig, wie die Aetherblätter abgestutzt, vierspaltig, gezähnt: gefranzt. Java.

81. *I. fasciculata* Nees. Hor. phys. Berol. t. 5. f. 4.

Waterl. Kap d. g. Hoffn. am Tafelberge.

82. *I. trilobata* Linn. (*I. radicans* Hofm. *I. tricrenata* Wahlenb.)

Stengel kriechend, fast ästig, wurzelnd. Blätter zweireihig, länglich, an der Spitze stumpf, dreizählig. Aetherblätter 2—4 spaltig. Waterl. Europa und Nordamerika.

83. *I. nitida* Web. (*I. convexa* Thunb.)

Waterl. Kap d. g. Hoffn., am Teufelsberge.

84. *I. cupressina* Swartz. (*I. pendulina* Hooker.)

Jamaika und Neuseeland.

85. *I. capillaris* (*I. crinita* Desv.)

Jamaika, Java und das Kap d. g. Hoffn. am Tafelberge.

86. *I. microphylla* Hook. (*I. trichodes* Nees.)

Neuseeland, Guadalupe und Java.

87. *I. pulchella* Hooker. (*I. capilligera* Schwaegr.)

Stengel lang, sehr einfach. Blätter vierlappig, die Lappen, wie die der fast nierenförmigen Aetherblätter, verlängert, gewimpert. Neuseeland.

88. *I. lanata* Hook. (*I. ulotrix* Schwägr.)

Wollige Jungermannie. Neuseeland.

C. Exstipulatae, *auriculatae* i. e. *foliis inaequaliter bilobis complicatis* Spr.

Die Afterblätter fehlen. Blätter ungleich, zweilappig, geebnet, mit Ohrläppchen versehen.

a. Blätter ganzrandig.

Hierher *I. complanata*, *resupinata* Linn. f. Lexic. I. *Boryana* Web. *I. exilis* Nees *I. cucullatus* Nees.

Waterl. der drei Leptern, Java.

89. *I. saxicola* Schrad.

Stengel fast ästig. Blätter umfassend, horizontal absteigend, rundlich, ungleich zweilappig, die untern Lappen sehr klein, spizlich. Wächst am Meißner und Harze.

90. *I. portoricensis* Spr.

Waterl. Portoriko.

91. *I. exsecta* Schmid. (*I. inflata* Mart.)

Stengel einfach, aufsteigend. Blätter horizontal stehend, ey-lanzettförmig, gespizt, ungleich zweilappig, die untern Lappen sehr klein, angedrückt, zahnförmig. Wächst in Deutschland und England.

92. *I. minuta* Dickson. (*I. Weberi* Mart. *I. bicornis* Web.)

Eine sehr kleine Jungermannie, deren Stengel aufrecht, fast zweitheilig sind. Blätter zweilappig, doppelt zweizählig, die Zähne gespizt. Waterl. Europa, die Schweiz, Deutschland, Schottland und Lappland.

93. *I. taxifolia* Wahlenb. lappon. t. 95. f. 2. a. c. (*I. Dicksoni* Hook. Brit. Jungerm. t. 48.)

Stengel aufsteigend, fast einfach. Blätter zweireihig, ungleich, zweispaltig, geebnet, absteigend, die Einschnitte gespizt, fast ganzrandig. Waterl. Schottland, Irland, Lappland und die Carpathen.

94. *I. obtusifolia* Hook. Brit. Jungerm.

Stengel einfach, aufsteigend. Blätter zweireihig, absteigend, ungleich, zweilappig, ganzrandig, die größern Lappen fast mondförmig, die kleinern eyförmig. Waterl. England.

b. Blätter gezähnt.

Hierher *I. albicans*, *undulata*, *nemorosa* Linn. f. Lexic. B. 5. *I. densifolia*, *pinnatifolia* Hook. Musc. exot. *I. sphagnoides* Rich. und folgende.

95. *I. umbrosa* Schrad.

Stengel aufrecht, fast ästig. Blätter wie Dachziegel über einander liegend, zweireihig, ungleich, zweilappig, gezähnt,

der größere Lappen länglich, langgespitzt, der kleinere eiförmig. Vaterl. Deutschland und England an schattigen Orten.

96. *I. cochleariformis* Weis. (*I. purpurea* Scop. *Mnium Iungermannia* Linn.)

Stengel lang, einfach, gestreckt. Blätter conver, rundlich-eiförmig, an der Spitze ausgekerbt fast gezähnt, ungleich zweilappig, der kleinere Lappen länglich, aufgeblasen. Deutschland und England.

97. *I. curta* Mart.

Stengel abgekürzt. Blätter zweireihig, bachziegelförmig über einander liegend, ungleich zweilappig, die Lappen eiförmig, spitzlich. Vaterl. Deutschland.

D. Keine Afterblätter, keine Ohrblättchen. Blätter ungleich, zweilappig.

a. Blätter zweizählig, die Zähne gespitzt.

Hierher *I. connivens* Dicks. *Iulacea bicuspidata* Linn. f. *Lexic. I. coadunata* Swartz.

Jamaika und Brasilien, und folgende.

98. *I. byssacea* Roth. (*I. bifida* Smith *I. divaricata* Engl. bot. 719.)

Stengel kriechend, fadenförmig, an der Spitze Früchte tragend. Europa und Nordamerika.

99. *I. excisa* Dicks. (*I. Ehrhardiana* Weber.)

Stengel einfach, gestreckt, an der Spitze Früchte tragend. Blätter zweireihig, gespalten. Europa und Nordamerika.

100. *I. curvifolia* Dicks.

Stengel gestreckt, fast ästig, wurzelnd. Blätter an der Basis kreisrund, concav, zweispaltig, die Zähne verlängert, pfriemenspizig, gekrümmt. England.

101. *I. Turneri* Hook. Brit. Iungerm. (*I. dentata* Radd.)

Stengel gestreckt, wurzelnd, an der Spitze Früchte tragend. Blätter halb umfassend, breit, eiförmig, zweitheilig, die Einschnitte gespitzt, gezähnt. Irland und Italien.

102. *I. juniperina* Swartz. (*I. adunca* Dicks.)

Stengel aufrecht, einfach. Blätter dicht stehend, lanzettlich, fast schelfförmig, einseitig, zweitheilig, die Theile langgespitzt, ganzrandig. Schottland, Irland und Westindien.

103. *I. laricifolia* Hook. Brit. Iungerm.

Stengel aufrecht, fadenförmig. Blätter entfernt stehend,

vierreihig, eiförmig, fast gekielt, zweispaltig, die Einschnitte aufrecht, ganzrandig. Irland.

b. Blätter stumpf, zweizählig oder zweilappig.

Hierher *I. ventricosa* Dicks. *I. orcadensis* Hook.

I. fluitans Nees. und folgende.

104. *I. inflata* Huds.

Stengel gestreckt. Aeste aufrecht. Blätter entfernt stehend, stumpf, zweizählig, die Zähne fast ungleich, die Buchten gespißt. Europa.

105. *I. concinnata* Lighlf.

Stengel aufrecht, fast ästig. Aeste an der Spitze verdickt. Blätter zweireihig, eiförmig, concav, stumpf, zweizählig. Deutschland und England.

106. *I. emarginata* Ehrh. (*I. macrorrhiza* Dicks.)

Stengel aufrecht, fast ästig. Blätter schlaff, abstehend, umgekehrteiförmig, ausgekerbt. Europa.

c. Blätter 3—5 spaltig.

Hierher *I. trichophylla*, *pusilla*-Linn. *I. setiformis* Ehrh. Hofm. f. Lexic. *I. quadripartita* Hook. Musc. exot. und folgende Arten.

107. *I. setacea* Web. (*I. multiflora* Huds. *I. sertularioides* Linn. Suppl.)

Stengel kriechend, ästig. Blätter dicht stehend, zart, 2—3 theilig. Rösche röhrig. Europa.

108. *I. incisa* Schrad.

Stengel gestreckt, wurzelnd. Blätter umfassend, fast vieredig, wellenrandig, fast dreispaltig, gezähnt. Europa.

E. Foliis indivisis. Blätter ungetheilt.

a. Blätter sägerandig.

Hierher *I. asplenioides* Linn. f. Lexic. *I. contracta*, *opposita* Nees. Waterl. Java und folgende.

109. *I. Donniana* Hook. Brit. Iungerm.

Stengel aufrecht, einfach, knieartig gebogen. Blätter lanzettlich, einseitig, angewachsen, am Rande zurückgerollt, an der Spitze gezähnt. Waterl. Schottland.

110. *I. simplex* Swartz.

Waterl. Jamaica und Java.

111. *I. patula* Swartz. (*I. bursata* Desv, *Lycopodium pinnatum* Lam.)

Westindien.

112. *I. adiantoides* Swartz.

Stengel aufrecht, zweitheilig. Blätter zweireihig, horizontal abstehend, halb-eiförmig, gezähnt = gewimpert. Westindien.

113. *I. cristata* Swartz.

Stengel fast getheilt. Blätter zweireihig, umfassend, herzh = lanzettförmig, an der Basis am Rande abwechselnd gezähnt = gefranzt, abwechselnd ganzrandig. Jamaica.

114. *I. bufaria* Swartz.

Blätter zweireihig, umfassend, eiförmig, gezähnt. Jamaica.

115. *I. spinulosa* Dicks. (*I. serrata* Roth. *I. tridentata* Michx.)

England und Nordamerika.

116. *I. saccata* Hook. Musc. exot.

Neuseeland.

117. *I. falcata* Hook. Musc. exot. et ramosissima, gigantea Hooker. J. c.

Neuseeland. *I. javanica* Swartz. Java.
b. Blätter ganzrandig.

118. *I. Schraderi* Mart.

Stengel kriechend. Blätter zweireihig, rundlich, ganzrandig. Kelche gipfelsändig. England und Deutschland.

119. *I. Sphagni* Dicks.

Wächst in Sümpfen auf Torfmoosen in Europa und Nordamerika.

120. *I. crenulata* Smith. (*I. gracillima* Sm. *I. prostrata* Swartz.)

Jamaica.

121. *I. cordifolia* Hooker.

Blätter herzh-eiförmig, umfassend, scheidenartig, ganzrandig. Schottland, Norwegen und auf den Sudeten.

122. *I. hyalina* Hook. Brit. Jungerm. t. 63.

Wächst in Schottland und Irland, auch auf dem Kap d. g. Hoffn. in Eichenwäldern am Teufelsberge, auf der Erde.

Zu dieser letzten Abtheilung mit Stengeln und ganzrandigen Blättern gehören noch folgende Arten: *I. denudata*

Nees. Deutschland. *I. repanda* Schwaeg. Insel Mascaren.

I. pallens et *perfoliata* Swartz. Beide in Jamaica.

II. Frondescens. Laubige Jungermannien.

† Laub

† Laub ohne Rippen.

I. pinguis, multifida Linn. f. Lexic. B. 5. und folgende Arten,

123. I. bipinnata Swartz.

Laub niederliegend, doppelt gefiedert, häutig, die Fiedern zweireihig, abstehend, linienförmig. Kelche seitenständig, behaart. Jamaica und Guadelupa.

124. I. sessilis Spr.

Laub liegend, länglich, buchtig, fast ästig. Kelch fehlt. Büchse stiellos. Neuspanien.

†† Laub gerippt.

a. niederliegend.

Hierher I. epiphylla, furcata Linn. f. Lexic. B. 5. und folgende Arten.

125. I. Blasia Hook. brit. Iungerm. t. 82—84. (Blasia pusilla Linn.)

Laub gabelästig, gestreckt. Aeste länglich, stumpf, gekerbt. Borste verlängert. Saamen 2—4, häutig, eingerollt. Europa.

126. I. pubescens Schrank. (I. tomentosa Hoffm. f. Lexic. B. 5. S. 170.)

127. I. Lyelli Hook. brit. Iungerm.

Laub gestreckt, länglich, stumpf, fast getheilt, häutig, wellenrandig, fast ganzrandig. Kelche doppelt gefranzt, der innere walzenrund, verlängert. Haube hervorstehend, glatt. Schottland und Irland.

128. I. hibernica Hook. brit. Iungerm. (I. biloba Swartz. Web.)

Laub gestreckt, länglich, stumpf, gabelästig, ganzrandig, glatt. Kelch doppelt, der innere lang hervorstehend, walzenrund. Irland und Schottland.

129. I. rhizophora et ulviformis Nees.

Beide Arten wachsen in Java.

b. Laub aufrecht.

130. I. podophyllum Thunb. (I. hymenophyllum Hook. Musc. exot.)

Laub aufrecht, mit einem Strunk versehen, zweitheilig, flach, glatt, sägerandig. Kelch doppelt, der innere walzenrund. Neuseeland.

131. I. flabellata Labillard.

Laub gestielt, aufrecht, kreisrund, handförmig, glatt, die

Dietr. Lex. 2r. Nachtr. IV. Bd.

U u

Einschnitte linienförmig, stumpf, gespalten. Kelch doppelt, der innere walzenrund. Neuholland und Neuseeland.

132. *I. Phyllanthus* Hook. Musc. exot.

Laub gestielt, länglich, stumpf, einfach, wellenrandig. Kelch doppelt, der innere walzenrund. Neuseeland.

133. *I. rhizoloba* Schwägr.

Laub gestielt, länglich, gespalten, gezähnt, an der Spitze sehr lang, verdünnt, wurzelnd. Insel Mascaren.

134. *I. fucoides* Swartz.

Laub gestielt, aufrecht, fast doppelt gefiedert. Aestchen linnenförmig, stumpf, abgekürzt. Westindien.

135. *I. eriocaulon* Hooker. Musc. exot.

Stengel kriechend, sitzig = wollig. Laub abwechselnd eiförmig, doppelt fiederspaltig, glatt. Neuseeland.

Außer den vorstehenden Jungermannien sind in einigen Schriften noch folgende neue Arten aufgeführt und beschrieben.

1) In Syst. Veg. ed. Sprengel Curæ posteriores p. 324. *I. Eckloni*. Spr. Kap d. g. Hoffn. *I. denticulata* Web. *I. conferta*, *pellucida*, *formosa*, *globosa*, *longifolia* Meissn. *I. nepalensis*, *brunea*, *ochroleuca*, *nervosa*, *taularis* Spr. Kap d. g. Hoffn. *I. superba* Nees.

2) In Schlechtendal's Linnaea vierter Band, drittes Heft. 1829. S. 358—370. *I. alata*, *fusca*, *expansa*, *vermicularis*, *flexuosa*, *semiteres*, *muricata*, *scariosa*, *congesta*, *colorata*, *tenuissima*, *aurita*, *fastigiata*.

Diese neuen Arten hat H. Prof. Schlechtendal in erwähnter Linnaea bestimmt und mit Diagnosen versehen.

Beim Anfange dieser Abhandlung habe ich schon bemerkt, daß bei weitem der größere Theil der zahlreichen Jungermannien andern Welttheilen, vornehmlich warmen Ländern angehören und in unsern bot. Gärten selten und dann nur mit großer Mühe und Sorgfalt kultivirt werden können, daher habe ich manche Arten, besonders solche, deren Selbstständigkeit als Art noch zweifelhaft zu seyn scheint, nicht beschrieben, sondern nur ihre Namen und Vaterland angegeben, denn was nützt dem verehrlichen Leser eine ausführliche Charakteristik solcher Pflanzen, die er im lebenden Zustande nicht beobachten und vergleichen kann? die nur in reichen Herbarien sich finden, oder in Abbildungen wie z. B. in Hooker's schätzbaren Werken u. a. Ueberdies darf man auch manchen

Abstract

Digitized by Google

	Seite		Seite
Ephen	324	Galactie	74
Erdbeere	44	Galardie	77
Erdpalme	129	Galaga	78
Erdrauch	65	Galenie	80
Esehe	49	Galinsogea	94
		Gaulttherie	107
F.		Gazanie	111
		Geerie	113
Fabiana	1	Geisraute	78
Fabricie	1	Geissois	113
Fagonia	4	Genipa	116
Faltenschwamm	389	Geodorum	128
Farfetie	6	Geoffräe	128
Feda	8	Geophila	135
Feigenbaum	23	Georgine	135
Ferkelkraut	550	Gerardie	145
Ferrarie	13	Gerbera	148
Flacourtie	38	Gerste	476
Flatovic	41	Giste	150
Flindesse	39	Gilliesie	159
Forstolea	42	Ginster	116
Francoa	46	Glaphirie	163
Frankenie	46	Gleichenie	166
Franzengriffel	29	Glimis	170
Franzosenholz	261	Globba	171
Fuchsie	58	Glorinie	178
Funkia	68	Glycine	179
Fusanus	70	Glycosmis	184
		Gmeline	186
G.		Gnadenkraut	238
		Gnidie	200
Gahnia	73	Goboya	202
		Gdthea	202

	Seite		Seite
Goldbachie	203	Habligie	305
Gomesie	204	Härstling	555
Gomphie	207	Hahnenkopf	359
Gomphilobium	211	Hakea	310
Gomutus	218	Halbblume	392
Gongore	219	Haleffe	313
Gonosolus	220	Hallerie	314
Gonzalie	223	Hallie	315
Goodpere	229	Hamadryade	317
Gordonie	230	Hamiltonie	319
Gouanie	232	Hancornie	320
Grateolopie	237	Harpullie	321
Gratiola	238	Harrachie	321
Grevillea	244	Hartheu	524
Grewie	250	Hasseltie	323
Grindelia	260	Hautfarn	511
Guarea	262	Haynie	323
Guardiola	262	Hedycarie	326
Guetterie	263	Hedycarpus	325
Güldenstädtie	271	Hedysmum	333
Gulielmapalme	274	Heilkraut	398
Gundermann	165	Heisterie	353
Gunnera	274	Helenie	334
Gymnadenie	274	Heliconie	369
Gymnandra	275	Heliopsis	378
Gynnema	277	Hellenie	314
Gymnogramme	278	Helonias	386
Gynerium	291	Helosia	387
Gyneterie	292	Helospora	388
Gynocardie	292	Helvella	389
Gypsifraut	293	Hemiantra	391
		Hemianthus	392
		Hemigenie	392
Habichtsfraut	433		

h.

	Seite		Seite
Hemiphragma	395	Hornmohn	164
Hemistemma	395	Hornſchuchie	477
Herbeſtes	405	Hortie	478
Hermannie	401	Hottonie	479
Hermefie	404	Honſtonie	479
Hesperis	409	Hovea	481
Heteranthere	411	Hovenie	482
Heuchere	415	Hoya	482
Heurnie	416	Hudsonie	484
Heynea	419	Hüllmoos	42
Hibbertie	419	Hülſen	579
Hibiscus	422	Huſeiſen	452
Hilarie	446	Hunterie	485
Hillia	447	Hutſinſie	486
Hippie	448	Hyacinthe	487
Hippocratee	450	Hybanthus	488
Hiptage	453	Hydrangea	494
Hiräe	454	Hydromyſtria	505
Hirtelle	455	Hydropithyon	507
Hoffmannie	459	Hygrophila	507
Hoffmannſeggie	460	Hymenauthera	509
Hoigia	461	Hymevelle	509
Holarrhee	463	Hymenopogon	519
Holböllie	465	Hymenospron	519
Holigarna	465	Hyphäne	536
Holmſkiöldie	465	Hypoläna	555
Holoſtemme	466		
Homalanthus	466		
Homalium	467		
Hombanthus	468		
Honiggras	463		
Hookerie	469		
Hoppea	476		

J.

Jacaranda	562
Jackia	503
Jacksonie	564
Jacquinia	565

	Seite		Seite
Adgeria	567	Kranzblume	326
Jambolane	567	Kreisel Frucht	297
Janipha	568	Kugelamaranth	212
Jassone	569	Kugelblume	174
Jasmin	570	Kuhbaum	76
Jatropha	574		
Jbisch	422	L.	
Jcacina	578	Labkraut	83
Jchnocarpus	578	Lappenblume	523
Jncarvillea	591	Leinblume	558
Indigo	592	Locustabaum	508
Jnga	601		
Johannis kraut	624	M.	
Johnia	609	Manschenilbaum	453
Johsonia	609	Meergras	61
Joliffia	610	Meerträublein	316
Jonidium	611	Meisterwurz	590
Josephine	615	Mischbaum	76
Jresine	627		
Jriarte a = Palme	629	N.	
Jris	631	Nachtviole	409
Jschilos	642	Nagelbeere	205
Jsoyprum	646	Nehfarn	394
Jtea	647	Nieswurz	383
Jubäapalme	647		
Juncus	649	D.	
Jungermannie	659	Ohring	333
R.		P.	
Renlenschwamm	388	Papiertilie	154
Kleber	504	Pferdehufhülse	452
Knorpelblume	582	Prachtferze	101
Knorpelketch	582		

	Seite		Seite
Prachtlilie	175	Sonnenrose oder Röschen	356
Purgierkraut	238	Sonnenwende	380
		Springsaame	586
Q.		Stachelfrucht	488
Quellmoos	42	Stachelschwamm	489
		Stechpalme	579
R.		Stechenkraut	13
Rinnenblume	506	Stielholde	403
Röhrlein Kraut	338	Storchschnabel	137
Ruhrkraut	186	Straußfeder	627
		Strichfarn	235
S.		Süßholz	185
Sattelbaum	2		
Schachblume	55	S.	
Schleifenblume	576	Taglilie	391
Schmalzkraut	9	Tang	61
Schneeglöckchen	77	Tannenweibel	453
Schraubenbaum	371	Trichterwinde	616
Schuppengras	659		
Schwertel	631	W.	
Schwertlilie	631	Waid	637
Schwindblume	386	Wallnuß	648
Schwingel	16	Wassernabel	497
Sedtenkraut	13	Winterblume	212
Siegwurz	160		
Simse	649	3.	
Sonnenblume	363	Zaubernuß	318
Sonnenfrucht	374	Zügelblume	298

Verbesserungen.

Seite	27	Seite	12	von unten statt Amplos lies Ampelos.
—	37	—	9	von unten st. Decronum l. Dicranum.
—	43	—	15	von unten st. Forsythea l. Forsythia.
—	49	—	16	von unten st. fuscifolia l. fucifolia.
—	56	—	18	von unten hinter barbata setze Kunth.
—	60	—	3	von unten st. Saamen l. Stamm.
—	64	—	14	st. Weigeti l. Weigelti.
—	68	—	16	v. unt. hinter hibernica setze Hooker.
—	76	—	9	v. unt. st. Brosimii l. Brosimi.
—	77	—	21	v. unt. streiche: Halbboden.
—	77	—	7	v. unt. st. Alisium l. Alysium.
—	83	—	14	st. verlesina l. Verbesina.
—	120	—	2	v. unt. st. dianchoides l. Dianthoides.
—	142	—	6	v. unt. st. völlig l. wollig.
—	155	—	14	v. unt. st. Aster l. Asterblätter.
—	188	—	20	st. Astalma l. Astelma.
—	213	—	9	st. Blättchen l. Blätter.
—	234	—	15	v. unt. hinter Graham setze: ein Schott-
				länder, jetzt Professor der Botanik in Edinburgh.
—	243	—	14	v. unt. st. stehend l. stehend.
—	262	—	5	st. festsändig l. festsändig.
—	269	—	4	st. umellata l. umbellata.
—	274	—	13 u. 14	v. u. st. Excocaria l. Excoccaria.
—	298	—	4	st. Gyonium vellatum l. Gyronium vil-
				leum.
—	334	—	3	v. unt. st. leucaphylla l. leucophylla.
—	402	—	2	v. unt. st. Blumenstamm l. Blumenstand.
—	423	—	17	st. Du l. D.
—	427	—	9	st. Bosc. l. Basse.

In der J. Ebner'schen Buchhandlung in Ulm ist zu haben und wird auch in andern Buchhandlungen Bestellung darauf angenommen:

Reider, J. E. v., die Beschreibung und Kultur der Georginen, Pänien und Amaryllis, um sie mit geringen Kosten zu erziehen, sicher zu erhalten und immer mehr zu vervollkommen; so wie auch neue Arten zu erzielen und schnell zu vermehren. 8. I fl. 12 fr.

— die Beschreibung und Kultur der Calceolarien, Lilien und Rhododendra. 8. I fl.

— die Beschreibung und Kultur der Azaleen, Cactus, Camellien und Calla aethiopica. 8. I fl. 20 fr.

Dietrich, F. G., der Wintergärtner; oder Anweisung, die beliebtesten Rhododendren oder Stierpflanzen ohne Treibhäuser und Mistbeete in Zimmern, Kellern und andern Behältern zu überwintern, oder für den offenen Garten vorzubereiten. Fünftete verm. Auflage. 8. I fl. 30 fr.

— die Gemüse- und Fruchtspeisewärterin; oder Anweisung, alle Arten von grünen und trockenen Gartengewächsen aufzubehalten, vor dem Verwelken, Erfrieren oder Verfaulen zu bewahren. 8. 48 fr.

Anweisung, vollständige, von seltener Schönheit und Größe, Blumen, als: Amaryllis, Aster, Aurikeln, Azaleen, Balsaminen, Cactus, Calla, Camellien, Georginen, Geranien, Goldlack, Hortensien, Hyacinthen, Leukoyen, Lilien, Nelken, Pänien, Pechnecken, Primeln, Reseden, Rittersporn, Rhododendra, Rosen und Tulpen, theils auf die leichteste Art in freiem Lande, wie in Töpfen zu erziehen, sie lang zu erhalten und theils daraus vorzüglich guten Saamen zu sammeln. 7 Hefte, jedes Heft 48 fr.

Anweisung, vollständige, die so geschätzte Hortensie, dergleichen auch gefüllte Leukoyen und Aster auf die leichteste Art zu erziehen, sie lange zu erhalten, und daraus vorzüglich guten Saamen zu sammeln. 8. 48 fr.

Bodenmüller, Dr. B., der Schlaf und die Erfordernisse zu Erzielung eines gesunden und naturgemäßen Schlafes. 8. 56 fr.

Bienenzucht, die, in ihrem ganzen Umfange, oder leichtfaßliche Anweisung zur Behandlung der Bienen 2c. 2c. 8. I fl.

Unterricht, gründlicher, in der Naturgeschichte der Kanarienvögel, oder Anweisung, wie die Kanarienvögel im Käfig und in der Hecke zu behandeln sind, was der Liebhaber bei deren Aufzucht, Fütterung, Heckezeit und Heilung der Krankheiten zu beobachten, und worauf man beim Einkaufe derselben zu sehen hat. Nebst Anleitung, wie man den jungen Kanarienvögeln Lieder und andere Stückchen am leichtesten beibringen und sie pfeifen lernen kann, und genauer Beschreibung aller derjenigen wilden Vögel, welche man mit den Kanarienvögeln paaren und von ihnen Junge ziehen kann. 8. 54 fr.

Ardeni, M. Ph., Unterricht in den neuesten und vortheilhaftesten Heizungsmethoden. Enthaltend eine gründliche Anleitung zur besten und wohlfeilsten Erbauung und Einrichtung der Kamine, Schornsteine, Oefen und Wärmeträger, zur Dampf- und Luftheizung. Ein nothwendiges Handbuch für Ofenfabrikanten, Lösser, Maurer, Manufakturbesitzer. Mit 4 Kupfertafeln. 8. 2 fl. 30 fr.



	Seite		Seite
Jägeria	567	Kranzblume	326
Jambolane	567	Kreiselfrucht	297
Janipha	568	Kugelararantb	212
Jasione	569	Kugelblume	174
Jasmin	570	Kupbaum	76
Jatropha	574		
Jbisch	422	P.	
Jcacina	578	Labkraut	83
Jchnocarpus	578	Lappenblume	523
Jcarvillea	591	Leinblume	558
Indigo	592	Locustabaum	508
Inga	601		
Johannisbraut	524	M.	
Johnia	609	Manschenilbaum	453
Johnsonia	609	Meergras	61
Joliffia	610	Meerträublein	316
Jonidium	611	Meisterwurz	590
Josephinie	615	Milchbaum	76
Jresine	627		
Jriarte = Palme	629	N.	
Iris	631	Nachtviole	409
Isochilos	642	Nagelbeere	205
Isoyrum	646	Nesfarn	394
Itea	647	Nieswurz	383
Jubäapalme	647		
Juncus	649	D.	
Jungermannie	659	Ohrling	333
		P.	
Kentenschwamm	388	Papiertilie	154
Kleber	504	Pferdehufhülse	452
Knorpelblume	582	Prachtferze	101
Knorpelketch	582		

	Seite		Seite
Prachtlilie	175	Sonnenrose oder Röschen	356
Purgierkraut	238	Sonnenwende	380
		Springsaame	586
Q.		Stachelfrucht	488
Quellmoos	42	Stachelschwamm	489
		Stechpalme	579
R.		Stechkraut	13
Rinnenblume	506	Stielbolbe	403
Röhrlin kraut	338	Storchschnabel	137
Ruhrkraut	186	Straußfeder	627
		Strichfarn	235
S.		Süßholz	185
Sattelbaum	2		
Schachblume	55	S.	
Schleifenblume	576	Taglilie	391
Schmalzkraut	9	Tang	61
Schneeglöckchen	77	Tannenwedel	453
Schraubenbaum	371	Trichterwinde	616
Schuppengras	639		
Schwertel	631	W.	
Schwertlilie	631	Waid	637
Schwindblume	386	Wallnuß	648
Schwingel	16	Wassernabel	497
Sedakraut	13	Winterblume	212
Siegwurz	160		
Simse	649	3.	
Sonnenblume	363	Seubernuß	318
Sonnenfrucht	374	Sügelblume	298

Verbesserungen.

Seite 27	Zeile 12	von unten statt Amplos lies Ampelos.
— 37 —	9	von unten st. Decronum l. Dicranum.
— 43 —	15	von unten st. Forsythea l. Forsythia.
— 49 —	16	von unten st. fuscifolia l. fucifolia.
— 56 —	18	von unten hinter barbata setze Kunth.
— 60 —	3	von unten st. Saamen l. Stamm.
— 64 —	14	st. Weigeti l. Weigelti.
— 68 —	16	v. unt. hinter hibernica setze Hooker.
— 76 —	9	v. unt. st. Brosimii l. Brosimi.
— 77 —	21	v. unt. streiche: halbboden.
— 77 —	7	v. unt. st. Alisium l. Alysium.
— 83 —	14	st. verlesina l. Verbesina.
— 120 —	2	v. unt. st. dianchoides l. Dianthoides.
— 142 —	6	v. unt. st. völlig l. wöllig.
— 155 —	14	v. unt. st. Aster l. Asterblätter.
— 188 —	20	st. Aftalma l. Astelma.
— 213 —	9	st. Blättchen l. Blätter.
— 234 —	15	v. unt. hinter Graham setze: ein Schott- länder, jetzt Professor der Botanik in Edinburgh.
— 248 —	14	v. unt. st. stehend l. stehend.
— 262 —	5	st. festsändig l. festsändig.
— 269 —	4	st. umellata l. umbellata.
— 274 —	13 u. 14	v. u. st. Excocaria l. Excoccaria.
— 298 —	4	st. Gyonium vellatum l. Gyronium vil- leum.
— 334 —	3	v. unt. st. leucaphylla l. leucophylla.
— 402 —	2	v. unt. st. Blumenstamm l. Blumenstand.
— 423 —	17	st. Du l. D.
— 427 —	9	st. Bosc. l. Basse.

In der J. Ebner'schen Buchhandlung in Ulm ist zu haben und wird auch in andern Buchhandlungen Bestellung darauf angenommen:

Reider, J. C. v., die Beschreibung und Kultur der Georginen, Päonien und Amaryllis, um sie mit geringen Kosten zu erziehen, sicher zu erhalten und immer mehr zu vervollkommen; so wie auch neue Arten zu erzielen und schnell zu vermehren. 8. I fl. 12 fr.

— die Beschreibung und Kultur der Calceolarien, Lilien und Rhododendra. 8. I fl.

— die Beschreibung und Kultur der Azaleen, Cactus, Camellien und Calla aethiopica. 8. I fl. 20 fr.

Dietrich, F. G., der Wintergärtner; oder Anweisung, die beliebtesten Modeblumen oder Stierpflanzen ohne Treibhäuser und Mistbeete in Zimmern, Kellern und andern Behältern zu überwintern, oder für den offenen Garten vorzubereiten. Fünftc verm. Auflage. 8. I fl. 30 fr.

— die Gemüse- und Fruchtspeisewärterin; oder Anweisung, alle Arten von grünen und trockenen Gartengewächsen aufzubehalten, vor dem Verwelken, Erfrieren oder Versaulen zu bewahren. 8. 48 fr.

Anweisung, vollständige, von seltener Schönheit und Größe, Blumen, als: Amaryllis, Aster, Aurikeln, Azaleen, Balsaminen, Cactus, Calla, Camellien, Georginen, Geranien, Goldlack, Hortensien, Hyacinthen, Levkoyen, Lilien, Nelken, Päonien, Pechnecken, Primeln, Reseden, Rittersporn, Rhododendra, Rosen und Tulpen, theils auf die leichteste Art in freiem Lande, wie in Töpfen zu erziehen, sie lang zu erhalten und theils daraus vorzüglich guten Saamen zu sammeln. 7 Hefte, jedes Heft 48 fr.

Anweisung, vollständige, die so geschätzte Hortensie, dergleichen auch gefüllte Levkoyen und Aster auf die leichteste Art zu erziehen, sie lange zu erhalten, und daraus vorzüglich guten Saamen zu sammeln. 8. 48 fr.

Bodenmüller, Dr. B., der Schlaf und die Erfordernisse zu Erzielung eines gesunden und naturgemäßen Schlafes. 8. 56 fr.

Bienenzucht, die, in ihrem ganzen Umfange, oder leichtfaßliche Anweisung zur Behandlung der Bienen &c. &c. 8. I fl.

Unterricht, gründlicher, in der Naturgeschichte der Kanarienvögel, oder Anweisung, wie die Kanarienvögel im Käfig und in der Hecke zu behandeln sind, was der Liebhaber bei deren Aufzucht, Fütterung, Heckezeit und Heilung der Krankheiten zu beobachten, und worauf man beim Einkaufe derselben zu sehen hat. Nebst Anleitung, wie man den jungen Kanarienvögeln Lieder und andere Stückchen am leichtesten beibringen und sie pfeifen lernen kann, und genauer Beschreibung aller derjenigen wilden Vögel, welche man mit den Kanarienvögeln paaren und von ihnen Junge ziehen kann. 8. 54 fr.

Urdenni, M. Ph., Unterricht in den neuesten und vortheilhaftesten Heizungsmethoden. Enthaltend eine gründliche Anleitung zur besten und wohlfeilsten Erbauung und Einrichtung der Kamine, Schornsteine, Oefen und Wärmeträger, zur Dampf- und Luftheizung. Ein nothwendiges Handbuch für Ofenfabrikanten, Töpfer, Maurer, Manufakturbesitzer. Mit 4 Kupfertafeln. 8. 2 fl. 30 fr.



